


Thy 4.
405^{III}

2007, 11.11.11



Enumeratio
der
Flora von Deutschland
und der
angrenzenden Länder

im
ganzen Umfange von Reichenbach's Flora germanica excursoria, vom Mittelländischen Meere bis zur Nord- und Ost-See.

Geordnet

nach dem natürlichen Systeme von De Candolle und der Reihenfolge von Koch's Synopsis, mit allen Synonymen, Varietäten und Fundorten, unter besonderer Berücksichtigung der Gegenden am Rheine

bearbeitet von

Math. Jos. Löhr,

Apotheker zu Köln a. R. früher in Trier, Vicedirector des Apothekervereins in Norddeutschland, Mitglieder mehrerer botanischen und naturhistorischen Gesellschaften.

Braunschweig,
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1852.

178. *J.*



Dem

hochverdienten, deutschen Botaniker

Herrn Hofrath

Dr. H. G. Ludw. Reichenbach,

Ritter des Königl. Sächsischen Ordens für Verdienst und Treue,
Professor der Naturgeschichte und Director des botanischen Gartens
an der Königl. medicinisch-chirurgischen Academie in Dresden und
vieler gelehrten und naturwissenschaftlichen Vereinen und
Gesellschaften Mitgliede etc.

widmet diese Schrift

als Zeichen seiner ausgezeichneten Hochachtung

der

V e r f a s s e r.

V o r w o r t.

Die erste Idee zu dieser Zusammenstellung einer »Enumeratio plantarum« der Flora von Deutschland, in dem ganzen Umfange von Reichenbach's Flora germanica excursoria, nach dem Systeme Decandolle's, in der Reihenfolge von Koch's Synopsis, Flora Germanica et Helvetica edit. II. und desselben Taschenbuch der Deutschen und Schweizer Flora geordnet, entstand bei der Revision meines Herbariums; weil man bei der Masse von Synonymen eine Zahl von Bücher nachschlagen mußte, um sich aus dem Chaos herauszuhelfen; dieses mir zu erleichtern und ein systematisches Ganze zu haben, unternahm ich die Arbeit.

Bei der Ausführung dieser, mit Ausdauer und nicht wenigen Schwierigkeiten verbundenen Arbeit, welche die Mußestunden einiger Jahre ausfüllten, wurde zuletzt mehr als ein systematisches Verzeichniß, für welchen Zweck ich die Aufzählung zu meinem Gebrauche begonnen hatte, und es entstand nun statt einem einfachen Verzeichnisse eine Enumeratio plantarum mit

allen Synonymen, Varietäten und Fundorten 2c. — In wie fern ich nun die mir später gestellte Aufgabe einigermaßen in wissenschaftlicher Beziehung gelöst habe, überlasse ich der billigen Beurtheilung Derjenigen, welche die Schwierigkeiten einer solchen umfassenden Arbeit ermessen können und wollen! Bewußt bin ich mir nur, allein im Interesse der Wissenschaft, für dieses Buch alle Mittel, welche mir zu Gebote standen, nach bester Einsicht und nach Kräften benutzt zu haben.

Ob schon ein solches Werk nicht allen Anforderungen entsprechen kann — so bin ich doch der Ansicht, daß das Buch gewiß vielen erwünscht sein wird, weil es in den angezogenen Grenzen ein treues Bild dieser Flora enthält, zum Ordnen von Herbarien ein bedeutendes Hülfsmittel abgibt, und bei Bearbeitung einer vollständigen Flora von erheblichem Nutzen sein wird.

Die Enumeratio umfaßt die Flora innerhalb ganz Deutschland, der ganzen Schweiz und der angrenzenden Länder »oder fast von Mittel-Europa«; sie erstreckt sich von Elsaß nach Luxemburg, Belgien längs der Nordsee-Küste nach Holland, Holstein u. Schleswig an der Ostsee bis Ostpreußen, durch Galizien nach Siebenbürgen, Ungarn längs dem südlichen Littoral, des Adriatischen Meeres nach Istrien, Croatien, Dalmatien, Venedig durch die Lombardei nach Piemont zum Mitteländischen Meere bis Genua, Nizza 2c.

Sie enthält in diesem Umfange in 134 Ordnungen (Familien); 894 Genera und circa 5000 Species. — Die Genera sind mit fortlaufenden Zahlen nach

Roch's synopsis edit. II. geordnet, mit den Classen nach Linné und den Namen der Autoren nach den angezogenen Werken von K. syn., Rehb. exc., Bluff und Fingerhuth, Comp. fl. g. u. versehen und im Register nach ihren fortlaufenden Zahlen zu finden.

Die angenommenen Species sind: 1) mit dem Namen der Autoren, nach K. syn. für die Deutsche und Schweizer Flora, die dort nicht beschriebenen mit Rehb. exc. oder Comp. etc. bezeichnet und die ohne Autor mit einem Sternchen versehenen Species sind mit Angabe der Quellen von mir benannt; 2) sind möglichst alle bekannten Synonymen und allgemein angenommenen Varietäten gehörigen Ortes angeführt; 3) sind citirt die Abbildungen Reichenbach's Icones von Deutschlands Flora u. Leipzig. 1845 bis 1850; 4) sind die bis jetzt als bestimmt bekannten und in den verschiedenen Werken aufgeführten Fundorte, dem vorgesezten Zwecke der Enumeratio entsprechend, möglichst getreu, mit Berücksichtigung der geognostischen Verhältnisse angegeben und nach den verschiedenen Ländern und Provinzen besonders vollständig für die Gegenden am Rheine soviel als thunlich aus den citirten Werken geordnet, so daß man zugleich eine übersichtliche Statistik der Verbreitung der Pflanzen von den nördlichsten Grenzen des Gebietes bis zu den südlichsten oder fast von der ganzen mitteleuropäischen Flora hat; 5) sind Blüthezeit mit den Zahlen der Monate und Ausdauer mit den gewöhnlichen Zeichen ☉, ☼, 4, 5, zusezt.

Meine Absicht war anfangs, die ersten Finder der Pflanzen anzugeben, aber bei der Arbeit sah ich bald

ein, daß es unmöglich war, dieses richtig durchzuführen, und mußte mich begnügen, die bei dem Buche benutzten Werke getreu anzugeben.

Im Vertrauen auf die nur aus Liebe zur Sache vollendeten Enumeratio übergebe ich dieselbe hiermit der Oeffentlichkeit. — Mögen billige Richter die Mängel beurtheilen, aber den Zweck des Buches, das Bestreben, nützlich zu sein, wie die Schwierigkeiten einer solchen Arbeit nicht verkennen. —

Edln im Juli 1850.

Der Verfasser
M. J. Vöhr.

U e b e r s i c h t

der

in der Enumeratio aufgeführten Ordnungen mit
der Zahl ihrer Genera und ihrer Species.

Erste Classe. Phanerogamische Exogeneen.

Dicotyledonen.

			Zahl der	
			Genera.	Species.
1. Ordnung.	Ranunculaceen Juss.	.	21	164
2. "	Berberideen Vent.	.	3	3
3. "	Nymphaeaceen DC.	.	2	10
4. "	Papaveraceen DC.	.	4	13
5. "	Fumariaceen DC.	.	2	19
6. "	Cruciferen Juss.	.	54	240
7. "	Capparideen Juss.	.	1	2
8. "	Cistineen Dunal	.	2	36
9. "	Violarieen DC.	.	1	33
10. "	Resedaceen DC.	.	2	9
11. "	Droseraceen DC.	.	3	6
12. "	Polygaleen Juss.	.	1	13
13. "	Sileneen DC.	.	10	131
14. "	Alsineen DC.	.	16	99
15. "	Elatineen Cambess.	.	1	5
16. "	Lineen DC.	.	2	26
17. "	Malvaceen R. Brow.	.	8	35
18. "	Tiliaceen Juss.	.	1	4
19. "	Hypericineen DC.	.	2	17

			Zahl der	
			Genera.	Species.
19b.	Ordnung.	Aurantiaceen DC. in addent.	1	5
20.	»	Acerineen DC. . . .	1	7
21.	»	Hippocastaneen DC. .	1	1
22.	»	Ampelideen Humb. . .	2	2
23.	»	Geraniaceen DC. . .	2	30
24.	»	Balsamineen A. Richard.	1	1
25.	»	Oxalideen DC. . . .	1	4
26.	»	Zygophylleen R. Brow.	1	1
27.	»	Rutaceen Juss. . . .	3	9
28.	»	Coriarieneen DC. . . .	1	1
29.	»	Celastrineen R. Brow.	2	4
30.	»	Rhamneen R. Brow. .	3	11
31.	»	Terebinthaceen DC. .	2	6
32.	»	Papilionaceen Lin. . .	40	386
33.	»	Caesalpineen R. Brow.	2	2
34.	»	Amygdaleen Juss. . .	3	16
35.	»	Rosaceen Juss. . . .	12	122
36.	»	Sanguisorbeeneen Lindl. .	3	11
37.	»	Pomaceen Lindl. . .	7	25
38.	»	Granateen Don. . . .	1	1
39.	»	Onagrarieen Juss. . .	5	22
40.	»	Halorageen R. Brow. .	1	3
41.	»	Hippurideen Link . .	1	2
42.	»	Callitrichineen Link. .	1	5
43.	»	Ceratophylleen Gray .	1	3
44.	»	Lythrarieen Juss. . .	4	9
45.	»	Tamariscineen Desv. .	2	4
46.	»	Philadelpheneen Don. .	1	1
47.	»	Myrtaceen R. Brow .	1	1
48.	»	Cucurbitaceen Juss. .	5	11
49.	»	Portulaceen Juss. . .	2	4
50.	»	Paronychieen St. Hill.	7	17
51.	»	Sclerantheneen Link. . .	1	3
52.	»	Crassulaceen DC. . .	7	40
53.	»	Cacteen DC.	1	1

			Zahl der	
			Genera. Species.	
54.	Ordnung.	Grassularieen DC. . .	1	7
55.	»	Saxifrageen Vent. . .	3	62
56.	»	Umbelliferen Juss. . .	76	242
57.	»	Araliaceen Juss. . . .	1	1
58.	»	Corneen DC.	1	3
69.	»	Loranthaceen Don. . .	2	3
60.	»	Caprifoliaceen Juss. .	3	17
61.	»	Stellateen Lin. . . .	7	63
62.	»	Valerianeen DC. . .	3	31
63.	»	Dipsaceen DC. . . .	6	36
64.	»	Compositeen Lin. Adans.	119	678
65.	»	Ambrosiaceen Link. .	2	4
66.	»	Lobeliaceen Juss. . .	1	1
67.	»	Campanulaceen Juss. .	7	82
68.	»	Vaccineen DC. . . .	1	5
69.	»	Ericineen Desv. . . .	10	22
70.	»	Pyrolaceen Lindl. . .	1	8
71.	»	Monotropeen Nuttal. .	1	1
72.	»	Ebenaceen Vent. . .	2	2
73.	»	Aquifoliaceen DC. . .	1	1
74.	»	Oleaceen Lindl. . . .	5	11
75.	»	Jasmineen R. Brow. .	1	2
76.	»	Asclepiadeen R. Brow.	3	8
77.	»	Apocyneen R. Brow. .	3	5
78.	»	Gentianeen Juss. . .	8	49
79.	»	Polemoniaceen Lindl. .	1	1
80.	»	Convolvulaceen Juss. .	3	20
81.	»	Boragineen Desv. Juss.	20	88
82.	»	Solaneen Juss. . . .	12	31
83.	»	Verbasceen Bartling. .	3	51
84.	»	Antirrhineen Juss. . .	11	88
85.	»	Orobancheen Juss. . .	2	36
86.	»	Bignoniaceen R. Brow.	1	1
87.	»	Rhinanthaceen DC. .	7	49
88.	»	Acanthaceen DC. . .	1	5

			Zahl der Genera, Species.	
89. Ordnung.	Labiaten Juss. . . .	39	181	
90. »	Verbenaceen Juss. . .	2	4	
91. »	Lentibularieen Richard.	2	9	
92. »	Primulaceen Vent. . .	14	70	
93. »	Globularieen DC. . .	1	5	
94. »	Plumbagineen Juss. .	3	26	
95. »	Plantagineen Juss. . .	2	30	
96. »	Amaranthaceen Juss. .	1	6	
97. »	Phytolaceen R. Brow.	1	1	
98. »	Chenopodeen Vent. .	15	68	
99. »	Polygoneen Juss. . .	3	43	
100. »	Thymeleen Juss. . .	2	14	
101. »	Laurineen DC. . . .	1	1	
102. »	Santalaceen R. Brow. .	2	13	
103. »	Elaeagneen R. Brow. .	2	2	
104. »	Cytineen A. Brogn. .	1	1	
105. »	Aristolochieen Juss. .	2	5	
106. »	Empetreen Nuttal. . .	1	1	
107. »	Euphorbiaceen Juss. .	6	63	
108. »	Urticeen Juss. . . .	8	18	
109. »	Juglandeent DC. . .	1	1	
110. »	Cupuliferen Richard. .	6	21	
111. »	Salicineen Richard. .	2	57	
112. »	Betulineen Richard. .	2	11	
113. »	Myriceen Richard. . .	1	1	
114. »	Coniferen Juss. . . .	5	24	
			728	4020

Zweite Classe. Phanerogamische Endogeneen.

Monocotyledonen.

			Zahl der Genera, Species.	
115. Ordnung.	Palmae L.	2	2	
116. »	Hydrocharideen DC. .	4	4	
117. »	Alismaceen Juss. . .	2	6	

Zahl der
Genera. Species,

118. Ordnung.	Butomeen Richard.	1	1
119. »	Juncagineen R. Brow.	2	4
120. »	Potameen Juss.	3	32
121. »	Najadeen Link.	3	9
122. »	Lemnaceen Link.	1	6
123. »	Typhaceen Juss.	2	8
124. »	Aroideen Juss.	4	9
125. »	Orchideen Juss.	24	85
126. »	Irideen Juss.	4	41
127. »	Amaryllideen R. Brow.	6	20
128. »	Asparagineen Juss.	7	20
129. »	Dioscoreen R. Brow.	1	2
130. »	Liliaceen DC.	20	126
131. »	Colchiaceen DC.	4	11
132. »	Juncaceen Bartl.	3	53
133. »	Cyperaceen Juss.	9	190
134. »	Gramineen Juss.	72	336
		<hr/> 174	<hr/> 965

Manacot. : Dicotyl. = 1 : 4, 1/2

Bei der Arbeit benutzte Werke und Litteratur.

- Allioni, C., *Flora Pedemontana* fol. Turini. 1785.
Balbis et Nocca, *Flora Ticinensis* 4. Tom. II. Ticini. 1816—1821.
Baumgarten, I. Ch. G., *Enumeratio stirpium in Transylvaniae*. 8. Tom. III. Vindobonae 1816.
Beauvois, Palisot de, *Essais d'une nouvelle Agrostographie*. 4. Paris. 1812.
Bertolonii, Ant. M. Dr., *Flora Italica*. 8. Tom. VI. Bononiae. 1843—1846.
Besser, M. Dr., *Primitiae flora Galiciensis*. 12. Tom. II. Viennae 1809.
Bieberstein, Marschall de, *Flora Tauro-Caucasica*. Charcowiae 1808.
Bluff et Fingerhut, *Compendium florum Germanicae* 12. Tom. I. pars 1 et 2, Tom. II. edit. 2. Norimbergae 1836—1838.
Boenninghausen, C. M. F. von, *Prodromus Florae Monasteriensis-Westphalicae Monasterii*. 1824.
Bogenhardt, C., *Taschenbuch der Flora von Jena, oder systematische Aufzählung und Beschreibung aller in Ostthüringen wildwachsenden und cultivirten Phanerogamen und höheren Cryptogamen etc., eingeliefert von Dr. M. J. Schleiden*. Leipzig bei W. Engelmann. 1850.
Botanische Zeitung. Hugo von Mohl und von Schlechtendal. Halle und Berlin 1842 bis 1851.
Brignoli *Fasciculi plantar. Foro-Julensium* 4. Urbini 1840.
Candolle, A. Pyr. de, *Regni vegetabilis systema natural*. Vol. II. Parisiis 1818—1821.

Candolle, A. Pyr. de, *Prodromus, systema natural.* 8. Vol. 10. Parisiis. 1824—1846.

Cesati Vincenzo, *Saggio su la geografia bot. e su la flora della Lombardia* 8. Milano. 1844.

Comolli, J. Du, *Flora Comensis.* 12. Vol. 3. Como. 1834 und 1836.

Desfontaines, J. R., *Flora Atlantica* 4. Vol. 2. Paris. 1798—99.

Döll, J. Ch., *Rheinische Flora vom Bodensee bis zur Mosel etc.* 8. Frankfurt a. M. 1843.

Flora oder Regensburger botan. Zeitung. Jahrgang 1 bis 32. Regensburg 1816 bis 1850.

Flora Danica. Fol. Tom. XIV. Hafniae. 1761—1846.

Garke, A. Dr., *Flora von Nord- und Mittel-Deutschland etc.* Berlin bei Wiegandt und Grieben. 1851.

Gaudin. *Flora Helvetica* 8. Vol. 7. Turici. 1827.

Gaudin et Mounard. *Synopsis Florae Helvetic.* 8. Turici. 1836.

Gmelin, C. C., *Flora Badensis.* 8. Tom. 4. Carlsruh. 1805.

Hagenbach, *Tentamen florae Basiliensis.* Basil. 1824—34.

Host, N. F., *Flora Austriaca.* 8. Vol. 2. Viennae 1827—31.

Jacquin N. F. de, *Enumeratio stirpium agri Vindobonensis* 8. Vindob. 1762.

Jacquin, N. F. de, *Flora Austriaca fol.* Tom. 5. Vindebon. 1773—78.

Jahresbericht des botanischen und naturhistorischen Vereins in Rheinland und Westphalen. Jahrgang 1837—1850.

Jacquin, N. F. de, *Collectanea ad. botan.* 4. Tom. 5. 1786—96.

Kaltenbach, J. H., *Flora des Aachener Beckens.* Vol. 2. Aachen. 1843—44.

Kirschleger, F. Dr., *Prodrome de la Flore d'Alsace.* 12. Strassbourg. 1836.

Kittel, M. B. Dr., *Taschenbuch der Flora Deutschlands.* 12. Tom. 2. Nürnberg. 1844.

Kunth, C. S., *Enumeratio plantar. etc.* 8. Vol. 5. Stuttgartar. et Tübingae. 1833—43.

Koch, Dr. G. I., *Synopsis Florae Germanicae et Helveticae edit.* II. Pars I., II., III. Francof. et Lipsiae 1843 bis 1845.

Koch, Dr. G. I., Taschenbuch der Deutschen und Schweizer Flora. Leipzig 1844.

Lejeune, Flore des environs de Spa etc. Liège. 1811, et Revue de la flore de Spa. 1824.

Lejeune et Courtois, Compendium Flora Belgicae etc. Leodii et Verviers. 1828—36.

Lantzius - Beninga, S. Dr., Beitrag zur Kenntniss der Flora von Ostfriesland. Göttingen. 1849.

Link, D. H. F., Handbuch zur Erkennung der Gewächse. Vol. 3. Berlin. 1829—33.

Löhr, M. J., Flora von Coblenz (Mittelrheine). Cöln. 1838.

Löhr, M. J., Taschenbuch der Flora von Trier und Luxemburg etc. Trier. 1844.

Maly, J. C. Dr., Enumeratio plantarum phanerogamicarum, Imperii austriaci universi. Vindobon. 1848.

Mertens et Koch, Röhling's Deutschlands Flora. 8. Vol. 5. Frankfurt a. M. 1823—1839.

Meyer, G. F. W. Dr., Chloris Hannoverana etc. Göttingen. 1836.

Moesler, J. Ch. Dr., Handbuch der Gewächskunde etc., umgearbeitet von H. G. L. Reichenbach, 3te Aufl. 8. Vol. 3. Altona. 1833—34.

Moquin-Tandon, A., Chenopodearum Monographia enumeratio. 8. Parisiis. 1840.

Moris, J. H., Flora Sardoia. 4. Turini. 1837.

Nees ab Esenbeck, Genera Plant. Bonae. Fascic. 1—24. 1833—18—.

Neilreich, Flora von Wien. Wien. 1846.

Noccari, Flora Veneta. 8. Vol. 6. Venezia. 1826.

Opitz, Ph. M., Boeheim's phanerogam. u. cryptogam. Gewächse. 8. Prag. 1823.

Patze, C., Meyer, E. u. L. Elkan, Flora der Provinz Preussen. 3 Lieferungen. Königsberg. 1848—50.

Pollich, J. A., Historia plantarum in Palatin. spont. nascentium. 8. Vol. 3. Manheimii. 1776.

Pollichia, Verhandlungen des naturwissenschaftl. Vereins der Baierischen Pfalz etc. Speier. Jahrgang 1843—1849.

Pollini, Flora Veronensis. 8. Vol. 3. Veronae. 1822—1824.

Presl, D. Dr., Swatopluk et Boriwog, Flora Cechica. 8. Pragae. 1819.

Reichenbach, L. Dr., *Flora Germanica excursor*. 12. 2 Vol. Lipsiae 1830—33.

Reichenbach, L. Dr., *Icones von Deutschlands Flora mit Abbildungen, deutsche Ausgabe*. Leipzig 1845 bis 1849, von den Isoeteen bis zu den Liliaceae und von den Coniferae bis Salicinae mit 660 Tafeln. Die Cruciferae mit 101 Tafeln, Papaveraceae und Caparideae mit 19 Tafeln, die Violaceae und Cistineae mit 40 Tafeln; die Ranunculaceae bis zu den Malvaceae mit 182 Tafeln etc.

Reichenbach *Flora saxonica*. Flora für das Königreich Sachsen und die angrenzenden Herzog- und Fürstenthümer etc., auch unter dem Titel »der Deutsche Botaniker 2ter Theil« etc., Dresden und Leipzig 1842 und 1844.

Rochel, A., *Plantae Banatus. rariores, iconibus descript. illustr. fol.* Pesthini. 1828.

Roemer et Schultes, Carol. Linn. *Systema vegetab. edit. nova*. Stuttgartia. 1817.

Sadler, J. Dr., *Flora Comitatus Pesthinensis*. 1825—26. Vol. 2. Edit. II. *ibid.* 1840.

v. Schlechtendal, D. F. L. Dr., *Flora Berolien-sis*. 1823.

Schnizlein, A. Dr., *Flora von Baiern nebst den angrenzenden Gegenden etc.* Erlangen. 1847.

Schmitz et Regel, *Flora bonnensis*. 8. Bonn. 1841.

Schrank, Fr., de Paula, *Flora Monacensis fol.* Vol. 2. Monachii. 1811.

Schultz, Fr. Dr., *Flora der Pfalz. Speier*. 1846.

Schultz, Fr. Dr., *Flora galliae et german. exsicc.* Cent. 1—9. 1836—1847.

Schubler und v. Martens, *Flora von Würtemberg. Tübingen*. 1834.

Scopoli, J. A., *Flora Carniolica. edit. 2.* 8. Vol. 2. Vindobonae. 1772.

Sebastiani et Mauri, *Florae Romanae prodrom.* 8. Romae. 1818.

Sonder, G. W. Dr., *Flora Hamburgensis*. Beschreibung der phanerogamischen Gewächse, welche in der Umgegend von Hamburg wild wachsen und häufig cultivirt werden. Hamburg bei R. Kittler. 1851.

Sprengel, C., *Systema Vegetabilium*. 8. Vol. 5. Goettingae. 1825—28.

Steudel, E. et Ch. F. Hochstetter, Enumeratio plant. Germ. et Helvet. etc. Stuttgartiae et Tubingae. 1826.

Thuillier, J. L., Flore des environs de Paris. 8. Paris 1799.

Tommasini Mutius, der Berg Slavnik im Küstenlande. 8. Halle. 1839.

Thurmann, J., Essai de Phytostatique, appliqué à la chaine du Jura et aux contrées voisines. Etude de la dispersion des plants etc. 8. Vol. 2. Berne. 1849.

Villars, Flora Delphinatus. 8. Lugduni. 1785.

Visiani, R. Dr., Flora Dalmatica. 4. Tom. 2. Lipsiae. 1842—47.

Wahlenberg, Flora lapponica. Berlin. 1812.

Wahlenberg, Flora Carpathorum principalium. 8. Goettingae. 1814.

Waldstein et Kitaibel, Plantae rariores Hungariae. fol. Vol. 3. Vindobonae. 1802—12.

Walpers, Repertorium botanices systematicae. 8. Vol. 1—6. Lipsiae. 1842—46.

Wimmer, F., Flora von Schlesien. 8. Breslau. 1841.

Wirtgen, Ph., Flora des Regierungsbezirks Coblenz etc. Coblenz. 1841.

Wirtgen, Bach, Bogenhard, Dr. Fingerhuth, Flöck, M. J. Löhr, Sehlmeyer und Dr. Vogel, Prodrum der Flora der Preussischen Rheinlanden. I. Abth. etc. Bonn. 1842.

Zawadzki, Alex. Dr., Enumeratio plantarum Galliciae et Bucovinae. 8. Breslau. 1825.



Gefäßpflanzen.

Pflanzen aus Zellgeweben und Gefäßen gebaut.

Erste Classe.

Exogenen oder Dycotyledonen.

Keim mit zwei oder mehreren Keimblättern
versehen.

Erste Unterclasse.

Thalamifloren (Fruchtbodenblüthige).

Erste Ordnung. Ranunculaceen.

Juss. Koch. syn. 1. K. Taschb. 1. Rchb. exc. p. 717.
Rchb. icon. Cent. XIII. u. XIV. t. 1—128. f. 4569—4745.

I. Gruppe Clematideen DC. syst. Koch. Taschb. 1.

1. *Clematis* L. (XIII. 5.) Waldbrebe. K. syn. Rchb.
exc. p. 734. Comp. fl. germ. I. 2, p. 265.

1. *C. integrifolia* L. K. syn. *C. inclinata* Scopoli.
Sumpfige Wiesen, besonders im südl. Geb. Rheing., Ober-
baden an der Ach zw. Zollboehring nach Beuren; Baiern bei
Passau; Destr. a. d. Donau, Mähren, im südl. Littorale,
Istrien bei Duino, Ungarn und Siebenbürgen. 6—7. 4

— 2. *C. recta* L. K. syn. Schattige Wiesen, Flußufer, Fel-
sen bis ins südl. Geb. Rheing. bei Neuwied, Main v. Frank-

furt, Offenbach bis Würzburg, Mosel bei Schengen oberhalb Trier, Eupen bei Aachen, Südschweiz; Destr., Böhmen, an d. Donau bis Regensburg, Krain, Littorale u. 6—8. 4

3. *C. angustifolia* Jacq. Rchb. exc. *C. lasiantha* Fisch. *C. Pallasii* Gmel. syst. Im südl. Littorale des adriatischen Meeres. 7—8. 4

4. *C. Flammula* L. K. syn. *C. caespitosa* Scop. Var. β . *C. maritima* Lamk. non Lin. — γ . *C. fragrans* Tenore. Felsige Orte unter Gebüsch im g. südl. Littorale, Istrien, Insel Dssero, Lussino piccolo, Croatien, Dalmatien, Galizien, Siebenb., Venedig. 7—8. 3

5. *C. Vitalba* L. K. syn. Var. β . *bannatica* Wierzb. Hecken, Gebüsche, dch. d. g. Geb. aber nicht in Schlesien; die Var. β im Banat. 6—8. 3

6. *Viticella* L. K. syn. Bäune, Gebüsche im südl. Geb. Destr., Tyrol, Krain, Littoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. 6—8. 3

2. *Atragene* L. (XIII. 5.) Alprebe. K. syn. 3. Rchb. exc. p. 734. Comp. I. 2. p. 267.

1. *A. alpina* L. K. syn. *A. austriaca* Scop. *A. clematides* Crntz. *Clematis alpina* Lamk. Mill. Walbige, steinige Orte d. Alpen u. Boralpen; Schweiz Cant. Graubünden, Genf a. d. Salève u. durch d. südl. Alpenkette nach Destr., Tyrol, Krain, Littoral, Istrien bis in d. Lombardei u. nach Venedig. 7—8. 3

Gruppe II. Anemoneen DC. syst. Koch Taschb. 2.

3. *Thalictrum* L. (XIII. 5.) Wiesenraute. K. syn. 3. Rchb. exc. p. 727. Comp. I. 2. p. 267.

1. *T. aquilegifolium* L. K. syn. Var. β . *T. atropurpureum* Jacq. — γ . *T. niveum* Baumg. Schattige Gebirgswiesen bis in d. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette vom Jura bei Meinwangen, Bodensee, Constanz, Rheing., Basel, Breisgau bei Sasbach, durch Schwaben,

Baiern, Sachsen nach d. Fichtelgebirge, Thüringen, Ostpreußen, Schlesien u. dch. g. Destr. 6—7. 4

2. *T. alpinum* L. K. syn. Hochalpen d. Schweiz, Bernina-Kette im Engadin u. a. d. Foully im Wallis, Tyrol, Kärnthen, a. Malnißer-Tauern, Geiseralp., Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

3. *T. foetidum* L. K. syn. *T. foetidum* u. *T. pubescens* Host. *T. styloideum* L. fil. *T. saxatile* Vill. delph. Var. β . *glabrum*: *T. alpestre* Gaud. helv. Felsen d. Alpen u. Boralpen besonders in d. südl. Alpenkette; Schweiz Cant. Wallis im Saaser- u. Nicolai-Thale, a. Gletscher oberhalb Allmagell, a. Matmar-See, zw. St. Niklas u. Zermatt; Südtirol im Deß-Thale, Böhmen bei St. Ivan, Littoral bei Salmezzo, Dalmatien, Ungarn Lombardei. 5—6. 4

4. *T. sylvaticum* Koch K. syn. *T. minus strictum*. K. syn. edit. I. *T. minus* Pollich. In Laub- und Nadelholzwäldern stchw. dch. d. Geb. Rheing. Kaiserslautern im Stadtwalde zw. Eselsferth u. Lauterspring, Vogelwehe, Obermosel im Luxemb., Sachsen, Schlesien im Oberg. Destr. bei Heiligenbluth in Kärnthen, Lombard. Schweiz. 7—8. 4

5. *T. minus* L. K. syn. *T. montanum* Wallr. *T. vulgatum* Fr. Schultz. Flora d. Pfalz; Var. α . *T. montanum* α . *virens* Wallr. — β . *T. mont.* β . *roridum* Wallr. *T. minus* DC. non Jacq. — γ . *T. mont.* γ . *glandulosum* Wallr. *T. pubescens* Schleich. Wiesen, grasige Hügel stchw. dch. d. g. Geb. 5—6. 4

6. *T. majus* Jacq. K. syn. *T. elatum* Auct. germ. Gaud. helv. Rchb. exc. *T. ambiguum* Schleich. *T. minus* E. *dumosum* K. syn. edit. I. Var. β . *T. capillare* Rchb. exc. — γ . *T. glaucescens* Willd. Wiesen, Ackergränzer unter Gesträuch, Rheing. Im Föhrenwalde zw. Mainz u. N. Ingelheim, Bornhofen bei Boppard, Fl. v. Coblenz, Pfalz bei Dürkheim, Saarwiesen bei Saarbrücken, Moselwiesen bei Trier u. Mosel abwärts Trarbach, Coblenz, Thüringen, Brandenburg, Schlesien, an d. Oder bei Frankfurt;

Schweiz Valle d'Aosta, Domo d'Ossola; Destr. Böhm., Mähren, Steyermark, Kärnthen, Krain, Littoral, Dalmat., Galizien, Ungarn, Siebenb. 6—7. 4

7) *T. Jacquinianum* Koch K. syn. *T. Kochii* Fries. *T. minus* Jacq. *T. collinum* Wallr. *T. flexuosum* Rchb. exc. non Bernh. *T. nutans* Schleich. Gräßige Kalkhügel, sandige Wiesen, lichte Waldstellen stellw. im südl. u. östl. Geb. Schweiz, Rheing. häufig zw. Mainz u. N. Ingelheim am Lenaberg, Pfalz zw. Ungstein u. Herrheim, Saarbrücken, Trier oberhalb Tgel, Neuwied; Thüringen a. d. Saale von Halle bis Bernburg, Jena, Sachsen an d. Elbe bis Barby, Hamburg; Schlesien, Destr., Böhm., Mähren, Tyrol, Ungarn. 6—7. 4

8. *T. nutans* Desf. Rchb. exc. *T. concinna* Willd. *T. collinum* β. K. syn. edit. I. Alpen im südl. Geb. Krain; Savoyen am Genfer See, M. Gramont. 7—8. 4

9. *T. elatum* Jacq. K. syn. Steinige Hügel im südl. Geb. Südtirol, Littoral Istrien bei Fiume, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei Domo d'Ossola, Valle Aost. 6—7. 4

10. *T. medium* Jacq. Rchb. exc. Bergwiesen an Säunen, Ungarn bei Pesth. 6—7. 4

11. *T. saxatile* Schleich. Rchb. exc. sub *T. nutans* Sonnige Felsen in d. südl. Schweiz auf d. Salève bei Genf, Chateau d'Ex, Cant. Wallis. 7—8. 4

12. *T. simplex* L. K. syn. *T. minus* Fl. Dan. *T. Leyii* Lohr. Prodr. d. rhein. Flora u. Flora v. Trier, *T. Nestleri* α. *latifolium* F. Schultz Flora d. Pfalz. Schattige Hügel, Wiesen Uferländer, Schweiz Cant. Wallis bis in d. Alpen; Rheing. in d. Rheinwaldung, zw. Weidengebüsch bei Speyer, Frankenthal, Mardorf, Trier in d. Eifel bei Prüm, Preußen bei Quednau, Memel, Pölstein, Harz; Steyermark, Tyrol, Lombardei. 6—7. 4

13. *T. galioides* Nestler K. syn. *T. angustifolium* Pollich. *T. Nestleri* F. Schultz. Wiesen, Heiden unter Gebüsch an Ufern zw. Weidensträucher, lichte Waldstellen im südl. u. südwestl. Geb. Schweiz in Graubünden, Oberschwaben; Rheing.

Bodensee, Basel, Elfaß bei Straßburg, Baden bei Karlsruhe, Mannheim, Pfalz bei Speyer, Germersheim, Lambsheim, Dagersheim, Marbors, Darmstadt, Frankfurt, Luxemburg; Oberbayern; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Kärnthen, Tyrol u. Ungarn. 7. 4

14. *T. angustifolium* Jacq. K. syn. *T. Bauhini* Spreng. *T. Bauhinianum* Wallr. *T. angustifolium* L. pr. part. *T. nigricans* Gaud. helv. *T. angustifolium* α . *stenophyllum* Wim. et Grab. Var. β . *heterophyllum* Wim. et Grab. *T. nigricans* DC. — γ . *laserpitiiifolium*: *T. laserpitiiifolium* Willd. *T. lucidum* DC. syst. Feuchte Moorniesen unter Gebüsch, Schweiz Cant. Tessin, Rheing., Basel, Luxemburg bei Stockem, Sachsen bei Halle, Preußen um Königsberg, bei Kasse Awenzen etc., Schlesien; Oberbayern; Destr. in allen Provinzen außer Dalmatien. 6—7. 4

15. *T. flavum* L. K. syn. Rchb. exc. *T. nigricans* Jacq. Rchb. exc. *T. anonymon* Wallr. *T. heterophyllum* Lej. Rev. *T. nigricans* Lej. et Court. Feuchte Wiesen an Fluß- und Bachufern unter Weidengebüsch, stellw. dch. d. g. Geb., besonders in d. Rheing. vom Bodensee dch. d. g. Rheinthale zerstreut etc. 6—7. 4

16. *T. rufinerve* Lejeun et Court. K. syn. *T. Morisonii* Gmel. Feuchte Wiesen in Belgien. Flora v. Spa bei Blisten, Schweiz bei Auet. 6—7. 4

17. *T. exaltatum* Gaud. helv. K. syn. Schattige Flußufer in d. Südschweiz an d. Adde bei Morben im Beltlin, bei Mendrisio im Cant. Tessin. 7—8. 4

18. *T. glaucum* Desf. Rchb. exc. *T. speciosum* Poir. Im südl. Geb. Lombardei M. Summano u. auf d. d. Euganeen etc. 6—7. 4

4. *Anemone* L. (XIII. 5.) Windrößchen. K. syn. 6. Rchb. exc. p. 731. Comp. I. 2. p. 274.

Erste Rotte. *Hepatica* Koch. syn.

1. *A. Hepatica* L. K. syn. *Hepatica nobilis* Volkam.

Rchb. exc. Host. *H. triloba* DC. Schattige Wälder, Haine stellw. dch. d. Geb. besonders im g. südl. Geb. bis in d. Boralpen der Schweiz u. Destr. 2c., Rheing. v. Bodensee auf dem g. Jura bis Elsaß, Baden auf d. Kaiserstuhl im Breisgau, auf Porphyre am Donnersberg, Harbt a. d. Hartenburg bei Dürkheim, Kalkhügel bei Grünstadt über d. Weinbergen, bei Callstadt u. Herrheim, Erbach, Oberingelheim am Algesheimer Berg, Kreuznach; Hamburg, an d. Bille; Preußen bei Kreuzburg, Braunsberg, Elbing, Graudenz 2c. 3—4. 4

Zweite Rotte. *Pulsatilla* Koch. syn.

2. *A. vernalis* L. K. syn. *Pulsatilla* — Miller Rchb. exc. Triften d. Alpen u. Boralpen, Heiden, trockene Waldfstellen d. Niederungen, Schweiz; Rheing., Pfalz auf d. g. Zuge d. Vogesen-Sandsteins bei Hochspeyer u. Lautern, zw. Kaiserslautern u. Mölschbach, Eppenbrunn, Pfaffenweiler, Freibrücker-Hardt bis Bitsch, Stürzelbrunn, Obersteinbach, Kaiserslautern, Pirmasens; Sachsen bei Dresden, Berlin, Pommern, Danzig, Graudenz, Nieder- u. Oberlausitz, Schlesien, Baiern; Destr. Böhmen, Mähren, Kärnten, Tyrol, Ungarn, Siebenb., Lombardei 4—5. 4

3. *A. Halleri* Allion. K. syn. *Pulsatilla* — Willd. Rchb. exc. Hochalpen in d. südl. Schweiz, Cant. Wallis im Nicolaithale um Zermatten, Piemont, Savoyen. 7—8. 4

4. *A. Hackelii* Pohl K. syn. *A. patens* Hoppe. *A. Wolfgangiana* Bess. *Pulsat. Hackelii* Rchb. exc. *P. Halleri* Presl. *P. hybrida* Mikan. Sonnige Bergstellen, Baiern bei München; Destr. bei Wien, Böhmen, Steyermark, Tyrol, Lombardei. 4—5. 4

5. *A. Pulsatilla* L. K. syn. *Pulsatilla vulgaris* Mill. Rchb. exc. *P. pratensis* Wagner. Var. β . *P. Bogenhardiana* Rchb. icon. *P. media* Bogenh. Sonnige Hügel, Heiden, Triften, an Waldrändern, in Nadelwäldern, stellw. dch. d. g. Geb., Schweiz im Jura, Rheing., Bodensee, dch. Elsaß, Baden bis Raftatt, Mannheim, Bergstraße bis Frankfurt, Speyer bis Mainz, Coblenz, Bonn, im Nahe- u. Glan- u. Mosel-Geb. bei Trier

häufig, Eifel u., Thüringen, nördl. bis Hamburg, Brandenburg u. Frauenburg; Destr. Ungarn bis in d. Lombard. 3—5. 4

6. *A. montana* Hoppe. K. syn. *A. Pulsatilla nutans* Gaud. helv. *A. intermedia* Hoppe, *Pulsatilla montana* Rchb. exc. Sonnige Kalkhügel im südl. Geb. Schweiz Cant. Graubünden bei Chur, Cant. Wallis bei Martinach; Destr. Kärnthen, Südtirol bei Bozen, Vittoral Istrien, auf d. Karst bei Triest, Dalmatien, Lombard. 4—5. 4

7. *A. pratensis* L. K. syn. *Pusatilla* — Mill. Rchb. exc. Sandige Hügel, Wiesen, Triften, Feldrainen im nördl. u. mittlern Geb. vom Thüringer Wald bis an d. Ostsee, Nordsee u. Hamburg n. Holstein, Jena, Sachsen, Preußen Berlin, Königsberg, Danzig, Graudenz, Memel, Elbing u., Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren u. 4—5. 4

8. *A. patens* L. K. syn. *Pulsatilla* — Mill. Rchb. exc. Bemooste Heiden u. Nadelholzwälder, stellw. im Geb., Ostpreußen bei Rastenburg, Pöthen, Pommern bei Damm u. Tempelburg, Königsberg, Graudenz, Schlesien im Königswald, Frankfurt a. d. Oder, Oberlausitz bei Guben; Baiern München. bei Garsching; Destr. Böhmen, Mähren, Vittoral, Dalmat. Galizien, Ungarn. 4. 4

Dritte Rotte. *Anemonanthea* DC. K. syn.

9. *A. hortensis* L. K. syn. Steinige Hügel im südl. Geb. Schweiz im Cant. Waadt u. Wallis; im südl. Vittoral Istrien bei Fiume, in Croatien, Dalmatien u. Piemont u. 2—3. 4

10. *A. coronaria* L. Rchb. exc. Hügel, im Olivenwäldchen im südl. Geb. Dalmatien bei Spalato, zw. Castel Sufuraz und Castel Cambio; Lombard. Vicensa, Genua u. Nizza. 3—5. 4

11. *A. narcissiflora* L. K. syn. Triften der Hochalpen bis in die Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Dester., Tyrol bis in d. südl. Geb. In d. bairischen Donaugegend bei Immenningen, Geislingen u. Bachzimmern, auf d. Hohenstaufen, d. Vogesen u. in d. Sudeten 5—7. 4

Vierte Rotte. *Preonanthus* DC. K. syn.

12. *A. alpina* L. K. syn. exc. Var. β . *Pulsatilla alba*. Lob. Rhb. exc. p. 732. Felsen der Hochgebirge u. Boralpen im Urgebirge, Schweiz u. dch d. g. Alpenkette nach Oester., Tyrol bis ins südl. Geb.; auf den Vogesen M. Hoheneck, auf d. Brocken im Harz u. auf d. Subeten. 6—9. 4

13. *A. grandiflora* Hoppe. *Pulsatilla Burseriana* Rhb. exc. Anem. — Scopol. *A. myrrhidifolia* Vill. delph. *A. alpina* β . Lin. Var. β . *sulphurea*: *A. sulphurea* L. mant. *A. lutea* C. Bauh. *A. apiifolia* Scopol. Wulf. *A. alpina* β . *sulphurea* Koch syn. Kalkalpen bis in d. Boralpen, Schweiz u. dch d. g. südl. Alpenkette v. Jura in d. Vogesen; Var. β . Hoheneck in d. Vogesen, Schweiz M. Riesen, Grimsel, Gemmi u.; Tyrol, Kärnthen u. 6—8. 4

Fünfte Rotte. *Anemone* K. syn.

14. *A. baldensis* L. K. syn. *A. fragifera* Wulf. *A. alpina* Scopol. carn. Riesige Orte d. Hochalpen Schweiz u. dch d. g. südl. Alpenkette, stellw. nach Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain bis z. südl. Littoral. 7—8. 4

15. *A. sylvestris* L. K. syn. Sonnige Bergstellen, Waldweiden, Nadelwälder, Hecken bis in d. Ebenen stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. Basel dch. Breisgau, Baden bis Offenbourg, Durlach, Bergstraße, Elsaß, in d. Pfalz, Harzgebirge, v. Oppenheim bis Mainz, Bingen, Boppard, Siegburg bei Bonn, Kreuznach, Saarbrücken bis Trier u. 5—6. 4

16. *A. apennina* L. Rhb. exc. Im südl. Gebiete Dalmatien, Lombardien am M. Balbo. 4—5. 4

17. *A. nemorosa* L. K. syn. In Laubwäldern, Hecken, Zäunen, schattige Wiesen im g. Geb. 4—5. 4

18. *A. ranunculoides* L. K. syn. Laubwälder, Waldwiesen bis in d. Gebirgen, stellw. dch. d. g. Geb. Rheing. nicht selten. 4—5. 4

19. *A. trifolia* L. K. syn. Wälder, Gebüsche d. M:

pen u. Boralpen, besonders in d. südl. Kette, Destr. Steyermark, Kärnthen, Tyrol, Salzburg, Krain, Vittoral, Istrien, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 4. 4

5. *Adonis L.* (XIII. 5.) *Adonis*. K. syn. 11. Rchb. exc. p. 726. Comp. I. 2. p. 282.

1. *A. autumnalis L.* K. syn. *A. micrantha DC.* Necker, Schutt, im südl. Geb. Schweiz, Cant. Wallis bei Leirion u. Contei; Vittoral, Istrien bei Pola, Dalmatien auf d. Insel Brioni; Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei; im übrigen Geb. nur verwildert. 5—8. ☉

2. *A. aestivalis L.* K. syn. Rchb. exc. *A. miniata Jacq.* *A. flava Schlechtend.* *A. maculata Wallr.* *A. ambigua Gaud. helv.* Var. β . *pallida*: *A. citrina Hoffm.* *A. maculata* β *ochroleuca Wallr.* *A. flava Vill. delph.* Unter d. Saat auf Kalk- und Thonboden, stellenw. dh. d. g. Geb. bis in d. Süden, Rheing. an vielen Orten, auf d. g. Rheinfläche, besonders häufig an d. Obermosel bei Trier, nördl. im Weichselgebiet bei Danzig, Graudenz, Marienburg, fehlt in Ostpreußen. 6—7. ☉

3. *A. flammea Jacq.* K. syn. Rchb. exc. *A. anomala Wallr.* *A. aestivalis Gaud.* Var. β . *pallida*: *A. citrina DC.* Saatäcker, Felder besonders auf Kalk im g. südl. u. mittlern Geb., Rheing. v. Basel dh. Baden, Breisg., Rastatt, Heidelberg bis Frankfurt, Pfalz v. Neustadt, Worms bis Mainz u. Bonn, im Rheing. u. Saarthal, Obermosel Trier bis Luxemburg; Thüringen, Harz, Braunschweig; Destr. Tyrol, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Lombardei. 5—7. ☉

4. *A. vernalis L.* K. syn. *A. apennina Jacq.* Sonlige Kalkhügel, Feldraine, sandige Heiden u. Nadelwälder vom südl. bis ins mittlere Geb. Schweiz im Cant. Wallis; Rheing., Pfalz bei Leisstadt, Dürkheim, Pfeddersheim, Mainz v. N. Ingelheim bis Bingen, bei Kreuznach, Oberstein; Thüringen, Frankfurt a. d. O., Preußen bei Thorn; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 4—5. 4

III. Gruppe. Ranunculeen DC. syst. K. Taschb. 8.

6. *Myosurus* L. (XIII. 5.) Mäuseschwanz. K. syn.
12. Rchb. exc. p. 718. Comp. I. 2. p. 302.

1. *M. minimus* L. K. syn. *Ranunculus Myosurus* Afzel. Feuchte, sandige Thonäcker, stellw. dch. d. g. Geb. Rheing. v. Oberbaden bis Frankfurt u. dch. d. Elsaß bis Coblenz, Trier zc. 5—6. ☉

7. *Ceratocephalus* Moench. (XIII. 5.) Hornköpfchen. K. syn. 12. Rchb. exc. p. 718. Comp. I. 2. p. 303.

1. *C. falcatus* Pers. K. syn. *C. spicatus* Moench. *Ranunculus falcatus* L. *R. testiculatus* Crantz. Lehmige, sandige Aecker, Brachfelder, besonders im südl. Geb., Württemberg bei Ulm, zw. d. Rm u. Donau, Thüringen häufig an d. Hainleite bei Sondershausen; Destr. bei Wien, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei u. Piemont. 3—4. ☉

2. *C. orthoceras* DC. K. syn. *C. falcatus* Fieb. ap. Sturm. Trockne Hügel, Aecker; Württemberg auf d. rechten Donauufer zw. Ulm u. Wiblingen; Destr. Hernals bei Wien, Böhmen bei Prag, Mähren. 3—4. ☉

8. *Ranunculus* L. (XIII. 5.) Hahnenfuß. K. syn.
12. Rchb. exc. p. 718. Comp. I. 2. p. 284.

Erste Rotte. *Batrachium* DC. K. Taschb. p. 8.

1. *R. hederaceus* L. K. syn. *Batrachium* — Fries. Quellen, Bäche, Gräben, stellw. dch. d. Geb., Schweiz bei Pfirt, Rheing. v. Basel stellw. bis in d. Niederlande dch. d. g. Rheinthal u. in d. Nebenthälern, Baden, Elsaß bis Speyer, Kaiserslautern, Kreuznach, Saarbrücken, Trier, Coblenz, Bonn, Köln, Aachen zc., Hessen, dch. Niedersachsen bis Oldenburg, Hannover, Hamburg nach Holstein; Dalmatien, Siebenbürgen, Piemont. 4—6. 4

2. *R. aquatilis* L. K. syn. *Batrachium* — Wimm. *R. heterophyllus* Wigg. Var. α . *terrestre*; — β . *peltatus*: *R. peltatus* Schrank. — γ . *truncatus*; — δ . *quinelobus*. In stehendem u. fließendem Wasser dch. d. g. Geb. 6—8. 4

3. *R. Petiveri* Koch K. syn. Var. α . *minor*: *R. Petiveri* Koch ap. Sturm. *R. tripartitus* Nolte nov. *R. tripartitus* β . *obtusiflorus* DC. syst. *Batr. confusum* F. W. Schultz. — β . *major*: *R. aquatilis* β . *tripartitus* K. syn. edit. I. Stehende Wasser, Gräben, Bäche, stchw. dch. d. g. Geb. 5—8. 4

4. *R. caespitosus* Thuill. Godron. *R. aquatilis* δ . *succulentus* K. syn. *R. minutus* Döll. Rhein. Flora. *Batr. caespitosum* Fr. Schultz, Flora d. Pfalz, p. 14. Var. β *aquaticus*: *R. caespitosus* B. *aquaticus* Godron. Im nassen Sande schlechter Wiesen auf d. Rheinfläche bei Mannheim; Lauskirchen unweit Blieskastel im Saarthal; Schweiz im Cant. Aargau bei Zurzach. 5—6. 4

5. *R. paucistamineus* Tausch. K. syn. in add. p. 433. *Batrachium* — Fr. Schultz. Flora d. Pfalz. *R. bipontinus* Fr. Schultz, *R. aquatilis* ϵ . *pantothrix* K. syn. edit. I. *R. pantothrix* Brot. *R. aquatilis* β . Pollich. Smith. *R. aquatilis* γ . *phellandrifolius* Fl. Dan. *Batr. trichophyllum* F. W. Schultz Archives. Var. β . *hirsutus*: *Batr. hirsutum* Fr. Schultz. *R. Godronii* Grenier. Stehende Wasser, Bäche, Rheinpfalz im Hagelgrund bei Kaiserslautern, bei Zweibrücken; Jena, bei Rahla, Burgau, Böhmen bei Lissa; d. Var. β . auf d. Muschelkalk bei Bitscher-Rohrbach in d. Rheinpfalz. 5—6. 4

6. *R. Rionii* Lager Flora 1848. p. 49. Stehende Wasser, Südschweiz Cant. Valais bei Sitten. 8. 4

7. *R. Boudotii* Godron K. syn. in add. p. 434. *Batrachium*. — Fr. Schultz. Stehende Wasser im oberen Saarthal bei Saarlouis im nahen Lotharingen. 6—7. 4

8. *R. divaricatus* Schrank. K. syn. *Batrachium* — Wimmer, *R. circinatus* Sibth. Rchb. exc. *Batrachium* — Fries, *R. rigidus* Hoffm. *R. stagnatilis* Wallr. *R. aqua-*

tilis α . L. R. pantothrix α . DC. syst. Stehende Wasser stellw. dch. d. g. Geb. Rheing., Bodensee, besonders in d. Altwasser d. Rheines, Baden bei Rastatt, Knielingen bis Mannheim, Speyer bis Mainz, Neuwied, Bonn, Köln, Düsseldorf, Trier, Aachen, Hamburg, Thüringen, Jena zc. 6—7. 4

9. R. Bachii Wirtgen Correspondenzbl. d. Naturhistor. Vereins d. preuß. Rheinprov. 1845 Nr. 15, p. 22. Var. β . mosellanus Wirtg. In Bächen, Flora v. Coblenz, in d. Sayn-Bach zw. Isenburg u. Sayn oberhalb Neuwied, im Uesthale bei Alf a. d. Mosel; Var. β . an d. Mosel bei Winningen u. Cobern. 6—7. 4

10. R. fluitans Lamk. K. syn. Batrach. — Wimm. R. fluviatilis Wigg. R. peucedanifolius Allion pedem. Host. R. aquatilis δ . Lin. γ . Pollich. R. pantothrix γ . DC. R. peucedanoides Desf. Flüsse, Bäche u. stehendem Wasser dch. d. g. Geb. Rheing. v. Basel dch. d. g. Rheinthal u. in d. Seitenthälern, stellw. nicht selten. 6—7. 4

Zweite Rotte. Hecatonia K. Taschb.

11. R. rutaefolius L. K. syn. Callianthemum — C. A. Meyer. C. coriandrifolium Rehb. exc. et icon. Hochalpen im Urgebirge an Gletscherrändern, Schweiz im Cant. Wallis, Saaserthal am M. Moro, Nicolaital über Zermatt, am Schwarzsee u. in Graubünden; Destr. Steyermark, Salzburg, Tyrol, Kärnthen, Krain, Galizien, Ungarn, Lombardien, Venedig, Piemont. 7—8. 4

12. R. anemonoides Zahlbruckner K. syn. Callianthemum rutaefolium Rehb. exc. et icon. Kalkalpen in Nadelholzwäldern, Destr. auf d. Jochen d. Schneebergs, Steyermark bei Wildalpen, Maria Zell, zw. Schwarzenau u. Hochberg. 3—5. 4

13. R. glacialis L. K. syn. Var. β . crithmifolius Rehb. exc. — γ R. rubriflorus Pacher. Im Urgebirgsgerölle d. Hochalpen an Gletscherrändern; Schweiz auf d. Grimsel, Furca, Gemmi, Wallis zc. u. dch. d. g. Kette bis Destr. Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Galizien, Ungarn bis in d. Lombardien. 7—8. 4

14. *R. Seguierei* Villars K. syn. *R. Columnae* All. ped. Gerölle d. Hochalpen stellw. Kärnthén, Tyrol Kirchbaumer: u. Geiseralp, Bréner Alpen, Krain auf d. Stov, Lombardei M. Baldo, Piemont, Savoyen. 6—7. 4

15. *R. alpestris* L. K. syn. Hochalpen bis in d. Vor: alpen, auf Rast; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. Ungarn, Galizien, Lombardei zc. 6—7. 4

16. *R. Traunfellneri* Hoppe K. syn. Im Gerölle d. Hochalpen, Schweiz, Destr. Steyermark, Tyrol am Wormser-Joch, auf d. Loibl, Kärnthén Steineralp, Krain, Litzoral zc. 6—7. 4

17. *R. crenatus* W. et Kitaib. K. syn. *R. vaginatus* Sommerauer. Hochalpen auf Urgeb.; Steyermark auf d. Rottenmanner-Lauern, Hochrieden am Fuße d. Dreistecken, am Hengst bei Bösenstein, Ungarn auf d. Mararosa, Lombardei. 7—8. 4

18. *R. aconitifolius* L. K. syn. Var. β . *altior*. *R. platanifolius* L. Gebirgswälder im g. südl. Geb. u. stellw. im mittlern bis in d. Vor: u. Hochalpen; Rheing. Brengenz, Constanz, auf d. Bogesen im Elsaß bis zum Donnersberg, dann nach d. Saar: u. Moselgebirgen, auf d. Hochwalde, d. Eifel, Kreuznach, Trier, Prüm, bis Luxemburg, Baden, bis zum Taunus u. an d. Rheingebirgen abwärts bis Bonn, v. da bis nach Eupen bei Aachen; Baiern, Thüringen, Sachsen, Schlesiën, u. in g. Destr. 5—9. 4

19. *R. lacerus* Bellard. Rechb. exc. Gebirgswiesen um Limone in Piemont. 5—6. 4

20. *R. parnassifolius* L. K. syn. Gräßige Orte im Gerölle d. Hochalpen an Gletscherrändern, Schweiz Cant. Wallis, Ravyll-Gletscher, M. Gemmi, St. Bernhard, über Zermatten, M. Fouly, Melener Alpen; Tyrol Kirchbaumeralp, Wormserjoch, Zielalpe, Grieskogel im Dethale, Kärnthén am Großglockner, Pasterze; Lombardei. 6—8. 4

21. *R. pyrenaeus* L. K. syn. Var. β . *R. bupleurifolius* Lapeyr. Jacq. — γ . *R. plantagineus* All. pedm. Triften d. Granit-Alpen 6—7000'; Schweiz Cant. Wallis,

Casser- u. Nicolaithal, St. Bernhard; Tyrol, Kärnthen, Combarbei u. Piemont. 6—7. 4

22. *R. gramineus* L. K. syn. Sonnige Hügel im südl. Geb.; Schweiz Cant. Wallis um St. Leonhard, Piemont bei Susa u. in d. Novarese. 5—6. 4

Dritte Rotte. *Ranunculus* K. syn.

23. *R. Flammula* L. K. syn. Sumpfige Wiesen, Waldstellen, Gräben, Teichen im g. Geb. 5—9. 4

24. *R. reptans* L. K. syn. 434. in add. *R. Flammula* β . *reptans* K. syn. 16. Nasse, sandige Orte an stehenden Wassern, Teichen, Seen; Schweiz am sumpfigen Ufer d. Rhone, am Genfer-, Neufchâtel- u. Murten-See; Rheing., Bodensee bei Bregenz, Constanz, im Bollmatinger Ried u., Mosel bei Trier; Destr. Böhmen, Tyrol, Siebenbürgen, Combarbei. 5—9. 4

25. *R. ophioglossifolius* Vill. K. syn. *R. ophioglossoides* Willd. *R. cordifolius* Bast. *R. fistulosus* Brignol. *R. uliginosus* Willd. en. *R. cochlearifolius* Hornem. Stehende Wasser am südl. Littorale Istrien, Insel Veglia, bei Aquileja, Dalmatien, Ungarn, Venedig. 5—6. ☉

26. *R. nodiflorus* L. Rchb. exc. Var. β *dentatus*. *R. nodiflorus* W. et Kit. Sümpfen, Gräben am Theiß in Ungarn, im Beszprer u. Bihar Comitat, u. im Banat. 6. ☉

27. *R. polyphyllus* Walds. et Kit. Rchb. exc. Ueberschwemmte Orte, Torfsümpfe in Ungarn am Theiß bei Szolnok. 5—6. 4

28. *R. Lingua* L. K. syn. *R. longifolius* Lamk. Stehende Wasser, sumpfige Gräben, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., Bodensee, von Basel stchw. bis in d. Niederlande, bei Rastatt, Mannheim, Hanau, Hagenau, Speier, Worms, Saarbrücken, Eifel, Bonn, Düsseldorf, Emmerich u. 7—8. 4

29. *R. Ficaria* L. K. syn. *Ficaria ranunculoides* Moench. Roth. Rchb. exc. p. 718. Wälder, Gebüsche, Zäune, schattige Wiesen dch. d. g. Geb. 4—5. 4

30. *R. calthaeifolius* Bl. et Nees. Comp. I. 2. *Ficaria* — Rchb. exc. p. 718. Im südl. Geb., Dalmatien an d. Abhänge d. M. Dsero. 3—4. 4

31. *R. Thora* L. K. syn. *R. scutatus* W. et Kit. Gebirgswiesen, Alpen u. Boralpen auf Kalk; Schweiz im Jura bei Lausanne über le Pertuis d'Avenire, oberhalb Ber, M. Salève bei Genf, M. Dole, M. Thoiry; Graubünden im Prättigau, u. um d. Sauerbrunnen v. St. Moritz; Steyermark an d. Sau bei Zilli, am Lüsserberg, Tyrol bei Brixen, Krain an d. Savegebirgen, Croatien, Galizien, Ungarn, Kombardei. 6—8. 4

32. *R. hybridus* Bria. K. syn. *R. Thora* Jacq. *R. Pseudo-Thora* Host. *R. Ptor* Crantz. Rchb. exc. Steinige Orte d. Kalkalpen, Destr. M. Schneeberg, Kärnthen Ruhwegeralp im Guithal, Steyermark a. d. Woga, bei Admont, Salzburg an d. Loferer, Tyrol M. Sollstein bei Zierl, Krain, Siebenbürgen, Kombardei. 7—8. 4

33. *R. illyricus* L. K. syn. *R. sericeus* Willd. *R. tomentosus* Mch. Grasstellen, Gebüschen, stellw. mehr im südl. Geb. Sachsen bei Dresden u. Mühlberg, Magdeburg bei Barby, Staßfurt, Schlesien bei Röslin; Destr. Böhmen, Mähren, Dalmatien, Croatien, Ungarn. 5—6. 4

34. *R. monspeliacus* L. Rchb. exc. Grasse Felsen in Piemont im Valle Angustana. 5—6. 4

35. *R. auricomus* L. K. syn. Sturm. *R. polymorpha* All. pedm. *R. cassubicus* Sturm. h. 59. *R. vernus* Spreng. Var. β . *R. binatus* W. et Kit. Rchb. exc. et icon. Fruchtbare, fette Wälder, Gebüsche, Waldwiesen stellw. dch. d. g. Geb. Rheing. nicht selten; d. Var. β . in Siebenbürgen. 4—5. 4

36. *R. cassubicus* L. K. syn. Schattige Wälder im östl. Geb. Schlesien bei Breslau, Leuthen, Ohlau, Leobschütz, Oberglogau, Ostpreußen in Cassuben; Mähren, Krain, Galizien; Kombardei. 4—5. 4

37. *R. flabellifolius* Heuffel Rchb. exc. p. 723. *R. flabellatus* Rchb. icon. Feuchte Orte der Kalkfelsen in Ungarn bei Krassowa u. in Croatien. 4. 4

38. *R. gracilis* Schleicher, Rchb. exc. *R. carinthiacus* Hoppe. *R. tenuifolius* Schleicher. Alpen u. Boralpen, Schweiz im Jura, M. Thoiry, Corni di Canzo; Kärnthen im Bobenthale, Krain, Dalmatien auf d. M. Biokovo. 4—8. 4

39. *R. montanus* Willd. K. syn. *R. nivalis* Jacq. non Lin. Var. β . major.: *R. pyrenaeus* Gouan. *R. Gouani* Willd. Rchb. icon. Alpen, Boralpen u. Niederungen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr.; Rheing., in Oberbaden bei Donaueschingen, Mähringen, Breisg. M. Feldberg, Immenbingen. 5—7. 4

40. *R. Villarsii* DC. K. syn. *R. lapponicus* Vill. delph. *R. orophilus* M. v. B. *R. Hornschuchii* Hoppe. Alpen u. Boralpen dch. d. südl. Kette, Südschweiz; Krain M. Ranaš, Glavnik u. Maggore, Littoral, Istrien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 5—6. 4

41. *R. acris* L. K. syn. Var. β . *R. Steveni* Andr. Rchb. exc. *R. napellifolius* Crantz. *R. propinquus* C. A. Meyer. *R. parvulus* Clairv. Wiesen, Wegen, Rainen im g. Geb. bis in d. Alpen. 5—6. 4

42. *R. lanuginosus* L. K. syn. Var. β . *geraniifolius* DC. Schattige Laubwälder aus d. Ebenen bis in d. Boralpen stellw. dch. d. g. Geb. Rheing., Constanz, im Badischen Jura, M. Dobel, Baden, Rastatt, Maischbach, Nußloch, Heidelberg, Hanau, Coblenz, Neuwied, Bonn, Kreuznach, an d. Saar bei Mettlach, Luxemburg; Württemberg, Baiern, Sachsen, Hamburg, Preußen bis Königsberg u. in g. Destr. u. — Var. β . bei Berviers in Belgien. 5—7. 4

43. *R. velutinus* Tenore K. syn. in add. 434. *R. Haarbuchii* Notaris test. Bertolon. Im südl. Littoral, Istrien u. d. Inseln; Lombardei. 5—6. 4

44. *R. polyanthemoides* L. K. syn. Var. α : *latifolius* Schimp. et Spenn. — β . *angustifolius* Schimp. et Spenn. Wälder, Waldwiesen, stellw. aber nur einzelnen dch. d. g. Geb., Rheing., Baden, im Breisg. am Kaiserstuhl, Karlsruhe, Pfalz a. d. Harbt, Saarbrücken, im Nahethale

bei Kirn, Meisenheim, Trier, Coblenz, Aachen, Bonn, Eurenburg 2c. 5—7. 4

45. *R. aureus* Schleicher Rchb. exc. et icon. *R. nemorosus* DC. K. syn. *R. Breyninus* Crantz austr. *R. sylvaticus* Thuill. *R. polyanthemos* β . *latifolius* F. Schultz, Flora d. Pfalz, *R. polyanthemos* b. *aureus* Schimp. et Spenn. Gebirgswälder u. sumpfige, torfige Gebirgswiesen, bis in d. Boralpen u. Alpen, v. d. Schweiz nach Destr. stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. Vom Jura dch. d. Vogesen nach Baden, Breisg. M. Feldberg, Pfalz Dürkheim an d. Hardt, Zweibrücken 2c., am Mittelrheine bei Coblenz, Boppard, Bonn, Siebengebirge, Ahrthal, Trier u. Eurenburg 2c. 5—7. 4

46. *R. pedatus* Waldst. et Kit. Rchb. exc. Sandige Hügel im südl. Geb. Dalmatien, Ungarn um Pesth u. Ofen am Schloßberge. Siebenbürgen. 4—5. 4

47. *R. repens* L. K. syn. Wiesen, Weiden, Dämmen, Wege, Aecker im g. Geb. 5—10. 4

48. *R. millefoliatus* Vahl. Rchb. exc. Desf. *R. chaerophyllus* L. Var. β . *R. flabellatus* Desf. Gebirgen im südl. Geb. Dalmatien, Insel Lesina u. mit d. Var. in Croatien. 4—5. 4

49. *R. bulbosus* L. K. syn. Var. β . *R. brachiatus* Schleich. Sonnige Hügel, Triften, Wege, Aecker im g. Geb. d. Var. β . Schweiz im Cant. Wallis. 5—7. 4

50. *R. Philonotis* Ehrh. K. syn. *R. hirsutus* Curt. Ait. Rchb. exc. *R. sardous* Crantz. *R. agrarius* All. pedm. *R. pallidior* Vill. *R. parvulus* L. Var. β . *subglaber*: *R. intermedius* Poir. *R. pumilus* Thuill. Feuchte, sumpfige Orte, Aecker, Weinberge dch. d. g. Geb. Rheing., besond. häufig v. Donnersberg bis in d. Nahe-, Glan- u. Saargegend u. theilweise bis Trier u. Aachen 2c. 5—7. ☉

51. *R. verrucosus* Presl. Rchb. exc. et icon. *R. trilobus* Desf. *R. trachycarpus* C.A. Meyer. Im südl. Eittoral, Triest zw. St. Anna u. Saule; Piemont an d. Straße nach Turin. 6—7. ☉. 4?

52. *R. laciniatus* Baumgarten. fl. Transylv. II. p. 131. Maly. enumer. plant. austr. p. 255. Trockene Bergstellen in Siebenbürgen. 6—7. 4

53. *R. sceleratus* L. K. syn. Sumpfige, moorige Orte, Wiesen, Triften, Gräben, dch. d. g. Geb. 5—10. ☉

54. *R. arvensis* L. K. syn. *R. echinatus* Crantz Var. β . *R. tuberculatus* DC. syst. — γ . *inermis* Nees. *R. reticulatus* Sch. et Reg. Fl. Bonn, Hecker, Felder im g. Geb. Var. β . Rheing. bei Bonn, Var. γ . Endenich bei Bonn u. Merzig. Flora v. Trier. 5—6. ☉

55. *R. muricatus* L. K. syn. Hecker, Schutt im südl. Littorale Istrien, Dalmatien, Croatien, Venedig u. 6—7. ☉

56. *R. parviflorus* L. K. syn. Wege, Weingärten im südl. Geb. Istrien, Fiume, Monfalcone, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Pavia, Rizza; Wasserbillig bei Trier u. in Belgien. 5—6. ☉

57. *R. insubricus* Cesati stirp. italic. Walpers Rep. I. p. 35. Maly. enum. pl. austr. p. 525. Im südl. Geb., Lombardei auf Mauern bei Mailand. 6—7. 4

IV. Gruppe. Helleboreen DC. syst. K. Taschb. 14.

9. *Caltha* L. (XIII. 5.) Dotterblume. K. syn. 20. Rchb. exc. p. 744. Comp. I. 2. p. 302.

1. *C. palustris* L. K. syn. Gräben, Sümpfen, Teichen, nasse Wiesen, Bächen im g. Geb. 4—5. 4

10. *Trollius* L. (XIII. 5.) Trollblume. K. syn. 21. Rchb. exc. p. 744. Comp. I. 2. p. 304.

1. *T. europaeus* L. K. syn. Var. β . *humilior*: *T. humilis* Crantz. *T. minimus* Wender. — γ . *T. medius* Wender. — δ . *tomoglossum* Rchb. icon. — ϵ . *viridis* Mielichhof. Gebirgswiesen bis in d. Boralpen, besonders dch. d. g. südl. Geb. Rheing., Basel, Oberbaden bei Billingen, Engen, Salem, Breisgau M. Feldberg, Hoerdt im Bernsbacher Thale,

Schwarzwald, Vogesen; Vogelsberg, Pfalz bei Blieskastel, nördl. um Königsberg bei Awenben zc. Var. in d. Schweiz. 6. 4.

11. *Eranthis* Salisbury (XIII. 5.) Winterling.

K. syn. 21. Rchb. exc. p. 745. Comp. I. 2. p. 304.

1. *E. hie malis* Salisb. K. syn. *Helleborus* — L. Koellea. — Bir. ren. *Robertia*. — Merat. *Helleb. monanthos* Mneh. Schattige Gebirgswälder besonders im südl. Geb., Schweiz, im Jura M. Chasseralle über Biel, Bern bei Morgues, Cant. Waadt bei Ber; Würtemberg bei Ulm, Rheing., Oberbaden bei Stocach, Eßrach; Elsaß bei d. Schloß Landsberg, bei Barr, Luxemburg bei Kutehant, Flora v. Spa bei Tathay bei Lüttich; Niederrhein auf Spillekes Werdt bei Emmerich, Westphalen; Thüringen, Jena nach Klossowiz; Destr. Krain, Ungarn, Croatien, Lombardei, Venedig, Verona, Pavia, Piemont. 2—3. 4

12. *Helleborus* L. (XIII. 5.) Nießwurz. K. syn.

21. Rchb. exc. p. 745. Comp. I. 2. p. 305.

1. *H. niger* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. Var. β . *H. altifolius* Hayne Rchb. exc. Thäler d. Kalkalpen u. Boralpen, besonders im südl. Geb., Schlesien, Oberbaiern; Schweiz Cant. Tessin; Destr. Böhmen, Steyermark, Salzburg, Tyrol, Krain, Galizien, Croatien, Lombardei u. Piemont. 1—2. 4

2. *H. viridis* L. K. syn. Rchb. icon. Gebirgswälder, Gebüschen, besonders im südl. Geb. u. zerstr. im mittlern Geb. oft verwildert; Schweiz bei Füssen, Basel, Rheing., Oberbaden bei Mühlheim, Bodenweiler, bei Ulm, Oberelsaß, Pfalz im Erzweiler Thale bei Kusel; Saar u. Mosel, Saarburg, Luxemburg, Zeltingen, Flora v. Trier, Eifel bei Prüm u. Münsterfels, Neuwied bei Coblenz, Bonn, Aachen, Elberfeld; Schwaben; Thüringen, Jena, Harz, Schlesien u. in g. Destr. excl. Dalmatien. 3—4. 4

3. *H. odoratus* W. et Kit. K. syn. Rchb. icon. Var. β . *H. atro rubens* W. et Kit. Rchb. exc. et icon. Berg-

wälder im südl. Geb., Grasgärten am Bodensee, Ried bei Bregenz, Tyrol, Salzburg, Steyermark, Krain a. d. Buzschenstein u. Savenstein bei Neustadt u. Wörbl; Ungarn, Croatien, Banat. 2—3. 4

4. *H. laxus* Host. Rchb. exc. et icon. Bergwälder im südl. Geb., Krain bei Idria u. in Slavonien. 2—4. 4

5. *H. dumetorum* W. et Kit. K. syn. Rchb. icon. *H. pallidus* Host. austr. Waldränder im südl. Geb. Steyermark, Innerkrain, Littoral, Istrien, Ungarn. 3—4. 4

6. *H. purpurascens* W. et Kit. Rchb. exc. et icon. Var. β . *H. Baumgartenii* Kowats. In Ungarn in d. Wäldern d. Matra, Verteser-Berg, Siebenbürgen, Galizien. 3—4. 4

7. *H. Bocconi* Tenore Rchb. exc. et icon. *H. multifidus* Visian. *H. angustifolius* Host. Gebirgsthäler im südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien M. Ragione bei Dizmo, Schloßberg bei Sign u. Massor. 3. 4

8. *H. graveolens* Host. Rchb. exc. et icon. Bergwälder in Slavonien bei Günskirchen. 3—5. 4

9. *H. foetidus* L. K. syn. Bewachsene Felsen, an Wegen, stellw. dch. d. g. Geb. Schweiz, nach Württemberg, Rheing., am g. Rheine abwärts bis in d. Niederlande, dch. Baden, Elsaß, Pfalz bis Coblenz, Bonn etc., Mainz, am Main bis Würzburg, an d. Mosel bis Trier u. Luxemburg, Nahe Thal bis Oberstein u. Meisenheim; Thüringen, Sachsen, dann in Destr. Tyrol, Steyermark, Lombardien, Venedig u. Oberitalien. 4—5. 4

13. *Isopyrum* L. (XIII. 5.) Muschelblümchen.

K. syn. 22. Rchb. exc. p. 747. Comp. I. 2. p. 307.

1. *I. thalictroides* L. K. syn. Schattige Laubwälder, besonders im südl. u. nördl. Geb., Ostpreußen bei Rastenburg u. Marienberg bei Königsberg, Schlesien bei Bissa, Leobschütz, Rupsdorfer Wald bei Löttschen; Destr. Böhmen auf d. Landskrone u. in allen Provinzen bis in die Lombardien etc. 5—6. 4

14. *Leptopyrum* Rchb. (XIII. 5.) Doldoße.
Rchb. icon. b. f. 4728.

1. *L. fumarioides* Rchb. icon. *Isopyrum* — *L.*
In Flandern. 6—7. ☉

15. *Nigella* L. (XIII. 5.) Schwarzkümmel. K. syn.
22. Rchb. exc. p. 750. Comp. I. 2. p. 308.

1. *N. arvensis* L. K. syn. Saatäcker, Gelber auf
Kalk, Thon u. Sand, stellw. dch. d. g. Geb. besonders im
südl. u. mittlern; Rheing. v. d. Schweiz bis Düsseldorf u.
Aachen. 2c. 6—8. ☉

2. *N. damascena* L. K. syn. Acker, Weingärten
im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Pie-
mont, Nizza, Genua u. stellw. im Geb. verwildert. 6—7. ☉

3. *N. sativa* L. K. syn. Acker im südl. Geb. Dal-
matien, Siebenbürgen: stellw. im Geb. cultiv. wie bei Mag-
deburg, Erfurt u. hin u. wieder verwildert. 6—7. ☉

16. *Aquilegia* L. (XIII. 5.) Akelei. K. syn. 13.
Rchb. exc. p. 747. Comp. I. 2. p. 309.

1. *A. vulgaris* L. K. syn. Rchb. icon. Var. β . *pla-*
tysepala Rchb. icon. *A. platysepala* Rchb. exc. Gebirgs-
wälder u. Waldbiesen besonders auf Kalk u. Sand. dch. d.
g. Geb. Rheing., v. d. Schweiz am g. Rheine abwärts u. in
d. Nebenthälern bis in d. Niederlande 2c.; Var. β . im südl.
Geb. u. in Schlessen. 6—7. 4

2. *A. nivea* Baumgarten fl. Transylv. II. 104. Maly
enum pl. austr. p. 257. *A. vulgaris* γ . *nivea* Rchb. icon.
f. 4729. Baumgärten in Siebenbürgen. 5—6. 4

3. *A. viscosa* W. et Kit. Gouan. Rchb. exc. et
icon. f. 4731. Alpenthäler im südl. Geb. Tyrol zw. d. M.
Schleren u. d. Alpen v. Fassa, bei Belluno, Krain, Croa-
tien, Lombardei am Corni di Conzo bei Como. 7—9. 4

4. *A. nigricans* Baumg. fl. Transylv. II. p. 104.
Maly enum. pl. austr. p. 257. Alpenthäler in Siebenbü-
rgen. 6—7. 4

5. *A. Haenkeana* Koch. K. syn. *A. alpina* Haenke in Jacq. coll. *A. Sternbergii* Rehb. exc. et icon. Alpen u. Boralpen im südl. Geb., Oberkärnthen an d. Felsen d. Drutenburger Alpen bei Spital, hohe Ufer d. Save bei Laibach, Krain an d. Jherna perst u. in Dalmatien. 6—7. 4

6. *A. atrata* Koch. K. syn. *A. nigricans* Rehb. exc. Alpen u. Boralpen, stellw. dch. d. Alpenkette, Schweiz im Bodenseeried bei Rheineck, Cant. Freiburg près de Bosgel, u. an d. Golbege, Oberbaiern über Tegernsee bei Kreuth neben d. Quelle; Kärnthen, Tyrol, Salzburg im Pöserer-Thale, Krain u. 6—7. 4

7. *A. alpina* L. K. syn. *A. montana* Sternberg. Felsen d. Alpen d. südwestl. Kette; Schweiz Cant. Waadt, Glarus, St. Gallen, Graubünden; Krain, Galizien, Lombardei. 7—8. 4

8. *A. pyrenaica* DC. syn. *A. alpina* Sternb. Lamk. *A. viscosa* Treviran. Felsen d. Alpen im südl. Geb. Kärnthen, Krain im Vipina-Thale, u. a. d. Arn. bei Rabl u. Tarvis, in Tyrol N. Schleren, Vittoral, Lombardei, Venedig, Col di Tenda, Schweiz am Comersee. 6—7. 4

Anmerkung. Nach Reichenbach wächst die echte *A. pyrenaica* DC. *A. viscosa* Treviran. nur in Vient auf d. Col di Tenda, u. alle übrigen Standorte gehören nach demselben zu *A. Sternbergii* Rehb., welche letztere Koch in seiner Synopsis zu *A. Haenkeana* gezogen hat.

17. *Delphinium* L. (XIII. 3.) Rittersporn. K. syn. 24. Rehb. exc. p. 735. Comp. I. 2. p. 256.

Erste Rotte. *Consolida* DC. K. syn.

1. *D. consolida* L. K. syn. Saatacker, Felber, Brachen dch. d. g. Geb. 6—8. ☉

2. *D. paniculatum* Host. K. syn. in add. p. 434. Rehb. exc. *D. divaricatum* Ledeb. Aecker im südl. Geb. Vittoral, Istrien, Insel Dsero, Dalmatien bei Cattaro u. in Ungarn. 6—7. ☉

3. *D. pubescens* DC. prodr. I. p. 51. Maly enum.

pl. aust. p. 258. *D. ambiguum* Loisl. Kecker im südl. Geb. Dalmatien. 6. ☉

4. *D. Ajacis* L. K. syn. Kecker im südl. Geb. Dalmatien; Lombardei bei Pavia u. in d. Novarese. Allgemein in Gärten als Zierpflanze u. stellw. im Geb. verwildert. 6—8. ☉

Zweite Rotte. *Delphinastrum* L. K. syn.

5. *D. peregrinum* L. Rchb. exc. All. pedm. *D. junceum* DC. *D. verdunense* Balb. *D. halteratum* Rchb. exc. *D. Cardiopetalum* DC. Saatäcker im südlichsten Geb. Dalmatien bei Spalato, Lombardei, Genua, Nizza. 4—5. ☉

6. *D. halteratum* Sibth. DC. prodr. I. p. 53. syst. I. p. 349. Maly enum. pl. austr. p. 258. An d. Felsen d. Berges Lubel in Croatien. 5. ☉

7. *D. elatum* L. K. syn. *D. intermedium* Ait. Rchb. exc. DC. syst. *D. Clusianum* Host. Var. β . *D. alpinum* W. et Kit. Rchb. exc. — γ . *D. palmatifidum* DC. syst. — δ . *D. cuneatum* DC. syst. — ϵ . *D. urceolatum* Jacq. DC. syst. — Gräßige Orte an Bächen d. Vor-alpen stellw. Schweiz Cant. Waadt über Ber, Helener Bergen; Schlesien in d. Sudeten, bei Glas; Destr. Böhmen, Mähren in d. Carpaten, Steyermark in d. Judenburger Alpen, Kärnthen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Lombardei. 6—7. 4

8. *D. montanum* DC. syst. Rchb. exc. et icon. *D. elatum* All. pedm. *D. hirsutum* Roth. *D. pyrenaicum* Pourr. *D. elatum* L. Var. α . K. syn. in not. Südschweiz Helener Alpen, an d. Savaraz u. in Piemont. 7—8. 4

9. *D. hybridum* Willd. K. syn. *D. fissum* W. et Kit. Steinige Waldstellen im südl. Geb. Littoral, Istrien bei Triest im Walde v. Vipizza u. an d. Karst, Dalmatien, Ungarn im Banat bei Mehavia, M. Domuglet u. in Siebenbürgen etc. 6—7. 4

10. *D. Staphysagria* L. K. syn. Im südl. Littoral, Istrien u. d. Inseln, Dalmatien; Nizza. 6—7. ☉

18. *Aconitum* L. (XIII. 3.) Eisenhut. K. syn. 25.
 Rchb. exc. p. 737. Comp. I. 2. 259.

1. *A. Anthora* L. K. syn. *A. Jacquini* Rchb. exc.
A. nemorosum M. v. B. Rchb. *A. D. Candolii* Rchb.
 Felsen d. Alpen, Schweiz besonders im Jura, M. Dolaz u.
 Thoiry, Graubünden; Oestr. Tyrol, Steyermark, Krain,
 Littoral, Galizien, Ungarn, Croatien, Siebenbürgen. 8–9. 4

2. *A. Napellus* L. K. syn. Gehören hierher:

a. Sporn kopfförmig.

α. Staubfäden behaart.

1. *A. Napellus* Dodon. Rchb. icon. f. 4700. 2. *A. neubergense* Clus. Rchb. icon. f. 4694. 3. *A. autumnale* Clus. Rchb. icon. f. 4693. 4. *A. eminens* Koch. Rchb. icon. f. 4695. 5. *A. multifidum* Koch. Rchb. icon. f. 4696. 6. *A. callibotryon* Rchb. icon. f. 4696. b. *A. amoenum* Rchb. 7. *A. pyramidale* Mill. Rchb. icon. f. 4697. 8. *A. Bernhardiana* Rchb. icon. f. 4698. Var. β. *A. albidum* Bernh. 9. *A. pubescens* Moench. Rchb. icon. f. 4699. *A. Funkeanum* Rchb. exc. 10. *A. laxum* Rchb. icon. f. 4701. Letzteres nur in Steyermark.

β. Staubfäden kahl.

11. *Acutum* Rchb. icon. f. 4702. 12. *A. Hoppeanum* Rchb. icon. 4703. In Kärnthén bei Heiligenbluth. 13. *A. angustifolium* Bernh. Rchb. icon. f. 4704. *A. tenuifolium* Host. austr. Steyermark u. Krain.

b. Sporn kopflos, stumpf.

α. Staubfäden behaart.

14. *A. tauricum* Wulf. Rchb. icon. f. 4709. Var. β. *A. commutatum* Rchb. monogr. 15. *A. formosum* Rchb. icon. f. 4706. 16. *A. hians* Rchb. icon. f. 4705. 17. *A. strictum* Bernh. Rchb. icon. f. 4707. 18. *A. laetum* Rchb. icon. f. 4708. *A. laetum* β. *rigidum* Rchb. icon. f. 4708. b. 19. *A. Koehleri* Rchb. icon.

4708. c. Var. β . *A. plicatum* Koehler. Rchb. icon. f. 4708 d. Fast alle nur in d. Sudeten.

β . Staubfäden fahl

20. *A. Kölleanum* Rchb. icon f. 4710. Schattige Orte an Bächen d. Alpen, Boralpen u. Gebirgen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, d. Geb. Rheing., Oberbaden bei Billingen, M. Belchen, Feldberg im Breisg., in d. Vogesen u. auf d. Schwarzwalde, häufig in d. Mittel-Eifel, in d. Flora v. Trier bis Münster-eifel gegen Bonn, im Rhl- u. Nims-Thale an schattigen Ufern; Hessen an d. Vogelsberg. Thüringen bei Jena, Baiern, Schlesien, Hamburg, Holstein bei Trittau; Destr. Böhmen, Mähren, Vittoral bis in d. Lombardei. 7—9. 4

3. *A. Stoeckeanum* Rchb. K. syn. *A. Napellus* Stoeck. *A. intermedium* DC. *A. neomontanum* Willd. *A. palmatifidum* Rchb. *A. exaltatum* Bernh. Rchb. *A. virgatum* Rchb. icon. Var. β . *versicolor* Rchb. icon f. 4690. *A. speciosum* Otto. Alpen u. Boralpen u. Gebirgswälder; Schweiz dch. d. Berner Alpen u. nach Württemberg, d. Schwarzwalde; Thüringen bei Breitenbach, Jena, Unterharz, Schlesien bei Carlsbrunn im Gesenke; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Salzburg an d. Untersberg, Tyrol, Krain, Galizien, Ungarn. 6—8. 4

4. *A. variegatum* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. *A. Bernhardianum* Wallr. sched. Rchb. exc. et icon. *A. rostratum* Bernh. Rchb. icon. *A. cammarum* Rchb. exc. et icon. *A. nasutum* Fisch. Rchb. icon. Var. β . *A. cammarum* Jacq. *A. Napellus* Schkr. Thäler d. Alpen, Boralpen u. Gebirge, Schweiz u. dch. d. g. südl. u. mittlere Alpenkette bis Württemberg, zw. Trochtelfingen u. Meyerkingen auf d. Heuberge, nach Franken, Thüringen, Harz, Königsberg an vielen Orten, Elbing u., Schlesien in d. Sudeten u. in g. Destr. 7—8. 4

5. *A. molle* Rchb. exc. et icon. Alpen d. Südschweiz auf d. Tavennaz u. Bovannaz. 8—9. 4

6. *A. Toxicum* Rchb. exc. et icon. Alpen in Siebenbürgen. 7—8. 4

7. *A. acuminatum* [Rehb. icon. f. 4689. Alpen d. Schweiz, Cant. Wallis u. Cant. Glarus. 7. 4

8. *A. paniculatum* Lamk. K. syn. Rehb. icon. *A. cernuum* Wulf. Rehb. icon. *A. flexicaule* Hoppe. *A. hebegynum* DC. Rehb. icon. Alpen, Schweiz im Cant. St. Gallen auf d. Rheineth, Cant. Bern u. Wallis, Gemmi M. Bovannaz; Destr. Kärnthen, Steyermark, Salzburg, Krain, Littoral, Siebenbürgen, Lombardien, Piemont. 7—8. 4

9. *A. Lycoctonum* L. K. syn. *A. pyrenaicum*, *A. Myoetionum*, *A. Thelyphonum* et *A. Vulparia* Rehb. icon. f. 4678 bis 6781. *A. Jacquinianum*, *A. intermedium*, *A. pauciflorum*, *A. parvisolium* et *A. pyrenaicum* Host. fl. austr. Gebirgswälder u. Boralpen, schattige Orte an Bächen, Ufern d. Gebirgen u. dch. d. g. Alpenkette, Rheing., Elsaß, Oberbaden, Schwarzwald, Breisg. M. Feldberg, Bogesen, Rastatt, Pfalz am Donnersberg, bei Dahn, Kreuznach u. Oberstein an d. Nahe, Hochwald, Eifel bei Trier, Luxemburg in d. Ardennen, Malmédy, Aachen, Coblenz, auf d. Mayenfeld, Hochsinner bei Gemünd, Flora v. Bonn, Thüringen, Sachsen u. Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. 11. 6—7. 4

10. *A. ochroleucum* M. v. B. Baumg. fl. Transylv. II. p. 97. Maly enum pl. austr. p. 259. Bergwiesen in Siebenbürgen. 7. 4

11. *A. ranunculifolium* Rehb. exc. et icon. 4681. Alpen v. Tyrol auf d. Schleren. 6—7. 4

12. *A. septemtrionale* Baumg. fl. Transylv. II. p. 98. Maly enum. pl. austr. p. 259. *A. Lycoctonum* β . *caeruleum* Wahlb. carp. Gebirgswälder in Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7. 4

V. Gruppe. Paeoniaceen. Paeoniariae Rehb. exc. p. 750. Ranunculaceae spuriae DC. K. syn. K. Taschb. 18.

19. *Actaea* L. (XIII. 4.) Christophskraut. K. syn. 27. Rehb. exc. p. 751. Comp. I. 2. p. 234.

1. *A. spicata* L. K. syn. *A. nigra* Fl. Wett. Wälder, Hainen stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. Jura dch. Baden, Elsaß, Pfalz, Bergstraße bis Coblenz, Bonn, Trier, Aachen u. 4—6. 4

20. *Cimicifuga* L. (XIII. 4.) Wanzenkraut. K. syn. 27. Rchb. exc. p. 750. Comp. I. 2. p. 264.

1. *C. foetida* L. K. syn. *Actaea Cimicifuga* L. spec. Gebirgswälder in Ostpreußen, Thorn bei Wolfsmühle am Weichselufer bei Graudenz, Marienburg u., Mähren bei Oloun, Galizien; Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

21. *Paeonia* L. (XIII. 2.) Sictrose. K. syn. 27. Rchb. exc. p. 751. Comp. I. 2. p. 254.

1. *P. corallina* Retz. K. syn. Bewachsene Felsen, Waldstellen im südl. Geb., Destr. Tyrol, Salzburg bei Reichenhall, Krain M. Nanaß, Dalmatien, Lombard bei Como, Piemont. 4—5. 4

2. *P. officinalis* L. Retz. Rchb. exc. *P. festiva* Tausch. Waldstellen in Galizien, Ungarn. 5—6. 4

3. *P. pubens* Sims. Rchb. exc. et icon. *P. rosea* Host. austr. Var. β . *P. bannatica* Rochel. Gräßige Orte im südl. Eittoral, Istrien bei Saguria, Matera, Lipizza, Triest, Krain u. Südtirol; d. Var. im Banat bei d. Dorfe Ulma. 5—6. 4

4. *P. peregrina* DC. K. syn. Rchb. exc. *P. officinalis* et *P. peregrina* M. et K. Gaud. *P. lobata* Desf. Var. β . *P. humilis* Retz. — γ . *P. peregrina* β . DC. syst. *P. paradoxo* β . *lejocarpa* DC. prodr. Wälder im südl. Geb. Schweiz Cant. Tessin, M. Generoso, im Thale Cassina oberhalb d. Comersee. 5—7. 4

5. *P. Russi* Bivonna. Bertol. fl. ital. Maly enum. pl. austr. p. 260. Gebirgen u. Boralpen in d. südlichsten Kette, Krain am Adelsberg, Dalmatien. 5—6. 4

6. *P. tenuifolia* L. Rchb. exc. Gräßige Abhänge in Ungarn, im Banat u. in Siebenbürgen. 3—4. 4

Zweite Ordnung. Berberideen.

Vent. K. syn. 28. K. Taschb. 19. Papaverac. pars
Rchb. exc. p. 702. et icon. tab. 18.

22. *Berberis* L. (VI. 1.) Sauerdorn. K. syn.
Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 624.

1. *B. vulgaris* L. K. syn. Var. β . *heterophylla*
Wierzb. Gebirgswälder im g. südl. bis ins mittlere Geb.,
im nördl. nur angepflanzt, Rheing., v. d. Schweiz stellw.
bch. d. g. Rheingeb. u. in d. Nebenthälern u. 5—6. 3

23. *Epimedium* L. (IV. 1.) Sockenblume. K.
syn. 29. Rchb. exc. p. 702. Comp. I. 1. p. 257.

1. *E. alpinum* L. K. syn. Schattige Orte, Gebü-
schen mehr im südl. Geb., Luxemburg im Brunewalde, Ost-
preußen bei Danzig; Kärnthen, Tyrol, Krain, Vittoral,
Istrien, Lombardien, Venedig, Genua, Piemont. 4—5. 4

24. *Leontice* L. (VI. 1.) Leontice. Person. syn.
I. p. 386.

1. *L. Leontopetalum* L. DC. prodr. I. p. 109.
Maly enum. pl. austr. p. 260. In Dalmatien. 4

Dritte Ordnung. Nymphaeaceen.

DC. K. syn. 29. Taschb. 19. Hydrocharideae pars
Rchb. exc. p. 14.

25. *Nymphaea* L. (XIII. 1.) Seerose. K. syn.
Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 234.

1. *N. alba* L. K. syn. Var. β . *minor*. DC. In ste-
hendem u. langsamfließendem Wasser, Seen, Teichen, stellw.
bch. d. g. Geb., Rheing. auf d. g. Rheinfläche, besonders in
d. Altwasser bch. Baden bis Worms, Bonn, Köln, Düsseldorf,
Aachen, Trier u. 6—7. 4

2. *N. biradiata* Sommerauer K. syn. Stehende Wasser, Sümpfe, Destr., Peltenthal in Steyermark, im Triebener-See, Salzburg, Zellersee im Pinzgau. 7—8. 4

3. *N. candida* Presl. K. syn. Stehende Wasser in Böhmen. 7—8. 4

4. *N. thermalis* DC. Rchb. exc. *N. lotus* W. et Kit. An d. heißen Quelle Pels bei Großwardein in Ungarn. 5—8. 4

26. *Nuphar* Smith (XIII. 1.) Teichrose. K. syn 30. Rchb. exc. p. 14. Comp. I. 2. p. 236.

1. *N. luteum* Sm. K. syn. Var. β . minor DuMort. *N. tenella* Rchb. In stehendem Wasser, stchw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

2. *N. sericeum* Lang. Rchb. exc. *N. lutea* β . *sericeum* Comp. I. 2. p. 237. Gräben in Ungarn an d. Donau bei Waizen u. in Galizien. 7—8. 4

3. *N. pumilum* Smith. L. K. syn. *Nymphaea* — Hoffm. *N. minima* Sm. *N. halmiana* Hook. Teiche, Seen, stchw. im Geb., Mecklenburg bei Laugnitz, Lauenburg bei Eichbaums, Schlessen bei Pless; Salzburg, Zellersee im Pinzgau in Tyrol, Schweiz bei Zürich. 6—8. 4

4. *N. Spennerianum* Gaud. helv. K. syn. *Nymph. minima* Spenner. Bergseen im Schwarzwalde, Felsberg am Schluchsee, Herrnwiese, Elsaß am Schwarzsee u. in d. Vogesen in d. Seen v. Gerardmer, Longemer u. Retournemer. 7—8. 4

Vierte Ordnung. Papaveraceen.

DC. K. syn. 30. K. Taschb. 20. Papaveraceen Rchb. exc. p. 699. et icon. XIII. Tab. 9 bis 17.

27. *Papaver* L. (XIII. 1.) Mohn. K. syn. Rchb. exc. p. 700. Comp. I. 2. p. 237.

1. *P. alpinum* L. K. syn. Rchb. exc. *P. alpinum* α . *albiflorum* K. syn. *P. Burseri* Crantz, *P. alpinum* Jacq.

Hochalpen bis in d. südlichsten Geb., Schweiz Cant. Wallis, Cant. Luzern M. Pilatus u.; Oestr. Tyrol, Steyermark, im Oberinnthale, Salzburg, Krain, Littoral, Siebenbürgen u. 7—8. 4

2. *P. pyrenaicum* Willd. Rchb. exc. et icon. *P. alpina* β . *flaviflorum* K. syn. *P. alpinum* Hoppe, *P. pyrenaicum* α . *luteum* DC. syst. *P. aurantiacum* Loisl. Hochalpen, Schweiz an d. Bernina-Kette; Kärnthen, Tyrol Kirchbaumeralp, Salzburg, Wormserjoch, Krain, Littoral, 7—8. 4

3. *P. Argemone* L. K. syn. *P. clavigerum* Lamk. *P. arvense* Borkh. — *P. maritimum*. Wisser. Saatacker, Felder, Schutt, dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

4. *P. hybridum* L. K. syn. *P. argemonoides* Cesat. test. Bertol. Necker, Rainen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., im Elsaß bei Colmar, Ruffach; Pfalz bei Mecktersheim bei Speyer, Forst, Grünstadt, Oppenheim, Rierstein, stellw. bis Mainz, Kreuznach, Disibodenberg, Luxemburg, Belgien, Darmstadt, Wetterau, Weilburg, Neuwied, Koblenz bei Bonn; Thüringen, Jena, Sachsen, Erfurt, Halle, Magdeburg, Barby; Mecklenburg bei Malchin; Krain, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien, Lombard. 5—7. ☉

5. *P. Rhocas* L. K. syn. Var. β . *P. intermedium* Becker Rchb. exc. — γ . *strigosum* Boeningh. — δ . *P. Roubiaei* Vig. diss. — ϵ . *P. trilobum* Wallr. Sandige Necker, Felder, Ufer, Schutt im g. Geb. 6—7. ☉

6. *P. dubium* L. K. syn. Var. β . *glabrum*: *P. laevigatum* M. v. B. Necker, Felder, Brachfelder, dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

7. *P. somniferum* L. K. syn. Var. α . *album*: *P. officinale* Gmel. — β . *nigrum*: *P. somniferum* Gmel. bad. Aus d. Orient, u. im g. Geb. cultivirt. 7—8. ☉

28. *Glaucium* Tournef. (XIII. 1.) Hornmohn.

K. syn. 32. Rchb. exc. p. 699. Comp. I. 2. p. 240.

1. *G. luteum* Scopol. K. syn. *G. flavum* Crantz. *Cheledonium Glaucium* L. Var. β . *G. fulvum* Rchb. exc. et icon. Sandige Hügel an d. Seeküste, Landseen u. auf

Necker, besonders im g. südl. Geb., Rheing., Pfalz zw. Worms u. Kirchheimboland, bei Zell an d. Pfimm; Jena, Thüringen an d. Gerainseln bei Erfurt, im Mannsfeldischen, Rüste in Mecklenburg, Ostsee bei Memel, Danzig; Destr. bei Wien, Mähren, Steyermark, Littoral Istrien, Dalmatien, Croatien, Galizien, Lombardie, Venedig; Schweiz am Neuchâtel-See, Cant. Wallis am Montorge. 6—7. ☉

2. *G. corniculatum* Curtis K. syn. Rchb. exc. Var. β . *G. rubrum* Sibth. Rchb. exc. *G. tricolor* Bernh. Rchb. pl. crit. et icon. *Chelidonium corniculatum* L. *Gl. phoeniceum* Gaertn. Wegen, Necker, besonders im südl. Geb. Rheing., Pfalz zw. Schwellingen u. Eckstein, zw. Mardorf u. Oggersheim, Trimb bei Mayen Flora v. Coblenz; Thüringen bei Erfurt, Frankenhausen, Eisleben, Sachsen; Destr. bei Wien, Böhmen, Mähren bei Brünn, Ungarn u. Siebenbürgen. 6—7. ☉

29. *Chelidonium* L. (XIII. 1.) Schöllkraut. K. syn. 32. Rchb. exc. p. 699. Comp. I. 2. p. 241.

1. *Ch. majus* L. K. syn. Var. β . *laciniatum*: *Ch. laciniatum* Mill. Rchb. exc. DC. *Ch. quercifolium* Willemet. Hecken, Büden, Schutt, im g. Geb. Var. β . Rheing., Baden bei Karlsruhe, Hamburg, Schlesien bei Frankfurt a. d. D., Ungarn. 5—10. 4

30. *Hypecoum* L. (IV. 2.) Leppenblume. K. syn. 33. Rchb. exc. p. 699. Comp. I. 2. p. 262.

1. *H. pendulum* L. K. syn. Esparsetten- u. Gelbräbenacker in d. Rheinpfalz bei Gönheim, Ellerstadt, Fußgönheim. 5—7. ☉

2. *H. procumbens* L. Rchb. exc. *H. legitimum* Clus. Olivengärten in Westligurien, Genua. 3—5. ☉

3. *H. littorale* Wulf. Rchb. exc. Südlittoral, an d. adriatischen Meere, in Dalmatien. 6—7. ☉

Fünfte Ordnung. Fumariaceen.

DC. K. syn. 33. K. Taschb. 22. Papaverac. pars Rchb.
exc. p. 696. icon. Cent. XIII. t. 1—8.

31. *Corydalis* DC. (XVII. 4.) Lerchensporn. K.
syn. Rchb. exc. p. 698. Comp. II. 131.

1. *C. cava* Schweig. et Koert. K. syn. *C. bulbosa*
Pers. Rchb. exc. *C. tuberosa* DC. *Fumaria bulbosa* L.
F. cava Ehrh. Mill. *F. major*. Roth. *Borkhausenia cava*
Fl. Wetter. Schattige Orte, Hainen, Hecken, Wiesen, stellw.
bch. d. g. Geb. 4—5. 4

2. *C. solida* Smith. K. syn. *C. digitata* Pers. Rchb.
exc. *C. bulbosa* DC. *C. Halleri* Hayne, *Fumaria* — Willd.
F. solida Ehrh. *F. bulbosa* γ. L. *Barkhausia solida* Fl.
Wett. Wald- u. Wiesenränder, Hecken, Gebüsche, stellw.
bch. d. g. Geb. 3—4. 4

3. *C. fabacea* Pers. syn. K. syn. *C. alpina* Walp.
Rep. *C. intermedia* Merat. *Fumaria* — Ehrh. Schkr. *F.*
fabacea Retz. *F. bulbosa* β. L. Schattige Waldstellen, Ge-
büschen, besonders in Gebirgsgegenden u. mehr im nördl.
Geb., Schweiz im Thurgau, Rheing., Basel, Elsaß auf d.
Hoheneck u. im Frankenthaler-Thale; Westphalen, u. bch. d.
nördl. Deutschl. v. Hamburg bis Preußen, Graubenz, Königsberg,
Danzig, Schlesien nach Sachsen, Thüringen nach
Baiern bei Baireuth, Muggendorf, Nürnberg, München;
Destr. Böhmen, auch in d. Lombardei u. in d. Alpen d.
Schweiz u. Salzburgs. 4—5. 4

4. *C. pumila* Host. K. syn. *C. Lobelii* Tausch., *Fu-*
maria pumila Host. Bergwälder, Niedersachsen; Destr.
Briel u. Baden bei Wien, Böhmen bei Prag, Steyermark.
3—4. 4

5. *C. lutea* DC. K. syn. *C. capnoides* β. DC. syst.
Fumaria lutea L. *Borkhausenia* — Fl. Wett. Felsen, alte
Mauern, stellw. besonders im g. südl. Geb., Rheing. bei
Constanz, Basel, Elsaß bei Straßburg, Pfalz bei Pirmasens,

Nassau am Idsteiner-Schloß, Linz a. Rhein, Eöln, Emmerich am Altenberge, Aachen, Trier; Sachsen bei Dresden; Schweiz Cant. Tessin; Südtirol, Destr. Littoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Nizza. 6—9. 4

6. *C. ochroleuca* Koch. K. syn. *C. capnoides* α. DC. *C. acaulis* β. Rehb. icon. Fumar. capnoides Scopol. non Lin. Felsige Orte im südl. Geb., Südtirol, Krain, Istrien bei Triest, Fiume, in Croatien u. Siebenbürgen. 7—9. 4

7. *C. acaulis* Pers. K. syn. *Fumaria* — Wulf. Felsen, Mauern am südl. Littoral, Istrien bei Pola u. Triest. 5—7. 4

8. *C. capnoides* L. K. syn. in add. 435. *C. Gebleri* Ledeb. Kalkfelsen in d. Carpathen, Tyroler-Alpen im Pusterthale u. im obern Teserecken. 6—7. ☉

9. *C. claviculata* DC. K. syn. Wälder im nördl. Geb., Westphalen nach Oldenburg bis Bremen, Varel, Lüneburg bis Holstein u. in Belgien. 6—9. ☉

32. *Fumaria* L. (XVII. 4.) Erdrach. K. syn. 35. Rehb. exc. p. 697. Comp. II. p. 129.

1. *F. capreolata* L. K. syn. Cultivirte Orte, Gärten, an Zäunen, Schutt, mehr im südl. Geb., Rheing., Oberbaden, Mannheim; Weßlar, Coblenz, Neuwied, Holstein, Schleswig, Magdeburg, Barby, Nürnberg: Südschweiz; Destr. Littoral, Istrien, Dalmatien, Galizien, Lombardien. 6—9. ☉

2. *F. muralis* Sonder. K. syn. in add. 1017. *F. Petteri*. K. syn. edit. I. An Mauern bei Horn u. Schiffeld, Flora v. Hamburg. 6—9. ☉

3. *F. agraria* Lagasca K. syn. in add. 1017. *F. major*. Baddaro Rehb. exc. *F. media* DC. syst. Loisl. Mauern, Zäunen id. südl. Littoral, Istrien, Destr., Pola; Genua. 5—6. ☉

4. *F. Petteri* Rehb. icon. fl. germ. t. 2, Ackeränder an Wegen im südl. Geb. Dalmatien, Ungarn bei Bafas. 7. ☉

5. *F. officinalis* L. K. syn. Var. α. vulgaris: *F. media* plur. bot. et Rehb. — β. minor. *F. officinalis tenuifolia* Fries. Cultivirte Orte, Schutt, im g. Geb. 5—9. ☉

6. *F. Wirtgenii* Koch. K. syn. in add. 1018. Cultivirte Orte, Acker am Mittelrheine, Coblenz bei Moselweis, Bonn, Eöln, Trier; Thüringen bei Jena. 5—9. ☉

7. *F. Vaillantii* Loisl. K. syn. Acker, Felder, besonders auf Kalk, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., Baden bei Billingen, Salem, Mannheim, Pfalz bei Worms, Alzen, Mainz, Nahe-, Saar- u. Mosel-Thale, häufig bei Trier, Coblenz, Bonn, Neuwied, Eöln, Aachen; Thüringen, Sachsen, Jena; Destr. bis in d. Kombarbei. 5—6. ☉

8. *F. micrantha* Lagasca. K. syn. in add. 1018. *F. calycina* Babingt. *F. densiflora* DC. Thonhaltige Acker bei Hamburg vor dem Sternthore. 6. ☉

9. *F. parviflora* Lamk. K. syn. *F. tenuifolia*. Fl. Wett. Felder, Acker, Wege, Schutt, im südl. u. mittlern Geb., Rheing., Bodenseegegend, Pfalz Mannheim, Worms, Westhofen, Grünstadt, Alzen, Mainz, Darmstadt bis Frankfurt, Friedberg, Mainz, Nahe-, Glan- u. Mosel-Thale, Kreuznach, Meisenheim, Trier, Luxemburg, Coblenz, Bonn, Eöln, Aachen; Mähren, Littoral Istrien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Kombarbei, Venedig. 6—9. ☉

10. *F. spicata* L. Rchb. exc. Saatäcker im südl. Geb., Belgien bei Lüttich; Kombarbei, Piemont bei Gusa, Nizza u. in d. Novarese. 4—5. ☉

Sechste Ordnung. Cruciferen.

Juss. K. syn. 36. K. Taschb. 24. Tetradinamiae Rchb. exc. p. 654. et icon. t. 1—98. fig. 4157—4440.

Erste Unterordnung.

Siliquosen, Schotenfrüchtige. K. Taschb. p. 24. Tetradinamia Siliquosae Lin.

I. Gruppe. Arabideen K. Taschb.

33. *Mathiola* Rob. Brown. Levfoi. K. syn. Rchb. exc. p. 684. Comp. II. p. 54.

1. *M. varia* DC. K. syn. *Cheiranthus varius* Sibth. *Ch. tristis* Suffren. Sturm. II. 22. Sandige, steinige Orte im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Binn bei Goms; Südtirol am Gardasee, Dalmatien, Lombardei, Piemont, Savoyen. 5—6. 4

2. *M. glandulosa* Visian. fl. Dalmatic. Maly enum. pl. austr. p. 263. In Dalmatien. ☉

3. *M. sinuata* R. Brow. K. syn. in add. 435. Rchb. exc. *Cheiranthus* — Host. austr. Felsen am südl. Eittoral, Istrien am Schlosse Duino, Dalmatien; Nizza. 4—5. ☉

4. *M. incana* R. Brow. Rchb. exc. *Cheiranthus* — L. Felsen, Mauern im südl. Eittoral, Dalmatien bei Ragusa, Genua, Capo di Noli. 4—5. 5

5. *M. tristis* R. Brow. Rchb. exc. *Cheiranthus*. — L. Sonnige Orte im südl. Geb., Krain bei Benzene, Eittoral Istrien, Piemont. 5—6. 5

34. *Cheiranthus* L. Jacq. K. syn. 36. Rchb. exc. p. 681. Comp. II. p. 56.

1. *Ch. Cheiri* L. K. syn. *Ch. fruticulosus* L. Alte Mauern, Felsen, stellw. besonders im südl. u. mittleren Geb., Rheing., an alten Mauerwerken am g. Rhein hinab v. Basel bis Wesel, bei Heidelberg, Worms, Mainz, Coblenz, Köln, Nahegebirgen bei Kreuznach, Kirn, Meisenheim; Luxemburg, Mosel bei Berncastel, Trarbach; Südtirol Krain, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Venedig, Piemont. 5—6. 5

35. *Nasturtium* R. Brow. Brunnenfresse. K. syn. 37. Rchb. exc. p. 683. Comp. II. p. 56.

a. *Nasturtium* *. *Cardaminum* DC. K. syn.

1. *N. officinale* R. Br. K. syn. Rchb. exc. *Sisymbrium Nasturtium* L. Baeumerta. — Fl. Wett. *Cardamine fontana* Lamk. Var. β . *N. mycrophyllum* Boeningh. Rchb. exc. Flüsse, Bächen, Quellen, Wiesengräben stellw. dch. d. g. Geb. 6—9. 4

2. *N. siifolium* Rehb. exc. *N. officinale* β . *siifolium* K. syn. In einem Teiche bei Mofritz unweit Dresden. 6—9. 4

b. *Armoracia*. Fl. Wetterau.

3. *N. Armoracia* F. W. Schultz Flora d. Pfalz. Fries mantiss. III. *Armoracia rusticana* Fl. Wett. K. syn. 71. *Cochlearia* — Lamk. C. *Armoracia* L. Rehb. exc. p. 669. *Raphanis magna* Moench. Seefüfte u. an Seen, Flußufern, Sümpfen, Gräben dch. d. g. Geb. wohl nur verwildert. 6—7. 4

4. *N. macrocarpum* * *Cochlearia macrocarpa* W. et Kit. Rehb. exc. *Cochlearia Armoracia* β . Sadler. Schattige, feuchte Orte, besonders auf salzhaltigem Boden, Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. 4

c. *Roripa* Rehb. icon. *Brachylobus* DC. K. syn.

5. *N. austriacum* Crantz. K. syn. *Camelina austriaca* Pers. *Roripa* — Rehb. icon. *Chamaelinum austriacum* Host. *Myagrum* — Jacq. M. *Crantzii* Vitm. Feuchte Orte, Uferwiesen, schattige Flußufer; Rheing., Weidengebüſche bei Boppard am Rheine, Sachsen an d. Elbe bis über Dresden, Schlefien an d. alten Oder bei Rosenthal, Oppeln, Troppau; Destr. an d. Donau, Böhmen an d. Wistawa, Mähren, Steyermarf, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien. 6—7. 4

6. *N. amphibium* R. Brow. K. syn. *Sisymbrium* — L. *Roripa* — Scopol. Rehb. icon. *Caroli-Gmelina lancifolia* Fl. Wett. *Myagrum aquaticum* Lamk. *Brachylobus amphibius* All. ped. *Cochlearia aquatica* Meyen. Var. α . *indivisum* DC. syst. *N. aquaticum* Wallr. Tausch. — β . *variifolium* Rehb. icon. Sturm. — γ . *auriculatum* DC. Rehb. icon. *N. riparium* Wallr. *Sisymbrium stoloniferum* Presl. — δ . *submersum* Tausch. Flüſſe, Teiche, Gräben, dch. d. g. Geb. 5—7. 4

7. *N. armoracioides* Tausch. K. syn. in add. 436. *N. anceps* β . Cesati Feuchte Gebüſche, Wiesen an d. Elbe,

Hamburg bei Geesthacht, u. a. d. Moldau in Böhmen, Destr. u. in d. Lombardei. 6—7. 4

8. *N. terrestre* Tausch. K. syn. in add. 436. Var. α . *integrifolium* Tausch. — β . *pinnatifidum* Tausch. Feuchte Wiesen, Böhmen, Tyrol, Lombardei. 6—7. 4

9. *N. anceps* Rchb. DC. K. syn. *N. barbaraeoides* Tausch. *Sisymbrium anceps* Wahlb. Feuchte Wiesen, Gräben, Ufer, stchw. dch. d. Geb. Rheing., Hafen bei Constanz, Rheininseln in Baden, Laubenheim bei Bingen, Weilburg, Coblenz, Bonn, an d. Siegmündung, am Niederrhein, an d. Nahe u. am Glan bei Obernheim, Moselufer bei Trier, Luxemburg an d. Sauer; Westphalen, Hamburg am Elbufer bei Grashbrook, im Vierlanden, Sachsen, Elbe bei Dresden, Schlesien; Destr. Böhmen, Steyermark, Tyrol, Krain, Lombardei. 6—7. 4

10. *N. sylvestre* R. Br. K. syn. *Sisymbrium* — L. Var. β . *N. rivulare* Rchb. exc. *Roripa* — Rchb. icon. — γ . *dentatum*: *N. sylvestre* Rchb. exc. — δ . *brevistylum*: *N. sylvestre* Sturm. *N. astylon* Rchb. icon. — ϵ . *N. Morisoni*: Tausch. bot. Zeit. Feuchte Wiesen, Triften, Gräben, Ufern im g. Geb. 6—8. 4

11. *N. palustre* DC. K. syn. *N. terrestre* R. Br. *Sisymbrium palustre* Leyser *S. hybridum* Thuill. *S. islandicum* Fl. Dan. *S. terrestre* Willd. *Caroli-Gmelina palustris* Fl. Wett. Sümpfe, Gräben, Teiche, Ufer dch. d. g. Geb. 6—8. 4

12. *N. lippizense* DC. K. syn. *N. Wulfenianum* Host. *Sisymbrium lippizense* Wulf. Steinige Hügel im südl. Geb., Südtirol bei Laibach, Littoral, Istrien, Fiume, Triest, Dalmatien, Croatien u. bei Sesto-Calende in d. ital. Schweiz. 5—6. 4

13. *N. pyrenaicum* R. Brow. K. syn. *Sisymbrium* — L. Feuchte, sandige Orte d. Alpen, Boralpen u. Gebirgstriften, Wiesen, Schweiz Cant. Tessin, Graubünden, Cant. Wallis bis Brieg; Rheing., Bodensee, Basel, Breisg. bei Freiburg in d. Hölle zw. Langendenzlingen u. Emmendingen,

Elßaß im Preuschthale bei Münster u. Straßburg; Südfrain, Ungarn im Banat, Siebenbürgen, Lombardei, Oberitalien. 5—6. 24

36. Barbarea R. Brow. Barbarakraut. K. syn.

39. Rchb. exc. p. 682. Comp. II. p. 59.

1. *B. vulgaris* Br. K. syn. *Erysimum Barbarea* L. Feuchte, kieselige Orte, Ufer, Wiesen, Triften, Aecker dch. d. g. Geb. 4—5. ☉

2. *B. arcuata* Rchb. exc. K. syn. *B. vulgaris* β. M. et K. *B. taurica* DC. *Erysimum arcuatum* Opitz. Sandige, feuchte Orte, Ufer, stellw. dch. d. Geb., Rheing. bei Zweibrücken, Trier an d. Mosel u. an d. Sauer; Coblenz bei Horchheim u. Niederlahnstein, Hamburg, Jena, Sachsen; Destr. Böhmen, Kärnthen, Lombardei. 4—6. ☉

3. *B. stricta* Andrzejowski K. syn. *B. iberica* DC. *B. parviflora* Fries. Feuchte, schattige Orte, Fluß- u. Bachufer, an Sümpfen, mehr im nördl. Geb., Rheing. zw. Braubach u. Oberlahnstein oberhalb Coblenz, im Nahethale bei Waldböckelheim, im Urthale bei Bonn u. v. Niederrheine stellw. dch. Westphalen nach Hamburg, Elbufer u. d. nördl. Deutschland bis Frankfurt a. d. Oder, Schlesien, Preußen bei Königsberg, Graudenz etc., Sachsen, Franken; Destr. Böhmen, Lombardei. 4—5. ☉

4. *B. praecox* R. Brow. K. syn. *Erysimum* — Fl. D. Sm. *Barbarea intermedia* Boreau. F. Schultz Flora 1850. indem d. echte *B. praecox* nach Schulz nur im Süden wachsen soll. — Feuchte, sandige Triften, Felder, Ufer, dch. d. Geb., Rheing. v. Straßburg bis Boppard, Coblenz, Bonn, Köln, Aachen, im Moseltale bis Trier, Luxemburg, Nahethal, Kreuznach, Kirn bis Merxheim, v. Westphalen bis Holstein u. Frankfurt a. d. Oder; Destr. bis nach d. Lombardei u. Piemont. 4—5. ☉

5. *B. bracteosa* Gussone prodr. fl. Sic. II. p. 257. Maly enum. pl. austr. p. 265. Feuchte Gebirgsstellen in d. Lombardei. 5. ☉

37. *Turritis* L. *Thurmfraut.* K. syn. 40. Rchb. exc. p. 681. Comp. II. 61.

1. *T. glabra* L. K. syn. *T. stricta* Host. *Arabis perfoliata* Lamk. Schattige Bergstellen, Felsen, Raine, Wege, stchw. dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

38. *Arabis* L. *Gänsefraut.* K. syn. 40. Rchb. exc. p. 677. Comp. II. p. 61.

Erste Rotte. *Alomatium* DC. K. syn.

1. *A. brassicaeformis* Wallr. K. syn. *Brassica alpina* L. *Turritis Brassica* Leers. *T. pauciflora* Presl. Steinige Gebirgswälder, stchw. dch. d. Geb. Rheing., auf d. Vogesen, v. Donnersberg bis zum Nahe u. Glangebirge, bei Steinbach, Kreuznach, Lauterecken, Meisenheim bis zur Mosel, bei Berncastel, Winningen, bei St. Goar, Boppard, durch Nassau bis Ems, Hessen bis Thüringen, Sena, Raumburg; Destr. Steyermark, Tyrol, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardie, Piemont; Schweiz im Cant. Waadt. 4—5. 4

2. *A. alpina* L. K. syn. Rchb. exc. *A. incana* Moench. non Roth., *Turritis verna* Lamk. Var. β . *crispata*: *A. crispata* Willd. Rchb. exc. — γ . *declinata* Tausch. Flora Walp. repert. Alpen u. Boralpen Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette bis ins südlichste Geb. mit d. Gebirgsströmen in d. Niederungen, bei Bregenz, Lindau, Oberschwaben; München, Schlesien in d. Sudeten bei d. Schnee-grube. Die Var. β . in Krain bei Laibach u. in Dalmatien. 4—5. 4

3. *A. verna* R. Br. K. syn. *Hesperis verna* L. Steinige Hügel, Felder im südl. Vittoral Istrien bei Pola, Dalmatien bei Zara, Piemont Nizza. 3—4. ☉

4. *A. auriculata* Lamk. K. syn. *A. patula* Wallr. *A. recta* Vill. *A. aspera* All. pedm. *A. incana* Roth. Rchb. exc. *A. conferta* Willd. *Turritis patula* W. et Kit. *Abasicarpon patulum* Andz. Var. β . *puberula* K. syn. *A. patula* β . Wallr. Sonnige Orte d. Kalkgebirge; Schweiz

Cant. Wallis u. auf d. M. Salève bei Genf; Rheing., Elsaß bei Ingersheim, Pfalz v. Dürkheim bis zum Rattenberg am Klosterberge, Ungstein, Kallstadt, Herrheim, Nahe bei Kreuznach am Rothenfels, Harbt, Lavenberg bei Laubenheim; Flora v. Spa; Thüringen bei Frankenhäusen, Aulichen, Jena am Hausberg; Destr. Böhmen, Mähren, Dalmatien, Croatien, Ungarn bei Pesth u. Ofen, Siebenbürgen. Var. β . Schweiz im Wallis. 4—5. ☉

5. *A. saxatilis* Allion. K. syn. *A. nova* Vill. delph. Kalk- u. Granitalpen im südl. Geb., Schweiz auf d. Walliser u. Helener Alpen, M. Bovannaz, Foully, Piemont; Südtirol. 7. ☉

6. *A. Gerardi* Bess. K. syn. *A. sagittata* Wimmer. Rechb. exc. zum Theil *A. planisiliqua* Rechb. icon. t. 42. f. 4343. Turrit. nemorensis Wolf. Arab. — Rechb. exc. z. Theil. Grasige Raine, Wiesen, Triften, Wegeränder, Gebüsche, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Pfalz v. Worms bis Mainz, bei Mardorf, Mutterstadt u., Coblenz im Raacher Walde, Andernach, Rolandseck, Köln, Moselgeb. bei Berncastel, Trier im Rödterwalde; Westphalen, Sachsen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren bis Ungarn u. Galizien. 5—6. ☉

7. *A. sagittata* DC. K. syn. Rechb. icon. t. 42. f. 4343. b. *A. longisiliqua* Wallr. sched. *A. hirsuta* β . *longisiliqua* K. syn. edit. I. Turritis planisiliqua Pers. syn. Turritis sagittata Bertol. Sonnige Gebirgsstellen, Felsen, stchw. im Geb., Rheing. an bewachsenen Kalkfelsen, im Rödterwalde bei Trier selten, Thüringen Jena u. Naumburg, Unterharz, Sachsen, Baiern bei Muggendorf; Destr. Böhmen, Krain, Ungarn, Lombardei, Genua, Piemont, M. Genis, Schweiz bei Genf, M. Salève. 5—7. ☉

8. *A. hirsuta* Scopoli K. syn. *A. contracta* Spenn. Turritis hirsuta L. T. Raji Presl. Var. β . glaberrima: *A. sudetica* Tausch. Hügel, Raine, Wege, Mauern, besonders grasige Abhänge, bis in d. Boralpen dch. d. g. Geb. Var. β . Oberbaden bei Maudach u. in d. Sudeten. 5—7. ☉ u. 24

9. *A. glastifolia* Rehb. icon. t. 43. f. 4344. Gräßige Abhänge d. Kalkgebirge, stellw. im Geb., Sachsen bei Dresden, Schweiz bei Genf, M. Salève zw. Archamp u. Veiry; Krain bei Laibach um Morast. 5—8. ☉

10. *A. ciliata* R. Br. K. syn. Var. α . *glabrata*: *A. ciliata* R. Br. DC. Rehb. Gaud. *Turritis* — Schleicher. *T. rupestris* Hoppe. *T. alpina* L. syst. — β . *hirsuta*: *Turritis alpestris* Schleich. Rehb. exc. et icon. *T. ciliata* Wahlenb. helv. Arab. *hirsuta* I. *sessilifolia* Gaud. helv. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette im Urgebirge. Cant. Bern, Wallis u. Appenzeller Alpen; Krain, Salzburg, Tyrol, Steyermark, Savoyen. 6—7. ☉ u. 4

11. *A. collina* Tenore. DC. prodr. I. p. 148. *Maly enum pl. austr.* p. 265 et 391. Hügel in Dalmatien. 6—7. 4

12. *A. muralis* Bertoloni K. syn. *A. incana* Willd. *Turritis minor* Schleich. *T. hirsuta* c. *minor* Vill. *T. humilis* Schleich. Felsen, Mauern im südl. Geb., Schweiz im Cant. Waadt bei Vevey, Cant. Wallis, Branson bei Genf; Südtirol, Dalmatien, Lombardien, Oberitalien. 5. 4

13. *A. stricta* Huds. K. syn. *A. hirta* Lamk. *Turritis Raji* Vill. non Presl. Sonnige Kalkfelsen im südl. Geb. Schweiz, im Jura M. Thoiry, M. Salève bei Genf; Siebenbürgen, Piemont M. Vesula u. M. Genis. 5. 4

14. *A. serpyllifolia* Vill. delph. K. syn. Kalkalpen u. Boralpen, Südschweiz im Cant. Waadt über Ber, am Gletscher Pannerofaz, M. Bovannaz, M. Dolaz u. Aelenzer Alpen; Krain, Lombardien, Savoyen. 6—7. 4 u. ☉

15. *A. procurrens* W. et Kit. K. syn. *A. praecox* Willd. Schattige Felsen im südl. Geb., Krain, Ungarn im Banat u. in Croatien. 4—5. 4

16. *A. vochinensis* Spreng. K. syn. *Draba mollis* Scopol. Sturm. *D. arabiformis* Vest. Triften d. Alpen, Kärnthen auf d. Alpe Rum, d. Leibl, Baba u. Dvir; Tyrol, Krain in den Bocheiner Alpen, M. Nanaß, Littoral. 7. 4

17. *A. petraea* Lamk. K. syn. *A. Crantziana* Ehrh. Rchb. exc. *A. hispida* L. fil. Smith, *Cardamine petraea* L. C. *hastulata*, Sm. C. *fervensis* Fl. Dan. Var. β . *glabrata*. — γ . *hirta*. Felsenabhänge, stellw. im Geb., Harz an d. Petershütte bei Osterode, an d. alten Stollberg bei Stempel, Thüringen, Baiern bei Maggendorf, Weltenburg an d. Donau; Destr. im Briel bei Wien, Böhmen, in d. Sudeten, Mähren, Steyermark, Tyrol, Galizien, Siebenbürgen. 4 — 5. 4

18. *A. stellulata* Bertoloni. DC. prodr. I. p. 147. Maly. enum. pl. austr. p. 266 et 391. In d. Lombardei. 4

19. *A. arenosa* Scopol. K. syn. *Sisymbrium arenosum* L. Steinige Orte, Felsen, Weinberge, Sandfelder, stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen; Rheing. v. Elsaß bis Coblenz, im Siebengebirge bei Bonn, bei Eöln, Düsseldorf, an d. Nahe, Saar u. Mosel bei Trier, Luxemburg 2c. bis ins südlichste u. nördl. Geb., Lombardei, Ostpreußen. 6—7. ☉

20. *A. Halleri* L. K. syn. Var. α . *A. Halleri* DC. syst. Rchb. exc. Sturm. — β . *A. stolonifera* DC. Host. Rchb. exc. *Cardamine* — Scopoli. — γ . *A. ovireus* Wulf. Jacq. Rchb. exc. — δ . *Cardamine diversifolia* Sternb. — ϵ . *A. tenella* Host. Steinige, grasige Orte d. Alpen, Wiesen, Triften d. Boralpen u. Gebirge, stellw. v. Westphalen, dch. Hannover, Braunschweig, Wolfenbüttel, nach d. Harze, Thüringen, Sachsen im Erzgebirge, Lausitz, in d. Elb- u. Muldethälern, Schlesien, Baiern bei Regensburg, Destr. Böhmen, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien, Lombardei; Schweiz im Tellinathale u. auf d. Matterhorn. 6—7. 4

Zweite Rotte. *Lomaspora* DC. K. syn.

21. *A. Turrita* L. K. syn. *A. umbrosa* Crantz., *A. ochroleuca* Lamk. *A. rugosa* Moench. *A. pendula* Lachen. *A. elongata* Salisb. *Turrita major* Clus. Wallr. Schattige Felsen, steinige Gebirgswälder im südl. u. mittleren Geb., Schweiz Cant. Tessin, Graubünden, Wallis, im Jura;

Rheing. an d. Hohentwiel, Basel, Breisg. in d. Hölle, Pfalz auf d. Donnersberg, an d. grauen Thurme im Wildsteiner Thale, Nahethal bei Kreuznach, Duchroth, Kirn, am Hellsberg, im Simmerthale, Luxemburg bei Wilz, Esch sur la Sure; St. Goar bei Coblenz, Lahnthal bei Ems, Ahrthal bei Altenahr; Destr. bei Wien, Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Vitoral, Triest, Fiume, Dalmatien, Ungarn, Lombardei. 4—7. ☉

22. *A. pumila* Jacq. K. syn. *A. scabra* Allion. *A. bellidifolia* Crntz. *A. nutans* Moench. *A. ciliaris* Willd. *Cardamine bellidifolia* Allion. Var. β . *laxa* K. syn. Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Destr., d. Lombardei u. Piemont. 6—7. 4

23. *A. bellidifolia* Jacq. K. syn. *Turritis*. — All. pedm. Steinige, etwas feuchte Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Destr. Tyrol, Salzburg im Pinzgau, Kärnthen, Krain, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei u. Piemont. 7. 4

24. *A. caerulea* Haenke. Wulf. K. syn. *Turritis* — All. ped. Hochalpen, Schneegrenze an d. Gletscherrändern in d. Schweiz, Cant. Glarus, M. Gotthard, Cant. Wallis, M. Simplon, Nicolai- u. Saasferthale u. dch. d. Alpenkette nach Destr., Kärnthen am Großglockner, Steyermark, Tyrol, Salzburg, Krain, Vitoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont u. Novara u. 7—8. 4

39. *Cardamine* L. Schaumkraut. K. syn. 46. Rehb. exc. p. 674. Comp. II. p. 70.

1. *C. asarifolia* L. K. syn. Bäche, Quellen d. Gra-nitalpen im südl. Geb., Südtirol, Alpe la Bergamasia über Darzo, Unterveltlin, Col de Morbegno, Lombardei, Piemont M. Genis, M. Lecco, M. Lenda u. am Comersee. 6—8. 4

2. *C. alpina* Willd. K. syn. *C. bellidifolia* β . *alpina* DC. *Arabis bellidifolia* Scopoli. *A. bellidioides* Lamk. Hochalpen im Urgebirge, an Gletscherrändern, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. u. in d. Lombardei. 7—8. 4

3. *C. resedifolia* L. K. syn. *C. heterophylla* Host. Alpen u. Boralpen, besonders im Urgebirge, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette bis in d. südlichste Geb. u. in d. Sudeten. 7—8. 4

4. *C. parviflora* L. K. syn. *Sisymbrium parviflorum* Gmel. sib. Schattige, feuchte Waldwiesen, Teichränder, Dämme, stchw. im Geb., Holstein, Schlesien v. Breslau bis Frankfurt a. d. Oder; Destr. Mähren, Siebenbürgen, Galizien, Lombardien, Venedig. 6—7. ☉

5. *C. impatiens* L. K. syn. *C. apetala* Moench. Schattige Gebüsche; Gebirgswälder bis in d. Boralpen u. an schattigen Bachufern d. Niederungen, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., v. d. Schweiz dch. Baden, Elsaß bis Eöln, Coblenz, Bonn, Mosel, Trier, Luxemburg, Saar bis Saarbrücken zc. 5—6. 4

6. *C. sylvatica* Link. K. syn. *C. hirsuta* β . Aut. *C. hirsuta* β . *sylvestris* Fries. *C. impatiens* Fl. Dan. Schattige Gebirgswälder, Schluchten, stchw. dch. d. Geb. Rheing., v. Jura dch. d. Vogesen, Elsaß, Baden, Pfalz bei Zweibrücken, Saarbrücken bis Trier, Coblenz, Urththal, Bonn, Eöln bis Düsseldorf zc., nördl. bis Königsberg u. Danzig; südl. nach Destr. Krain, Ungarn. 5—7. ☉

7. *C. hirsuta* L. K. syn. *C. multicaulis* Hoppe, *C. intermedia* Hornem. *C. hirsuta* α . *campestris* Fries. *C. hirsuta* β . *micrantha* Gaud. Var. β . *C. umbrosa* Andrzej. Gebirge, Weinberge, Raine, lichte Waldstellen an Wassergräben u. Bachufern, stchw. im g. Geb., Rheing. Häufig sowohl im Hauptthale, als in d. Nebenthälern, besonders an d. g. Mosel bis Trier u. Luxemburg, Aachen gemein. 6—7. ☉ u. ☺

8. *C. granulosa* All. ped. Rchb. exc. et icon. Graßige Hügel im südlichsten Geb. bei Turin. 4—5. 4

9. *C. pratensis* L. K. syn. Var. β . *dentata* Rchb. *C. sylvatica* Besser, *C. dentata* Schultz. fl. austr. — γ . *Hayneana* Rchb. exc. p. 676. *C. Hayneana* Welwitsch. *C.*

stricta Hayne. Wiesen, feuchte, grasige Orte, Waldstellen
bch d. g. Geb. Var. γ . Wien bei Mauerbach. 4—6. 2

10. *C. amara* L. K. syn. *C. nasturtiana* Thuill.
Var. β . *hirta* Wim. et Grab. *C. amar. \gamma. umbrosa* DC.
syst. *C. amara \gamma. pubescens* Lej. et Court. Fl. Belg. *C.*
umbrosa Lej. Fl. Spa, *C. Libertiana* Lej. rev. *C. paludosa*
Knaf, *C. sylvatica* Hartm. scand. Hofm. *C. hirsuta* Fl.
Dan. — γ . *subalpina* K. syn. *C. amara \gamma. umbrosa* Wim.
et Grab. *C. Opizii* Presl. Sumpfige Wiesen, an Gräben,
schattige Quellen, Teichen, bch. d. g. Geb. Var. γ . Schlesien
u. Böhmen, M. Schneeberg, Altvater am Ochsenstalle.
4—5. 2

11. *C. chelidonia* L. Rchb. exc. Bergwälder in
Dalmatien u. Croatien. 6—7. 2

12. *C. maritima* Portenschlag. K. syn. *C. micro-*
phylla Presl. *Pteroneurum dalmaticum* Visian. Sandige
Küste im südl. Littoral, Istrien. Insel Dsero, Dalmatien.
5—6. ☉

13. *C. thalictroides* All. ped. K. syn. *C. mari-*
tima Var. Rchb. icon. *C. Plumieri* Vill. delph. *C. petio-*
laris DC. *Pteroneurum bipinnatum* Rchb. exc. p. 676.
Feuchte, bewachsene Felsen im südl. Geb. Istrien, M. Mag-
giore, Insel Dsero auf d. M. Dsero, Dalmatien, Lombardei,
Piemont. 5—6. ☉ u. 2

14. *C. trifolia* L. K. syn. Etwas feuchte Gebirgs-
wälder u. Boralpen, Schweiz Cant. St. Gallen im Aethale,
unweit Rheineck bei Dornbirn; Schlesien im Grunewalde;
Böhmerwald bei Hohenfurth, Destr. Steyermark, Kärnthen,
v. da nach Tyrol, Salzburg, Krain, Dalmatien, Galizien,
Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 5—6. 2

40. *Pteroneurum* DC. Leistenschötel. Rchb.
exc. p. 679. Comp. II. p. 75.

1. *P. carnosum* Rchb. exc. *Cardamine carnos*
W. et Kit. Felsen im südl. Geb. Croatien u. Dalmatien.
6—7. 2

2. *P. graecum* DC. Rchb. exc. *Cardamine graeca* L. Felsen im südl. Littorale, Insel Curzola in Dalmatien. 3—4. ☉

3. *P. Rochelianum* Rchb. icon. Felsen an d. Donau im Banat. 3—4. ☉

41. *Dentaria* L. Zahnwurz. K. syn. 48. Rchb. exc. p. 676. Comp. II. p. 76.

1. *D. enneaphyllos* L. K. syn. *D. triphyllos* Clus. Grasige, schattige Orte d. Gebirge bis in d. Alpen, Baiern, Fichtelgebirge, Sachsen, Oberlausitz, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Salzburg, Kärnthen, Krain, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Venedig. 4—5. 4

2. *D. glandulosa* W. et Kit. K. syn. Gebirgswälder stellw., Schlesien bei Huthheim, Schillerdorf; Mähren, Dalmatien, Ungarn u. Galizien. 4—5. 4

3. *D. trifolia* W. et Kit. K. syn. Wälder d. Vor-alpen, Steyermark im Teufelsgraben bei Gili, Krain, Croa-tien u. Ungarn. 4—5. 4

4. *D. digitata* Lamk. K. syn. *D. pentaphyllos* Scopol. *D. Clusiana* Rchb. exc. Gebirgswälder, Boralpen, stellw. im Geb., Rheing. bei Basel, Württemberg bei Wolfegg, Tuttlingen, Oberbad. Constanz, Münsterlingen, Engen, Elsaß; Schweiz auf d. M. Albis bei Zürich, St. Gallen, Bern, Niesen bei Thun, M. Dolas auf d. Jura u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, am Tegernsee bei Fischbach u. nach Destr. bis in d. Lombardei. 5—6. 4

5. *D. polyphylla* W. et Kit. K. syn. Gaud. helv. *D. ochroleuca* Gaud. in Ebel. Schattige Laubwälder im südl. Geb. Schweiz, in d. Elus, Buchenwald bei Valjaine unweit Marchlins; Croatien u. Lombardei. 4. 4

6. *D. pinnata* Lamk. K. syn. *D. heptaphyllos* Vill. delph. Gebirgswälder u. Boralpen, Schweiz besonders im Jura, M. Weissenstein, Hasenmatte, Chasseral; Rheing. im Oberelsaß bei Rappoltsweiler, bei Barr, Oberbad. bei Kandern, im Breisg. an d. Schönb. bei Freiburg; Steyer-

mark bei Gili, Lombardei, Savoyen, Piemont, Genua.
4 — 5. 24

7. *D. bulbifera* L. K. syn. Schattige Gebirgswälder bis in d. Boralpen u. Alpen, Schweiz auf d. g. Jura, Rheing. Bregenz, v. Baden bis Waghäusel, im Taunus, an d. Nahe bei Kreuznach, Kirn bis Trier, Eifel bis Luxemburg, Aachen, Mosel bei Berncastel, Trarbach, Coblenz, Boppard, Siebengebirge, Köln bis nach d. Niederlanden, Hamburg, Holstein, Pommern, Schlesien, Ostpreußen bei Sarkau, Danzig, Osterröde, Sachsen, Oberlausitz u. in allen Provinzen Destr. bis ins südlichste Geb. 4 — 5. 24

II. Gruppe. *Sisymbrieen* Koch. Taschb.

42. *Hesperis* L. Nachtviole. K. syn. 50. Rchb. exc. p. 685. Comp. II. p. 79.

1. *H. matronalis* L. K. syn. *H. inodora*. L. Feuchte Wiesen zw. Gebüsch, zerstreut dch d. Geb. besonders im südl., Schweiz selten; Rheing., Bodenseegegend im Rheinthale bei Embs, Rußdorf, Coblenz, Neuwied, Neuenkirchen am Hülfsenstein, Nürnberg in d. Eifel, Luxemburg, in d. Ardennen bei Bouillon; Westphalen, Oldenburg, Mecklenburg, Harz, Sachsen; Destr. bei Wien, Böhmen, Mähren, Steyermark, Vittoral, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 5 — 6. ☺

2. *H. runcinata* W. et Kit. K. syn. Var. β . *H. bituminosa* Savi. Wälder im südl. Geb. Destr. bei Wien, Dalmatien u. Ungarn. 5 — 7. ☺

3. *H. tristis* L. K. syn. Buschige Hügel, Ackergränzen im südl. Geb. Destr. bei Wien, Mähren, Vittoral, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Rheing. bei Coblenz wohl nur verwildert. 5. ☺

4. *H. laciniata* All. ped. K. syn. *H. glutinosa* Visian. Sonnige Felsen im südl. Geb. Destr. Vittoral, Istrien auf d. Insel Beglia, Dalmatien, Ungarn u. Piemont. 4 — 5. ☺

43. *Malcolmia* R. Brow. *Malkolmie*. K. syn.

50. Rchb. exc. p. 685. Comp. II. p. 80.

1. *M. africana* R. Br. Rchb. exc. Hesperis — L. Felbränder, Wege, in Ungarn um Ofen. 4—5. ☉2. *M. Chia* Andr. DC. prodr. I. p. 187. Maly enum. pl. austr. p. 269. Cheiranth. Chius L. Hesperis Chia Pers. Aeferränder in Dalmatien. 6—7. ☉3. *M. maritima* R. Br. K. syn. Hesperis — Pers. Cheiranthus — Linn. Sandige Orte am südl. Littoral, Istrien bei Fiume; Dalmatien, Venedig, Nizza. 3—4. ☉4. *M. littorea* R. Br. Rchb. exc. Im südl. Littoral bei Nizza u. Terracina. 6—7. ☉44. *Sisymbrium*. L. *Rauße*. K. syn. 51. Rchb.

exc. p. 689. Comp. II. p. 81.

1. *S. officinale* Scop. K. syn. Erysimum. — L. Klukia — Andr. Chamaeplum — Wallr. Wege, Saune, Felber, Schutt, im g. Geb. 6—8. ☉2. *S. polyceratum* L. Rchb. exc. Chamaeplum — Wallr. *Sis. corniculatum* Lamk. An alten Mauern im südl. Geb., Dalmatien, Lombard; Schweiz bei Lausanne. 6—8. ☉3. *S. austriacum* Jacq. K. syn. Rchb. exc. *S. multisiliquosum* Hoffm. Rchb. exc. *S. eckartsbergense* Willd. *S. compressum* Moench. *S. Tilleri* Bellard. *S. erysimifolium* Pourr. Var. β . *S. contortum* Willd. *S. taraxacifolium* DC. fl. fr. Bewachsene Gebirgsabhänge, stellenw. bch. d. Geb. Schweiz; Rheing. Burg Hammerstein bei Neuwied, Starckenburg bei Trarbach an d. Mosel, Württemberg bei Ludwigsthal u. Tuttlingen, Franken bei Würzburg, Thüringen bei Vibra u. Eckartsberge, Jena, Naumburg, Hannover auf d. Hohenstein, Sachsen bei Meissen; Oestr. Mähren, Steyermark u. Ungarn. 5—6. ☉4. *S. acutangulum* DC. Rchb. exc. *S. hyoseridifolium* Gaud. *S. pyrenaicum* Vill. Sinapis — L. Jacq. *S. austriacum* γ . *acutangulum* K. syn. Bergabhänge, Felsen; Rheing., Aachen zw. Dolhain u. Berviers; Schweiz bei

Genf, Cant. Wallis M. Getroz, M. Ger am Gletscher, Valle d'Aost, Lombardei, Savoyen, Piemont. 7—8. 4

5. *S. Loeselii* L. K. syn. *Leptocarpaea* — DC. syst. *Turritis* — R. Brow. Felsen, Mauern, Schutt, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Pfalz bei Worms, Oppenheim bis Mainz, Frankfurt, Bingen, Burg Rheinstein, Burg Cöbern, an d. Mosel oberhalb Winningen; Thüringen bei Magdeburg, Ostpreußen, Danzig auf d. Stadtwällen, Schlesien, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. Lombardei. 6—7. ☉

6. *S. Irio* L. K. syn. Wege, Ackerränder, Mauern, Schutt, mehr im südl. Geb., Suhl am Thüringer Walde, Schweiz an d. Friedhofsmauer bei Visp im Cant. Wallis; Belgien; Destr. Mähren, Ungarn, Galizien u. Lombard. 5—7. ☉

7. *S. columnae* L. K. syn. Jacq. Var. β . *hebecarpa* K. syn. Wegen, Schutt, Mauern im südl. Geb., Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Ungarn, Galizien, Lombard. 6—7. ☉

8. *S. pannonicum* Jacq. K. syn. *S. Sinapeos* Retz. *S. Sinapistrum* Crntz. Aecker, Brachfelder, Wege, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Elsaß bei Straßburg, Preuschthal bei Müßig, Baden zw. Sanddorf u. Schwesingen, Jena am Jenzig; Schlesien bei Frankfurt a. d. Oder, Thorn in Preußen, Brandenburg, Memel, Pillau, Danzig; Schweiz Cant. Wallis; Destr. Böhmen, Mähren, Krain, Dalmatien, Ungarn, Galizien u. Genua. 5—6. ☉

9. *S. Sophia* L. K. syn. *S. parviflora* Lamk. Sandfelder, Aecker, Wege, Mauern dch. d. g. Geb. 5—9. ☉

10. *S. strictissimum* L. K. syn. Flußufer, an feuchten Zäunen, stellw. im Geb., Rheing. bei Weibling am Neckar, Heidelberg, Darmstadt, Main v. Frankfurt, Hanau, bis Würzburg, Wetterau bei Isenburg, im Nassauischen an d. Bahn, Trimborn bei Aachen; Sachsen an d. Elbe bei Dresden, Thüringen an d. Ilm bei Weimar; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Kärnthen im Oberinnthale, Galizien, Lombardei, Piemont, Savoyen; Südschweiz St. Bernhard, Beltlin, Valle d'Aost, Graubündten. 5—8. 4

11. *S. junceum* M. v. B. Rchb. exc. *Erysimum* — Host. *Cheiranthus* — W. et Kit. *Brassica polymorpha* Murr. Gräßige Hügel, Triften in Ungarn u. Siebenbürgen. 5—6. ☉

12. *S. Alliaria* Scopol. K. syn. *Erysimum* — L. Waldränder, schattige Bergstellen, in Gebüsch, an Wegen im g. Geb. 4—5. ☉

13. *S. Thalianum* Gaud. K. syn. *Arabis Thaliana* L. *Conringia* — Rchb. exc. Var. *β. hispida* Wahlb. *S. arenosum* L. Fl. suec. Sandfelder, Brachäcker, Mauern, Felsen, stellenw. dch. d. g. Geb. 4—6. ☉

45. *Hugueninia* Rchb. exc. *Hugueninie*. K. syn.

53. Rchb. exc. p. 691. Comp. II. p. 86.

1. *H. tanacetifolia* Rchb. exc. K. syn. *Sisymbrium tanacetifolium* L. Felsen d. Alpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis, St. Bernhard, Valle d'Aosta, Tzer-montana-Gletscher, Piemont M. Genis, Nizza, Savoyen. 7. 4

46. *Braya* Sternb. et Hoppe. *Braye*. K. syn. 53.

Rchb. exc. p. 684. Comp. II. p. 87.

1. *B. alpina* Sternb. et Hoppe. K. syn. Hochalpen in Kärnten am Großglockner, Gambsgrube u. d. Leibern bei Heiligenbluth, M. Gollstein in Tyrol, Krain. 7. 4

2. *B. pinnatifida* Koch. K. syn. *Sisymbrium* — dum DC. *S. dentatum* Allion. ped. *S. bursifolium* Vill. delph. Hochalpen im Urgebirge, Südschweiz, Cant. Wallis auf d. St. Bernhard, M. Foully, am Gletscher über Bagnes, M. Barbarine, Monbrou, M. Breven oberhalb Chamouny. 6—8. 4

3. *B. supina* Koch. K. syn. *Sisymbrium supinum* L. Kieselige, sandige Orte, Schweiz im Jura bei Joux, Jupitersee bei Baude oberhalb l'Attage, Rheing.; Lauterthal in Unterelsaß, Luxemburg an d. Obermosel bei Grevenmacher u. einmal an d. Untermosel bei Winingen. 6—9. ☉

47. *Erysimum* L. *Hederich*. K. syn. 54. *Rchb. exc.*
p. 686. *Comp. II.* p. 88.

a. *Erysimastrum* DC. syst. K. syn.

1. *E. cheiranthoides* L. K. syn. *E. parviflorum*
Pers. cheiranthus sylvestris Lamk. *Ch. scapigerus* Willd.
Var. β . *dentatum*: *E. micranthum* Buck. *Felder, Wegerän-*
der, Schutt *bdh d. g.* *Geb.* 6—9. ☉

2. *E. virgatum* Roth. K. syn. *E. longisiliquosum*
Schleich. Rchb. exc. *E. altissimum* Lejeune. Var. β . *E.*
durum Presl. *Rchb. exc.* *Gebirge, sandige Hügel, Raine,*
Grabenränder, in Weidengebüschen, an Mauern, Rheing. v.
Mainz bis Bingen an d. Hardtmühle u. bei Nombach, v.
Eurley bis Oberwesel gegenüber; Deuß bei Eöln, Luxem-
burg bei Bettembourg, bei Spa, Mainufer am Schlosse bei
Wertheim, Thüringen, Erfurt bei Stadtilm, Sachsen, Char-
lottenburg bei Berlin, Schlesien Frankfurt a. d. Oder; Destr.
Böhmen, Mähren, Istrien, Dalmatien, Lombardei; Schweiz
Cant. Wallis bei Sitten. 6—7. ☉

3. *E. strictum* Fl. Wetter. K. syn. *E. hieracifo-*
lium L. Ehrh. *E. virgatum* DC. syst. Var β . *parviflorum*.
E. virgatum juranum Gaud. helv. *Cheiranthus turrifolius*
Lamk. Felsen, Flußufer, Wege, Mauern, Schutt, stchw. im
Geb., Rheing. v. Mainz bis Bingen, Coblenz, Neuwied,
Hammerstein bei Linz, Beuel am Ausfluß d. Sieg, Bonn
gegenüber u. stchw. am g. Niederrheine bis Wesel, am
Maine v. Mainz bis Frankfurt, Hanau, Würzburg, bis Er-
langen, Nahe bei Kreuznach, Luxemburg bei Domelange;
Magdeburg, Barby, Sachsen bei Dresden, Regensburg,
Preußen Graudenz bei Marienau, Schlesien Obergegend bis
Frankfurt; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Galizien,
Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei; Schweiz im Jura u. im
Engadin. 6—7. ☉

4. *E. odoratum* Ehrh. K. syn. *E. hieracifolium*
Jacq. E. strictum DC. syst. *E. pannonicum* Crntz. *E.*
cheiriflorum Wallr. *Cheiranthus erysimoides.* L. *Chei-*

ranthus firmus Schleich. *E. lanceolatum* Gaud. helv. Kalkgebirge, stellw. dch. d. Geb. Bodenseegegend an d. Ruinen v. Hohenkrähen, Main v. Würzburg bis Frankfurt, Baireuther Gebirge, Thüringen, Jena bei Dornburg, Sachsen, Donauthal Pappenheim bis Regensburg; Destr. bei Wien, Mähren, Steyermark, Tyrol, Littoral, Galizien, Ungarn, Croatien. 6—7. ☉

5. *E. carniolicum* Dolliner Rehb. exc. K. syn. edit. I. *E. odoratum* β. *dentatum* K. syn. edit II. *E. odoratum* Rehb. icon. Bewaldete Kalkgebirge, Krain an Felsen d. Schlosses Scharfenberg bei Raasdach, Steyermark M. Botsch, Vittoral, Istrien, Triest, Fiume u. Dalmatien. 6—7. ☉

6. *E. Witmanni* Zawadzky enum. pl. Galic. p. 194. Maly enum pl. austr. p. 271 u. 391. Kalkgebirge in Galizien. 4

7. *E. repandum* L. K. syn. *E. ramosissimum* Crntz. Aecker, Mäuern, Schutt, stellw. Rheing. zw. Eupen u. Limburg bei Aachen; Thüringen, Hannover bei Göttingen, Baiern bei Würzburg; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Dalmatien, Galizien u. Ungarn. 5—6. ☉

8. *E. crepidifolium* Rehb. exc. K. syn. *E. hieracifolium* Pollich. DC. *E. pallens* Wallr. *E. cheiranthus* Presl. *E. odoratum* K. et Ziz. Steinige Orte, Abhänge, Felsen, auf Kalk-, Sand-, Thonschiefer u. Porphyr. Rheing. Bodenseegegend auf d. Basaltfelsen d. Ruinen v. Hohentwiel u. Hohenstoffeln, Pfalz von Bingen bis Martinstein an d. g. Nahe herauf u. in d. Seitenthälern, Kreuznach am Rheingrafenstein u. Lemberg; Thüringen bei Jena, Eisenach, Erfurt, Frankenhäusen, Franken am Hasselberg; Baiern bei Anspach u. Baireuth; Destr. Böhmen an d. Podbaba bei Prag, Steyermark u. Ungarn. 5—7. ☉

9. *E. canescens* Roth. K. syn. *E. diffusum* Ehrh. *Cheiranthus alpinus* Jacq. Sonnige, uncultivirte Orte, Gebirge, Dämme, Ufer, Mauern im südl. Geb., Destr. bei Wien, Mähren, Südtirol v. Bogen nach Meran; Schweiz Cant. Wallis; Galizien, Ungarn, Lombardien, Nizza. 5—7. ☉

10. *E. rhaeticum* DC. syst. K. syn. *E. pallens* Koch. syn. edit. I. *Cheiranthus rhaeticus* Schleich. Felsen im südl. Geb., Schweiz Cant. Graubünden, Cant. Tessin, Bestlin, Südtirol u. Lombardei. 5—7. ☉

11. *E. cheiranthus* Pers. K. syn. *E. lanceolatum* DC. (R. Brow.?) *E. murale* Desf. *Cheiranthus erisymoides* Jacq. Var. β . *E. pumilum* Gaud. helv. *cheiranthus alpinus* Lamk. Hochalpen bis in d. Voralpen u. Gebirge im südl. Geb., Oest. bei Wien, Böhmen, Steyermark, Kärnten bis zum Großglockner; Tyrol, Krain, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei; Schweiz an d. Matterhorn, im Aost-Thale bei St. Marcel. 4—6. 4.

12. *E. helveticum* DC. K. syn. Gaud. helv. *E. pallens* Hall. fil. K. syn. edit. I. Var. α . 3. Theil *E. cheiranthus* β . Pollini veron. *Cheiranthus helveticus* et *pumilus* Schleich. Alpen u. Voralpen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Leuk, Sitten, Gonthen, Saß u. Nicolai-Thal über Zermatten, Foully, Brieg; Tyrol, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Piemont u. 4—8. 4

13. *E. ochroleucum* DC. K. syn. *Cheiranthus — cus*. Haller. fil. Schleich. DC. Ch. *decumbens* Willd. Schleich. Sonnige, steinige Orte, Schweiz auf d. Jura am Fuße d. M. Chasseral, Creux du Van, Pertuis de la Bise, M. Dolaz; Krain, Galizien u. Lombardei. 6—8. 4

14. *E. linariaefolium* Tausch. Flora 1831. Rchb. exc. Dalmatien. 4

15. *E. suffruticosum* Spreng. DC. syst. K. syn. *E. virgatum* Lej. Fl. Spa. *Cheiranthus helveticus* Jacq. Wegeränder, Mauern, Rheing. zw. Berviers u. Limburg bei Aachen, Spa, in Holland Harlem u. in d. Carpaten. 4—6. 4

b. *Conringia* DC. syst. K. syn.

16. *E. orientale* R. Brow. K. syn. *Brassica — lis* L. Er. *perfoliatum* Crntz. *Conringia orientalis* Andr. DC. syst. Rchb. exc. *Gorinkia* — Presl. Hecker auf Kalk- u. Lehmboden, stellw. im südl. u. mittleren Geb., Rheing., Ober-

baden bei Engen, bei Heidelberg, Eppelheim, Eadenburg, Pfalz, Mardorf, Worms, Mainz, dch. d. Nahe, Glanz u. Saarthal bis Trier, Luxemburg, Ahrthal bei Bonn, Hannover, Schlesien, Thüringen, Jena, Sachsen, Baiern; Destr. Böhmen, Vittoral, Tyrol, Dalmatien, Galizien, Siebenbürgen u. Lombardien. 5—8. ☉

17. *E. austriacum* Baumg. K. syn. *Brassica* — *ca* Jacq. *Conringia* — Pers. *Rchb. exc.* Weder stellw. im südl. Geb., Destr. Mähren, Ungarn u. Siebenbürgen. 5—6 ☉

48. *Syrenia* Andrzejowski. Fadengriffel. K. syn.

58. *Rchb. exc.* p. 688. *Comp.* II. 95.

1. *S. angustifolia* *Rchb. exc.* K. syn. *Erysimum* — *lium* Ehrh. *Syren.* Ehrharti Andrzej. *Cheiranthus virgatus* Poir. *Chr. canus* Pill. et Mitterb. Sandboden im südl. Geb., Destr. Ungarn. 7—9. ☉

2. *S. cuspidata* *Rchb. exc.* *Cheiranthus* — *tus* M. v. Bieb. *Erysimum* — DC. Felsen in Ungarn, an d. Herkulesbädern, im Banat bei Mehadia. 4—6. ☉

III. Gruppe. Brassiceen K. Taschb.

49. *Brassica* L. Kohl. K. syn. 58. *Rchb. exc.* p. 694. *Comp.* II. p. 95.

1. *B. incana* Tenore. DC. *syst.* II. p. 596. *Maly enum. pl. austr.* p. 272. *B. villosa* Bivona. Felsen im südl. Vittoral, Dalmatien. 4—5. ‡

2. *B. oleracea* L. K. syn. Felsen an d. Küste bei Nizza; u. allenthalben im Geb. cultivirt. 4—6. ☉

3. *B. Rapa* L. K. syn. *Rchb. exc.* Var. α . *B. campestris* L. *Rchb. exc.* *B. campestris* α . *annua* *Rchb. icon.* — β . *rapifera*: *B. Rapa* L. *B. Rapa* β . *biennis* *Rchb. icon.* — γ . *oleifera*: *B. campestris* β . *biennis* *Rchb. icon.* Küste d. Nordsee u. in vielen Varietäten als Winter- u. Sommer-*rapa* allenthalben cultivirt. 7—8. ☉ u. ☉

4. *B. praecox* W. et Kit. *Rchb. exc.* Culturpflanze. 4—5. ☉

5. *B. Napus* L. K. syn. Var. α . *oleifera*, Winterkohltreß. ☉ — β . *annua*, Sommerkohltreß. ☉ — γ . *esculenta*, Erdkohlrabe 4—5.

6. *B. Richerii* Vill. Rehb. exc. Triften d. Alpen im südl. Geb. Piemont an d. M. Genis 2c. 7. 4

7. *B. balearica* Pers. Rehb. exc. *Erucastrum balearicum* Comp. II. p. 101. Am südlichsten Littorale, Gegend v. Genua. 4—5. 5

8. *B. nigra* Koch. K. syn. *Sinapis* — L. Rehb. exc. *Melanosinapis communis* Schimp. et Spenn. Geküschte, besonders an Flußufern, Dämmen, Acker, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. am Rheine v. Speyer bis Mainz, Bingen, Coblenz, Eöln 2c., am Neckar v. Heidelberg bis Tübingen, am Main bis Würzburg, Mosel bis Trier, Sachsen, Baiern, an d. Elbe u. Donau; Destr. Südtirol, Ungarn bis in d. Lombardei. 6—7. ☉

50. *Erucastrum* Schimp. et Spenn. Rempe. K. syn. 50. Rehb. exc. p. 693 Comp. II. p. 100.

1. *E. obtusangulum* Rehb. exc. K. syn. *Sisymbrium* — Schleich. S. *Erucastrum* Vill. *Brassica Erucastrum* L. *B. obtusangula* F. W. Schultz Fl. d. Pfalz. *Erisimum* — lum Clairv. *Sinapis nasturtioides* Lamk. Steinige Orte, Mauern, Schutt, Ufer, stchw. dch. d. Geb. Rheing., Baden, Constanx auf d. Sandfläche beim Bodensee, Rheineck, Korschach 2c., auf einer Rheininsel bei Neunburg; Elsaß bei Straßburg; Düsseldorf; Schweiz bei Basel, Neuchâtel, Cant. Waadt, Genf, Cant. Wallis; Destr. bei Wien, Tyrol, Krain, Lombardei. 6—7. 4

2. *E. Pollichii* Schimp. et Spenn. K. syn. *E. inodorum* Rehb. exc. *Sisymbrium Erucastrum* Pollich. Villars, S. *hirtum* Host., *Erucastrum* Fl. Wett. *Brassica Pollichii* Schultz. Fl. d. Pfalz, *B. ochroleuca* Soyer Wilem. Acker, Wegeränder, Ufer, Dämme, Raine, stchw. Schweiz, am Genfersee; Rheing., Oberbaden bei Constanx, Oberelsaß u. v. Freiburg im Breisgau fast am g. Rheine

hinab bis Mainz, Coblenz, Eöln, Düsseldorf, im Rhe= u. Moselthale bei Kreuznach, Trier, Luxemburg; Halle, Danzig; Destr. Steyermark, Siebenbürgen u. Venedig. 5—10. ☉ u. ☉

3. *E. incanum* Koch. K. syn. *Sinapis incana* L. Rchb. exc. Brassica — F. Schultz. Fl. Pfalz. Hierchfeldia adpressa Moench. Sinap. heterophylla DC. Steinige Hügel, Schutt, stellw. im Geb., Rheing. bei Basel, Mühlhausen, Baden zw. Neuenheim u. Eadenburg, bei Heidelberg; Felsen im südl. Eittorale, Dalmatien, Ungarn, Genua u. Nizza. 6—7. ☉

4. *E. elongatum* Rchb. exc. Brassica elongata Ehrh. Sandige Pergwiesen, Aefferränder. In Ungarn bei Ofen u. in Siebenbürgen. 6—9. ☉

51. *Moricandia* DC. syst. Moricandie. Rchb. exc. p. 694.

1. *M. arvensis* DC. Rchb. exc. Diplotaxis — Koch. Erucastrum De Candollii Spreng. Turritis arvensis. R. Brow. Wege, Mauern im südlichsten Geb., Eigurien um Ventimiglia u. Nizza. 4—5. ☉ u. ☉

52. *Sinapis* L. Senf. K. syn. 60. Rchb. exc. p. 693. Comp. II. p. 99.

1. *S. arvensis* L. K. syn. Var. β . *S. orientalis* Murr. Schkr. *S. Schkuhriana* Rchb. icon. Aecker, Brachfelder dch. d. g. Geb. oft in bedeutender Menge. 6—9. ☉

2. *S. campestris* Besser. Fl. Galiz. II. p. 88. Maly enum. pl. austr. p. 272 u. 392. Aecker in Galizien bei Krakau. 6—7. ☉

3. *S. Allionii* Jacq. Rchb. icon. Cultivirte Orte in Oberitalien. 6—8. ☉

4. *S. alba* L. K. syn. *Napus leucosinapis* Spenn. Saatacker stellw. besonders dch. d. südl. Geb., sonst cultivirt u. hin u. wieder verwildert, z. B. in d. Rheingegenden 2c. 6—7. ☉

5. *S. cheiranthus* Koch. K. syn. Var. α . Bras-

sica Cheiranthos Villars. Rehb. exc. B. montana DC. Fl. fr. Sinapis Tournesortii Allion. — β . Br. cheiranthiflora DC. syst. N. v. E. Rehb. exc. Sinap. recurvata All. ped. Raphanus cheiranthiflorus Willd. Brassica Erucastrum Pollich. Sisymbrium monense Gmel. bad. Felsen, Weinberge, Ufer, Wege, besonders auf Sand u. Thonschiefer, stellenw. dch. d. Gebirge, Rheing. v. Basel dch. Elsaß bei Hagenu, Baden bei Rastatt, Mannheim, Pfalz bei Dürkheim dch. d. Geb. nach Kaiserslautern, Homburg bis Saarbrücken, Kusel, dann dch. d. Nahe-, Glan- u. Moselgebirge, bei Trier, Trarbach u. häufig auf d. Feldern d. vulkanischen Sandes d. Eifel, d. g. Mayensfeldes u. Laager-Sees bei Coblenz, im Ahrthale bei Bonn bis Eöln, Luxemburg u. im südl. Geb. in d. Lombardei, Piemont um Nizza; Savoyen. 5—9. Var. α . \odot β . \odot

53. *Diplotaxis* DC. Doppelsame. K. syn. 61. Rehb. exc. p. 691. Comp. II. p. 101.

1. *D. tenuifolia* DC. K. syn. *Sisymbrium* — L. *Sinapis* — R. Br. *Brassica muralis* Huds. Abhänge, Ufer, Wege, Mauern, Schutt im g. südl. u. im mittleren Geb. Südschweiz; Rheing. Bodensee bei Constanx zc., v. Basel dch. Elsaß, Baden auf d. g. Rheinfläche bis Mainz, im Neckar- u. Mainthale, bei Bingen, Kreuznach, Coblenz, Eöln, Düsseldorf, Wesel, Aachen, Luxemburg u. Spa, an d. Ostsee bei Travemünde, Königsberg, Danzig, Memel, Pillau; Thüringen, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Südtirol, Krain, Dalmatien, Ungarn u. Lombardei. 6—10. 4

2. *D. muralis* DC. K. syn. *Sinapis* — R. Brow. *Eruca* — Moench. *Sisymbrium* — le L. S. *Erucastrum* Gouan. Felder, Brachäcker, Wege, Ufer im südl. u. stellenw. im mittleren Geb., Schweiz im Cant. Waadt; Rheing. Constanx, Ueberdingen u. auf d. g. Rheinfläche v. Oberelsaß dch. Baden, Breisg., Mannheim, Heidelberg, Pfalz, Mainz, Hochheim bis Hanau, Bingen bis Kreuznach, Coblenz, Bonn, bei Godesberg, Eöln, Düsseldorf, Moselthal Trier bis

Luxemburg, Spa, Wetterau, Ostsee bei Stralsund, Danzig u. Memel; Thüringen Jena; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark Tyrol, Vitoral, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Kombarbei. 5—8. ☉

3. *D. viminea* DC. K. syn. *D. brevicaulis* Bl. et Fingh. *Sisymbrium vemineum* L. *S. brevicaule* Wibel, *S. pumilum* Lamk. Necker, Weinberge, Schutt, stellw. im Geb. Rheing. Hochheim bei Mainz, Main aufwärts, Steinheim bei Hanau 1824, Franken bei Werthheim; Destr. Dalmatien u. Piemont. 6—9. ☉

4. *D. saxatilis* DC. Reh. exc. *Sisymbrium* — le Lamk. *S. monense* L. Hochalpen in d. südlichsten Kette, Piemont um Bassolino. 6—7. 4

5. *D. Barrelieri* DC. Reh. exc. *Eruca* — Barrel. *Sisymbrium* — L. *S. asperum* Zuccarini. Im südl. Vitoral, Istrien bei Pola. 4—5. ☉

6. *D. erucoides* DC. *Eruca* — Reh. exc. *Sinapis* — L. Felder, Weinberge, Wege im südl. Geb. Kombarbei, Piemont, Nizza. 5—9. ☉

54. *Eruca* DC. Tournef. Runke. K. syn. 62. Reh. exc. p. 692. Comp. II. p. 103.

1. *E. sativa* Lamk. K. syn. *Brassica Eruca* L. *Sinapis* — Röhl. Felder, Wege, Schutt, im südl. Geb. Schweiz, im Cant. Wallis bei St. Leonhard zw. Inden u. Varen bei Leuf, Martinach; Südtirol, Ungarn, Kombarbei, Piemont, Genua. 5—6. ☉

Zweite Unterordnung.

Latisepten, breitwandige Schötchen.

K. Taschb. p. 43. *Siliculosae* L.

55. *Vesicaria* Lamk. Blasenschötchen. K. syn. 62. Reh. exc. p. 672. Comp. II. p. 7.

1. *V. utriculata* Lamk. K. syn. *Alyssum utriculatum* L. Gebirge, Felsen im südl. Geb. Rheing. wohl ange-

saet, an Rolandseck u. an d. Godesberg, oberhalb Bonn; Schweiz Cant. Wallis am Ausflusse des Giesbaches Trient, in d. Rhone; Eittoral Istrien bei Dsero, Dalmatien, Ungarn im Banat u. Piemont. 4—5. 4

2. *V. sinuata* Poiret. K. syn. *Alyssum sinuatum* L. Felsen, steinige Orte im südl. Eittoral, Istrien, Insel Dsero u. Cherso, bei Fiume, Monfalcone, Dalmatien, Combarbei. 5—6. 4

3. *V. microcarpa* Visiani Flora 1829. Maly enum. pl. austr. p. 272 u. 392. Dalmatien an d. M. Fiofovo. 5. ☉

56. *Alyssum* L. Steinfraut. K. syn. 63. Rchb. exc. p. 670. Comp. II. p. 7.

1. *A. petraeum* Arduino L. syn. *A. edentulum* W. et Kit. Rchb. exc. *A. gemonense* L. Steinige Orte, Felsen im südl. Geb. Krain bei Görz, Eittoral, Istrien auf Dsero u. Cherso, Dalmatien, Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen. 5—6. ☉

2. *A. medium* Host. K. syn. *A. gemonense* Wulf. Jacq. Sturm. Kalkgebirge im südl. Geb. Oberkärnthen bei Ponteba, Gemona, Krain, Tyrol, Eittoral, Istrien auf Dsero. 5—6. ‡

3. *A. saxatile* L. K. syn. *Aurinia saxatil.* Desv. Kalkgebirge stellw. im Geb. Sachsen an d. Mulde in d. Eulenkluft bei Weichsburg, an d. Elbe bei Meissen, Schlesien, Baiern im Baireuther Gebirge bei Muggendorf; Destr. Böhmen an d. Pobbaba bei Prag, Mähren, Krain, Dalmatien u. Ungarn. 4—5. 4

4. *A. nebrodense* Tineo Rchb. exc. In Dalmatien: 4—5. 4

5. *A. alpestre* L. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *elaticus* K. syn. *A. alpestre* β . *argenteum* Gaud. helv. Felsen d. Alpen u. Boralpen; Schweiz im Cant. Wallis Nicolaital M. Stock über Zermatten, Valle Farnanche u. Chatillon; Rheing. Oberbadon auf d. Schaufelsen bei Stetten am kalten Markt; Destr. Eittorale, Galizien, Siebenbürgen, Combarbei u. Piemont. 6. 4

6. *A. tortuosum* W. et Kit. Rehb. exc. et icon. *A. serpyllifolium* DC. *A. alpestris* β . *majus* K. syn. Sandige, uncultivirte Orte im südl. Geb. Schweiz im Cant. Wallis; Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen u. Galizien. 4—8. 4

7. *A. argenteum* Vitm. K. syn. Rehb. exc. *A. murale* W. et Kit. Rehb. exc. *A. obtusifolium* DC. *A. Bertolonii* Desv. Felsen im südl. Geb. Südschweiz, Valle d'Aost, Chatillon; Rheing. Flora v. Spa, Berviers bei Aachen; Dalmatien bei Ragusa, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont M. Genis. 5—6. 4

8. *A. montanum* L. K. syn. Var. β . *A. arenarium* Loiseleur — γ . *A. arenarium* Gmel. bad. Kalkfelsen, Abhänge, Raine, Weinbergsmauern, Sandfelder, stellw. dch. d. Geb. Rheing., Baden bei Wiesloch, Darmstadt, Mainz an d. Hardtmühle, Bingen, Coblenz, Linz, Remagen bis ins Ahrthal nach Altenahr, Drachensfels bei Bonn, an d. Rahe aufwärts bis Martinsstein, Kreuznach am Rothenfels, Mosel bei Uerzig, Lahn bei Runkel; Franken, Main u. an d. Donau, Sachsen, Baiern, an d. Weichsel, Weisenberg bei Stuhm; Schweiz im Jura u. 5—7. 4

9. *A. vernale* Kitaib. Rehb. icon. *A. montanum* γ . *molliusculum* Rehb. exc. sub 4274. Im südl. Geb. Dalmatien, Ungarn im Banat. 4—5. ☉

10. *A. Wulfenianum* Bernhadi K. syn. *A. alpestre* Wulfen. *A. cuneifolium* Tenore. Alpen, Tyrol, Kärnthén M. Dvir, Krain u. in Oberitalien. 5—8. 4

11. *A. Rochelii* Andr. Rehb. icon. f. 4273 b. *A. Wulfenianum* Rehb. pl. crit. Ungarn im Banat auf d. Alpe Baifu. 7—8. 4

12. *A. Wierzbikii* Heuffel. Rehb. icon. 4272 b. *A. hirsutum* β . *bannaticum* Wierzb. Im Banat bei Dravica Tisza-Mare an d. Stofaina, Felsen bei Majdau. 5—6. ☉

13. *A. rostratum* Steven. Rehb. exc. in add. p. 872. Sandhügeln, Mauern im südl. Geb. Dalmatien bei Cattaro, in Ungarn u. Siebenbürgen. 4—5. ☉

14. *A. calycinum* L. K. syn. *A. campestre* M. v. B. *Adyseton calycinum* Scopol. *Psilonema* — C. A. Meyer. Sonnige Hügel, Raine, Ufer, Felder dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

15. *A. campestre* L. K. syn. Var. β . *micropetalum* Fisch. Feldränder, Brachäcker im südl. Geb., Südschweiz, im Unterwallis; Rheing. Flora v. Spa; dann in Croatien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont u. Oberitalien. 4—5. ☉

16. *A. hirsutum* M. v. Bieb. Rchb. exc. *A. campestre* γ . *hirsutum* K. syn. Felder im südl. Geb. Dalmatien, Ungarn, in d. Lombardei, Venedig. 5—6. ☉.

17. *A. minimum* Willd. K. syn. Sandige Orte, Hügel, stellenw. im südl. Geb.; Destr. bei Wien, Ungarn bei Pesth. 4—6. ☉.

18. *A. repens* Baumg. transyl. II. p. 237. DC. prodr. I. p. 161. Maly enum. pl. austr. p. 275. Kalkfelsen in Siebenbürgen. ‡

57. *Lobularia* Desveaux. Lobularien. K. syn. K. syn. 65. Comp. II. p. 12.

1. *L. maritima* Desv. K. syn. Koniga — R. Br. Rchb. exc. 659. *Alyssum* — um Lamk. *A. halimifolium* Curt. *Clypeola maritima* L. *Glyce maritima* Lindl. *Draba maritima* Lamk. Im südl. Vittoral, Istrien, bei Fiume, Triest, Dalmatien, Venedig, Nizza u. Genua. 6—8. 4

2. *L. halimifolia* Bluff. et Fgh. Comp. II. Koniga — Rchb. exc. *Alyssum*: *halimifolium* Willd. *Lunaria halimifolia* All. ped. Hügel, Felsen im südlichsten Geb., Piemont bei Tenda, Chindola, Nizza bei Garezso u. Oneglia. 4—5. ‡

58. *Farsetia* Turra R. Brow. Farsetie. K. syn. 65. Rchb. exc. p. 672. Comp. II. p. 13—14.

1. *F. incana* R. Br. K. syn. *Berteroa* — DC. Rchb. exc. *Alyssum incanum* L. Var. β . *viridis*: *Berteroa viridis*

Tausch. Rchb. exc. Raine, Wege, Feldränder, Brachäcker stellw. dch. d. Geb. Rheing. v. Oberbaden bis Köln, besonders an d. Rheindämmen, bei Speyer, Mainz, nach Thüringen, Sachsen, auch an d. Nahe, Mosel, Neckar, Main, Elbe, Donau, Ostsee u. Nordsee, Königsberg, Holstein, Hamburg zc., d. Var. β . bei Hannover u. in Dalmatien. 5 — 10. ☉

2. *F. procumbens** Berteroa — Portenschl. Rchb. exc. *Farsetia mutabilis* Maly, *Alyssum mutabile* Vent. Auf Schutt im südl. Geb., Dalmatien bei Sing u. Spalatro. 5 — 6. ☉

3. *F. clypeata* R. Br. K. syn. in add. 438. *Alyssum clypeatum* L. *Lunaria clypeata* All. ped. Steinige Orte im südlichsten Geb. Istrien, Alle Laste östl. v. Trient, Lombardei bei Verona, Piemont Nizza. 5 — 6. ☉

4. *F. triquetra* R. Br. Rchb. exc. In Dalmatien an Felsen bei Clissa u. Almissa. 4 — 5. ☿

59. *Lunaria* L. Mondviole. K. syn. 66. Rchb. exc. p. 673. Comp. II. p. 14.

1. *L. rediviva* L. K. syn. *L. perennis* Gmel. Bergwälder u. Boralpen dch. d. g. Alpenkette u. stellw. dch. d. Berggeb., besonders an felsigen Bachufern, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. Bodensee u. v. Basel bis Düsseldorf, an d. Nahe bei Kreuznach, Stromberg, Mosel bei Berncastel, Trier, Hochwald, Eifel, Luxemburg, Aachen, Westphalen, Hannover bis Königsberg, Danzig, Sachsen, Baiern, Destr. zc. 5 — 6. ♀

2. *L. biennis* Moench. K. syn. *L. annua* L. sp. Bewaldete Felsen, besonders im südl. Geb. Rheing., Luxemburg bei Martilly u. Herbeumont, Flora v. Spa; Südschweiz; Dalmatien, Galizien, Ungarn u. Lombardei; auch an mehreren Orten verwildert z. B. in Baden, bei Kreuznach zc. 4 — 5. ☉

60. *Clypeola* L. Schildfraut. K. syn. 66. Rchb. exc. p. 664. Comp. II. p. 15.

1. *C. Jonthlaspi* L. K. syn. *C. Gaudini* Trachsel, *Fosselina Jonthlaspi* All. ped. Sandige Orte im südl.

Geb., Schweiz Cant. Wallis am Tourbillon bei Sitten; am südl. Eittorale, Istrien bei Fiume, Dalmatien u. Croatien. 4—5. ☉

61. *Peltaria* L. Scheibenkraut. K. syn. 66. Rchb. exc. p. 664. Comp. II. p. 16.

1. *P. alliacea* L. K. syn. Bondschia — All. ped. *Clypeola perennis* Arduin. Schattige Felsen, Bachufer im südl. Geb., Unteröstr. am Schneeberg, am Guttenstein in Steyermark, im Eittoral, Istrien M. Maggiore, Fiume an d. Fiumara, Croatien, Dalmatien, Ungarn u. Siebenbürgen. 5—7. 4

62. *Petrocallis* R. Brow. Steinschmüchel. K. syn. 66. Rchb. exc. p. 664. Comp. II. p. 16.

1. *P. pyrenaica* R. Brow. K. syn. *Draba* — L. *Dr. rubra* Crntz. *Zizia pyrenaica* Roth. Felsen d. Hochalpen besonders dch. d. g. südl. Kette; Schweiz Cant. Bern, M. Stockhorn u.; bairische Alpen bei Berchtesgaden; Destr. Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Salzburg, Krain, Eittoral bis in d. Lombardei. 6—7. 4

63. *Draba* L. Hungerblümchen. K. syn. 66. Rchb. exc. p. 664. Comp. II. p. 17.

Erste Rotte. *Aizopsis* DC. K. syn.

1. *D. aizoides* L. K. syn. Var. β . *D. affinis* Host. — γ . *montana* K. syn. *Dr. elongata* Host. Alpen, Vor-alpen u. felsige Orte d. Niederungen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette; dann v. Jura nach Ober-Elßaß u. Württemberg am Hohentwiel im Hegau, längs d. Donau bis Regensburg nach Baiern, bei Erlangen, Muggendorf: Baireuth; Destr. bei Wien, Mähren, dch. d. Alpenkette bis in d. Eittoral, Ungarn u. 4—5—8. 4

2. *D. Aizoon* Wahlenb. Rchb. exc. *D. lasiocarpa* Rochel. Kalkfelsen d. Karpathenkette; Dalmatien, Ungarn im Banat am Adlersberg u. Blockberg bei Ofen. 5—6. 4

3. *D. Zahlbruckneri* Host. K. syn. *D. glacialis* Hoppe Koch. *D. Hoppeana* Rehb. exc. Hochalpen im Urgebirge; Schweiz; Salzburger Alpen an d. Pasterze, Salzhöhe, Kärnthen an d. Hohenschwab, Steyermark an d. Hohenolling. 8. 4

4. *D. Sauteri* Hoppe. K. syn. Rehb. exc. Var. β . *D. Spitzelii* Hoppe Rehb. icon. Hohe Kalkalpen, Steyermark an. d. Schwarzkogel im Tennengebirge, M. Watzmann in Berchtesgaden, Salzburg bei Lofer. 6—7. 4

5. *D. cuspitata* M. v. B. Rehb. exc. *D. aspera* Bertolon. *D. taurica* Willd. Felsen im südlichsten Geb., Siebenbürgen, Oberitalien in d. Appenninen. 5. 4

6. *D. alpina* L. Rehb. exc. Alpen in d. südlichsten Kette, Piemont in d. Novarese auf d. Monte Moro. 7—8. 4

Zweite Rotte. *Leucodraba* DC. K. syn.

7. *D. tomentosa* Wahlb. helv. K. syn. Hochalpen, Schweiz M. Gemmi, Nicolai- u. Saffenthal u., Oberbaiern, Tyrol bei Rißbühl, Salzburg bei Lofer, Kärnthen an d. Salzhöhe, Carpathen in Ungarn u. in d. Lombardei. 7—8. 4

8. *D. stellata* Jacq. Sauter, K. syn. *D. hirta* Jacq. *D. austriaca* Crntz. *D. saxatilis* Koch. *D. macrantha* Vest. Hohe Kalkalpen, Oestr. M. Schneeberg u. Pyrgas; Schieblegger, Hochsalm u. Kalbling in Steyermark, Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen. 6—7. 4

9. *D. frigida* Sauter K. syn. *D. stellata* Koch. *D. dubia* Suter. Var. β . *siliculis ciliatis* K. syn. — γ . *D. stellata* β . *hebecarpa* DC. syst. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis, Saffer- u. Nicolaithal über Zermatt u. nach Tyrol, Salzburg am Untersberg, Kärnthen, Steyermark, Krain, Lombardei, Venedig; Piemont M. Genis. 7. 4

10. *D. Traunsteineri* Hoppe. K. syn. *D. muricella*. Rehb. exc. Alpen in Tyrol an d. Rißbühler Horn, Salzburg bei Lofer. 7—8. 4

11. *D. Johannis* Host. Hoppe. K. syn. *D. carinthiaca* Hoppe. *D. hirta* Gaud. Var. β . *minor*: *D. nivalis* DC.

syst. Gaud. Rehb. pl. crit. *D. stellata* Fl. Dan. — γ . *glabrata*: *D. Hoppeana* Rudolf. *D. Hoppii* Trachsel. Hochalpen im Urgebirge; Schweiz M. Gemmi, Wallis M. Moro, M. Fouly; Tyrol Salzburg, Steyermark, Kärnthen u. Ungarn. 7—8. 4

12. *D. hirta* L. Baumg. Transyl. II. p. 234. Rehb. pl. crit. Cent. X. DC. prodr. I. p. 169. Maly enum. pl. austr. p. 277. Felsen d. Alpen in Siebenbürgen. 7. 4

13. *D. Wahlenbergii* Hartm. K. syn. Var. α . *homotricha* Lindbl. *D. fladnizensis* Wulf. Rehb. exc. K. syn. edit. I. *D. helvetica* Schleich. *D. sclerophylla* Gaud. *D. androsacea* Wahlb. *D. ciliaris* Wahlenb. non. Lin. *D. nivalis* Sering. *D. lactea* Adans. — β . *heterotricha* Lindbl. *D. lapponica* Willd. DC. syst. Rehb. exc. Wahlenb. K. syn. edit. I. *D. fladnizensis* Gaud. — γ . *laevigata*: *D. laevigata* Hoppe. Hochalpen, Schneegrenze an Gletscherändern, Schweiz M. Gemmi, M. Reggis, Sandalp u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Kärnthen, Steyermark, Krain bis in d. Lombardei. 7—8. 4

14. *D. ciliata* Scopul. K. syn. *D. androsacea* Willd. *D. fladnizensis* DC. *D. ciliaris* Baumg. Hochalpen in d. südl. Kette, Krain an d. M. Ranaš zw. Prewalb u. d. Hironymus Kapelle, Littorale, Istrien, M. Maggiore, Dalmatien, Croatien u. Siebenbürgen. 5—6. 4

15. *D. rupestris* R. Br. Reh. icon. t. 14. f. 4245. Schweiz im Cant. Wallis. 7—8. 4

16. *D. muralis* L. K. syn. *D. nemorosa* All. ped. Steinige, beschattete Orte, Bergabhänge, Felsen, Mauern, steilw. dch. d. Geb., Rheing. v. Basel steilw. bis in d. Niederlande, bei Hünningen, am Donnersberg, Nahe bei Kreuznach, Oberstein, an d. Mosel bei Trier, Luxemburg, Berncastel an d. Mosel, Coblenz, Neuwied, Altenahr bei Bonn bis Wesel, Thüringen, Sachsen, Harz, Hamburg, Schlesien; Böhmen, Mähren, Dalmatien, Ungarn, Lombardei; Schweiz u. Piemont. 4—6. ☉

17. *D. nemoralis* Ehrh. Rehb. exc. Sandige, gra-

fige Hügel im südl. Geb. Dalmatien, Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen. 5—6. ☉

18. *D. incana* L. K. syn. *Rchb. exc.* Var. α . *D. contorta* Ehrh. — β . *D. confusa* Ehrh. Alpen, Schweiz, Cant. Bern M. Ganterich, Graubünden bei Albula, Cant. Wallis im Saasthale; Tyrol M. Schlehen. 5—6. 4

19. *D. Thomasii* Koch. K. syn. 438. in add. *D. stylaris* Gay. K. syn. 70. *D. confusa* D. Fl. Sturm, *Rchb. exc. et icon.* DC. syst. Steinige Orte d. Alpen, Schweiz Cant. Wallis im Saasthal u. Nicolaithale über Zermatten; Südtirol Schleern-Gebirge. 5—6. ☉

Dritte Rotte. *Erophila* DC. K. syn.

20. *D. verna* L. K. syn. *D. Krockeri* *Rchb. Erophila vulgaris* DC. syst. Var. β . *D. spathulata* Lang. *D. praecox* Steven *Rchb. exc.* Cultivirte u. uncultivirte Orte, Raine, Mauern, Wege zc. im g. Geb. 3—4. ☉

64. *Cochlearia* L. Löffelkraut. K. syn. 71. *Rchb. exc. p.* 668. *Comp.* II. 24.

1. *C. officinalis* L. K. syn. Küste d. Nord- u. Ostsee, Holstein, Oldenburg, Norderney bei Bremen, Danzig; im Binnenlande an Salinen, Salzquellen, Rheing., Soden bei Frankfurt, Haan bei Düsseldorf, Aachen, Luxemburg, Bodensee, Basel, Oberschwaben, Württemberg, Werthheim, Baireuth, Dissen in Hannover; Pommern; Schweiz bei Ber; Destr. Böhmen, Steyermark, Galizien. 5—6. ☉

2. *C. pyrenaica* DC. K. syn. *C. groenlandica* Host. *Rchb. exc.* Feuchte Orte, Bachufer, Rheing., bei Aachen hinter d. Eineburg mit *C. officinalis*; Steyermark bei Marienzell auf der grünen Au. 4—5. ☉ nach d. Flora v. Aachen. ☉

3. *C. groenlandica* L. *Rchb. exc.* Maly enum. pl. austr. p. 278. Hochalpen d. Carpathen in Galizien. 7. ☉

4. *C. danica* L. K. syn. Nördlicher Seestrand, Holstein, Oldenburg, Mecklenburg Rostock; u. Holland. 5—6. ☉

5. *C. anglica* L. K. syn. Nördlicher Seestrand, Bremen, Insel Rorderney, Holstein bei Heiligenhafen, Oldenburg, Zeven, Barel; Holland 2c. 5—6. ☉

6. *C. brevicaulis* Fachini K. syn. add. 439. *Rhizotrya alpina* Tausch. Steinige Orte in Südtirol, Alpe Nera seconda in Primiero u. Alpe Camerloi in Fassa. 7—8. 4

65. *Kernera Medicus*. *Kernera*. K. syn. 72. Rchb. exc. p. 669. Comp. II. p. 28.

1. *K. saxatilis* Rchb. exc. K. syn. 72. *Cochlearia* — Lamk. K. syn. in add. 439. *Myagrum saxatile* L. *Alyssum alpinum* Scopol. *A. rupestre* Willd. *A. myagroides* All. ped. *Kernera* — Medik. *Camelina saxatilis* Pers. syn. Var. β . *K. auriculata* Rchb. *Cochlearia* — Lamk. *Myagrum* — tum. DC. *M. alpinum* Lapeyr. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Oestr. 2c. Rheing. am Bodensee, im Rheinthale bei Embs an d. Kalkfelsen. 7—8. 4

2. *K. glastifolia* Rchb. icon. *Cochlearia* — L. Rchb. exc. Im südl. Eitoral, Istrien bei Pirano u. an d. M. Maggiore. 5. ☉

66. *Camelina Crantz*. DC. syst. Leindotter. K. syn. 72. Rchb. exc. p. 673. Comp. II. p. 24.

1. *C. sativa* Crantz. K. syn. *Myagrum sativum* L. *Alyssum* — Smith. *Chamaelinum* — Host. *Moenchia sativa* Roth. Sandboden, Aecker, Felder im g. Geb. 6—7. ☉

2. *C. microcarpa* Andr. Rchb. exc. *C. sativa* α . *pilosa* K. syn. *C. sylvestris* Fries, Wallr. *Myagrum sylvestre*. C. Bauh. Felsen, Hügel, Mauern, Aecker, Brachfelder, stellw. dch. d. g. Geb. 5—7. ☉

3. *C. dentata* Pers. K. syn. *C. pinnatifida* Hornem. *Myagrum dentatum* Willd. *M. pinnatifidum* Ebrh. *M. Bauhini* Gmel. bad. *M. sativum* γ . L. *Alyssum pinnatifidum* Willd. enum. Moench. *arvensis* Bernh. *Cochlearia foetida* Schkr. Auf Leindäckern, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. Basel bis in

b. Niederlanden; in Sachsen, Thüringen, Oestr. bis in d. Lombardei. 6—7. ☉

4. *C. macrocarpa* Wierzb. Rchb. exc. Weingärten u. Feinacker, Ungarn im Banat bei Kufova. 7. ☉

67. *Subularia* L. Pfriemenkresse. K. syn. 73. Rchb. exc. 664. Comp. II. p. 30.

1. *S. aquatica* L. K. syn. Landseen, Teichen unter d. Wasser u. am Rande; Rheing. Belgien bei Lüttich; Baiern bei Erlangen im Bischofsweiher, Preußen bei Wittenberg, Holstein, Braunschweig; Galizien u. Ungarn. 6—7. ☉

Dritte Unterordnung.

Angustisepten. Schmalwandige Schötchen. K. Taschb. p. 51. Siliculosae L.

68. *Thlaspi* L. Täschelkraut. K. syn. 73. Rchb. exc. p. 657. Comp. II. p. 30.

1. *T. arvense* L. K. syn. Felder, Wege, Schutt, im g. Geb. 4—10. ☉

2. *T. alliaceum* L. K. syn. Hügel, Acker, besonders im südl. Geb. Rheing. bei Aachen teste Koch, Holstein; Oestr. Salzburg bei Berchtesgaden, Littoral, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei bei Mailand u. in Piemont. 5—6. ☉

3. *T. perfoliatum* L. K. syn. *T. alpestre* Gmel. bad. Kalk u. Lehmboden, Hügel, Acker, Wege, stellenw. bh. d. g. Geb. Rheing. v. Basel bis Worms, Mainz, Coblenz, Köln, Düsseldorf, an d. Mosel u. Saar, bei Trier, Saarbrücken, Luxemburg, Aachen 2c. 4—6. ☉

4. *T. alpestre* L. K. syn. *T. caerulescens* Presl. *T. montanum* Pollich. *T. praecox* Lej. Var. β . *T. calamitare* Lej. et Court. Fl. Belg. Steinige Bergwiesen, Abhänge stellenw. bh. d. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Jura; Rheing. Vogesen, Pfalz am Donnersberg, an d. Nahe bei Kreuznach, auf d. Lemberg bei Niederalben, Boppard, Alrthal bei Altenahr, Aachen, Luxemburg, Herborn, Schwaben; Halle, Sachsen

bei Leipzig, Dresden; Destr. Böhmen, Mähren, Ungarn u. Lombardei; Var. β . häufig auf d. Salmei bei Aachen. 4—6. 4

5. *T. praecox* Wulfen K. syn. *T. montanum* Scop. *T. alpinum* Crntz. *T. montanum* β . *praecox* DC. syst. Kalkgebirge im südl. Littoral, Istrien, Fiume, Triest, Görz, Dalmatien, Croatien, Lombardei u. Venedig. 3—4. 4

6. *T. montanum* L. K. syn. Kalkhügel, Felsen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. auf d. Tertiärkalke d. Pfalz bei Dürkheim, Callstadt, Jurakalk bei Luxemburg; Schweiz mit d. Jurakalke nach Schwaben, Franken, Baiern bis Bai-reuth, Thüringen Jena, Sachsen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Kärnthen, Steyermark, Dalmatien, Ungarn u. Lom-bardei. 4—5. 4

7. *T. alpinum* Jacq. K. syn. Schleicher. *T. mon-tanum* γ . DC. syst. Var. β . *T. sylvium* Gaud. Rchb. icon. *Noccaea stylosa* Rchb. exc. Iberis — Tenore. Triften d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis über Zermatten am Mat-terhornletscher, auf d. Rifel; Destr. Kärnthen an d. Seles-nika, Rablthal, Steyermark, Tyrol, Littoral, Siebenbürgen. 7—8. 4

8. *T. rotundifolium* Gaud. helv. K. syn. Iberis — α . L. Hutchinsia — R. Br. *Noccaea* — Moench. Rchb. exc. Var. β . *Th. corymbosum* Gaud. helv. Rchb. icon. *Hutchinsia corymbosa* Gay. Steinige Orte d. Hochalpen an Gletscherränder Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. Krain, Littoral, Ungarn, Siebenbürgen u. Lombardei; die Var. β . im Cant. Wallis über Zermatten am Rifel u. Flühe. 7—8. 4

9. *T. cepeaefolium* Koch. K. syn. Iberis — lia Wulf. *Noccaea* — Rchb. exc. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis über Zermatten u. auf d. Ravanpaß 1827; Kärn-then im Rablthale an d. Galmengrube unter d. Bitriolwand, Krain. 5. 4

69. *Teesdalia* R. Brow. Teesdalie. K. syn. 75. Rchb. exc. p. 658. Comp. II. p. 34.

1. *T. nudicaulis* R. Br. K. syn. *T. Iberis* DC. *Iberis nudicaulis* L. *Lepidium scapiferum* Wallr. *Guepinia nudicaulis* Bast. Sandboden, Haiden, Aecker, Wege stellw. dch. d. Geb. 4—6. ☉

2. *T. Lepidium* DC. Rehb. exc. *Lepidium nudicaule* L. Haiden im südlichsten Geb. Piemont bei Romenzino in d. Novarese. 3—4. ☉

70. *Iberis* L. Bauernsensf. K. syn. 75. Rehb. exc. p. 659. Comp. II. p. 34.

1. *I. saxatilis* L. K. syn. *I. Garrexiana* Scopol. Felsige Orte, besonders im südl. Geb. Schweiz auf d. Jura im Cant. Solothurn; Lombardei, Piemont, Novarese. 6. ‡

2. *I. sempervirens* L. Rehb. exc. Im südlichsten Geb., Piemont bei Nizza am Baillon-Fluß. 6—7. ‡

3. *I. Garrexiana* All. ped. Rehb. exc. Bergabhänge im südlichsten Geb. Dalmatien, Piemont, Genua, Nizza; Col de Tenda. 6—7. ‡

4. *I. amara* L. K. syn. Var. β . *I. ruficaulis* Lej. — γ . *bicolor*: *I. bicolor* Rehb. exc. Kalkboden, Aecker, Brachfelder, Weinberge, stellw. dch. d. Geb. bis in d. Süden, Rheing. v. Basel bis Köln u. in d. Seitenthälern u. 6—8. ☉

5. *I. carnosa* W. et Kit. Host. Fl. austr. II. 226. Maly enum. pl. austr. p. 280. *I. spathulata* DC. Gebirgsstellen im südl. Geb., Dalmatien, Ungarn. 6. ☉

6. *I. pinnata* L. K. syn. Kalkfelsen im südl. Geb., Destr. bei Wien, Littoral, Istrien, Triest; Piemont. 6—7. ☉

7. *I. umbellata* L. K. syn. Steinige Orte im südl. Littoral, Krain, Istrien, Triest, Dalmatien, Lombardei, Piemont, Genua u. Nizza. 6. ☉

8. *I. intermedia* Guersent K. syn. *I. amara* Scopol. *I. divaricata* Tausch. Steinige Bergabhänge, Rheing. auf Thonschiefer unterhalb d. Altenburg bei Boppard, Flora v. Coblenz u. im Destr. Littorale. 6—9. ☉

9. *I. linifolia* L. Rehb. exc. Steinige Orte im südl.

Ettoral, Krain, Istrien, Triest, bei Görz, Dalmatien; Piemont Nizza. 6. ☉

10. *I. ciliata* Allion. Rehb. exc. I. Molinieri Balbis. Bergstellen im südlichsten Geb., Piemont am Baillonufer bei Nizza oberhalb Pont de l'Escarene. 6 ☉

11. *I. nana* All. Rehb. exc. *Ib. aurosica* Vill. Piemont an Felsen bei Mondovi u. Carlin. 5. ☉

71. *Biscutella* L. Brillenschote. K. syn. 76. Rehb. exc. p. 660. Comp. II. 37.

1. *B. auriculata* L. Rehb. exc. *Thlaspidium saccatum* Moench. Var. β . *B. erigerifolia* DC. Im südl. Geb., Aester in Piemont bei Susa, Nizza, Triesten in d. Novarese. 6—7. ☉

2. *B. coronopifolia* Allion. Rehb. exc. Felsen im südlichsten Geb., Piemont im Bardonnache u. Magrathale am Monte Trelot. 6. 4

3. *B. hispida* DC. K. syn. *B. dilatata* Visian. Im südl. Ettoral, Istrien, Insel Veglia, bei Fiume, Dalmatien bei Gardona am Wasserfalle u. in Piemont. 6—7. ☉

4. *B. ciliata* DC. Rehb. exc. *B. apula* L. *B. coronopifolia* Willd. Hügel im südl. Geb., Dalmatien, Lombardien, Verona, Trient u. bei Venedig. 5—6. ☉

5. *B. laevigata* L. K. syn. *B. alpestris* W. et Kit. *B. ambigua* Wallr. Var. β . *glabra* Gaud. *B. lucida* DC. — γ . *scabra*: *B. saxatilis* Schleich. Rehb. exc. *B. longifolia* Vill. delph. *B. subspathulata* Suter. *B. didyma* Scop. — ϵ . *hispidissima*: *B. ambigua* DC. Rehb. icon. Alpen, Boralpen u. Gebirgen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. u., Rheing. an d. Vogesen hinter Dombach u. Scherweiler, bei Straßburg; Nahe v. Kreuznach bis Oberstein, Rheingrafenstein, Simmerthal, im Mosel- u. Ahrthale bei Bonn; Schwaben, Thüringen, Sachsen, Baiern, Schlesien; Böhmen, Mähren u. 7—8. 4

72. *Lepidium* L. Kresse. K. syn. 77. Rehb. exc. p. 661. Comp. II. p. 39.

1. *L. Draba* L. K. syn. *Cochlearia* — L. Jacq. *Cardaria* — Desv. *Rchb. exc. Cardialepis dentata* Wallr. *Draba ruderalis* Baumg. *Dr. umbellata* Moris. Aßerränder, Raine, Dämme, Schutt, stchw. dch. d. Geb., Rheing. Elsaß bei Burweiler; Pfalz bei Speier, Heidelberg, Frankfurt, Mainz u. stchw. bis Westphalen, Thüringen, Jena, Franken, Baiern bei Erlangen, Nürnberg, Sachsen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Dalmatien, Galizien, Ungarn u. Lombardien. 5—6. 4

2. *L. sativum* L. K. syn. Var. β . *crispum*. — γ . *latifolium*. Cultivirt u. auf Schutt verwildert. 5—7. ☉

3. *L. incisum* Roth. DC. *prodr. I. p. 206. Maly enum. pl. austr. p. 281—293. Steinige Orte, Ungarn im Banat. 5—6. ☉*

4. *L. campestre* R. Brow. K. syn. *Thlaspi* — L. *Iberis* — tris Wallr. Hügel, Acker, Raine, Schutt, besonders auf Kalk u. Lehmboden dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

5. *L. hirtum* Smith. *Rchb. exc. Thlaspi* — L. Baumgart. Hügel mehr im südl. Geb. Siebenbürgen, Belgien bei Doorn; Piemont bei Nizza u. Oneglia. 4—5. ☉

6. *L. perfoliatum* L. K. syn. Wiesen, Aßerränder, Wegen im südl. Geb.; Unteröstr., in Croatien, Siebenbürgen, Ungarn u. Galizien. 5—6. ☉

7. *L. ruderale* L. K. syn. *Nasturtium* — Scopoli *Iberis* — lis Crntz. Wallr. *Senkenbergia* — Fl. Wett. Zäunen, Wegen, Mauern, Schutt, dch. d. g. Geb. 5—8. ☉

8. *L. graminifolium* L. K. syn. *L. Iberis* Pollich. Wegen, Mauern, Schutt, Abhänge, besonders im g. südl. u. mittleren Geb., Rheing. fast auf d. g. Rheinfläche v. Bruchsal bis Mainz, Coblenz, Köln, Düsseldorf nach d. Niederlanden u. Westphalen u. stchw. in d. Nebenthälern d. Main, d. Nahe u. Mosel, Trier; Oberhessen; Destr. bis in d. südl. Littoral. 6—9. ☉

9. *L. latifolium* L. K. syn. Schattige Orte d. Alpen, auch am Seestrande u. stchw. an Salinen; Schweiz Cant. Waadt M. Prapioz, Panerossaz; Cant. Freiburg;

Rheing. Oberbaden, Bodenseegegend, Hohentwiel, Höhenhöwen bei Engen, Secküste, Holstein, Mecklenburg, Warnemünde; Saline Soden bei Frankfurt am Main, Belgien; Böhmen, Krain, Galizien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen; Piemont. 6—7. 4

10. *L. crassifolium* W. et Kit. Reh. exc. Salz-
boden in Ungarn am Neusiedlersee bei Weissenburg. 6. 4

73. *Hutchinsia* R. Brow. Hutchinsie. K. syn.

78. Comp. II. p. 42. *Noccaea* Reh. exc. p. 663.

1. *H. alpina* R. Br. K. syn. *Nocc.* — Reh. exc. *Lepidium alpinum* L. L. Halleri Crntz. Kieselige Orte d. Kalkalpen u. mit d. Bächen in d. Niederungen, Schweiz u. d. g. Alpenkette bis in d. südl. Vittoral, in d. Lombardei u. bei Venedig. 4—8. 4

2. *H. brevicaulis* Hoppe K. syn. *Noccaea* — Reh. exc. Kieselige Orte, Bachränder d. Hochalpen im Urgebirge, Schweiz Cant. Wallis im Nicolaithale über Zermatt auf d. Rifel; Kärnten an d. Pasterze, Salzburg in d. Gambsgrube, Tyrol an d. Schleern. 6—8. 4

3. *H. petraea* R. Br. K. syn. *Hornungia* — Reh. icon. *Teesdalia* — Reh. exc. *Lepidium petraeum* L. Lep. Linnaei Crntz. *Capsella petraea* Fries. Sonnige Kalkhügel, Felsen, stellw. im Geb. Rheing. in Oberelsaß bei Ruffach; Pfalz bei Callstadt, Thüringen bei Vibra, Auleben, Frankenhausen; Destr. bei Wien, Salzburg, Tyrol, Vittoral, Dalmatien, Ungarn u. Lombardei. 4—5. ☉

74. *Capsella* Medicus. Sirtentasche. K. syn. 79.

Reh. exc. p. 664. Comp. II. p. 43.

1. *C. Bursa pastoris* Moench. K. syn. *Thlaspi* — *L. Nasturtium* — Roth. *Rodschiedia* — Fl. Wetter. Cultivirte u. uncultivirte Orte im g. Geb. Var. β . *apetala*. 2—12. ☉

2. *C. procumbens* Fries. K. syn. *C. elliptica*. C. Meyer. *Lepidium procumbens*. L. *Thlaspi* — Wallr. *Noc-*

caea — Rehb. exc. Hutchinsia — R. Brow. Salzhaltige, feuchte Triften, stellw. besonders im südl. Geb., Thüringen an d. Salinen bei Frankenhäusen, Bernburg, Staßfurt zw. Naumburg u. Auleben; Venedig bei Treviso, Genua, Piemont bei Savaglia u. Nizza. 5. ☉

3. *C. pauciflora* Koch. K. syn. Alpen in Südtirol am Udai im Fassathale am Idro-See u. in d. Lombardei. 6—7. ☉

75. *Aethionema* R. Brow. Steinkresse. K. syn.

80. Rehb. exc. p. 663. Comp. II. p. 45.

1. *A. saxatile* R. Br. K. syn. Thlaspi — L. Th. peregrinum Scopol. Felsen d. Alpen, besonders im südl. Geb. mit d. Bächen in d. Niederungen; München an d. Isar; Südschweiz; Destr. bei Wien, Südtirol bis an d. adriatische Meer, Dalmatien, Ungarn u. in d. Lombardei. 5—6. 4

5. *A. gracile* DC. Rehb. exc. Im südlichsten Geb. Piemont, Oberitalien. 5. 4 -

76. *Senebiera* Pers. Senebiere. K. syn. 80.

Rehb. exc. p. 661. Comp. II. p. 45.

1. *S. Coronopus* Poiret. K. syn. Cochlearia — L. Coronopus Ruellii Allion. *C. depressus* Moench. *C. vulgaris* Desf. Seefüsten, Salinen, Flußufer, u. auf Schutt, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. fast am g. Rheinufer u. Nebenthälern nicht selten u. 7—8. ☉

2. *S. didyma* Pers. K. syn. *S. pinnatifida* DC. *Lepidium didymum* L. *L. anglicum* Huds. *Coronopus didymus* Smith. *C. pinnatus* Hornem. Angebauter Boden, an Ufern, stellw. im Geb. am Elbufer bei Altona, Hamburg an d. Sternschanze; Preußen bei Königsberg u. Tilsit; Schweiz bei Bern; Venedig. 7—8. ☉

Vierte Unterordnung.

Nucamentaceen DC. Nußartige Schötchen. K.
Taschb. 56. Siliculosae L.

77. *Euclidium* R. Brow. Schnabelschötchen. K.
syn. 81. Rchb. exc. p. 654. Comp. II. p. 46.

1. *E. syriacum* R. Br. K. syn. *Anastatica* — ca.
L. *A. hierochuntica* Schkr. *Myagrum rostratum* Scopol.
Bunias syriaca Gaertn. *Ornithohynchium* — cum. Röhl.
Bege, Aefferränder, im südl. Geb., Destr. bei Wien vor
St. Marcus, Croatien, Galizien u. Ungarn. 5. ☉

78. *Isatis* L. Waib. K. syn. 81. Rchb. p. 657.
Comp. II. p. 47.

1. *I. tinctoria* L. K. syn. Var. β . *campestris*: I.
campestris Steven. — γ . *praecox*: I. *praecox* W. et Kit.
DC. syst. Rchb. exc. — δ . *alpinum*: I. *Villarsii* Gaud.
Rchb. exc. I. *alpina* Vill. — ϵ . I. *bannatica* Link. Son-
nige, steinige Berge, Abhänge, Ufer, Weinberge, stellw. dch.
d. Geb., Südschweiz; Rheing. v. Basel bis Coblenz, Neuz-
wied, Bonn, Köln, Düsseldorf, Wesel, Mosel bei Wipplingen
stellw. bis Trier u. Luxemburg; Main bis Würzburg, Han-
nover, Thüringen, Sachsen, Baiern bis Regensburg; an d.
Donau bis Destr., Böhmen, Mähren, Tyrol, Steyermark,
Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien;
Var. γ . et ϵ . in Ungarn. 5—6. ☉

2. *I. alpina* Allion. ped. Rchb. exc. Im südlichsten
Geb., Piemont M. Vesulo. 5—6. ☉

79. *Myagrum* L. Hohl dotter. K. syn. 81. Rchb.
exc. p. 657. Comp. II. p. 48.

1. *M. perfoliatum* L. K. syn. *M. littorale* Scopol.
Acker, Ufer, Wege, besonders im südl. Geb., Rheing. bei
Basel, Heidelberg am Neckar, selten bei Mainz, Belgien bei
Spa; Schweiz im Cant. Wallis, Solothurn; Württemberg

bei Tübingen, Eßlingen, Stuttgart, Disingen; Destr. Moosbrunn bei Wien, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei zc. 5—6. ☉

80. *Neslia* Desv. *Neßlie*. K. synn. 81. Rchb. exc. p. 673. Comp. II. p. 48.

1. *N. paniculata* Desv. K. syn. *Myagrum* — tum. L. *Rapistrum* — Gaertn. *Vogelia* — ta. Hornem. V. *sagittata* Fl. Wetter. *Alyssum paniculatum* Willd. Bergäcker, Brachfelder, besonders auf Kalk u. Lehm, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. Basel bis Karlsruhe. Speyer, Frankfurt, Mainz, Coblenz, Bonn, Trier, Saarlouis, Luxemburg, Württemberg, Franken, Baiern, Sachsen; Danzig; Destr. zc. 5—6. ☉

81. *Calepina* Desv. *Kalepine*. K. syn. 82. Rchb. exc. p. 655. Comp. II. p. 49.

1. *C. Corvini* Desv. K. syn. *Laelia cochlearioides* Pers. *Crambe corvini* Allion. *Myagrum rugosum* Vill. *M. erucaefolium* Vill. *Cochlearia auriculata* Lamk. Felder, Brachäcker, Wegen im südl. u. mittleren Geb., Rheing. Flora v. Coblenz auf d. g. Mayensfelde v. Bassenheim bis Andernach, Neuwied, Sinzig u. stchw. bis Köln; Schweiz bei Branson; Destr. im Eittoral, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei, Genua, Piemont. 4—5. ☉

82. *Bunias* L. *Zackenschote*. K. syn. 82. Rchb. exc. p. 654. Comp. II. p. 49.

1. *B. Erucago* L. K. syn. *Erucago runcinata* Hornem. E. *glandulosa* Roehl. *Myagrum clavatum* Lamk. Var. β . *B. aspera* Retz. Saatäcker, Weinberge, im südl. Geb., Rheing., Elsaß im Castelwald; Destr. Eittoral, Istrien, Steyermark, Salzburg, Tyrol, Schweiz Cant. Waadt bei Lausanne, Vevay bei Cherbres, Cant. Wallis; in Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei u. Venedig. 6—7. ☉

2. *B. macroptera* Rchb. Rchb. exc. Wege am südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei. 5. ☉

3. *B. orientalis* L. K. syn. *Laelia* — Desv. Rchb. exc. p. 654. *Myagrum taraxacifolium* Lamk. Trockene Bergwiesen, Saune, stchw. im Geb. Rheing., Limburg bei Aachen; bei Lübeck, Warnemünde u. Rostock; Danzig; Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen. 5—6. 4

Fünfte Unterordnung.

Lomentaceen DC. Gliederschoten. DC. K. Taschb. 57. *Siliculosa* Lin.

83. *Cakile* Tourn. L. Meersenf. K. syn. 82. Rchb. exc. p. 654. Comp. II. p. 51.

1. *C. maritima* Scop. K. syn. *C. Serapionis* Gaertn. *Bunias Cakile* L. Var. β . *C. latifolia* Poir. *C. aegyptiaca* Willd. Dämmen d. Nord- u. Ostsee u. im südl. Littorale. 7—10. ☉

84. *Rapistrum* Boerh. DC. Rapßdotter. K. syn. 83. Rchb. exc. p. 655. Comp. II. p. 51.

1. *R. perenne* Allion. pedm. K. syn. *Myagrum* — L. M. *biarticulatum* Crntz. *Rapistr. diffusum* Crntz. Kalkhügel, Acker, Wege im g. südl. u. stchw. im mittleren Geb., Thüringen v. Halle bis Barby, Sachsen bei Dürrenberg, Jena, Weisensfeld; Baiern bei Würzburg u.; Oestr. Böhmen, Mähren, Littoral, Istrien, Dalmatien, Ungarn u. Lombardei. 6—7. 4

2. *R. rugosum* All. K. syn. *Myagrum* — L. *Cakile* — a. l'Herit. *Rap. hirsutum* Host. Var. β . *R. hirtum* Host. — γ . *R. glabrum* Host. Saatacker, Felder, stchw. im Geb., Südschweiz; Rheing. v. Basel bis Rastatt, Mannheim, Pfalz bei Hagenau, Speyer, Oggersheim, Nackenheim, Mainz u. Bingen; Thüringen, Jena, Salza, Wittenberg u. Steyermark, Tyrol, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig; Piemont u. Oberitalien. 6—7. ☉

85. *Crambe* L. Meerfohl. K. syn. 83. Rchb. exc. p. 655. Comp. II. p. 52.

1. *C. maritima* L. K. syn. Dämme d. Nord- u. Ostsee, Belgien, Holland, Holstein u. Mecklenburg. 4—5. 4

2. *C. pinnatifida* R. Brow. Rchb. exc. *C. orientalis* Jacq. Brachfelder in Ungarn um Ofen. 5—6. ☉

3. *C. Tataria* Jacq. K. syn. *C. Tataria* α. hungarica DC. *C. tatarica* Willd. *C. laciniata* Lamk. Var. β. *C. aspera* M. v. B. Rchb. exc. Felber, Weingärten, Wiesen; stchw. im Geb., Mähren um Hartau bei Ausig, Charlottenfeld bei Brunn, Galizien u. Ungarn. 4—5. 4

86. *Raphanus* L. Rettig. K. syn. 83. Rchb. exc. p. 656. Comp. II. p. 53.

1. *R. sativus* L. K. syn. Cultivirt in vielen Varietäten. 5—6. ☉

2. *R. Raphanistrum* L. K. syn. *R. sylvestris* Lamk. *Raphanistrum* *Lampsana* Gaertn. *R. innocuum* Fl. Wett. *R. segetum* Baumgart. Rchb. exc. *R. arvense* Wallr. Allioni. Gebirgsäcker, Brachfelder, Felber dch. d. g. Geb. 6—8. ☉

3. *R. Landra* Moretti. Pollini Fl. Veronens. III. t. 4. *Raphanistrum* — Rchb. exc. Acker, Gärten im südl. Geb., Dalmatien, Lombardien bei Mailand, Pavia u. Mantua, Genua u. Oberitalien. 5—6. ☉

4. *R. maritimum* Smith. *Raphanistrum* — Rchb. exc. An d. Nordsee bei Scheveningen in Holland. 5—6. ☉

Siebente Ordnung. Capparideen.

Juss. K. syn. 84. K. Taschb. 58 Rchb. exc. Papaverac. Capparid. p. 703. et icon. t. 19.

87. *Capparis* L. (XIII. 1.) Rappernstrauch. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 242.

1. *C. spinosa* L. K. syn. Var. β. *C. rupestris* Smith.

Felsen, Mauern, im südl. Geb. Eittoral, Istrien bei Duino, Rovigno, Dalmatien; Südschweiz auf d. Baromaischen Inseln, Comersee, Lombardei, Genua u. Piemont. 6—7. ‡

2. *C. ovata* Desfont. K. syn. *C. Fontanesii* DC. *C. spinosa* β. L. Felsen, Mauern im südl. Tyrol bei Bozen. 6—7. ‡

Achte Ordnung. Cistineen.

Dunal. K. syn. 84. Koch. Taschb. 58. Rchb. exc. p. 710. icon. Cent. XIII. t. 25—40. f. 4526—4568.

88. *Cistus* L. (XIII. 1.) Eistrose. K. syn. 85. Rchb. exc. p. 716. Comp. I. 2. p. 242.

1. *C. salvifolius* L. K. syn. Rchb. exc. Steinige Orte im südl. Eittoral, Istrien u. Inseln, Triest, Dalmatien; Südschweiz bei Chiavenna; Piemont, Nizza. 5—6. ‡

2. *C. corbariensis* Pourr. DC. Rchb. exc. *C. hybridus* Pourr. Im südlichsten Geb. Lombardei auf d. Euganeischen Hügeln; Piemont, Nizza. 5—6. ‡

3. *C. monspeliensis* L. K. syn. Rchb. exc. *C. oleaefolius* Mill. Im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien. 5—6. ‡

4. *C. Ledon* Lamk. Rchb. exc. Am südl. Eittoral, Istrien auf d. Insel Brioni. 5—6. ‡

5. *C. laurifolius* L. Rchb. exc. Im südl. Geb., Lombardei auf d. Euganeen, M. Venda u. in Piemont bei Bistagno. 5—6. ‡

6. *C. crispus* L. Rchb. exc. In Piemont, Gegenb v. Nizza. 5—6. ‡

7. *C. undulatus* Dunal. Rchb. icon. f. 4564. In Dalmatien bei Sebenico. 5—6. ‡

8. *C. albidus* L. Rchb. exc. *C. canescens* Sweet. Sonnige Hügel im südl. Geb., Tyrol am Garda-See über Torci, am Baldo, Vall d'Artillon, Lombardei, Venedig, Genua u. Nizza. 5—6. ‡

9. *C. incanus* L. Rchb. exc. Im südl. Eittoral,

Istrien auf d. Insel Brioni u. Insel St. Nicolo bei Parenzo; Piemont bei Nizza. 5—6. 3

10. *C. villosus* Lamk. Rchb. exc. Im südl. Littoral, Istrien bei Pola, auf Dsero, Dalmatien bei Spalato, Ragusa. 5—6. 3

11. *C. creticus* L. K. syn. Rchb. exc. *C. villosus* Wulf. Kalkhügel am südl. Littoral, Istrien, auf d. Inseln Dsero, Cherso u. Curzola u. in Dalmatien. 5—6. 3

89. *Helianthemum* Tournef. Gaertn. DC.

Sonnenröschen. (*Cistus* L.) K. syn. 85. Rchb. exc. p. 711. et icon. Comp. I. 2. p. 244.

1. *H. umbellatum* Mill. Comp. I. 2. p. 244. Trockene, sonnige Orte, Rheing. bei Gangelt an d. Grenze d. Regierungsbezirks Aachen, in Belgien bei Schenvelt. 5—6. 3

2. *H. guttatum* Mill. K. syn. Var. β . *Cistus serratus* Cavan. — γ . *C. plantagineus* Willd. *C. serratus* Desf. Sandige Hügel, stellw. im Geb., Hannover auf d. Insel Norderney, Wittenberg bei Teucherl, Moberlischberg, Lausig bei Krausnig, nach dem Wasserburger Forst; Dalmatien, Kombarbei u. Venedig. 6—8. ☉

3. *H. Vivianii* Pollini Rchb. exc. *Cist. acuminatus* Viv. Im südlichsten Geb., Piemont bei Genua auf d. Spitze d. Monte del Gazzo. 6. ☉

4. *H. Tuberaria* Mill. Rchb. exc. Sand- u. Thonhügel im südl. Geb., Dalmatien auf d. Insel St. Antiocha, Piemont bei Genua u. Nizza. 5—6. 4

5. *H. lunulatum* DC. Rchb. exc. *Cistus* — Allion. pedm. Gebirge im südlichsten Geb., Piemont bei Limone, Ormea u. Garrexia u. 5. 4

6. *H. Fumana* Mill. K. syn. Kalkhügel, Fesler stellw. mehr im südl. Geb., Rheing. bei Schweßingen, Pfalz v. Dürkheim bis Mainz bei Nombach, Kreuznach; Thüringen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Dalmatien, Croatien, Galizien u. Ungarn; Südschweiz Cant. Wallis u. Graubünden u. 6—7. 3

7. *H. ericoides* Dunal. Rchb. exc. Sandige Hügel, Ufer im südlichsten Geb., Piemont, Ligurien. 5. ‡

8. *H. italicum* Pers. Rchb. exc. Im südlichsten Geb., Piemont bei Guzzo, Col de Brause. 5. ‡

9. *H. oelandicum* Wahlb. Fl. suec. K. syn. *H. vineale* Rchb. exc. et icon. *H. oelandicum* α . *glabrum* Wahlenb. *H. oeland.* β . Gaud. helv. Var. β . *tomentosum*: *H. oelandicum* γ . *tomentosum*. K. syn. *H. canum* Dunal. Rchb. exc. et icon. *Cistus* — us Jacq. *C. vinealis* Willd. Pers. Rchb. exc. *C. marifolius* Smith. Roth. non DC. *C. anglicus* L. *C. oelandicus.* γ . *canescens* Wahlb. suec. Kalkgebirge u. Boralpen mehr im mittleren Geb., besonders in d. Zuge d. Thüringer u. Harzer Gebirgskette um Halle, Kölm, Schmon, Franken bei Mergentheim, Baiern, Sachsen, Schlesien; Destr. bei Wien u. Baden, Ungarn; Schweiz M. Salève bei Genf. 5—6. ‡

10. *H. alpestre* Rchb. exc. et icon. *H. oelandicum* β . *hirtum* K. syn. *Cistus alpestris* Scopoli, *C. Segueri* Crntz. Kalkalpen u. Boralpen Schweiz u. bch. d. g. Alpenzette nach Baiern, Destr. α . 5—8. ‡

11. *H. marifolium* DC. Rchb. exc. Im südl. Geb., Lombardei am Garda-See. 5. ‡

12. *H. ledifolium* Willd. Rchb. exc. *Cistus* — L. Im südlichsten Geb., Piemont um Nizza. 5. ☉

13. *H. salicifolium* Pers. K. syn. *Cistus* — ius. L. Var. β . *H. punctatum* Willd. *H. intermedium* et *denticulatum* Thib. ap. DC. Sonnige Abhänge im südl. Littoral, in Istrien v. Pola nach Veruda, Insel Lesina u. in Dalmatien; Schweiz Cant. Wallis, Branson, Martinach; Piemont, Nizza, Lombardei bei Verona, Oberitalien α . 4—5. ☉

14. *H. retrofractum* Person. Rchb. exc. *H. sanguineum* Lag. DC. prodr. *Cistus* — cus. Host. Austr. Bewachsene, sandige Orte am südl. Littoral, Istrien u. in Dalmatien. 5. ☉

15. *H. laevipes* Willd. Rchb. exc. Sandhügel im süblichſten Geb., Piemont bei Genua, Nizza. 4—5. ‡

16. *H. laeve* Pers. Rchb. exc. *Cistus* — vis. Cavan. Host. Im sübl. Eittoral, Inſel Liſſa in Dalmatien. 6. ‡

17. *H. viride* Tenore Rchb. exc. Hügel am sübl. Eittoral, Dalmatien Inſel Liſſa u. in Weſtligurien. 6—7. ‡

18. *H. thymifolium* Pers. Rchb. exc. Im sübl. Eittoral, Dalmatien Inſel Liſſa, Piemont bei Dneglia, Nizza u. in Ligurien. 5—6. ‡

19. *H. glutinosum* Pers. Rchb. exc. Im sübl. Eittoral, Dalmatien bei Trau u. Sebenico, Inſeln Liſſa, Liſſina u. Brazza. 5—6. ‡

20. *H. Savii* Bertolon. Fl. ital. V. 378. Maly enum. pl. austr. p. 286. *H. arabicum* Tenore. In Dalmatien auf d. Inſel Liſſina. 5 - 6. ‡

21. *H. vulgare* Gaertn. K. syn. *H. controversum* Schultz. Fl. d. Pfalz. *Cistus Helianthemum* L. Hel. *Chamaecistus* Mill. Var. α . *tomentosum*: *H. vulgare* DC. Gaud. — β . *hirsutum*: *H. obscurum* Pers. *H. vulgaris* β . *obscurum* Wahlenb. suec. *Cistus hirsutus* Lej. — γ . *glabrum*: *Cist. serpyllifolius* Crntz. All. *H. — lium* Mill. Rchb. exc. — δ . *grandiflorum*: *H. grandiflorum* DC. Rchb. exc. *Cistus* — Scopol. *C. tomentosus* Scopol. — ϵ . *leptopetalum*: *H. surrejanum* Mill. *Cistus* — L. Heiden, Triſten, Walbränder, Wegen d. Ebenen u. Gebirge bis in d. Alpen dch. d. g. Geb. Var. β . Schweiz Cant. Wallis bei Branson; γ . u. δ . Hochalpen Schweiz auf d. Gemmi, M. Moro im Saasthale u. u. in Piemont. 6—8. ‡

22. *H. apenninum* Pers. Rchb. exc. *Cistus* — us L. *H. vulgare* ϵ . *albiflorum* K. syn. Kalshügel mehr im sübl. Geb., Rheing. zw. Mainz u. Bingen an d. Ockelheimer Spitze; Südschweiz Cant. Tessin; Piemont Col de Brause u. Nizza. 5—6. ‡

23. *H. croceum* Pers. Rchb. exc. Im süblichſten Geb., Piemont bei Nizza. 5. ‡

24. *H. hirtum* Pers. Rchb. exc. Im südl. Geb. Dalmatien, Siebenbürgen, Piemont, Nizza. 5—6. 3

25. *H. pilosum* Pers. Rchb. exc. Gebirge im südlichsten Geb., Piemont bei Nizza, Ravenna. 5—6. 3

26. *H. polifolium* Koch. K. syn. *H. apenninum* Gaud. Var. α . *oblongifolium*: *H. pulverulentum* DC. Rchb. exc. et icon. *Cistus polifolius* L. *C. pulverulentus* Lej. — β . *angustifolium*: *H. pilosum* Pers. Rchb. exc. *Cistus pilosus* L. α . *C. quartus* Clus. *C. linearis* Lej. — γ . *roseum*: *H. mutabile* Pers. Rchb. exc. et icon. *Cistus* — *lis* Jacq. *H. roseum* DC. Rchb. exc. Sonnige Kalkgebirge mehr im südl. Geb. Rheing. zw. Mainz, Bingen u. Kreuznach auf d. Ockelheimer Spitze, Main nach Franken, Baiern bei Würzburg; an d. Maas bei Huy u. Namur in Belgien; Südschweiz bei Locarno, Lugano, M. Salvadore, Südtirol bei Bogen, Dalmatien, Lombardei, Benedig; Piemont, Nizza u. Dneglia u. 5—6. 3

Neunte Ordnung. Violarieen.

DC. K. syn. 88. K. Taschb. 61. Rch. exc. p. 704. Icon. Cent. XIII. t. 1—23. f. 4489—4519.

90. *Viola* L. (V. 1.) Veilchen. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 405.

Erste Rotte. *Nomimium* DC. prod. K. 294.

1. *V. pinnata* L. K. syn. Triften d. Alpen u. Voralpen in d. südl. Kette, Schweiz in d. Penninischen Alpen, Cant. Wallis Saas u. Nicolaithale über Zermatten, Cant. Graubünden; Tyrol Seiser u. Lienzer Alpen, Kärnthen bei Heiligenblut, Krain M. Manas, Eittoral, Lombardei u. 6—7. 4

2. *V. palustris* L. K. syn. Torfboden, moorige, moosige Wiesen, sumpfige Waldstellen der Ebenen u. Gebirge bis in d. Voralpen stellw. dch. d. g. Geb. 4—5. 4

3. *V. epipsila* Ledebour. K. syn. *V. palustris* β .

Fries. Sumpfwiesen, sumpfige Waldstellen, Holstein bei Trittau, dann stellw. mehr im südl. Geb., Salzburg, Krain bei Laibach. 5—6. 4

4. *V. uliginosa* Schrader. K. syn. *V. nitens* Host. *V. scaturiginosa* Wallr. *V. hybrida* Wulf. Moorige, sumpfige Orte, stellw. im Geb. Thüringen bei Bockwitz u. Weihe, Sachsen bei Leipzig, Lausitz bei Miezky, Schlesien bei Oppeln; Krain im Laibacher Moose, Dalmatien, Croatien u. Galizien. 3—4. 4

5. *V. hirta* L. K. syn. Grasige Orte, Heiden, Raine, an Hecken 2c. stellw. bch. d. g. Geb. 4—5. 4

6. *V. collina* Besser K. syn. *V. umbrosa* Hoppe non Rchb. et Fries. Walbhügel, schattige Raine, stellw. im Geb. Schweiz bei Basel; Baiern bei Regensburg zw. d. Weichselmühle u. Irbing, bei Mading; Ostseeprovinzen bei Doblen; Destr. bei Einz, Kärnthen, Tyrol, Steyermark, Krain u. wahrscheinlich längs dem g. Fuße d. Alpenkette. 4—5. 4

7. *V. odorata-hirta* Rchb. icon. f. 4497. b. *V. hirta* γ. *uncinata* Rossmässler, *V. hirta* β. *stolonifera* Tausch. Schattige Wiesen in Hecken; Sachsen bei Weyda; Böhmen, am südl. Littoral, Istrien, Triest; Schweiz bei Ber u. im Cant. Wallis; Oberitalien. 5—6. 4

8. *V. sciaphila* Koch K. syn. *V. umbrosa* Sauter. Schattige Bergstellen bis in d. Boralpen; Schweiz; Tyrol, Kärnthen u. Salzburg. 4—5. 4

9. *V. ambigua* W. et Kit. K. syn. *V. campestris* M. v. B. Rchb. exc. Walbwiesen, Triften; in d. südl. Geb. Schweiz Cant. Wallis; Destr. Ungarn u. Siebenbürgen. 4—5. 4

10. *V. odorata* L. K. syn. Var. β. *albiflora*. Waldränder, Heine, Raine, Grasgärten. Hecken bch. d. g. Geb. 3—4. 4

11. *V. alba* Besser K. syn. *V. odorata* β. *alba* Rchb. icon. Kalkgebirgs-Wälder; Jurakalk in d. angrenzenden Lotharingen u. an d. Obermosel bei Nanci; Destr. Krain, Littoral, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. Lombardei. 4. 4

12. *V. suavis* M. v. Bieb. K. syn. Grasige Gebirgsstellen, Ufer an Hecken, stellw. im Geb.; Rheing. bei Kreuz-

nach am Rheingrafenstein, Westphalen bei Bielefeld; Ober-
ufer bei Frankfurt; Südtrol. 3—4. 2

13. *V. arenaria* DC. K. syn. *V. Allionii* Pio. Rchb.
exc. *V. glauca* M. v. B. *V. nummulariaefolia* Host. *V.*
rupestris Schmidt. Rchb. exc. *V. hirta* var. *aprica* Spreng.
V. Krockeri R. et Sch. Var. β . *V. livida* Kit. Rchb. icon.
Sandige Heiden, Triften, Nadelwäldungen bis in d. Boral-
pen stellw. dch. d. Geb., Rheing. bei Schwefingen, Manns-
heim, Maxdorf, Dürkheim, Mainz, Bingen, Bonn, West-
phalen, Hannover, Preußen bei Königsberg, Sachsen, Baiern u.;
Schweiz bei Bern, Cant. Wallis, Graubünden; Oestr. Böh-
men, Mähren bis in d. Lombardei. 4—5. 2

14. *V. canina* L. K. syn. *V. pumila* β . *ericetorum*
DC. *V. flavicornis* Smith. *V. canina lucorum* Rchb. icon.
V. ericetorum Schrad. — *V. canina* β . *Ruppü* D. Fl. —
V. canina γ . Bertolon. Fl. ital. — *V. canina* γ . *montana*
Fries. Rchb. Trockene, grasige Orte, Heide, Gebüsch, Raine,
Wegen dch. d. g. Geb. 5—6. 2

15. *V. sylvestris* Lamk. K. syn. Rchb. icon. *V.*
canina β . *sylvestris* Fries. Laub- und Heidewälder, Gebü-
sch, Hecken dch. d. g. Geb. 4—5. 2

16. *V. Riviniana* Rchb. exc. et icon. *V. sylvestris*
 β . *Riviniana* K. syn. *V. sylvestris* β . *grandiflora*. Fl. v.
Trier. Laubwälder, Gebüsch dch. d. g. Geb. 4—5. 2

17. *V. Schultzii* Billot. K. syn. *V. Ruppü* Rchb.
exc. Schattige Bergwälder auf Moormiesen, stellw. im Geb.,
Rheing., Elsaß bei Hagenau, Pfalz bei Mutterstadt; Ober-
lausitz; Salzburg, Südtrol, Krain auf d. Laibacher Mo-
rase, Ungarn u. Piemont. 4—6. 2

18. *V. stagnina* Kitaib. K. syn. *V. lactea* Smith
Rchb. exc. *V. Billotii* Schultz. *V. persicifolia* Schweig.
et Koerte, *V. lancifolia* Thore. *V. pumila* Mutel. *V. pra-*
tensis Mutel. Feuchte, schattige Wiesen an Bachufern, stellw.
dch. d. g. mittlere u. nördl. Geb., Rheing., Bodenseegegend,
in Sümpfen bei Harbt, Elsaß bei Straßburg, Benselden,
Worms, Bischweiler, Rußbach u. Ruppertsberg, Haslocher

Wald, Marborsf bis Mainz, Mannheim, Labenburg; Schlesien; Destr. 2c. 5—6. 4

19. *V. Billotiana* F. Schltz. Fl. d. Pfalz. K. syn. *V. stricta* Hornem. *V. nemoralis* Kützing. *V. Ruppil* Koch. syn. edit. I. Wiesen in Gebirgswäldern, Hainen, stellw. dch. d. Geb. Rheing., Elsaß, bei Benselsden, Pfalz bei Ellerstadt, Marborsf; Sachsen, Magdeburg im Biederizer Wäldchen, Schlesien, Pommern bei Stettin; Destr. Tyrol im Etschland, Galizien u. Ungarn. 5—6. 4

20. *V. pratensis* M. et K. K. syn. *V. lactea* Koch. et Z. Fries. *V. persicifolia* Roth. *V. Ruppil* Presl. *V. pumila* Chaix. Schultz Fl. d. Pfalz. Rasse Wiesen, stellw. Rheing., Pfalz bei Speyer, Otterbach, Ruppertsberg, Marborsf bis Mainz, Mannheim, Darmstadt; Thüringen, Baiern, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren, Ungarn u. Siebenbürgen. 5—6. 4

21. *V. elatior* Fries K. syn. *V. persicifolia* Schkr. M. et K. Rechb. exc. *V. montana* Roth. Feuchte Wiesen, Waldstellen d. Ebenen u. Gebirge; stellw. dch. d. Geb., Rheing. bei Schwegingen, Mannheim, Speyer, Otterbach bis Oppenheim, Farst, Darmstadt, Frankfurt am Main, Hessen, Thüringen, Jena, Sachsen, Schlesien nach Preußen, Westphalen, Baiern; Schweiz im Jura; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Krain, Galizien, Ungarn u. Lombardei. 5—6. 4

22. *V. mirabilis* L. K. syn. Gebirgswälder besonders auf Torfboden, stellw. dch. d. Geb., Rheing. Oberbaden bei Stockach, Denningen u. Engen; Basel nach Baden bei Detsingen, Elsaß, im Neckar- u. Mainthale, im Griesheimer Walde bei Darmstadt, Hillesheim in d. Eifel, Flora v. Trier, Obermosel bei Perl; scheint in Pfalz, in Hessen, am g. Niederrheine u. in Westphalen zu fehlen; Thüringen bei Jena, Preußen bei Marienwerder mit d. vorigen; Destr. fast in allen Provinzen bis in d. Lombardei. 4—5. 4

Dritte Rotte. *Dischidium* DC. prodr. K. syn.

23. *V. biflora* L. K. syn. Schattige Orte d. Alpen u.

Borralpen bis in d. fortsetzenden Gebirge u. damit zusammenhängenden Niederungen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Rom Jura bis in d. Vogesen nach Württemberg bei Wangen, Argon u. Egloß; Schlesien, Böhmen, Mähren bis in d. Combarbei. 5—8. 4

Dritte Rotte. *Melanium* DC. prod. K. syn.

24. *V. tricolor* L. K. syn. *V. bicolor* Hoffm. *V. Kitaibeliana* R. et Schl. Var. α . *V. arvensis* Murray. — γ . *lutea*: *V. saxatilis* Schmidt. — δ . *V. banatica* Kitaib. — ϵ . *V. maritima* Spr. *V. syrtica* Floerke. Felder, Brachfelder, Aecker u. Gartenland im g. Geb. bis in d. Gebirgen u. Alpen, Var. γ . Alpen u. Borralpen Böhmen, Schweiz; δ . in Ungarn u. ϵ . am Seeferande. 4—10. ☉

25. *V. rothomagensis* Desf. K. syn. *Cultivirtes* Land, Wiesen stchw. im Geb., Rheing. Flora v. Trier bei Diekirch, Luxemburg in d. Ardennen; Limburg bei Aachen in d. Flora v. Spa; Tyrol im Oberinntale. 4—9. ☉

26. *V. lutea* Smith. Huds. K. syn. Rehb. icon. Var. α . *V. grandiflora* Villars. *V. lutea* Rehb. icon. — β . *V. sudetica* Willd. — γ . *multicaulis*. — ϵ . *tricolor* Kaltenbach. Fl. v. Aachen. Alpen, Borralpen u. Gebirgsgegenden; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, Rheing. in d. Vogesen; sehr häufig in allen Formen auf d. Galmeyboden bei Aachen u. d. Flora v. Spa; Schlesien, Baiern; Böhmen, Mähren, Steyermarf, Tyrol u. Galizien zc. 5—9. 4

27. *V. heterophylla* Bertolon. K. syn. Var. α . *V. Bertolonii* Pio. *V. gracilis* Bivona. *V. valderia* Rehb. exc. non Allioni. — β . *V. gracilis* Sibth. Sm. Rehb. exc. *V. declinata* W. et Kit. Gaud. helv. Rehb. icon. Felsen d. Kalkalpen; Tyrol auf Tremali im Ledrothale, Tombea Valle di Vestino u. Turano; Dalmatien, Galizien, Ungarn, Combarbei am Comersee, Corno di Conzo u. Piemont. 7—8. 4

28. *V. calcarata* L. K. syn. Var. β . *flava*: *V. Zoysii* Wulf. Triften d. Hochalpen; Baiersche Alpen auf d.

Einkersköpf; Schweiz auf d. Jura, Gemmi, Grimsel, Cant. Wallis, Graubünden; Destr. Tyrol an d. Wormserjoch; Siebenbürgen, Lombardei, Piemont, Var. β . an d. Matscher-Alpen in Krain. 7—8. 4

29. *V. cenisia* L. K. syn. Var. β . *V. valderia* All. ped. Steinige, etwas feuchte Orte, an Gletscherränder d. Hochalpen, Schweiz Cant. Waadt, Graubünden, Wallis im Saasthale am M. Moro, Nicolaithal am Fouli, Enzeindaz, Bagnes-Thal, M. Gemmio; Südtirol bei Trient; Siebenbürgen, Lombardei u. Piemont M. Genis. 7—8. 4

30. *V. nummulariaefolia* All. ped. Rchb. exc. et icon. Südliche Seealpen in d. Lombardei, Col della Fenestre, Piemont di Valbieri, Novarese Col de Tenda. 6—7. 4

31. *V. cornuta* L. Rchb. exc. et icon. Im südlichsten Geb., Lombardei, Gebirge d. Comersees. 7—8. 4

32. *V. Comollia* Massara K. syn. Alpen in d. südlichsten Schweiz im Weltlin. 7—8. 4

33. *V. alpina* Jacq. K. syn. Hochalpen; Destr. Schneeberg bei Wien, Steyermark an d. Hohenschwab, Weitscher-Alpen, Ungarn, Siebenbürgen u. Galizien. 7—8. 4

Zehnte Ordnung. Resedaceen.

DC. K. syn. 96. K. Taschb. 66. Tetradynamae pars Rchb. exc. p. 695 et icon. t. 99—102. f. 4441—4449.

91. *Reseda* L. (XI. 3.) Rau, Reseda. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. 158.

1. *R. Phyteuma* L. K. syn. Brachäcker, Weinberge, Wege im südl. Geb., Südschweiz Rhoneufer bei Genf; Destr. Krain, Littoral, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei u. Venedig. 6—7. 4

2. *R. inodora* Rchb. icon. f. 4445. b. *R. mediterranea* Jacq. Host. Weinberge, Felber, Wege, Hügel; Ungarn im Banat. 5—8. ☉

3. *R. lutea* L. K. syn. *R. ochracea* Moench. Felsen,

Raine, Schutt, Felber stellw. dch. d. g. Geb., Schweiz; Rheing. dch. d. Thäler d. Rheines, d. Neckars, d. Mains, d. Mosel u. bis Westphalen; Ostsee bis Preußen, Braunschweig, Thüringen, Fena, Schwaben, Baiern; Destr. bis in d. Lombardei. 7—8. ☉

4. *R. gracilis* Tenore. Rechb. icon. f. 4446. Hohe Gebirgsstellen; Destr. Hohe Wand am Schneeberg; Dalmatien. 6—7. 4

5. *R. undata* L. Rechb. exc. et icon. *R. decursiva* Forsk. Gebüsche am südl. Eittoral, Dalmatien bis Spalatro, Destr. Eittoral, in Istrien. 6—7. 4

6. *R. alba* L. Rechb. exc. Sandstellen, Schutt im südl. Geb., Südtirol, Lombardei bei Venedig um St. Marta, Piemont, Nizza. 6—10. 4

7. *R. fruticulosa* L. Rechb. exc. et icon. Mauern, Schutt im südl. Geb. in Dalmatien. 4—5. 3

8. *R. luteola* L. K. syn. Raine, Ufer, Schutt, Wege, Aecker dch. d. g. Geb. 6—9. ☉

92. *Astrocarpus* Necker. (XI. 3.) Sternwau. Rechb. exc. p. 696. Comp. I. 2. p. 160.

1. *A. sesamoides* DC. Rechb. exc. et icon. Reseda — L. Sonnige Orte im südlichsten Geb., Piemont. 4—5. ☉

Elfte Ordnung. Droseraceen.

DC. K. syn. 97. K. Taschb. 67. Cistineae pars Rechb. exc. p. 710. et icon. t. 24. f. 4521—4524.

93. *Aldrovanda* Monti (V. 5.) *Aldrovanda*. Rechb. exc. p. 711. Comp. I. 1. p. 539.

1. *A. vesiculosa* L. Rechb. exc. Stehende Wasser im südlichsten Geb., Oberschlesien im Pleßner Kreise bei Gzorzow; Galizien, Lombardei, Venedig, Piemont, Bologna, Lago di Candia. 7—8. 4

94. *Drosera* L. (V. 5.) Sonnentau. K. syn. Rechb. exc. p. 711. Comp. I. 1. p. 538.

1. *D. rotundifolia* L. K. syn. Sümpfe u. Torf=

moore unter Sphagnum stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, besonders häufig auf d. Vogesensandstein dch. d. g. Rheing. bis Aachen, Trier, Coblenz, Eöln, Düsseldorf zc. 7—8. 24

2. *D. obovata* M. et K. K. syn. edit. I. *D. longifolia* β . *obovata* K. syn. edit. II. Torfmoore, stellw. dch. d. Geb.; Rheing. Vogesen, Flora v. Trier bei Saarbrücken, Neuhäusel, Limbach; Baiersche Alpen am Vorderjoch bei Hindelang, Deininger Moos bei München, Throl am Schwarzensee bei Rißbühl zc. 7—8. 24

3. *D. longifolia* L. K. syn. *D. anglica* Huds. Auf ausgedehnten Torfmooren, an Fischweihern in den Ebenen fast dch. d. g. Geb., Rheing. in d. g. Vogesensandstein v. Kaiserslautern bis Saarbrücken, Trier dch. d. Eifel bis Aachen, am Niederrheine, Mühlheim, Passrath bei Eöln, Siegburg bei Bonn, Düsseldorf, Westphalen nach dem Norden, Hamburg, Danzig zc. 7—8. 24

4. *D. intermedia* Hayne K. syn. *D. longifolia* Smith. Tiefe Torfsümpfe u. Weiher, zerstr. dch. d. Geb., seltener als vorige; Rheing. besonders auf d. Vogesen-Sandstein v. Trippstadt bis Saarbrücken, Kaiserslautern, Eöln, Aachen, Düsseldorf, Westphalen nach Hamburg, Holstein, Preußen, Schlesien, Baiern; Destr. Mähren, Kärnthen, Tyrol u. Lombardei. 7—8. 24

95. *Parnassia* L. (V. 4.) Parnassie. K. syn. 98.

Rchb. exc. p. 710. Comp. I. 1. p. 537.

1. *P. palustris* L. K. syn. Feuchte bemooste Wiesen, Waldsümpfe d. Ebenen, Gebirge bis in d. Alpen, stellw. dch. d. g. Geb. 7—9. 24

Zwölfte Ordnung. Polygaleen.

Juss. K. syn. 98. K. Taschb. 67. Rchb. exc. p. 350.

96. *Polygala* L. (XVII. 5.) Kreuzblume. K. syn.

Rchb. exc. Comp. II. p. 134.

Erste Rotte. Polygalon. DC. K. syn.

1. *P. major* Jacq. K. syn. *P. rosea* Desf. Gräßige Hügel, Wiesen im südl. Geb.; Destr. bei Wien, Mähren, Steyermark, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Apenninen. 5—6. 4

2. *P. hospita* Heuffel. ined. Maly. enum. pl. austr. p. 316. Bergstellen an d. Donau im Banat. 4

3. *P. nicaeensis* Risso K. syn. *P. amblyptera* β . pubescens Rchb. *P. buxifolia* β . Rchb. Bewachsene Hügel, Brachäcker im südl. Geb. Tyrol, Krain, Vittoral Istrien bei Triest, Dalmatien u. Venedig. 5—6. 4

4. *P. flavescens* DC. Rchb. exc. In d. Apenninen bei Florenz. 5—6. 4

5. *P. vulgaris* L. K. syn. Var. β . *P. oxyptera* Rchb. exc. *P. multicaulis* Tausch. — γ . *alpestris*, *P. vulgaris* β . densiflora Tausch. Gräßige Hügel, Wiesen d. Ebenen u. Gebirge im g. Geb. bis in d. Boralpen u. Alpen bis in d. südl. Kette; Var. γ . auf d. Sudeten u. Tyroler-Alpen. 5—7. 4

6. *P. pixophylla* Ave Lallm. Rchb. exc. Bocheiner-Alpen in Krain. 8—9. 4

7. *P. comosa* Schkr. K. syn. Gräßige Gebirgsstellen, trockene Wiesen mit *P. vulgaris* stchw. dch. d. g. Geb. doch seltener; Rheing. an vielen Orten. 5—7. 4

8. *P. monspeliaca* L. Rchb. exc. Trockene Triften im südl. Geb., Dalmatien, Lombardien u. Venedig. 4—5. ☉

9. *P. depressa* Wenderoth K. syn. *P. serpyllacea* Weihe Rchb. exc. *P. vulgaris depressa* Fries. Torfwiesen, Heiden u. Wälder stchw. dch. d. Geb., Rheing. stchw. bis in d. Niederlande, Westphalen, Holstein, Hamburg, Würtemberg, Sachsen, Oberbaiern, Tyrol, Krain. 5—7. 4.

10. *P. calcarea* F. W. Schultz. K. syn. *P. amara* Rchb. fl. exsicc. Trockene Wiesen u. Laubwälder d. Muschelkalks d. Rheinpfalz v. Stambach bis in d. Gegend v. Zweibrücken, Saarbrücken, Eifel bei Gerolstein, Flora v. Trier; Destr. bei Ling. 4—6. 4

11. *P. exilis* DC. prodr. Rchb. icon. Maly enumerat. pl. austr. p. 316. Am südl. Littoralè in d. Lombardien, bei Venedig. 5. ☉

12. *P. amara* L. K. syn. Var. α genuina: *P. amara* Jacq. Rchb. exc. *P. amarella* Crntz. Rchb. exc. — β . amblyptera: *P. amblyptera* α Rchb. exc. *P. buxifolia* Rchb. exc. *P. thuringiaca* Spreng. — γ . alpestris: *P. alpestris* Rchb. exc. *P. microcarpa* Gaud. — δ . austriaca: *P. austriaca* Rchb. exc. *P. myrtifolia* Fries non L. *P. uliginosa* Rchb. exc. Etwas feuchte, torfhaltige Wiesen, Heiden d. Ebenen u. Gebirge bis in d. Alpen stellw. dch. d. g. Geb. Var. β . in d. Rheinpfalz Frankenthal, Zweibrücken, Saarbrücken, Kreuznach; Thüringen Jena, Sachsen, Baiern; Destr. u. Var. γ . auf d. Alpen. 6—8. 4

Zweite Rotte. *Chamaebuxus* DC. K. syn.

13. *P. chamaebuxus* L. K. syn. Heiden, Wälder d. Alpen, Boralpen u. Gebirge, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette; Rheing. in d. Vogesen nach Oberelsaß; Oberbaden bei Detsingen, Württemberg, Baiern bis Regensburg u. vereinzelt bis Nürnberg, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Kärnten, Tyrol, Ungarn bis in d. Lombardien. 4—7. 5

Dreizehnte Ordnung. Sileneen.

DC. K. syn. 101. K. Taschb. 69. Caryophylleae pars Rchb. exc. p. 800. Rchb. icon. Cent. XVII. t. 280—308. f. 4988—5133.

97. *Gypsophila* L. (X. 3.) Gypsäkraut. K. syn. Rchb. exc. 801. Comp. I. 2. p. 77.

1. *G. petraea* Rchb. exc. Banffy — Baumg. Fl. trans. Hochalpen in Siebenbürgen. 7—8. 4

2. *G. repens* L. K. syn. *G. prostrata* All. pedm. *Saponaria diffusa* Lamk. Riesige Orte d. Kalkalpen u. Boralpen, Schweiz im Jura u. dch. d. g. Alpenkette mit d. Kiese d. Alpenbäche in d. Niederungen; Rheing. in Ober-

baden bei Mersburg, Ueberlingen, Romanshorn, Füssen; Baiern in d. Alpen, u. vereinzelt im Harz bei Walkenried; Destr. Steyermark, Kärnthén, Salzburg, Krain, Vitoral, Galizien, Ungarn, Lombardien u. Venedig. 7—8. 4

3. *G. prostrata* L. Rchb. exc. Felsen d. Hochalpen, Schweiz M. Simplon an d. ital. Seite. 7—8. 4

4. *G. fastigiata* L. K. syn. *G. arenaria* W. et Kit. Kalt u. Sandsteingebirge, Sandfelder, stchw. bch. d. Geb., Rheing. Oberbaden bei Madingen, Mainz bei Niederingelheim; Sachsen bei Jena, Thüringen bis Berlin, Hannover, Harz, Lausitz, Preußen bei Tilsit, Posen, Gumbinnen, Weichsel u., Schlesien; Böhmen, Mähren, Schweiz Cant. Graubünden; Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. Piemont. 7—8. 4

5. *G. illyrica* Smith. Rchb. exc. Saponaria — L. Fiedleria — Rchb. icon. Tunica — Fisch. et Meyer. Steinige Orte in Dalmatien, Illyrien. 7. 4

6. *G. dichotoma* Besser. Comp. I. 2. p. 79. An Felsen in Galizien bei Jaslo. 7—9. 4

7. *G. altissima* L. Rchb. exc. Kaltfelsen, Sandfelder in Galizien. 7—8. 4

8. *G. paniculata* L. K. syn. *G. effusa* Tausch. Rchb. exc. Sandhügel, Felder, Wege im südl. Geb., Destr. bei Wien an d. Türkenschanze, Geiziger See in Mähren, Vitoral Istrien bei Triest u. Ungarn. 7—8. 4

9. *G. acutifolia* Fischer. K. syn. Sandfelder v. Unterösterreich nach Ungarn. 7—8. 4

10. *G. muralis* L. K. syn. Var. β . *G. serotina* Hayne. Waldstellen, Triften, Felder, Wege, Mauern bch. d. g. Geb. 7—8. ☉

98. *Velezia* L. (X. 3.) *Belezia*. Rchb. exc. p. 803. Comp. I. 2. p. 77.

1. *V. rigida* L. Rchb. exc. In Dalmatien um Stretto. 6—7. ☉

99. *Tunica* Scopoli Koch. (X. 3.) *Felsnelke*. K. syn. 102. Comp. I. p. 80.

1. *T. Saxifraga* Scop. K. syn. *Gypsopila* — L. *G. rigida* Rchb. exc. p. 802. Steinige Hügel, Riesfelder, Wege, besonders im südl. Geb., Oberschwaben, Baiern bis Regensburg, vereinzelt bis Thüringen, Jena bei Mörsdorf u. Walbeck, Hannover bei Göttingen; Südschweiz im Veltlin; Oestr. an d. Donau bis Wien, Südtirol, Eittoral, Istrien, Ungarn u. 6—7. 4

100. *Dianthus* L. (X. 3.) Nelke. K. syn. 102. Rchb. exc. p. 803. Comp. I. 2. p. 81.

Erste Rotte. *Armeriastrum* DC. prodr. K. syn.

1. *D. prolifer* L. K. syn. Rchb. exc. *Kohlrauchia* — *Ficin* Rchb. icon. *Caryophyllus aridus* Moench. Var. β . *D. diminutus* L. Rchb. exc. Felsen, Hügel, sandige Raine, Felder dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *D. obcordatus* Reuter. *Kohlrauchia* — *ta.* Rchb. icon. f. 5009. In Dalmatien. 6—8. ☉

3. *D. velutinus* Gussone. K. syn. Sonnige Hügel am südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien u. Ungarn. 7—8. ☉

4. *D. Armeria* L. K. syn. *D. hirtus* Lamk. Walbwiesen, Waldränder, schattige Raine, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉ u. ☉

5. *D. barbatus* L. K. syn. *Tunica* — *ta.* Scopol. Alpentriften u. Bergwiesen im südl. Geb., Schweiz im Veltlin; Steyermark, M. Glockner in Kärnten, Klagenfurt in Tyrol, Krain, Dalmatien, Ungarn, Galizien u. Kombardei. Auch in d. Flora v. Coblenz u. Eöln angegeben, ob verwildert? 7—8. 4

6. *D. compactus* W. et Kit. Rchb. exc. Var. β . *D. lancifolius* Tausch. Rchb. exc. Alpen in Ungarn u. Siebenbürgen. 7—8. 4

7. *D. Carthusianorum* L. K. syn. Var. β . *D. vaginatus* Rchb. exc. Felsige Orte, Weinberge, Abhänge, grasige Raine bis in d. Alpen, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

8. *D. atrorubens* All. pedm. Gaud. K. syn. *D. vaginatus* Villars. Eriften d. Alpen u. Gebirge, felsige Abhänge, Thüringen, Jena am Kunißberg, besonders in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis, Gemmi etc., Uri, am Gotthard; Südtirol, Vittoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Croatien Ungarn u. Lombard. 6—7. 4

9. *D. capitatus* DC. prodr. I. 356. *D. atrorubens* M. v. Bieb. Rehb. icon. Maly. enum. pl. austr. p. 302 — 395. In Siebenbürgen. 6—7. 4

10. *D. sanguineus* Viviani. Rehb. icon. Maly. enum. pl. austr. p. 302 — 395. Wälder am südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien. 6—7. 4

11. *D. glaucophyllus* Hornemann. Maly. enum. pl. austr. p. 302 — 395. *D. collinus* Balb. *D. Balbisii* DC. prodr. *D. liburnicus* β ? K. syn. Gräßige Bergstellen, Ungarn im Banat. 7. 4

12. *D. diutinus* Kitaib. Rehb. exc. Var. β . *D. polymorphus* M. v. B. Rehb. icon. Sandige Orte im südl. Geb., Tyrol, Croatien, Ungarn, Banat. 6—7. 4

13. *D. liburnicus* Bartl. K. syn. Felsen am südl. Vittoral, Istrien Wald v. Vipizza, Fiume, Krain, Croatien u. Lombard. 7. 4

14. *D. Seguierei* Villars K. syn. *D. asper* Willd. *D. collinus* Gaud. *D. Carthusianorum* Allion. Var. α . *asper*: *D. Seguierei* Wulf. *D. asper*. et *Courtoisii* Rehb. exc. *D. scaber* Schleich. — β . *D. sylvaticus* Hoppe. *D. Seguierei* Rehb. icon. — γ . *D. collinus* W. et Kit. — δ . *D. controversus* Gaud. *D. Sternbergii* Schleicher. Gräßige, buschige Hügel, Felsen, besonders im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Tessin; Rheing., Oberbaden bei Kloster Beuren, Möhringen, Immeldingen; Billingen, Mundelfingen, Stuhlingen, Oberelsaß bei Sigolsheim; Baiern bei München, Regensburg, Sachsen; Böhmen, Mähren, Tyrol, Steyermark, Galizien, Ungarn u. Lombard. 6—8. 4

15. *D. lineatus* Bartl. Rehb. exc. *D. biflorus* Sibth. Felsen in Croatien bei Ruminjaf. 7. 4

16. *D. trifasciculatus* Kitaib. Rechb. exc. Wälder, Ungarn, im Banat an d. Herkulesbädern. 7—8. 4

17. *D. corymbosus* Sibth. Rechb. icon. f. 5025. An Felsen in Kärnthen. 7—8. 4

3weite Rotte. *Caryophyllus* Ser. DC.
prodr. K. syn.

18. *D. neglectus* Loisl. K. syn. *D. glacialis* DC. Gaud. *D. alpinus* DC. *D. tener*. Balb. Hochalpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Graubündten am Umbrail u. v. da nach d. Glarener Alpen; Lombardei, Piemont, N. Genis u. in d. Novarese. 7. 4

19. *D. alpinus* L. K. syn. Alpen u. Boralpen besonders auf Kalk; Destr. Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen. 6—8. 4

20. *D. glacialis* Haenke. K. syn. *D. alpinus* Sturm. Hochalpen d. Urgebirges an d. Schneegrenze, Schweiz Cant. Graubündten, Cant. Glarus; Tyrol, Salzburg N. Goldberg im Rauris, Kärnthen am Heiligenbluter u. Malniger Tauern, Steyermark, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

21. *D. nitidus* W. et Kit. Rechb. exc. Kalkalpen in Ungarn u. Siebenbürgen. 8—9. 4

22. *D. deldoides* L. K. syn. Rechb. exc. *D. supinus* Lamk. Var. β . *D. glaucus* L. Rechb. exc. *D. albus* Schkr. Waldränder, Waldtriften, Sandfelder stellw. dch. d. g. Geb., südl. d. Alpen seltener; Schweiz nur im Engadin; Rheing. v. Karlsruhe bis Mannheim, Pfalz Dürkheim bis Saarbrücken, Trier, Eifel, Coblenz, Eöln, Aachen 2c. nach Norden u. Süden. 6—8. 4

23. *D. bebius* Visiani Rechb. icon. f. 5041. In Dalmatien N. Bebiš. 6—7. 4

24. *D. integer* Visiani bot. Zeitg. 1829. Rechb. exc. Felsen in Dalmatien, N. Biočovo. 7. 4

25. *D. ciliatus* Gussone. K. syn. Tenore. *D. littoralis* Host. *D. racemosus* Visiani. Felsen am südl. Littoral, Istrien, Torre d'Arlando bei Pola, Beglia; Dalmatien. 6—7. 4

26. *D. sylvestris* Wulf. K. syn. *D. Caryophyllus* ϵ . *inodorus* L. Var. α . *D. virgineus* Jacq. *D. Scheuchzeri* et *D. Caryophylloides* Rchb. exc. — β . *D. sylvestris* Wulf. Jacq. Sturm. Rchb. exc. — γ . *subacaulis*: *D. subacaulis* Villars Rchb. exc.? *D. frigidus* Koch. — δ . *D. tergestinum* Rchb. icon. Felsige, trockene Orte bis in b. Alpen im südl. Geb., Südschweiz; Destr. Steyermark, Kärnten, Südtirol, Krain, Littoral Istrien, Dalmatien, Croatien, Galizien, Lombardien, Venedig. 7—8. 4

27. *Caryophyllus* L. K. syn. Rchb. exc. *D. coronarius* Lamk. Felsen, Mauern im südl. Littoral, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardien, Genua u. Inseln, Oberitalien u. im g. Geb. als Stierpflanze gezogen u. stellw. besonders im südl. Geb. verwildert. 7—8. 4

28. *D. callizonus* Schott et Kotschy. Bot. Zeit. 1851. p. 192. Südl. Kalkalpen 6000 bis 7000', in Siebenbürgen auf d. *Piatra Craiului*. 8. 4

29. *D. longicaulis* Tenore. Rchb. exc. *D. nodosus* Tausch. In Dalmatien. 7. 4

30. *D. furcatus* Balbis Rchb. exc. Hügel in Piemont bei *Tenda*. 6—7. 4

31. *D. caesius* Smith. K. syn. *D. glaucus* Huds. *D. virgineus* β . L. *D. flaccidus* Fieber. Bewachsene Felsen stellw. bis in d. Boralpen; Schweiz im g. Jura; Rheing. Bodenseegegend bei Hohenems u. Rheineck im Höhgau u., Nahegebirge bei Kreuznach, Rheingebirge bei St. Goar, Moselgebirge bei Trier, Luxemburg in d. Ardennen bei Bouillon, Ahrthal am weißen Kreuz u. an d. Signalstange bei Altenahr unweit Bonn, Schwaben, Baiern Erlangen, München, Baireuth bei Muggendorf u., Thüringen Jena, Barby im Elbegebirge, Harz, Sachsen, nach Schlesien; Böhmen, Mähren, Salzburg, Tyrol, Croatien, Siebenbürgen, Lombardien. Auch Gartenpflanze, welche leicht verwildert. 5—7. 4

32. *D. plumarius* L. K. syn. Rchb. exc. *D. moschatus* Meyer, *D. odoratus* Vest. Var. β . *D. hungaricus*

Pers. Rechb. exc. *D. hortensis* Schrader. — γ . *D. blandus* Rechb. Felsige Orte; Oberbadon bei Homeneck, Markelfingen an d. Rudolfszeller Straße bei Blumegg, Hohentwiel; Destr. bei Wien. Mähren, Steyermark, Tyrol, Galizien, Ungarn, Lombardien. 7—8. 4

33. *D. serotinus* W. et Kit. Rechb. exc. Sandhügel Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—11. 4

34. *D. arenarius* L. K. syn. *D. plumarius* Hagen. Sandfelder stellw. im Geb. v. Königsberg dch. Preußen, Graubenz, Elbsitz u., Pommern bis Frankfurt a. d. Oder nach Schlesien, Niederlausitz; Destr. Croatien u. in Holland bei Nimwegen. 6—8. 4

35. *D. petraeus* W. et Kit. Rechb. exc. *D. saxatilis* Pers. Kalkfelsen d. Carpathen, Galizien, Ungarn im Banat u. Siebenbürgen. 6—7. 4

36. *D. superbus* L. K. syn. Var. β . *D. speciosus* Rechb. icon. Sumpfige Waldwiesen stellw. dch. d. Geb. Schweiz; Rheing., Oberbadon im Rheinthal bei Embs, Salem bei Lüssingen, Ueberlingen, Rastatt, Heidelberg, Sanddorf, Pfalz häufig v. Kaiserslautern bis Bittsch, Speyer, Iggelheim, Deidesheim, Dürkheim, Marbort u., Coblenz im Wasenacher Wald bei Laach, selten am Niederrhein; Hamburg in d. Wesenhorst, Thüringen bei Jena; Württemberg, Baiern, Sachsen, Preußen bei Rastenburg, Marienwerder u., Destr. in allen Provinzen. Var. β . auf Alpen u. Voralpen. 6—7. ☉

37. *D. monspessulanus* L. K. syn. *D. erubescens* Treviran. *D. odoratissimus* Vest. *D. acuminatus* Tausch. Var. β . *D. plumosus* Spreng. *D. Waldsteinii* Sternb. Rechb. exc. — γ . *alpicola*: *D. alpestris* Sternb. et Hoppe, *Tunica arenaria* Scopol. Waldige Felsen im südl. Geb. bis in d. Alpen; Schweiz im Jura, Cant. Tessin; Kärnten, Steyermark, Südtirol, Krain, Vitoral, Istrien bei Triest, Croatien, Siebenbürgen, Lombardien u. Piemont. 7—8. 4

101. *Saponaria* L. (X. 3.) Seifenkraut. K. syn.

108. Rechb. exc. p. 800. Comp. I. 2. p. 90.

Erste Rotte. *Vaccaria* DC. K. syn.

1. *S. Vaccaria* L. K. syn. *S. rubra* Lamk. *S. setigalis* Neck. *Gypsophila Vaccaria* Sm. *Lychnis* — Scopol. *Vaccaria parviflora* Moench. *V. pyramidata* Fl. Wett. *V. vulgaris* Host. Necker, Felber, besonders auf Kalk u. Lehm, stellw. dch. d. g. Geb., im nördl. seltener. 6—7. ☉

Zweite Rotte. *Bootia* Necker. K. syn.

2. *S. officinalis* L. K. syn. *Bootia vulgaris* Neck. Ufer, Raine, Wege, kieselige Orte im g. Geb. 6—8. 4

3. *S. ocymoides* L. K. syn. *S. repens* Lamk. Gebirge u. Voralpen, besonders auf Kalk u. Sand, Schweiz im g. Jura; Baiern im Mittenwalde; Kärnthen, Tyrol, Lombardci u. Venedig. 4—8. 4

4. *S. glutinosa* M. v. Bieb. DC. prodr. I. 365. *Bootia* — Necker. Rehb. icon. f. 4994. b. Waldränder an d. Donau, Ungarn im Banat. 5—7. 4

Dritte Rotte. *Smegmatherium* Reichenb.

5. *S. bellidifolia* Smith. Rehb. exc. *Smegmatherium* — lium Rehb. icon. Gebirge in Dalmatien an d. M. Biofovo. 6—7. 4

6. *S. lutea* L. K. syn. Rehb. exc. *Smegmatherium luteum* Rehb. icon. Hochalpen in d. südl. Kette; Schweiz an d. Südseite d. M. Rosa über d. Thale Tarnanche u. oberhalb d. Alphütte am Breuil häufig; Lombardci, Savoyen, Piemont. 7—8. 4

102. *Cucubalus* L. (X. 3.) Taubentropf. K. syn. 108. Rehb. exc. p. 824. Comp. I. 2. p. 128.

1. *C. bacciferus* L. K. syn. *C. horizontalis* Moench. *Lychnanthus scandens* Gmel. Schattige Fluß- u. Bachufer, feuchte Gebüsche stellw. dch. d. g. Geb. nördl. bis Memel u. in d. südl. Littoral, Rheing. bei Mannheim, Worms, Coblenz, Bonn u. stellw. bis Wesel u. 7—8. 4

103. *Silene* L. (X. 3.) Leimkraut. K. syn. 109. Rehb. exc. p. 812. Comp. I. 2. p. 110.

Erste Rotte. Viscago K. syn.

1. *S. gallica* L. K. syn. *Rchb. exc.* *S. lusitanica* L. *S. cerastoides* DC. Var. β . *S. sylvestris* Schott. *Rchb. exc.* — γ . *S. quinquevulnera* L. — δ . *S. anglica* L. *Rchb. exc.* Sandige Aecker, Weinberge, mehr im südl. Geb., Schweiz Cant. Bern, Cant. St. Gallen; Rheing., Bodensee bei Rheineck, bei Rehl, Hagenau, Pfalz, Limbach bei Saarbrücken, Coblenz, Linz am Rhein; Baiern, Sachsen, Preußen bei Danzig, Schlesien; Destr. in allen Provinzen. 6—7. ☉

2. *S. cerastoides* L. *Rchb. exc.* *Host. austr.* *Lych-nis* — *Scopol.* Cultivirte Orte im südl. Littoral Istrien bei Görz, Triest; Kombardei u. Nizza. 6. ☉

3. *S. hispida* Desf. *Fl. Atl. Moris Fl. Sard. t. 19.* Bertol. *Fl. ital. IV. p. 574.* *Maly. enum. pl. austr. p. 305 — 395.* Am südl. Littoral, Istrien am Campo Marzio bei Triest. 6. ☉

4. *S. nocturna* L. *Rchb. exc.* *S. bicolor* Mnch. *S. discolor* Sibth. *S. spicata* DC. Olivenwäldchen im südl. Littoral, Dalmatien, Genua, Nizza. 5—6. ☉

5. *S. trinervia* Seb. et Mauri. *Fl. Rom. prodr. t. 2.* Bertol. *Fl. ital. Maly. enum. pl. austr. p. 305 et 395.* In Dalmatien. ☉

6. *S. brachypetala* Robill. et Cast. *Rchb. exc.* Aecker, Schutt im südlichsten Geb., Ligurien im Valle d'Andora. 6—7. ☉

7. *S. vespertina* Retz. K. syn. *S. bipartita* Desf. *S. colorata* Poir. Sandige Orte am südl. Littoral Istrien bei Triest, Kombardei, Venedig. 5—6. ☉

8. *S. dichotoma* Ehrh. K. syn. *S. membranacea* Poir. Waldränder, Aecker, Wege im südl. Geb.; Destr. bei Wien, Erlau, nach Ungarn, bei Ofen am Adlerberge, Croatien u. Siebenbürgen. 5—6. ☉

9. *S. Gallinyi* Heuffel. *Rchb. exc.* Gebüsch, Ungarn im Banat bei Mehavia u. 6—7. ☉

10. *S. canescens* Tenore. Rchb. exc. *S. decumbens* Bivon. Im südlichsten Geb., Westligurien. 5—6. ☉

11. *S. sericea* Allion. pedm. Rchb. exc.. Im südlichsten Eittoral, Lombardei, Venedig, Nizza. 6—7. ☉

12. *S. nicaeensis* All. pedm. Rchb. exc. *S. villosa* Moench. *S. arenaria* Desf. Im südlichsten Eittoral, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza, Ligurien, Genua. 5—6. ☉

Zweite Rotte. *Otites* K. syn.

13. *S. viscosa* Pers. K. syn. *Cucubalus* — us. L. *Viscago* — sa Baumgart. non Pers. Sandige Tristen, Wege, stchw. im Geb., Pommern Insel Rügen; Destr. Böhmen, Mähren, Ungarn u. Siebenbürgen. 6—7. ☉

14. *S. italica* L. K. syn. Rchb. exc. *Cucubalus* — us. L. *C. selinoides* Vill. delph. *Viscago clavata* Mnch. Var. β . *S. viscosa* Schleicher. — γ . *S. pilosa* Spreng. Rchb. exc. *S. molissima* Host. *Cucubalus* — us. W. et Kit. Schattige Hügel im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin; Südtirol, Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Genua, Piemont. 6—7. 4

15. *S. nemoralis* W. et Kit. K. syn. *Cucubalus floccosus* et *catholicus* Ficin. Wälder mehr im südl. Geb., Sachsen bei Dresden, Schlesien bei Wolfsdorf; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Eittoral Istrien, bis Venedig. 6—7. 4

16. *S. paradoxa* L. Rchb. exc. Bertolon. Fl. ital. Felsen, Hügel im südl. Geb., Dalmatien, Lombardei am Cap. Noli. 5—6. 4

17. *S. pelidna* Rchb. Rchb. exc. *S. insubrica* Gaud. Südschweiz, Lombardei auf d. M. Generoso bei Mailand. 6—7. 4

18. *S. nutans* L. K. syn. Var. β . *S. infracta* W. et Kit. Gebirgswälder, schattige Felsen, gebirgige Waldwege dch. d. g. Geb. Var. β . bei Wittenberg, Harz an d. Roßtrappe. 5—6. 4

19. *S. livida* Willd. K. syn. *S. nutans* β . M. et K. *S. rubens* Vest. Cucubalus — Roth. Wälder im südl. Geb., Destr. Steyermark, Kärnthn, Tyrol, Krain, Littoral Istrien, Dalmatien, Lombard. 7. 4.

20. *S. longiflora* Ehrh. Rehb. exc. *S. juncea* Roth. Weinberge, sandige Wiesen im südl. Geb., Dalmatien, Ungarn bei Pesth u. Ofen, Siebenbürgen u. Galizien. 7—10. 4

21. *S. viridiflora* L. Rehb. exc. Ackeränder im südl. Geb., Krain, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombard u. Piemont. 6—7. 4

22. *S. catholica* Aiton. Rehb. exc. *S. glutinosa* Pers. Cucubalus — us. Retz. *C. catholicus* Jacq. In Dalmatien auf d. Monte Marian. 6. 4

23. *S. chlorantha* Ehrh. K. syn. *Viscago* — Moench. Cucubalus — us Willd. *C. catholicus* β . L. *C. catholicus* Krock. Grasige Hügel, Waldbstellen, an Wegen, mehr im südl. Geb., udrdl. Odergegend v. Frankfurt dh. Schlesien, Niederlausitz, Brandenburg nach Pommern, Preußen bei Kößen, Thorn, Graudenz; Destr. Krain, Littoral Istrien, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien 7—8. 4

24. *S. tatarica* Pers. K. syn. Cucubalus — cus. L. *Viscago unilateralis* Moench. Sandige, grasige Orte stellw. im Geb.; Preußen in d. Neumark, Memel, Tilsit, Graudenz, Danzig u. längs d. Weichsel, Ober u. Warthe bis Frankfurt; in Galizien u. Siebenbürgen. 7—8. 4

25. *S. multiflora* Pers. Rehb. exc. Cucubalus — us. W. et Kit. Feuchte Wiesen, in Ungarn u. Siebenbürgen. 5—9. ☉

26. *S. Otites* Smith. K. syn. Cucubalus — L. *C. parviflorus* Lamk. Sandige Hügel, Sandfelder, Raine, Wege, stellw. dh. d. Geb., Südschweiz; Rheing. dh. Oberelsaß, Oberbaden, Raßtatt, Heidelberg bis Mainz, Bingen, Kreuznach; Westphalen, Lüneburg, Mecklenburg nach Ostpreußen, Königsberg, Graudenz, Thorn u., Schlesien, Sachsen, Harz, Thüringen, Naumburg, im Mainthal v. Frankfurt nach Hanau, Würzburg, Regensburg; Destr. in allen Provinzen. 5—7. 4

27. *S. Pseud-Otites* Besser. Rehb. exc. *Lychnis*

Otites Scopoli. Steinige Wiesen am südl. Eittoral, Istrien u. in d. Lombardei. 6. 4

28. *S. parviflora* Pers. Rehb. exc. Cucubalus — us. Ehrh. Sandige Orte im südl. Geb., Eittoral, Ungarn im Banat, Siebenbürgen bei Torda u. Kolas 2c. 6—7. 4

29. *S. effusa* Bernh. Otth. Rehb. exc. Cucubalus effusus Fisch. *C. wolgensis* Willd. *Silene* — Spreng. Ungarn im Banat 6—7. 4

30. *S. spergulifolia* M. v. Bieb. Rehb. exc. Cucubalus — lius Desf. *S. polyphylla* M. v. B. Sonnige, sandige Hügel in Siebenbürgen. 6—8. 4

Dritte Rotte. *Atocion* K. syn.

31. *S. saponariaefoliae* Schott. Rehb. exc. *S. Csereii* Baumg. *S. commutata* Gussone. In Weinbergen, Siebenbürgen. 7—8. ☺

32. *S. inflata* Smith. K. syn. Cucubalus Behen L. Sil. Cucubalus Wibel. Var. β . *angustifolia*: Cucubalus *angustifolius* Balb. et Nocca. *C. petraeus* Fries. *S. inflata* β . M. et K. — γ . *latifolia*: *C. antelopus* Vest. — δ . *glauca* Rehb. icon. Cucub. *glauca* Willd. — ϵ . *chlorophylla*: Cucub. *montanus* Vest. — ζ . *marginata*: Cucub. *margi-natus* Kitaib. — η . *alpina* K. syn. *S. uniflora* β . et γ . DC. Fl. fr. *S. maritima* Host. Cucub. *alpinus* Lamk. Gräßige Hügel, Wiesen, Triften, Felsen, steinige Orte dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen; Var. β . in d. Rheinpfalz auf d. Donnersberg, Nahegebirge bei Oberstein; Salzburg bei Lofer; Var. η . Hochalpen Oestr. an d. hohen Briel, Schweiz Cant. Wallis. 6—8 4

33. *S. maritima* Withr. Rehb. exc. K. syn. in not. *S. uniflora* Roth. Felsen im südl. Eittoral, Croatien, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

34. *S. Pumilio* Wulf. K. syn. Cucubalus — L. *Lychnis* — Scopoli, *Melandrium* — Fries. Feuchte Gra-nitfelsen d. Hochalpen; Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärn-then, Krain, Siebenbürgen u. Venedig. 6—7. 4

35. *S. Elisabethae* Jan. Rchb. exc. Kalkgebirge im südlichsten Geb., Kombardei bei Grigne am Lecco-See, ein Zweig d. Comer-Sees, auf d. Gipfel il Caprione. 7—8. 24

36. *S. Zawadzkii* Herbieh. Comp. I. 2. p. 120. Alpen in Siebenbürgen, in d. Bukowina M. Rareu. 6—7. 24

37. *S. conica* L. K. syn. Sandige, grasige Orte, Brachfelder, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Straßburg, Mannheim, Mainz, Bingen, Kreuznach, Coblenz, Eöln bis nach Westphalen, Trier, Saarlouis, Luxemburg, Limburg, Schwaben, Baiern u.; Destr. Krain, Eittoral Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Kombardei, Venedig. 5—6. ☉

38. *S. conoidea* L. K. syn. Saatäcker, Felder, Luxemburg, Pej. Mansfeld. 6—7. ☉

39. *S. noctiflora* L. K. syn. Melandrium — um. Fries. Saatäcker, Felder, besonders auf Thon u. Kalk; stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Oberbaden bei Salem, Engen, Rastatt bis nach Landau, Speyer, Heidelberg, Kaiserslautern, Alzen nach Saarbücken, Trier, Luxemburg, Coblenz bis Neuwied, Laacher-See, Hannover, Preußen bei Danzig; Sachsen, Baiern u.; Destr. bis in d. Kombardei. 7—9. ☉

40. *S. apetala* Willd. Rchb. exc. Im südl. Eittoral, Dalmatien auf d. Insel Lesina. 5—6. ☉

41. *S. vallesia* L. K. syn. *S. clavata* Mneh. Hochalpen, Schweiz St. Bernhard unterhalb d. M. Rosa, eine Stunde v. Breuil zw. Courtmageur u. Allé blanche selten; Kombardei, auf d. Apuanen-Sagro u. Waldenser-Alpen. 7. 24

42. *S. graminea* Visian. Fl. Dalm. Rchb. icon. Dalmatien M. Kamešnizza an d. Grenze v. Bosnien. 7. 24

43. *S. Lerchenfeldiana* Baumgart. Rchb. exc. Hohe Gebirgshöhe in Siebenbürgen. 7—8. 24

44. *S. Siegeri* Baumg. Rchb. exc. *Lychnis nivalis* Kitaib. Schult. Fl. austr. Kalkfelsen in Siebenbürgen, Rodner Alpen in d. Marmorosa. 7—8. 24

45. *S. cordifolia* All. pedm. Rchb. exc. Felsen im südlichsten Geb., Piemont um d. Quellen v. Vinadio u. bei Nizza u. 6—7. 24

46. *S. Armeria* L. K. syn. *Cucubalus fasciculatus* Lamk. Felsen unter Gebüſche, ſandige, ſteinige Orte am Fuße der Gebirge, Waldſtellen, ſtellw. dch. d. Geb., mehr im ſüdl. Geb., Rheing., Pfalz bei Kaltenbach, Horbach zw. Pirmasenz u. Annweiler, im Lauterthale bei Dahn, Raheſthal, Kreuznach, ſtellw. bis Coblenz, Ahrthal bei Altenahr unweit Bonn, Schwaben, Weſtphalen bei Hörter, Harz an d. Bode; Südschweiz, Deſtr., Kärnthen, Südtirol bei Bogen, Krain, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig und hin und wieder im Geb. auf Mauern verwildert. 7—8. ☉

47. *S. compacta* Fisch. Rchb. exc. Sandige Orte; Ungarn, im Banat u. in Siebenbürgen. 7—9. ☉

48. *S. rubella* L. Rchb. exc. Aecker, im ſüdl. Littoral, Iſtrien bei di Porcia. 6—7. ☉

49. *S. Muscipula* L. Rchb. exc. Im ſüdlächſten Geb., Piemont, Ligurien. 6—7. ☉

50. *S. cretica* L. Bertolon. Fl. ital. IV. p. 612. Maly enum. pl. austr. p. 308—396. Saatäcker im ſüdl. Littoral, Dalmatien auf der Inſel Leſina. 7. ☉

51. *S. annulata* Thore K. syn. in add. 439. *S. rubella* Wulf. Saatfelder im ſüdl. Geb., Südtirol, Littoral, Iſtrien bei Triest, Dalmatien u. Croatien. 6—7. ☉

52. *S. linicola* Gmel. bad. K. syn. *S. eranthema* Wibel, *S. stricta* L. *S. marginata* Schott. Leinäcker, ſtellw. im Geb., Württemberg bei Tuttlingen, nördlich bis Wertheim u. Waſſertrüdingen u. Leltersheim, öſtlich dch. Schwaben, Baiern bis München; Deſtreich und Lombardei. 6—7. ☉

53. *S. picta* Pers. Rchb. exc. *S. bicolor* Rchb. Dalmatien auf d. M. Bioſovo. 8—9. ☉

54. *S. tenerrima* Presl. Rchb. exc. Sandige Brachäcker in Böhmen im Bunzlauer Kreiſe. 6. ☉

55. *S. bicolor* Thore. Rchb. exc. Felsen, Wege im ſüdlächſten Littoral, Nizza bei Chiandola. 5. ☉

56. *S. inaperta* L. Rchb. exc. Aecker im ſüdl.

Geb., Krain, Eittoral, Istrien, Lombardei, Piemont, Nizza.
6—7. ☉

57. *S. flavescens* W. et Kit. Rchb. exc. Kalkfelsen,
Ungarn im Banat bei Mehadia. 6—7. 4

58. *S. sedoides* Jacq. K. syn. DC. Fl. fr. suppl. Felsige Orte im südl. Eittoral, Istrien, Dsero, Cherso, Dalmatien. 5—7. ☉

59. *S. Tommasinii* Visian. Rchb. exc. *S. ramossissima* Sibth. In Dalmatien, M. Sello. 5—6. ☉

60. *S. Saxifraga* L. K. syn. Var. β . *S. petraea* W. et Kit. Rchb. exc. — γ . *S. Seguieri* Rchb. Alpen, Boralpen u. Gebirge, besonders im südl. Geb., Süd Schweiz, Südtirol, Kärnthen, Steyermark, Krain, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Venedig. Var. β . im Banat. 6—8. 4

61. *S. dinarica* Spreng. Rchb. exc. *S. depressa* Baumg. Kalkalpen in Siebenbürgen, Alpe Szura. 6—8. 4

62. *S. quadrifida* L. K. syn. Rchb. exc. *S. quadridentata* DC. Host. *Lychnis quadrifida* Scop. Var. β . *S. pudibunda* Hoffmsegg. Rchb. exc. — γ . *S. pusilla* W. et Kit. Rchb. exc. Feuchte Felsen der Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. bis in d. Lombardei zc. 6—7. 4

63. *S. alpestris* Jacq. K. syn. *S. viscida* Spreng. *Lychnis alpestris* L. Schattige, bemooste Orte d. Boralpen, Destr. Steyermark, Kärnthen, Krain, Tyrol, Dalmatien, Galizien, Siebenbürgen u. Piemont. 7—8. 4

64. *S. rupestris* L. K. syn. *S. Kaulfussii* Spreng. Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr., Rheing. bei Basel, Oberbaden, Breisgau im Höllethale a. d. M., Welchen, Blauen, bei Badenweiler, Vogesen, Schwarzwald, Donaueschingen, Stauffen, Füssen, bei Mühlheim a. d. Rheinfelsen zc. 7—8. 4

65. *S. acaulis* L. K. syn. Var. *S. exscapa* Allion. pedm. Steinige, grasige Orte d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette. nach Destr., Baiern bis in d. Lombardei u. Piemont. 6—8. 4

104. *Lychnis* DC. (X. 5.) Lichtnelke. K. syn. 115.

Rchb. exc. p. 824. Comp. I. 2. p. 139.

1. *L. Viscaria* L. K. syn. *Viscaria vulgaris* Röhl. *V. purpurea* Wim. et Grab. Gräßige, trockene Bergstellen, Felsen, Nadelholzwaldungen, besonders auf Sand, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., auf d. Vogesensandstein bis Trier u. Luxemburg, an d. Bergstraße, Pfalz, am Hardtgebirge, Coblenz, Remagen, im Ahrthale bei Bonn zc. 5—6. 4

2. *L. alpina* L. K. syn. Granitfelsen d. Hochalpen in d. südl. Kette, über die Schneegrenze; Schweiz, Cant. Wallis, Graubünden, Veltlin, M. Rosa, Piemont, M. Genis; Tyrol, Kärnthen auf d. Kaiseralpen, Vittoral u. Lombardei 7—8. 4

3. *L. nemoralis* Heuffel Rchb. exc. Hohe Buchenwälder, Ungarn, im Banat, Siebenbürgen. 5—6. ☉

4. *L. vespertina* Sibth. K. syn. *L. dioica* β. Lin. *L. arvensis* Schkr. *L. alba* Miller. *L. pratensis* Spreng. *Melandrium* — se Röhl. Wiesen, Raine, Gebüsch, Felder, im g. Geb. 5—6. ☉

5. *L. diurna* Sibth. K. syn. *L. dioica* α. Lin. *L. sylvestris* Hoppe, *Melandrium* — tre Röhl. Feuchte, schattige Orte, Gebirgswälder, Waldbäche, Wiesen, stellw. dch. d. g. Geb. 5—6. 4

6. *L. Flos-cuculi* L. K. syn. Feuchte Wiesen, Waldstellen im g. Geb. 5—7. 4

7. *L. coronaria* Lamk. K. syn. *Agrostemma*. — *L. A. Flos Jovis* Pollich. Schattige Felsen, Abhänge, Hügel, besonders im südl. Geb., Rheing., Oberbaden im Bühlerthale bei Rastatt; in d. Vogesensandsteinformation d. Pfalz, zw. Hartenburg u. Dürkheim bei d. Kloster Limburg, Neustadt a. d. Hardt a. d. Kapellenberg, bei Maderburg, Schloßruine Neucastel, zw. Annweiler u. Leinsweiler, Falkenburg bei Wilgarswiesen, Hessen auf d. Rase bei Gelnhausen; Südschweiz Cant. Wallis, im Nicolai-Thale M. Foully; Südtirol bei Bozen, Vittoral, Istrien, Dalmatien,

Groaten, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei u. Piemont. 6—7. ☉

8. *L. Flos-Jovis* Lamk. K. syn. *Agrostemma* — L. Sonnige, steinige Orte, Alpenwiesen, im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Burg vor St. Niklas, bei Zermatten, M. Foully, Cant. Graubünden, Cant. Tessin; Tyrol bei Brixen im Trompia-Thale, Lombardei, Piemont u. Ligurien. 6—7. 4

9. *L. Coeli-rosa* Desv. Rchb. exc. *Agrostemma* — L. Saatäcker im südl. Geb., Dalmatien, auf d. Insel Tessina, Croatien; Nizza. 7—8. ☉

105. *Agrostemma* L. (X. 4.) Raden. K. syn.

117. Rchb. exc. p. 826. Comp. I. 2. p. 142.

1. *A. Githago* L. K. syn. *Lychnis* — Lamk. *Githago segetalis* Desf. Var. β . *Agr. nicaeensis* Willd. Saatäcker, Felder, durch d. g. Geb. Var. β . bei Nizza. 6—7. ☉

106. *Drypis* L. (X. 3.) Kronenfraut. K. syn.

117. Rchb. exc. p. 812. Comp. I. 2. p. 109.

1. *D. spinosa* L. K. syn. Sandboden am südl. Littoral, Südfrain, Istrien bei Fiume M. Rana, Dalmatien, Lombardei. 6—7. 4

Vierzehnte Ordnung. Alsineen.

DC. K. syn. 117. K. Tschb. 81. Caryophylleae pars Rchb. exc. p. 782. Rchb. icon. Cent. XV. t. 200 bis 230.

Cent. XVI. t. 231—237. f. 4899—4987.

107. *Buffonia* L. (X. 2.) Buffonie. K. syn.

Rchb. exc. p. 782. Comp. I. 2. p. 77.

1. *B. tenuifolia* L. K. syn. *B. annua* Suter helv. *B. perennis* Clairv. Var. β . *pennicillata* Gaud. Riefige Orte, Schweiz, Cant. Wallis, Gypsühgel unterhalb Siebers, bei Luzern u. St. Severin; Piemont, Nizza. 7. ☉

108. *Sagina* L. (IV. 3.) Mastfraut. K. syn. 117.

Rchb. exc. p. 793. Comp. I. 1. p. 271.

1. *S. ciliata* Fries. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *S. depressa* Schultz. fl. starg. Rchb. exc. *S. apetala* β . L. Aecker, Brachfelder, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Rodus-Berg bei Bingen, Euremburg, Westphalen bei Reß, Münster, Mecklenburg, bei Neubrandenburg, Sachsen bei Leipzig; Mähren. 6—7. ☉

2. *S. procumbens* L. K. syn. Var. β . *fontana* Fries. — γ . *littoralis* Fries. Feuchte, grasige Orte, Ufer, Aecker, Triften, stellw. dch. d. g. Geb. 5—10. ☉

3. *S. bryoides* Froelich. K. syn. Rchb. exc. *S. muscoides* Froel. K. syn. edit. I. Voralpen, Gebirge auf faulem Holze, stellw. im Geb., Oberharz; Destr. Mauerbach bei Wien, Tyrol im Synthale bei Steeg, Agordo bei Tiser. 7—8. ☉

4. *S. apetala* L. K. syn. Etwas feuchte, sandige Orte, Triften, Aecker, stellw. dch. d. g. Geb. 5—9. ☉

5. *S. stricta* Fries. K. syn. *S. maritima* Don. Seeküste, in Mecklenburg, Lauenburg, Holstein, Schleswig u. am südl. Littorale. 5—8. ☉

109. *Spergella* Rchb. (X. 4.) Spergelle. Rchb.

exc. p. 794. K. syn. 118. Comp. I. 2. p. 130.

1. *S. saxatilis* * *S. saginoides* Rchb. exc. *Sagina saxatilis* Wim. K. syn. *S. Spergella* Fenzl, *Spergula saginoides* L. Felsige, moosige Orte d. Alpen und Voralpen; Schweiz u. stellw. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Oberbaden a. d. Belchen, Feldberg im Breisgau, Schwarzwald, auf dem Pfänder bei Bregenz, Schlesien im Gesenke d. Sudeten, Destr. Böhmen, Mähren, Littoral, Istrien, Croatien, Ungarn, Lombardien. 6—7. 4

2. *S. macrocarpa* Rchb. icon. f. 4963. b. *Sagina* — *Maly cuum*. pl. austr. p. 293. *Spergula saginoides*

Pollini Veron. Alpen u. Boralpen in d. südl. Kette, Destr., Ruchschneeberg, Tyrol. 6—7. 4

3. *S. subulata* Rchb. exc. *Sagina* — Fenzl. K. syn. *Spergula* — Sw. *Sp. laricifolia* Huds. *Spergula saginoides*. β . M et K. Sandige Aecker, stchw. im Geb., Baden auf d. Herrnwiese und am Kaltenbrunnen oberhalb Baden-Baden? Thüringen bei Teichrode, Oldenburg bei Dötlingen, Gantersfese und Immer; Bremen, Hamburg, Holstein, Schlesien bei Oppeln; Destr. auf d. Schoberstein, Steyermark, Tyrol, Lombardei; Schweiz im Beltlin an d. Abba. 7—8. 4

4. *S. glabra* Rchb. exc. *Sagina* — Koch. Fenzl. K. syn. in add. 439. *Spergula* — Willd. *Sp. saginoides* Allion. pedm. Grasige Orte d. Alpen u. Boralpen im südl. Geb., Südtirol zw. Terragnolo u. Golsanto östl. v. Roveredo; Piemont, M. Campo bei Bassano, Novarese Valle d'Ossola u. 7—8. 4

5. *S. nodosa* Rchb. exc. *Sagina* — f. Meyer K. syn. *Spergula* — L. Var. β . *glandulosa* Rchb. icon. *Sagina nodosa*. β . *pubescens* K. syn. *Spergula glandulosa* Besser. Sumpfige, feuchte, torfige Tristen, Heiden, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Baden, Elsaß, Hagenau, Speyer, Mainz, Eöln, Trier, Aachen, Westphalen, Hannover, Sachsen, Baiern, Destr. u. 7—8. 4

110. *Spergula* L. (X. 4.) Sparrk. K. syn. 120.

Rchb. exc. p. 566. Comp. I. 2. p. 128.

1. *S. arvensis* L. K. syn. Var. α . *Sp. sativa* Boeningh. — β . *Sp. vulgaris* Bgh. Sandboden, Aecker, Felder, Brackäcker im g. Geb. auch angebaut. 6—7. ☉

2. *S. maxima* Weihe Rchb. exc. *Sp. arvensis*. γ . *maxima* K. syn. Leinäcker, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Baden, Pfalz, Trier, am Niederrheine u. in Westphalen u. 6—7. ☉

3. *S. pentandra* L. sp. K. syn. *Stellaria* — Scopoli, *Arenaria* — Wallr. *Alsine marginato* Schreb.

Sandboden, Hügel, Brachfelder, Heiden, Triften, Wald- u. Felbränder, Nadelholzwälder. stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., dch. Baden, Elsaß, Pfalz bis Saarbrücken, Trier, Coblenz, Köln u.; Schweiz nur bei Basel, Oestr. bis in die Lombardei. 4—5. ☉

Anmerkung. Nach F. W. Schulz ist d. *Sp. pentandra* Koch. K. syn. *Sp. Morisonii* Boreau Regensb. bot. Z. 1850. p. 451. mit dunkel-geflügeltm Samen, wogegen die echte *Sp. pentandra* L. schneeweiß-geflügelten Samen hat; beide Pflanzen sollen nach Schulz nicht unter einander wachsen, welches ich auf dem Kölner Fundort bei Mühlheim nicht bestätigt gefunden habe, indem dort Pflanzen mit ganz dunkel und auch schneeweiß-geflügeltm Samen vorkommen.

111. *Lepigonum* Fries. (X. 3) Schuppenmiere.

K. syn 120. *Alsine* Rchb. exc. p. 566. Comp. I. 2. p. 92.

1. *L. segetale* Koch. K. syn. *Alsine* — L. *Al. unilateralis* Moench. *Arenaria segetalis* Lamk. Unter d. Saat stellw. mehr nördl., Rheing., Einz am Rhein bei Coblenz, Luxemburg bei Dubelange, Belgien bei Limburg; Westphalen, Hannover, Hessen, Lausiß. 6—7. ☉

2. *L. rubrum* Fries. K. syn. Wahlenb. *Alsine* — Wahlenb. K. syn. edit. I. *Arenaria* — Host. A. *rubra* α. *campestris* L. *Spergularia rubra* Pers. *Stipularia* — Haw. Feuchte, grasige Sandstellen, Aecker d. Ebenen u. Gebirge bis in die Alpen dch. d. g. Geb. 4—9. ☉ u. 4

3. *L. medium* Wahlenb. K. syn. *L. marinum* Wahlenb. *Alsine marina* Rchb. exc. *Al. marina* α. K. syn. edit. I. *Arenaria marina* Roth. Ar. *rubra*. β. *marina* L. *Spergularia marina* Presl. *Sp. marina* α. *heterosperma* Neilr. vind. Salzhaltige Orte, Salinen an d. nördl. u. südl. Seeküste, dch. d. g. Geb. bis in d. Lombardei, Rheing., an d. Salinen von Dürkheim, Nauheim, Eoden, Kreuznach, auf salzführendem Boden bei Saarbrücken und Trier u. 5—9. ☉ ob auch ☉?

4. *L. marginatum* Koch. K. syn. *L. marinum* Wahlenb. *Alsine marginata* Rchb. exc. *Arenaria* — DC. Ar. *media* L. Mit d. Vorigen an d. nördl. u. südl. See

strande an Salinen und Salzquellen doch seltener. 7—8. 4

112. *Halianthus* Fries (X. 3) Salzmiere. K.
syn. 121. *Alsine*. Comp. I. 2. p. 94.

1. *H. peploides* Fries. K. syn. *Alsine* — Wahlenb. *Arenaria* — L. Honkenya — Ehrh. *Rchb. exc.* p. 568. Am nördl. u. südl. Seestrande, an d. Ost- u. Nordsee u. am adriatischen Meere. 6—7. 4

113. *Fachinia* Rchb. icon. (X. 3) Fachinie. K.
syn. in add. 440. K. Tschb. 84.

1. *F. lanceolata* Rchb. K. syn. in add. 440. *Alsine* — M. et K. K. syn. 122. *Sabulina* — Rchb. *exc.* *Arenaria brevicaulis* Pollini Veron. Var. α . *laxa*: *Arenaria lanceolata* All. pedm. *Stellaria rupestris* Scopol. — β . *condensata*: *Arenaria cherlerioides* Vill. *Ar. lanceolata*. β . *cherlerioides* DC. Hochalpen, in d. südl. Kette, Kärnthén, Tyrol, Krain, Piemont; Var. α . Krainer-Alpen; Var. β . Seiseralpe; Schweiz im Beltlin. 7—8. 4

114. *Alsine* Wahlenberg. (X. 3.) Miere. K.
syn. 122. Comp. I. 2. p. 94. *Sabulina* Rchb. *exc.* p. 785.

1. *A. aretioides* M. et K. K. syn. *Siebera cherlerioides* Hoppe Rchb. *exc.* p. 783. *Arenaria aretioides* Portenschl. *Sommerauera quadrifida* Hoppe, *Cherleria imbricata* Sering. Ch. *octandra* Sieber. Felsen d. Hochalpen, in d. südl. Kette; Destr., Tyrol, Kärnthén, Salzburg, Steyermark, Krain. 6—7. 4

2. *A. stricta* Wahlenb. K. syn. *Sabulina* — Rchb. *exc.* *Spergula* — Sw. *Alsinanthe* — Rchb. icon. *Arenaria uliginosa* Schleich. Gaud. helv. Torfmoore, stellenw. im Geb., Torfwiese d. Schweiz im Jura, Würzach in Württemberg; Oberbaiern im Deiningen Moos, Tegern-, Burm- u. Starnberger-See, Schönrainer-Moos; Tyrol u. Lombard. 6—8. 4

3. *A. biflora* Wahlenb. K. syn. *Sabulina biflora et obtusata* Rchb. *exc.* *Stellaria biflora* L. *Alsinanthe* —

Rchb. icon. Hochalpen im Urgebirge an d. Schneegrenze, Schweiz an d. Ravy: u. Panerofaz-Gletscher, Wallis, Saasthal, M. Foully; Tyrol auf d. Gresspeina- u. Seiser-Alpe im Gordenathale. 7—8. 4

4. *A. laricifolia* Wahlenb. K. syn. *Sabulina* — Rchb. exc. *Wierzbickia* — Rchb. icon. *Arenaria* — Vill. delph. Jacq. *Ar. rostrata* Kitaib. *Ar. stricta* Host. Austr. Var. β . *glandulosa*; *A. laricifolia* β . DC. *Ar. liniflora* L. fil. *Ar. stricta*. Vill. delph. *Wierzbickia* — Rchb. icon. Hochalpen d. westl. u. südl. Schweiz, Jura M. Dolaz, Wallis Nicolai-Thal; Saasthal; Destr. am Schneeberg, Hohenboller; Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Krain, Destr. Mähren, Vittoral, Istrien, Lombardei, Galizien, Ungarn u. Piemont. 7—8. 4

5. *A. macrocarpa* Maly enum. pl. austr. p. 295. *Wierzbickia* — Rchb. icon. f. 4931. *Arenaria* — Kitaib. Host. austr. non Hornem. Alpen u. Boralpen in Croatien. 7. 4

6. *A. Arduini* Fenzl. Comp. I. 2. *Sabulina graminifolia* Rchb. exc. *Arenaria Arduini* Visian. *Ar. graminifolia* Arduini, Pettera — Rchb. icon. *Aren. clandestina* Portenschl. *Ar. Rosani* Tenore. Felsen d. Hochalpen in d. südlichsten Kette, Dalmatien M. Biokovo, Venedig in d. Feltres'schen Gebirgen bei Bette. 6—7. 4

7. *A. proscera* * *Sabulina procera* Rchb. exc. *Arenaria* — Sprengel. *Alsine graminifolia* Bl. et Fgh. *Aren.* — Schrader, *Eremogone* — Fenzl. *Er. procera* Rchb. icon. Trockene Waldstellen, Bergwiesen in Istrien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. 4

8. *A. austriaca* M. et K. K. syn. *Sabulina* — Rchb. exc. *Arenaria* — Jacq. Host. *Ar. elongata* Schlechtenth. *Neumayera austriaca* Rchb. icon. *Stellaria biflora*. Wulf. Hochalpen, Destr. Steyermark, Kärnthen, Südtirol, Krain, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

9. *A. Villarsii* M. et K. K. syn. *Sabulina* — Rchb. exc. *Neumayera* — Rchb. icon. *Arenaria* — Balb. *Ar.*

austriaca All. ped. Ar. triflora Vill. Ar. flaccida Clairv. Var. β . Als. Villarsii β . DC. Gaud. Hochalpen, Schweiz, Cant. Wallis am M. Rosa, Törnanchenthal; Kärnthen, Lombardei. 7—8. 4

10. A. verna Bartl. K. syn. Arenaria — L. Ar. caespitosa Ehrh. Sabulina verna et caespitosa. Rchb. exc. Triphane verna et caespitosa Rchb. icon. Ar. saxatilis Roth. Var. β . alpina: Arenaria liniflora Jacq. Ar. Gerardi Willd. Sabulina — Rchb. exc. Triphane — Rchb. icon. Aren. stricta Roth enum. Ar. proquinqua R. Brow. Alsine saxatilis Wahlenb. Steinige Orte d. Alpen u. Hochalpen u. stchw. dch. d. Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern u., Rheing., in Oberbaden, M. Belden, Elsaß M. Ballon, Schwarzwald und häufig auf d. Galmeyboden bei Aachen; dann an d. Harze u. mit d. Subeten nach Destr. Dalmatien, Galizien, Ungarn. 6—9. 4

11. A. sedoides Froelich K. syn. Sagina decandra Rchb. exc. p. 794. Alsine rubella — Wahlenb. Hochalpen in Tyrol im Algau, Borgo di Val Sagana. 7—8. 4

12. A. recurva Wahlenb. K. syn. Sabulina — Rchb. exc. Triphane — Rchb. icon. Arenaria — All. pedm. Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz M. Gotthard, M. Bernhardt, M. Isenstock, M. Grimsel, M. Furka; Saas- u. Nicolaithal, Tyrol am Zimpeljoch, Lienzer-Alpen, Kärnthen, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

13. A. setacea M. et K. K. syn. Sabulina — Rchb. exc. Arenaria — Thuill. Ar. heteromalla Pers. Ar. saxatilis Loisl. Ar. frutescens Kit. Gebirge, Felsen, besonders auf Kalk, stchw. im Geb., Rheing., Oberbaden im Breisgau, M. Kaiserstuhl u. bei Limburg; Baiern im Donauthale bei Weltenburg, Nabthal zw. Kalmünz u. Triefendorf, Altmühlthal zw. Kellheim u. Essingen u.; Destr. Böhmen bei St. Joan, Mähren, Steyermark, Ungarn. 7—8. 4

14. A. banatica Bluff et Fgh. Comp. I. 2. p. 99. Sabulina — Rchb. exc. Arenaria — Heuffel. Kalkfelsen in Ungarn, Herkulesbäder im Banat. 7. 4

15. *A. fasciculata* Maly enum. pl. austr. p. 295. *Minuartia* — Rchb. icon. t. 206. f. 4919. *b. Arenaria* — Gouan. non Jacq. *Ar. lancifolia* Visiani. In Dalmatien. 7—8. ☉

16. *A. rostrata* Koch K. syn. *Sabulina* — Rchb. exc. *Arenaria* — Pers. *Ar. fastigiata* Smith. *Ar. mucronata* DC. Fl. fr. Gaud. helv. *Alsine* — Gouan. Felsen b. südl. Hochalpenkette; Schweiz, Cant. Wallis, Nicolaithal über Bermatten, am Rifel, Gombs, M. Stock, Val d'Aost, Furka; Südtirol im Benosta-Thale, Lombardei bei Bormio, Savoyen; Piemon. am M. Genis u. 7—8. 4

17. *A. Jacquini* Koch K. syn. *A. fasciculata* M. et K. *A. mucronata* Lamk. *Arenaria* — Jacq. *Sabulina* — Rchb. exc. *Minuartia* — Rchb. icon. t. 206. f. 4919. *Stellaria rubra* Scopol. Trockene, sandige Hügel, Sandfelder, stchw. im Geb., Rheing. bei Basel, Baden im Breisgau auf d. Kaiserstuhle, bei Vogtsburg u. Oberbergen, Elsaß bei Westhalten, Pfalz auf d. Tertiärkalke bei Ungstein, Callstadt, Dürkheim; Darmstadt bei Griesheim, Seeheim, Bickenbach bis Mainz, Niederingelheim, Bingen, Kreuznach; Oberbaiern; Schweiz Cant. Wallis, Genfersee; Destr. Mähren, Steyermark, Kärnthen, Tyrol, Dalmatien, Ungarn, Lombardei. 7—8. ☉

18. *A. glomerata* Maly enum. pl. austr. p. 296. *Arenaria* — M. v. Bieb. DC. prodr. I. p. 407. In Ungarn. 7—8. ☉

19. *A. mucronata* L. *Sabulina* — Rchb. exc. et icon. *Minuartia tenuifolia* Mart. An Mauern in Dalmatien, am Wasserfalle d. Kerka. 4—6. ☉

20. *A. tenuifolia* Wahlenb. K. syn. *Sabulina* — Rchb. exc. *Arenaria* — L. Var. β . *Arenaria viscidula* Thuill. Gebirgsfelder, Triften u. Aecker in d. Niederungen bch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten. 6—8. ☉

21. *A. viscosa* Schreber. *Sabulina* — Rchb. exc. *Als. tenuifolia* β . *viscosa* K. syn. *Alsinella viscosa* Hartmann. Sandige Orte, Sandfelder, stchw. im Geb., Rheing.,

Wfalz, Mainz, Coblenz, Bonn, Trier, Luxemburg, Sachfen bei Leipzig, Harz, Berlin, Schlefien, Preußen bei Thorn, Danzig; Destr. 2c. 5—6. ☉

22. *A. mediterranea* Maly enum. pl. austr. p. 295. *Arenaria* — Ledeb. DC. prodr. I. 406. *Ar. triandra* Schkr. *Sabulina mediterranea* Rchb. icon. f. 4918. In Dalmatien auf d. Infel Vefina. 5—6. ☉

115. *Cherleria* L. (X. 3.) Cherlerie. K. syn.

126. Rchb. exc. p. 783. Comp. I. 2. p. 100.

1. *Ch. sedoides* L. K. syn. *Alsine sedoides* Kittel. Feuchte Felfen d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Destr., bis in d. Lombardei. 7—8 4

116. *Moehringia* L. (X. 3.) Möhringie. K. syn.

126. Rchb. exc. p. 783—785. Comp. I. 2. p. 100.

1. *M. muscosa* L. K. syn. Var. β . *acifolia* Rchb. icon. Alpen u. Boralpen an etwas feuchten, fchattigen Orten, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Destr. bis in d. Lombardei u. Piemont, feltener außer d. Alpenzuge, Oberbaden, bei Triberg, Sachfen auf d. Saalgebirge und in d. Sudeten 2c. 6—7. 4

2. *M. Ponaë* Fenzl. K. syn. *Sabulina* — Rchb. exc. *Arenaria* — Rchb. pl. crit. *Ar. bavarica* L. Host. Felfen d. südl. Alpenkette, Steyermarf, Südtirol bei Brixen M. Baldo, Salzburg, Lombardei, Felttrifchen Alpen bei Bassano, Venedig. 5—6. 4

3. *M. polygonoides* M. et K. K. syn. *Sabulina* — Rchb. exc. *Arenaria* — Wulf. Jacq. *Ar. obtusata* All. ped. *Stellaria ciliata* Scopol. *Cerastium filifolium* Vest. Felfen d. Alpen im Gerölle, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Tyrol, Destr. bis in d. Lombardei u. nach Piemont. 6—7. 4

4. *M. sphagnoides* Bluff et Fgh. Comp. I. 2. *Sabulina* — Rchb. exc. *Ar. polygonoides* β . *nana* Gaud.

helv. Alpen in d. südl. Kette, Schweiz auf den Melener-Alpen; Tyrol im Binschgau. Rchb. 7—8. 4

5. *M. pendula* Fenzl. Comp. I. 2. *Arenaria* — W. et Kit. Rchb. exc. p. 791. Kalkfelsen in Ungarn, im Banat u. Siebenbürgen. 4—5. 4

6. *M. villosa* Fenzl. K. syn. *Arenaria* — Wulf. Jacq. Rchb. exc. Var. β . *glabrescens* Freyer. Alpen in Oberfrain am Porezen über Sarz. 6—8. 4

7. *M. diversifolia* Dolliner. K. syn. *M. heterophylla* Dollin. Rchb. icon. f. 4947. b. Schattige Kalkfelsen in d. südl. Alpenkette, Tyrol, Steyermark im Samßgraben bei Stainz, Krain längs d. Save bei Rosbach. 5—6. 4

8. *M. trinervia* Clairv. K. syn. *Arenaria* — L. Rchb. exc. Wälder, Gebüſche, feuchte, ſhattige Raine, an Quellen dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

117. *Arenaria* L. (X. 3.) Sandfraut. K. syn.

127. Rchb. exc. p. 791. Comp. I. 2. p. 105.

1. *A. Marschlinii* Koch K. syn. *Arenaria serpyllifolia* β . *alpina* Gaud. helv. Ar. *viscida* Hall. fil. Hochalpen an Gletscherränder, Schweiz auf d. Splügen, M. Getroz, Wallis über Zermatten um St. Moriz, Oberengadin; Tyrol an d. Wormser-Zoch, Solennferner. 7—8. ☉

2. *A. serpyllifolia* L. K. syn. *Stellaria* — Scop. Var. β . *glutinosa*: Ar. *viscida* Loisl. Sandhügel, Sandfelder, an Mauern im g. Geb. bis in d. Alpen. 7—8. ☉

3. *A. ciliata* L. K. syn. Var. α . Ar. *ciliata* Wulf. — β . *frigida*: Ar. *multicaulis* L. Wulf. Steinige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. bis ins südl. Geb. 7—8. 4

4. *A. gracilis* W. et Kit. Rchb. exc. Alpen im südl. Geb., Dalmatien, M. Biokovo u. in Croatien. 7. 4

5. *A. biflora* L. K. syn. Feuchte Felsen an Bächen d. Hochalpen an Gletscherränder, Schweiz, St. Bernhard, M. Fouly, M. Furka, Gotthard; Tyrol, Salzburg, Kärn-

then, Steyermark, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei u. Piemont. 7—8. 4

6. *A. grandiflora* All. pedm. K. syn. *Ar. juniperina* Vill. *Stellaria aculeata* Scopol. Felsige Gebirgswiesen mehr im südl. Geb., Destr. bei Wien, Südmähren auf d. Polauer-Bergen, Krain, Tyrol; Westschweiz im Jura, M. Chasseral, am Salève u. Suchet bei Genf; Dalmatien, Croatien, Lombardei. 5—7. 4

7. *A. montana* Rchb. exc. Felsen im südlichsten Geb. auf d. M. Turlo in d. Novarese u. in d. Gebirgen d. Bukowina. 5—6. 4

8. *A. thesiifolia* Froelich Rchb. exc. Alpen im Algau bei Füssen. 7—8. 4

9. *A. aggregata* Loisl. Rchb. exc. *Gypsophylla* — L. *Ar. tetraquetra* All. Im südlichsten Geb., Gebirge in Piemont a. d. Col di Tenda. 6—7. 4

118. *Holosteum* L. (III. 3.) Sparre. K. syn.

129. Rchb. exc. p. 783. Comp. I. 1. p. 210.

1. *K. umbellatum* L. K. syn. *Alsine* — DC. Var. β . *H. Heuffelii* Wierzbick. Rchb. icon. f. 4901. b. Hügel, Raine, Mauern, Wege, Felser dch. d. g. Geb. Var. β . im Banat. 3—5. ☉

119. *Stellaria* L. (X. 3.) Sternkraut. K. syn.

129. Rchb. exc. p. 784. Comp. I. 2. p. 105.

1. *St. viscida* M. v. Bieb. K. syn. *St. anomala* Rchb. exc. *St. dubia* DC. *Cerastium anomalum* W. et Kit. *Dichoton* — Rchb. icon. Trockene Triften, stchw. im Geb., Rheing., Oberbaden zw. Neuenberg u. Mühlheim, Obermosel zw. d. Grenze u. Meß, Schlesien; Destr. Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 5—6. ☉

2. *St. cerastoides* L. K. syn. *St. multicaulis* Willd. Host. *Cerastium triginum* Vill. *C. stellarioides* Hartm. *C. refractum* Allion. pedm. Feuchte Orte d. Granitalpen, beson-

ders in d. Hochalpenkette, Schweiz; Tyrol, Steyermark, Kärnthén bis in d. Lombardei, Piemont. 7—8. 24

3. *St. dichotoma* L. Moesler p. 763. Maly enum. pl. austr. p. 298. Bergwälder in Siebenbürgen. 5—7. 24

4. *St. nemorum* L. K. syn. *St. latifolia* Pers. non DC. *St. dichotoma* Roth. Feuchte Waldstellen, Gebüsch, Felsen bis in d. Boralpen, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., Elsaß dch. Baden, Pfalz bis Kreuznach, Trier, Luxemburg, Coblenz bis Bonn, Eifel bis Aachen u. 5—7. 24

5. *St. Reichenbachii* Wierzbick. Rechb. icon. f. 4906. b. Waldbüsch zw. Prigor u. Neubarlöven. Rechb. icon. 6—7. 24

6. *St. media* Vill. delph. K. syn. *Alsine* — L. Var. β . major: *St. neglecta* Weihe Rechb. exc. *St. umbrosa* Opitz. Felder, Acker, Gärten, Wegen u. im g. Geb. 2—12. ☉

7. *St. bulbosa* Wulf. K. syn. *St. dichotoma* Scop. In Hainen am Fuße alter Eichen; im südl. Geb., Tyrol, Steyermark bei Rothmannsdorf u. Lauzelsdorf, Krain bei Laibach. 4—5. 24

8. *St. Holostea* L. K. syn. Gebüsch, Wald- und Wiesenränder, Wege unter Hecken, dch. d. g. Geb., Rheing. häufig, seltener in d. Schweiz. 4—5. 24

9. *St. glauca* Withering. K. syn. *St. graminea* β . L. *St. palustris* Retz. Var. β . *St. Dilleniana* Moench. Rechb. exc. Feuchte Waldstellen, Wiesen, Seichränder, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten, Schweiz nur bei Basel; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Venedig. 5—7. 24

10. *St. spathulata* Rechb. icon. f. 4910. Maly enum. pl. austr. In Mähren an d. Quellen um Jamník. 6. 24

11. *St. graminea* L. K. syn. *St. arvensis* Hoppe. — Var. β . *St. brevisolia* Walth. Rechb. icon. Wiesen, Saune, Wege, Felldraine, Triften, Acker dch. d. g. Geb. 5—7. 24

12. *St. Frieseana* Sering. K. syn. *St. longifolia*

Fries. Rchb. exc. Grasige Orte in Nadelholzwäldern, stellw. im Geb., Holstein bei Lauenburg, Ostpreußen, Königsberg, Danzig u., Schlesien im Gesenke; Südtrol. 7—9. 4

13. *St. saxifraga* Bertolon. Rchb. exc. Auf der Apuanischen Alpe Sagro. 7—8. 4

14. *St. uliginosa* Murray K. syn. *Larbrea* — Rchb. exc. p. 567. *St. aquatica* Pollich. *St. Alsine* Reichard. *St. graminifolia* γ. L. *St. Dilleniana* Leers, *St. fontana* Wulf. *St. hypericifolia* Wigg. Wäldersümpfe, scharftige, sumpfige Wiesen, an Gräben, Quellen, Bächen, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

15. *St. crassifolia* Ehrh. K. syn. *Larbrea* — Rchb. exc. p. 567. *St. humifusa* Retz, *St. dichotoma* Wiggers. Nasse Torfwiesen mehr im nördl. Geb., Westphalen dch. Hannover nach, Hamburg, Brandenburg, Pommern, Preußen, Königsberg, Graubenz u., Oldenburg, Mecklenburg, Holstein u. Niederlausitz. 7—8. ○

16. *St. bracteata* Richter Fl. Lipz. *Larbrea* — Rchb. exc. p. 567. *St. helodes*. M. v. Bieb. In einem Bache in Sachsen, Burghausen unweit Leipzig. 5—6. 4

120. *Moenchia* Ehrh. (IV. 3.) Mönchie. K. syn.

131. Rchb. exc. p. 793. Comp. I. 1. p. 271.

1. *M. erecta* Fl. Wetter. K. syn. *M. quatrinnella* Ehrh. *M. glauca* Pers. *Sagina erecta* L. *Alsinella* — Moench. *Cerastium quatrinnellum* Fenzl. Feuchte, steinige Orte, Heiden, Triften, Hügel, Raine, stellw. dch. d. g. Geb., mehr im südl., Rheing. an vielen Orten, von Karlsruhe bis Mainz, Bingen, Kreuznach, Trier, Coblenz, Bonn, Köln, Aachen u.; Hamburg, Thüringen, Jena, Württemberg, Baiern, Sachsen; Böhmen, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombard. 4—5. ○

2. *M. mantica* Bartling. K. syn. *Malachium manticum* Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 131. *Cerastium* — L. *Stellariaca*. DC. — Grasige, feuchte Orte im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin, im Veltlin; Südtrol, Steyermark, Istrien,

Krain, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Verona im Walde del Mantica; Piemont. 5—6. ☉

121. *Malachium* Fries (X. 4) Weichmeier. K. syn. 132. Rchb. exc. p. 795. Comp. I. 2. p. 131.

1. *M. aquaticum* Fries. K. syn. *Cerastium* — *L. Stellaria* — ca. Scopol. Larbrea — Sering. in DC. prodr. Feuchte Gebüſche, Ufer, Bäche, Gräben, Teiche im g. Geb. 6—8. 4

122. *Cerastium* L. (X. 4.) Hornfraut. K. syn. 132. Rchb. exc. p. 795. Comp. I. 2. p. 132.

1. *C. brachypetalum* Desport. K. syn. *C. viscosum* Pollich. *C. barbulatum* Wahlenb. *C. strigosum* Fries. Hügel, Raine, Aſterränder, beſonders auf Sand, ſtellw. dch. d. Geb., Rheing., Bodensee, Elſaß dch. Baden, Breiſg., Carlsruhe, Durlach, Bergſtraße, Pfalz, Kaiſerslautern bis z. Donnersberg, Mainz, nach Kreuznach bis Trier, Coblenz, Bonn, Aachen, Württemberg, Baiern, Jena, Sachſen, Deſtr. 2c. 5—6. ☉

2. *C. glomeratum* Thuill. K. syn. *C. viscosum* L. spec. *C. vulgatum* L. Rchb. exc. Host. *C. ovale* Pers. *C. viscosum* Fries. *C. rotundifolium* Hoppe. Var. β . *C. apetalum* Du Mort. Raine, Ufer, Triſten, Felder 2c. dch. d. g. Geb. 5—8. ☉

3. *C. pumilum* Curt. Fl. Lond. F. Schultz. *C. aggregatum* Dürren. F. Schultz. Fl. Gal. et Germ. exsicc. 240. Glimmerſchiefer in Baiern bei Aſchaffenburg (Rittel). 4—6. ☉

4. *C. glutinosum* Fries. K. syn. *C. pumilum* M. et K. Rchb. exc. K. syn. edit. I. *C. Lenzii* Schultz. Fl. d. Pfalz, *C. Grenieri* Schultz. Fl. exsicc. *C. semidecandrum* Pers. *C. ovale* Bess. Var. α . *C. obscurum* Chaubard. *C. Grenieri* α . *obscurum* Schultz. — β . *C. Grenieri* β . *pallens* F. Schultz. *C. alsinoides* Loisl. Pers. syn. Felsen, unangebaute Orte, Weinberge, Triſten,

Brachfelder, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., auf d. Tertiär-
 falke d. Pfalz bei Callstadt, Dürkheim, Kreuznach, Saar-
 brücken, Trier, Coblenz, Bonn 2c., Württemberg, Baiern,
 Sachsen, Preußen, Schlesien; Destr. Böhmen, Steyermark,
 Kärnthen, Tyrol, Krain, Combarbei. 4—5. ☉

5. *C. semidecandrum* L. K. syn. *C. viscidum*
 Link. *C. viscosum* Pers. *C. pellucidum* Schaub. Var. β .
 glaberrima: *C. macilentum* Aspegren Rchb. pl. crit. San-
 bige Hügel, Raine, Aecker im g. Geb. Var. β . In Mecklen-
 burg bei Güstrow. 4—5. ☉

6. *C. tetrandrum* Curtis Lond. K. syn. in adnot.
Esmarchia cerastoides Rchb. exc. p. 793. *Sagina* — Smith.
 An d. Küste d. Nordsee, d. Inseln Manoe u. Eyst. 5—6. ☉

7. *C. triviale* Link. K. syn. *C. vulgatum* L. Wahlenb. *C. viscosum* L. herb. Host. Var. β . *C. vulgatum*
 β . *helosteoides* Fries. — δ . *alpinum* Sturm. Ufer, Tristen,
 Wiesen, Felber, Brachäcker; dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen.
 5—9. ☉ u. ☉

8. *C. campalunatum* Viviani K. syn. *C. praecox*
 Tenore. Hügel, Felber im südl. Geb., Schweiz Cant. Val-
 lis; Dalmatien, Combarbei, Verona, Mantua, Piemont Ge-
 nua. 4—5. ☉

9. *C. illyricum* Arduin. Rchb. exc. *C. pilosum*
 Sibth. In Dalmatien. 7—9. ☉

10. *C. sylvaticum* W. et Kit. K. syn. Feuchte
 Wälder, besonders im südl. Geb., Ostpreußen, Kreuzburg,
 Einkehner Wald bei Kapheim; Destr. Mauerbach bei Wien,
 Böhmen, Steyermark bei Marburg, Istrien, Krain Tsong-
 thal, Triest, Südtirol, Croatien, Dalmatien, Galizien, Un-
 garn, Siebenbürgen, Venedig. 6—8. ☉

11. *C. latifolium* L. K. syn. Var. β . *glabriusculum*.
C. latifolium glabratum Sturm. — γ . *grandifolium* Sturm.
C. latifolium γ . *intermedium* Gaud. helv. *C. flexuosum*
 Hegestschl. — δ . *glaciale*: *C. glaciale* Gaud. in DC. Sturm.
C. latifolium δ . *subacaule* Gaud. helv. *C. uniflorum* Murr.
 — ϵ . *pedunculatum*: *C. pedunculatum* Gaud. Rchb. exc.

C. filiforme Schleicher. Hochalpen im Gerölle an Gletscher-
rändern, Schweiz u. dch. d. g. südl. Alpenkette nach Tyrol,
Oestr. u. 7—8. 4

12. *C. alpinum* L. K. syn. *Centunculus alpinus* Sco-
poli. Var. β . *glutinosum* K. syn. *C. Soleirolii* Sering. Alpen
u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette; Schlesien
auf d. Babia Gora u. mit d. Isar nach München. 5—8. 4

13. *C. lanatum* Lamk. Rchb. exc. *C. alpinum* γ .
lanatum K. syn. *C. alpinum* Wulf. Jacq. coll. *C. erio-*
phorum Kit. *C. villosum* Baumg. transylv. Hochalpen,
Schweiz Cant. Wallis im Nicolai- u. Saasthale u. auf d.
Simplon; Kärnthen, Carpathen, Ungarn, im Banat, Sieben-
bürgen. 7—8. 4

14. *C. ovatum* Hoppe. K. syn. *C. carinthiacum*
Vest. Rchb. icon. f. 4977. Bachgerölle u. Rieß d. Hochal-
pen, Kärnthen, Steyermark, Krain, Littoral, Istrien u. 6—8. 4

15. *C. arvense* L. K. syn. *Centunculus arvensis*
Scopoli. *Cerast. polymorphum* Schltz. Fl. d. Pfalz. Var.
 β . *C. strictum* Haenke. — γ . *C. suffruticosum* L. M. et
K. *C. strictum* DC. *C. laricifolium* Vill. Rchb. exc. Son-
nige Hügel, Rhine, Wegeränder, Felder u. Brachäcker dch.
d. g. Geb. bis in d. Alpen, Var. β . auf d. Alpen, Var. γ .
in Südtirol u. in Ungarn. 4—7. 4

16. *C. ciliatum* W. et Kit. Rchb. exc. *C. matrense*
Kitaib. op. Spreng. Alpen u. Boralpen, in Istrien, Dal-
matien u. Croatien. 7—8. 4

17. *C. tomentosum* L. K. Taschb. p. 73. Rchb.
exc. *C. repens* L. K. syn. Rchb. exc. Lejeun. DC. prodr.
Sonnige Orte, Mauern, stchw. besonders im südl. Geb.,
Rheing., Belgien, Limburg bei Cuxen, an d. Grenze bei
Aachen, Lüttich; Luxemburg bei Ansembourg; Schweiz Cant.
Baadt u. Wallis, Val d'Aost; Tyrol, Krain, Dalmatien,
Siebenbürgen, Lombardei. 5—6. 4

18. *C. insubricum* Moretti. Rchb. exc. Schattige
Wälder, Lombardei bei Pavia. 5—6. 4

19. *C. grandiflorum* W. et Kit. K. syn. *C. te-*

nusfolium Vivian. C. argenteum M. v. Bieb. Var. β . glabrum: C. banaticum Rochel. Alpen in Steyermark an d. Hohenschwab; Dalmatien, Croatien, Ungarn, im Banat. 7—8. 4

Funfzehnte Ordnung. Elatineen.

Cambessed. K. syn. 137. K. Taschb. 94. Lythrarieae pars Rehb. exc. p. 639.

123. Elatine L. (VIII. 4.) Tännel. K. syn. Rehb. exc. Comp. I. 2. p. 34.

1. E. major Al. Braun. Syll. soc. ratish. I. p. 83. Rehb. exc. p. 639. M. et K. III. B. p. 69. E. Hydropiper. DC. Fl. fr. Var. α . E. paludosa β . octandra Seubert in Walp. Rep. I. B. 284. Teichränder in d. Lombardei. 7—8. ☉

2. E. hexandra DC. K. syn. E. Hydropiper Lin. spec. E. paludosa Seubert, E. tripetala Smith. An stehendem Wasser, im Sande u. Schlamm, stellw. im Geb., Rheing., Baden im Breisg. auf d. faulen Wang, Kehler-Kinzigbrücke, Karlsruhe bei Scheibhardt, Elsaß, Pfalz v. Worms bis Kaiserslautern, Bitsch nach Saarbrücken, Eifel im Gillensfelder u. Pulver-Maar, Flora v. Trier, Eöln, bei Mühlheim, Flora v. Aachen, Raeren; Hamburg, Wittenberg, Lausitz, Regensburg; Oestr. Krain, Lombardei. 6—8. ☉

3. E. triandra Schkr. K. syn. Stehende Wasser, Fischteiche im Schlamm u. im Wasser, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Baden im Breisg. an d. faulen Waag, bei Kehl, Karlsruhe, Friedrichsfeld am rothen Loch; Mühlheim bei Eöln; Wittenberg, Lausitz, Regensburg, Steyermark, Pöls bei Grätz, Ungarn, Siebenbürgen. 6—8. ☉

4. E. Hydropiper L. Fl. succ. K. syn. E. Schkuhriana Drev. et Hayne. Uberschwemmte, feuchte Orte, an Teichen, Ufern, stellw. dch. d. Geb., Rheing., bei Bregenz, Baden Constanz, Karlsruhe bei Rork, Friedrichsfeld, Mannheim, Oppenheim, Aßheim, Eöln, Eurenburg, Schwaben,

Baiern, Wetterau, Sachsen, Hamburg, Holstein, Ostpreußen Danzig, Königsberg 2c, Schlessien; Destr. Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 6—8. ☉

5. *E. Alsinastrum* L. K. syn. Ueberschwemmte Orte, Teiche, Gräben, stchw. dch. d. Geb., Schwaben, Rheing. Elsaß, Baden im Breisg., Friedrichsfeld, Mannheim, Trier, zw. Deuß und Brück bei Cöln, Westphalen, Hamburg, Sachsen, Ostpreußen bei Thorn, Graudenz, Schlessien; Destr. Syrol, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. ☉

Sechzehnte Ordnung. Lineen.

De Cand. K. syn. 137. K. Taschb. 94. Rehb. exc.
Hypericin. pars p. 831.

124. *Linum* L. (V. 5.) Lein. K. syn. 138. Rehb. exc. p. 831. Comp. I. p. 544.

1. *L. gallicum* L. K. syn. Rehb. exc. *L. aureum* W. et Kit. *Cathartolinum gallicum* Rehb. icon. Brachfelder, Aefferränder im südl. Geb., Krain, Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei, Venedig, Genua, Piemont u. Oberitalien. 6—7. ☉

2. *L. corymbulosum* Rehb. exc. K. syn. *L. aureum* DC. *L. gallicum* Sm. Fl. gr. *Cathartolinum corymbulosum* Rehb. icon. Hügel im südl. Vittoral, Istrien, Triest, Fiume, Dalmatien, Ungarn. 6—7. ☉

3. *L. strictum* L. K. syn. Rehb. exc. *Cathartolinum* — Rehb. icon. Sandboden, Aecker im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien, Piemont, Nizza 2c. 6—7. ☉

4. *L. nodiflorum* L. K. syn. Rehb. exc. *L. liburnicum* Scopol. *L. luteolum* M. v. Bieb. *Xantholinum nodifl.* Rehb. icon. Weingärten, Brachfelder im südl. Vittoral, Istrien, an d. Stramare bei Triest, Insel Cherso, Dalmatien, Lombardei, Venedig, bei Verona. 6—7. ☉

5. *L. maritimum* L. K. syn. Rehb. Am Strande d. südl. Vittorals Istrien bei Triest, Monfalcone, Dalmatien,

Croatien, Lombardei an d. Quellen d. Euganeen, Venedig, Genua, Nizza. 8—9. 4

6. *L. campanulatum* L. Rchb. exc. *L. glandulosum* β . DC. prodr. *Xantholinum campanul.* Rchb. icon. In Piemont, Ligurien. 6—7. 4

7. *L. capitatum* Kitaib. Rchb. exc. *L. glandulosum* δ . DC. *L. serrulatum* Bertoloni, *Xantholinum capitatum.* Rchb. icon. In Croatien auf d. Alpe Plissivicza. 4

8. *L. flavum* L. K. syn. Rchb. exc. *Xantholinum* — Rchb. icon. Var. β . *L. tauricum* Willd. *L. campanulatum* M. v. Bieb. Bergwiesen, sonnige Hügel, besonders im südl. Geb., Würtemberg bei Ulm hinter d. Wannen am Rienles u. Eselsberg bei Höfingen u. an d. Weilersteig bei Blaubeuren; Baiern; Destr. bei Wien, Brunn, Baden, Böhmen, Mähren, Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Krain, Galizien, Ungarn u. im g. süblichen Eittoral. 7—8. 4

9. *L. hirsutum* L. K. syn. Rchb. exc. Grasige Hügel, Wiesen mehr im südl. Geb., Destr. bei Wien, Mähren, Steyermark, Tyrol, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Genua. 6—7. 4

10. *L. viscosum* L. K. syn. Rchb. exc. *L. sylvestre* Scopol. Gebirgswiesen, Triften, Weinberge, besonders im südl. Geb., Oberbaiern bei Augsburg, München bis Salzburg; Destr. Kärnthen, Tyrol, Krain, Istrien, Croatien, Dalmatien bis Venedig. 6—7. 4

11. *L. tenuifolium* L. K. syn. Rchb. exc. Sonnige Hügel, Raine, Ackerländer, besonders auf Kalk, stellw. δ h. d. g. Geb., mehr im süblichen; Rheing., v. d. Schweiz δ h. Baden bei Durlach, Wiesloch, Elsaß, Pfalz, Dürkheim, Worms bis Mainz, Kreuznach, Trier, Coblenz, Aachen, Luxemburg; δ h. g. Mitteldeutschland; Destr. in allen Provinzen bis in d. Lombardei u. nach Venedig u. 6—7. 4

12. *L. suffruticosum* L. *Cathartolinum* — Rchb. icon. f. 5165. b. In d. Lombardei am Cap Noli, Piemont, Genua. 7. 4

13. *L. usitatissimum* L. K. syn. Rchb. exc. Var.

β. crepitans: *L. humile* Miller Rchb. exc. *L. sativum* Bauhin. Allgemein, besonders im Berggebiet angepflanzt, u. verwildert. 7,—8. ☉

14. *L. scribrosum* Rchb. icon. f. 5158. b. Triften am südl. Eittoral, Istrien v. Pola nach Berruda. 7. ☉

15. *L. perenne* L. K. syn. Rchb. exc. *L. austriacum* Pollich. *L. anglicum* Miller, *Adenolinum perenne* Rchb. icon. Hügel, Sandfelder, stellw. im Geb., Rheing. zw. Darmstadt u. Benzheim, Frankfurt am Schwengelbrunnen; Baiern; Dalmatien, Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. 4

16. *L. alpinum* Jacq. K. syn. Rchb. exc. *L. alpinum β. Bertolon* *Adenolinum alpinum* Rchb. icon. Var. *β. montanum*: *L. montanum* Schleich. *L. bavaricum* Fr. Schultz bot. Z. *L. perenne* Allion. pedm. *L. laeve* Scopol. *L. narbonense* Suter helv. Triften d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. stellw. besonders dch. d. g. südl. Alpenkette nach Tyrol, Destr. bis in d. Lombardei; dann auf Wiesen d. Niederungen im Süden, Var. *β.* auch bei München u. Regensburg. 6—7. 4

17. *L. Leonii* Fr. W. Schultz (non Schtz. bip.) Rchb. icon. f. 5159. *L. montanum* Hollander Fl. de la Mosell. Ralkhügel im nahen Lotharingen bei St. Michael etc. 6—7. 4

18. *L. Tommasinii* Maly enum. pl. austr. p. 328. *Adenolinum* — Rchb. icon. f. 5156. a. Am südl. Eittoral, Monte Spaccato bei Triest. 6—7. 4

19. *L. austriacum* L. K. syn. Rchb. exc. *Adenolinum* — Rchb. icon. Bergheiden, Hügel, an Wegen im südl. Geb., Rheing. an d. Felsen d. Godesberger Schlosses bei Bonn; Destr. Böhmen, Mähren, Krain, Eittoral, Istrien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. 4

20. *L. marginatum* Poir. Rchb. exc. *L. austriacum*. Bot. Mag. *L. squamulosum* Rud. *L. barbulatum* Lang. Sonnige Felsen in Dalmatien, Ungarn bei Carofsz. 6. 4

21. *L. angustifolium* Hudson. K. syn. *L. tenuifolium* L. Steinige Hügel am südl. Littoral, Destr. Südkrain, Istrien, Dalmatien, Kombardei, Venedig, Ligurien; 6—7. 4

22. *L. narbonense* L. K. syn. *L. laeve* Rehb. exc. non Scopoli. Bergwiesen, grasige Orte im südl. Geb., Krain, Littoral, Dalmatien, Croatien, Kombardei, Venedig, Verona, Piemont M. Baldo u. 6—7. 4

23. *L. nervosum* W. et Kit. Rehb. exc. Waldwiesen, Ungarn M. Mofra im Banat, Siebenbürgen. 5. 4

24. *L. hologynum* Rehb. exc. et icon. Ungarn im Banat auf d. Domuglett-Berge. 7. ☉ u. 4

25. *L. catharticum* L. K. syn. Rehb. exc. *Cathartolinum pratense* Rehb. icon. Wiesen, Triften, grasige Orte stchw. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

125. *Radiola* Gmel. (IV. 4.) Zwergflachs, Strahlfraut. K. syn. 141. Rehb. exc. p. 831. Comp. I. 1. p. 274.

1. *R. linoides* Gmel. K. syn. *R. millegrana* Smith. Rehb. exc. *Linum Radiola* L. Sandige, etwas feuchte Orte, Triften, Wiesen, Heiden, Aecker, stchw. dch. d. g. Geb. bis in d. Norden u. Süden; Rheing. v. d. Schweiz dch. Elsass, Baden, Pfalz bis Trier, Luxemburg, Coblenz, Bonn, Köln, Aachen u. 7—8. ☉

Siebenzehnte Ordnung. Malvaceen.

Brow. K. syn. 141. K. Taschb. 97. Rehb. exc. p. 770. et icon. t. 165—182. f. 4830—62.

126. *Malope* L. (XVI. 8.) Malope. Rehb. exc. p. 770. Comp. II. p. 115.

1. *M. malacoides* L. Rehb. exc. Steinige Orte in Dalmatien. 6—7. ☉

2. *M. althaeoides* Morison. Comp. II. p. 115. Aecker in Dalmatien bei Trau. 5. ☉

127. *Kitaibelia* Willd. (XVI. 8.) Kitaibelie.

Rchb. exc. p. 771. Comp. II. p. 116.

1. *K. vitifolia* Willd. Rchb. exc. Sumpfige Orte in Ungarn, Slavonien, im Comitat Syrmien. 6—7. 4

128. *Malva* L. (XVI. 8.) Malve. K. syn. 141.

Rchb. exc. p. 771. Comp. II. p. 116.

1. *M. Alcea* L. K. syn. Var. β . *multidentata*: *M. italica* Pollini Rchb. exc. — γ . *excissa*: *M. excissa* Rchb. icon. Sonnige Hügel, Raine, Wege, stchw. dch. d. g. Geb. Var. β . Rheing. im Naheethale, auch an Kalkfelsen bei Trier, in Südtirol bei Bogen, Italien. 6—7. 4

2. *M. fastigiata* Cavanill. Koch. Deut. Fl. IV. p. 41. Rchb. icon. f. 4844. b. *M. Alcea* β . *fastigiata* K. syn. Hügel, Saune, besonders im südl. Geb., Rheing. an einem Kalkfelsenabhange oberhalb Tgel an d. Grenze v. Luxemburg unweit Trier, Flora v. Spa, Schweiz bei Bregenz; Destr. Tyrol im Etschthale bei Brentonico, Krain. 7—8. 4

3. *M. Morenii* Pollin. Fl. veron. Rchb. exc. et icon. Schattige Orte in d. Lombardei, M. Pastello bei Dolce im Veronesischen, bei Venedig. 7—8. 4

4. *M. Bismalva* Bernh. Rchb. exc. et icon. *M. decumbens* Host. Fl. austr. Im südl. Geb., Belgien bei Theux, Krain auf d. Sanzberg. 7—8. 4

5. *M. moschata* L. K. syn. Var. β . *M. laciniata* Lamk. Fl. fr. Hügel, Wege, Raine, Aderländer; stchw. dch. d. g. Geb., besonders im südl. u. westlichen; Schweiz u. dch. d. g. Rheinthal u. Nebenthäler bis zur Mosel u. Maas, Würtemberg, Hessen, Nassau, Westphalen, Hamburg, Thüringen, Baiern Regensburg, Destr. Krain bis in d. Lombardei. 7—8. 4

6. *M. sylvestris* L. K. syn. *M. orbicularis* Dethar. *M. vulgaris* Tenore. Var. β . *parviflora*: *M. nicaeensis* Nees. Ufer, Raine, Mauern, Schutt, Brachäcker dch. d. d. g. Geb. Var. β . Altenahr bei Bonn. 7—9. ☉

7. *M. nicaeensis* Allion. pedm. K. syn. Wege, Schutt im südl. Geb., Istrien bei Pola, Dalmatien, Nizza, Venedig. 7—8. ☉

8. *M. mauritiana* L. Rchb. exc. Gartenland, Felder, Schutt verwilbert, stellw. besonders im südl. Geb. 7—9. ☉

9. *M. littoralis* Dethar. Rchb. exc. et icon. Sandige Küste d. Ostsee bei Warnemünde. 7—8. ☉

10. *M. crispa* L. Desf. Rchb. exc. Ackerland, Schutt, in Ungarn um Késthely u. stellw. im Geb. verwilbert. 7—8. ☉

11. *M. microcarpa* Rchb. exc. *M. parviflora* Allion. non L. Acker in Piemont, bei Nizza. 6—7. ☉

12. *M. vulgaris* Tragus. K. syn. p. 440. K. Taschb. 98. *M. rotundifolia* Pollich (non Lin.) *M. neglecta* Wallr. Cultivirte Orte, Raine, Wege, Mauern, Schutt; im g. Geb. 6—10. ☉

13. *M. borealis* Wallmann. K. syn. *M. rotundifolia* Lin. Fries. nov. *M. parviflora* Hudson. *M. pusilla* Wither. *M. Henningii* Goldb. Cultivirte Orte, Wege, Schutt, stellw. v. Westphalen dch. d. nördl. Geb., Hamburg nach Preußen, Ostsee, Schlesien, Thüringen; Destr. Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen, Lombard. 6—10. ☉

129. *Althaea* L. (XVI. 8.) Eibisch. K. syn. 143. Rchb. exc. p. 773. Comp. II. p. 120.

1. *A. officinalis* L. K. syn. Feuchte, besonders salzführende Wiesen, an Salinen u. an d. Seeküsten, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Bodensee bei Friedrichshafen, Pfalz bei Dürkheim, Wetterau bei Nauheim, Nassau bei Eoden bis zum Niederrheine, dch. Westphalen nach Mecklenburg, Berlin, Lausig, Sachsen, Thüringen, Schwaben; Schweiz; Destr. Krain bis in d. südl. Vittoral. 7—8. 4

2. *A. taurinensis* DC. Rchb. exc. *A. officinalis* β .

Willd. Hügel im südlichsten Geb., Piemont bei Turin u. in Sardinien. 7—8. 4

3. *A. cannabina* L. K. syn. Unter Gebüsch, an Zäunen, Gräben, im südl. Geb., Destr. Krain, Littoral, Istrien bei Duino, Fiume, Dalmatien, Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Piemont. 7—8. 4

4. *A. hirsuta* L. K. syn. *Malva setigera* Spenn. Fl. Frib. Aecker, Weinberge auf Kalk u. Thonboden stellw. dch. d. Geb., Schweiz Cant. Waadt, Wallis; Rheing., Oberelsaß, Oberbaden, Württemberg bis Wertheim, Rheinpfalz bis Saarbrücken, im g. Rhenothale, Kreuznach, Meisenheim, Oermosel bei Trier, Thüringen bei Eisenach, Baiern; Destr. Krain, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

5. *A. narbonensis* L. DC. prodr. I. p. 436. Maly enum. pl. austr. p. 311 et 396. Jacq. icon. t. 138. In d. Lombardei. 7—8. 4

6. *A. pallida* W. et Kit. K. syn. Hügel, Weingärten, Aecker, Weger im südl. Geb., Destr. Soos bei Wien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Verona. 7—8. ☉

7. *A. rosea* Cavanill. Rchb. exc. *A. sinensis* Cavan. *Alcea rosea* L. Aus d. Orient; Siebenbürgen u. Piemont bei Nizza; auch allgemein in Gärten angepflanzt u. aus diesen entflohen, stellw. im Geb. verwildert. 7—8. ☉

130. *Lavatera* L. (XVI. 8.) *Lavatre*. K. syn.

144. Rchb. exc. p. 773. Comp. II. p. 122.

1. *L. trimestris* L. Rchb. exc. Olivengärten in Ligurien, um Genua. 7—8. ☉

2. *L. Olbia* L. Rchb. exc. Olivengärten in Westligurien zw. Massis u. Albenga 6—7. 5

3. *L. thuringiaca* L. K. syn. Weinberge, Waldränder, Wege stellw. im Geb., Westphalen bei Hörter, Thüringen, Barby, Helmstedt, Jena, Weimar, Sachsen, Schle-

sien; Destr. Mähren, Vittoral Istrien, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

4. *L. punctata* Allion. pedm. Rechb. exc. Olivengärten in Westligurien. 6—7. ☉

5. *L. maritima* Gouan. Rechb. exc. *L. rotundifolia* Lamk. *L. hispanica* Miller. Felsen am südlichsten Vittoral, Piemont, Nizza, Ligurien z. Finali u. Noli. 6—7. 5

6. *L. arborea* L. Rechb. exc. Felsen am südl. Vittoral, Dalmatien; Piemont, Nizza. 7—9. ☉

7. *L. cretica* L. DC. prodr. I. 439. Jacq. I. t. 41. Maly enum pl. austr. p. 311 et 396. In Dalmatien. 6—7. ☉

131. *Pavonia Cavanill.* (XVI. 8.) Pavonie. Rechb. exc. p. 774.

1. *P. pentacarpos* Rechb. exc. *Hibiscus* — Lin. Comp. II. p. 124. Sumpfige Aecker im südl. Geb., Destr. Krain im Chiadin-Thale, Venedig an d. Piave. 7—8. 4

132. *Hibiscus* L. (XVI. 8.) Hibiskus. K. syn. 144. Rechb. exc. p. 774. Comp. II. p. 124.

1. *H. Trionum* L. K. syn. *Ketmia* — Scopol. Ackerland, Wege im südl. Geb., Destr. Mähren, Tyrol Steyermark, Vittoral Istrien, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

2. *H. roseus* Thore. Rechb. exc. *Ketmia rosea* Zannichell. In Sümpfen in d. Lombardei bei Mantua u. am Ausfluß d. Piave bei Venedig. 7—8. 4

133. *Abutilon* Dill. Tournef. (XVI. 8.) Samtpappel. K. syn. in add. 440. Rechb. exc. p. 771. Comp. II. p. 124.

1. *A. Avicennae* Gaertn. K. syn. *Sida Abutilon*. L. Feuchte Orte, Weingärten, Gräben, Wege im südl. Geb. Schweiz im Beltlin bei Pergamo; Destr. Vittoral Istrien,

Insel Beglia, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardien, Venedig bei Treviso; Piemont. 6—8. ☉

Achtzehnte Ordnung. Tiliaceen.

Juss. K. syn. 144. K. Taschb. 99. Rchb. exc. p. 828.
et icon. t. 311—324. f. 5137—50.

134. *Tilia* L. (XIII. 1.) Linde. K. syn. Rchb. exc.
Comp. I. 2. p. 252.

1. *T. grandifolia* Ehrh. K. syn. *T. platyphyllos* Scopol. DC. prodr. Rchb. exc. *T. europaea* β. et ε. L. *T. communis* γ. Spenn. *T. cordifolia* Bess. *T. pauciflora* Hayne. *T. corallina* Aiton. *T. rubra* DC. *T. mollis* Spach. Walp. Rep. Laubwälder, besonders im g. südl. u. mittleren Geb. bis in d. Boralpen; auch bei Hamburg. 6—7. ☯

2. *T. parvifolia* Ehrh. K. syn. *T. ulmifolia* Scopol. *T. microphylla* Willd. *T. europaea* α. L. *T. cordata* Mill. *T. hybrida* Bechst. *T. sylvestris* Desf. Var. β. *polyantha*: *T. parvifolia* Hayne. — γ. *intermedia*: *T. vulgaris* Hayne. *T. intermedia* DC. *T. europaea*. L. Smith. Rchb. exc. Wälder bch. d. g. Geb. 7. ☯

3. *T. vitifolia* Host. Austr. Rchb. exc. Gebirgswälder, Ungarn im Banat. 6. ☯

4. *T. argentea* Desfont. Rchb. exc. *T. alba* W. et Kit. *T. rotundifolia* Vent. *T. tomentosa* Mnch. *T. communis* ζ. Spenn. *T. petiolaris* DC. *T. pannonica* Jacq. Wälder im südl. Geb., Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. ☯

Neunzehnte Ordnung. Hyperiniceen.

DC. K. syn. 146. K. Tschb. 100. Rchb. exc. p. 836.
et icon. t. 342—352. f. 5176—92.

135. *Androsaemum* Allion. (XVIII. 1.) Grundheil. K. syn. Rchb. exc. p. 839. Comp. II. p. 267.

1. *A. officinale* All. K. syn. *A. vulgare* Gaertn. Hyperic. *Androsacum* L. Var. β . *grandifolium* Hyp. *grandifolium* Schoisy. *A. Webbianum* Spach. Feuchte Orte, an Bächen d. Gebirge, im südl. Geb., Schweiz Cant. Valais bei Sitten, Cant. Tessin bei Lugano; Südtirol, Krain, Lombardei, bei Como, Piemont, Genua, Nizza; Var. β . Südtirol, M. Baldo. 6—7. 4

136. *Hypericum* L. (XVIII. 1.) Hartheu. K. syn.

146. Rchb. exc. p. 836. Comp. II. p. 262.

1. *H. perforatum* L. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *latifolium*: *H. commutatum* Nolte Rchb. exc. *H. medium* Peterm. Wälder, Haiden, Raine, Wiesen, Wege, im g. Geb.; Var. β . in Lauenburg u. in Sachsen zc. 7—9. 4

2. *H. veronense* Schrank K. syn. in add. 440. *H. perforatum* β . *angustifolium* K. syn. 146. Rchb. exc. Sonnige Orte, an Wegen mehr, im südl. Geb., Rheing., im Hardtwalde zw. Karlsruhe u. Graben, bei Heidelberg, Pfalz am Hardtgeb., sonnige Kalkfelsen bei Trier, Schweiz Cant. Waadt über Ber; Südtirol u. am g. Eittoral, Istrien, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

3. *humifusum* L. K. syn. Var. β . *nanum*: *H. Liotardi* Villars. Sandige Haiden, Triften, Felder, stellenw. dch. d. g. Geb.; Var. β . nach d. Ernte auf Saatäcker. 6—9. 4

4. *H. quadrangulum* L. K. syn. *H. dubium* Leers, *H. maculatum* All. pedm. *H. delphinense* Villars. *H. Leersii* Gmel. bad. *H. obtusum* Mnch. *H. fallax* Grim. Waldtriften, Wiesen, Ufer an Quellen u. etwas feuchten, schattigen Orten, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

5. *H. tetrapterum* Fries. K. syn. *H. quadrangulum* Crantz Sm. *H. quadrangulare* Willd. *H. quadrialatum* Wahlenb. *H. acutum* Mnch. Rasse Wiesen, Gräben, Ufer, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

6. *H. crispum* L. Rchb. exc. Alpen in Piemont a. d. M. Genis. 7—8. 4

7. *H. barbatum* Jacq. K. syn. Waldwiesen im südl.

Geb., Destr. Mauerbach bei Wien, Steyermark bei Marburg, Ungarn. 5—6. 4

8. *H. Richeri* Villars. K. syn. *H. fimbriatum* Lamrk. Var. β . *H. androsaemifolia* Vill. *H. alpinum* W. et Kitaib. Hochalpen, Schweiz im Jura, M. Chasseral, Dolaz; Destr. M. Schneeberg, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont M. Genis. 7—8. 4

9. *H. elegans* Stephan. K. syn. *H. Kohlianum* Spreng. Sonnige Bergstellen, Weinbergen, stellw. im Geb., Bannstädt u. Adlme bei Halle, Erfurt bei Schwellenburg, Tosmarberg bei Hildesheim, Sachsen, Böhmen, Mähren bei Ezeitsch, Littoral, Istrien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. 4

10. *H. pulchrum* L. K. syn. *H. elegantissimum* Crantz. Gebirgswälder, Berghaiden, Gebüsche, stellw. dch. d. Geb., Schweiz, Rheing. von Basel dch. Elsaß, Faden, Schwarzwald, Odenwald, Heidelberg, Pfalz nach d. Saar u. Moselgegend bis in d. Niederlanden, Westphalen nach Hamburg, Hessen, Thüringen, Harz, Sachsen, Baiern; Destr. Mähren, Krain, Dalmatien, Croatien, Ungarn. 7—9. 4

11. *H. montanum* L. K. syn. Var. β . *scabrum*. Gebirgswälder, Gebüsche, dch. d. g. Geb. 6—8. 4

12. *H. hirsutum* L. K. syn. *H. villosum* Crantz. Wälder, Gebüsche, stellw. dch. d. g. Geb. 6—8. 4

13. *H. nummularium* L. Rehb. exc. Gebirgsstellen in Savoyen, M. Grenier bei Chambray. 7—8. 4

14. *H. tomentosum* Rehb. exc. Stehende Wasser, in Gräben, im südlichsten Geb., Piemont bei Nizza. 7—8. 4

15. *H. Coris* L. K. syn. *H. multicaule* Lamrk. Felsige Orte d. südl. Boralpen, stellw. Schweiz, Cant. Glarus, M. Weggis, Südtirol oberhalb Cel gegen d. Joch la Breca Roveredo gegenüber, Genua. 7—8. 3

16. *H. elodes* L. K. syn. *Elodes palustris* Spach. Rehb. icon. Torfgründe, Moorniesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Frankfurt a. M., Darmstadt, Bonn bei Siegburg, Eöln bei Schlebusch, Luxemburg bei Etalle, Düsseldorf nach

Westphalen, Hannover, Jever, Verden, Unteröstr. bei Lilienfeld 2c. 8—9. 4

Zwanzigste Ordnung. Acerineen.

DC. K. syn. 148. K. Tschb. 102. Sapindaceae pars Rchb. exc. p. 769.

137. *Acer* L. (VIII. 1.) Ahorn. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 22. et icon. t. 162—64. f. 4824—4829.

1. *A. Pseudoplatanus* L. K. syn. Gebirgswälder, stellw. dch. d. Geb., bis in d. Boralpen. 5. ‡

2. *A. opulifolium* Vill. K. syn. *A. Opulus* Aiton. Rchb. exc. DC. *A. vernum* Reyn. *A. italicum* Lauth. *A. rotundifolium* Lamrk. Wälder am Fuße d. südl. Alpen, Schweiz Cant. Wallis bei Sitten, Cant. Waadt; Oestr. Vitoral, Istrien bei Pisino, Lombardei. 3—4. ‡

3. *A. obtusatum* Kitaib. Rchb. icon. *A. Opulus* β. *obtusatum* Rchb. exc. *A. neapolitanum* Tenore neap. *A. opulifolium* β. *tomentosum* K. syn. Steinige, bewachsene Orte im südl. Geb. in Dalmatien, Croatien. 3—4. ‡

4. *A. platanoides* L. K. syn. Var. β. *palmatifidum* Tausch. — γ. *laciniatum*: *A. crispum* Willd. Wälder d. Geb. u. Ebenen, stellw. dch. d. Geb. 4—5. ‡

5. *A. campestre* L. K. syn. *A. austriacum* Tratt. *A. molle* Opitz, *A. hebecarpum* et *microcarpum* Tausch. Laubwälder, Gebüsche, Hecken, Bäume, im g. Geb. 5. ‡

6. *A. monspessulanum* L. K. syn. *A. trilobatum* Lamrk. *A. illyricum* Jacq. fil. Sonnige Gebirgsabhänge, Felsen, Weinberge, mehr im südl. Geb., Rheing., vom Donnersberg stellw. bis z. Nahe, Bingen u. in allen Rheingeb. stellw. bis z. Mosel, bei Berncastel, Trarbach bis Winningen, Coblenz bei Boppard, Tyrol, dann im g. südl. Vitoral, Krain, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. 4—5. ‡

7. *A. tataricum* L. Rehb. exc. Wälder im südl. Geb., Croatien, Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen. 5. ‡

Einundzwanzigste Ordnung.

Hippocastaneen.

DC. K. syn. 149. K. Tschb. 102. Rehb. exc. p. 768.
et icon. f. 4822.

138. *Aesculus* L. (VII. 1.) Roßkastanie. K. syn.
Rehb. exc. Comp. I. 2. p. 2.

1. *A. Hippocastanum* L. K. syn. Aus Asien u.
allgemein im g. Geb. angepflanzt. 5. ‡

Zweiundzwanzigste Ordnung.

Ampelideen.

Humb. Bl. et Kth. K. syn. 150. K. Tschb. 103. Rehb.
exc. p. 485.

139. *Ampelopsis* Micheaux (V. 1.) Zaunrebe.
K. syn. in add. 440. Rehb. exc. p. 485.

1. *A. hederacea* Mich. K. syn. *A. quinquefolia*
Rehb. exc. *Hedera* — L. *Vitis* — Lamrk. *Vitis hederacea*
Willd. Aus Nordamerika, unter Gebüsch in Südtirol ver-
wildert, sonst im Gebiete angepflanzt. 7—8. ‡

140. *Vitis* L. (V. 1.) Weinrebe. K. syn. Reh. exc.
Comp. I. 1. p. 402.

1. *V. vinifera* L. K. syn. *V. sylvestris* Gmel. *V.*
Labrusca Scopol. non L. Var. β . *V. laciniosa* L. Rehb. exc.
Im südl. und mittleren Geb., cultivirt in vielen Abänderun-
gen am Rheine, an d. Mosel, an d. Donau u., u. dort an
bewachsenen Bergstellen, an Zäunen verwildert, Rheing. bei
Rastatt, zw. Straßburg u. Speyer u. stchw. an d. Mosel u.
6. ‡

Dreißigste Ordnung.

Geraniaceen.

DC. K. syn. 150. K. Taschb. 103. Rchb. exc. p. 775.
et icon. t. 183—198. f. 4864—94.

141. *Geranium* L. (XVI. 2.) Storchschnabel. K. syn.
Rchb. exc. Comp. II. p. 107.

Erste Rotte. *Batrachium* K. syn.

1. *G. macrorhizon* L. K. syn. Schattige, felsige Orte d. Alpen u. Voralpen im südl. Geb. Oberbaden, auf d. Feldberg; Kärnthen, Krain M. Krim auf d. Wege nach Triest, Idria, Pleßner-Alpen, Südtirol, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig u. 4—6. 4

2. *G. phaeum* L. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *lividum* l'Herit. Waldwiesen d. Gebirge u. Voralpen, besonders im g. südl. Geb. Schweiz nach Baiern, Württemberg, M. Aalegg bei Tönn u. längst d. Alpenkette nach Destr., Rheing. Oberbaden, Burg Forst bei Reichlingen zw. Rdlu u. Düsseldorf, Eupen u. Limburg bei Aachen, Luxemburg, Westphalen, Hamburg, Harz, Sachsen, Thüringen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Kärnthen, Tyrol, Ungarn, Galizien bis in d. Lombardei. Var. β . in d. Schweiz, Cant. Wallis zw. Jnden u. Leuf; Schloß Wellenstein bei Bregenz. 5—6. 4

3. *G. reflexum* L. Rchb. exc. An Bäumen im südlichsten Geb., Dalmatien, Lombardei u. 5—6. 4

4. *G. tuberosum* L. Rchb. exc. Hecker im südlichsten Geb., Dalmatien bei Ragusa u. Spalato. 4—5. 4

5. *G. nodosum* L. K. syn. Steinige Gebirgswälder, besonders im g. südl. Geb. Schweiz, Cant. Bern bei Dessenberg, Cant. Tessin bei Lugano u. im Veltlin; Südtirol, Krain, Vittoral, Istrien, Isonzothale bei Görz, M. Adelsberg, M. Krim bei Laibach, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig; Como, Piemont, Genua. 6—7. 4

6. *G. sylvaticum* L. K. syn. *G. batrachioides*

Cavan. diss. Gebirgswälder, schattige Wiesen, Triften bis in d. Boralpen, stellw. dch. d. g. Geb. Schweiz, Rheing., Bodenseegegend, dch. Elsaß, Baden nach d. Pfalz, Bergstraße bis Bingen, Kreuznach, Coblenz, Bonn, Aachen, Eifel, Trier, Luxemburg, Hochwald, Westphalen, Hannover, Preußen, Sachsen, Jena, Baiern u.; Destr. in allen Provinzen bis in d. südl. Eittoral. 6—8. 4

7. *G. pratense* L. K. syn. Etwas feuchte Wiesen, Waldwiesen, schattige Ufer, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Elsaß, Oberbaden, Breisgau, Rastatt, Karlsruhe, Mannheim bis Frankfurt, Pfalz bis Coblenz, Trier, Luxemburg u.; Destr. bis Galizien, Ungarn, nicht im Eittoral. 7—8. 4

8. *G. aconitifolium* l'Herit. K. syn. *G. rivulare* Villars. *G. striatum* Clairv. Alpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis, Saasthal am M. Moro, Nicolaithal bei d. Finelenalpe, M. Foully u. M. Catogne; selten im Oberinnthale bei Mauritius, Lombardei, Piemont, M. Genis, Novaresse. 6—8. 4

9. *G. palustre* L. K. syn. Nahe Wiesenränder unter Gesträuche, stellw. dch. d. Geb., Rheing., v. Bodensee nach Baden, bei Langenbrücken, Nußloch, Rapp nau, Neckargemünd, Mosbach, im Odenwalde, Frankfurt, Coblenz im Langenthal bei Wunningen, Neuwied, Trier in d. Eifel, Luxemburg, Kreuznach, Württemberg, Westphalen, Hamburg, Hannover, Preußen an d. Weichsel, Königsberg, Thüringen, Sachsen, Baiern, Destr. Böhmen, Mähren, Kärnten, Tyrol, Steyermark, Krain, Eittoral, Galizien, Ungarn. 7—8. 4

10. *G. sanguineum* L. K. syn. Sandfelsen, Abhänge, Waldstellen, sandige Orte, stellw. dch. d. g. Geb., Schweiz, dch. Elsaß, Baden, Pfalz bis Frankfurt, Mainz, Coblenz, Trier, Aachen u. 6—9. 4

Zweite Rotte. *Batrachioides* K. syn.

11. *G. argenteum* L. K. syn. Hochalpen in d. südl. Alpenkette; Tyrol, Krain auf d. Eisez, Alpe Zhera, Perst, Krn. Eittoral, Lombardei, Venedig, Piemont. 7—8. 4

12. *G. pyrenaicum* L. K. syn. *G. umbrosum* W. et Kit. *G. molle* Fl. Wetterau. Waldwiesen, Gebüſche, Hecken bis in d. Boralpen, Schweiz, Rheing., Geisa bei Rheineck, Elſaß, Württemberg, Baden, Frankfurt, Hanau, Pfalz, Zweibrücken, Baumholder Fl. v. Trier, ſtellw. bis Belgien; Thüringen, Sachſen, Lauſiß, Baiern, Schleſien; Deſtr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Dalmatien, Ungarn, Galizien, Lombardei, Venedig. 7—9. 4

13. *G. sibiricum* L. K. syn. Uncultivirte Orte bei Bruchſal in Baden. 7—8. 4

Dritte Rotte. *Columbinum* K. syn.

14. *G. pusillum* L. K. syn. *G. rotundifolium* Pollich, *G. malvaefolium* Scopoli *G. parviflorum* Curtis. lond. Schutt, Wege, Zäune, Bruchfelder im g. Geb. 7—10. ☉

15. *G. bohemicum* L. K. syn. Wälder, Heiden ſtellw. im Geb., Preußen, in d. Miſchener Heide zw. Muſchau u. Nieſky in d. Lauſiß; Schweiz auf d. nördl. Alpenzuge d. Cant. Wallis, Morcles a. d. Herbignon u. a. d. M. Foully, Cant. Graubünden bei Chur; Böhmen bei Carlsbad, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. ☉

16. *G. dissectum* L. K. syn. Hecken, Raine, Sandfelder, ſandige Orte, dch. d. g. Geb. 5—7. ☉

17. *G. Columbinum* L. K. syn. Steinige Orte, Gebüſche, Aecker, dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

18. *G. rotundifolium* L. K. syn. *G. viscidulum* Fries. *G. malvaceum* Wahlenb. *G. subrotundum* Hoffm. Gebirgsſtellen, Felsen, Weinberge, Aecker, ſtellw. dch. d. Geb., Schweiz, Rheing., dch. Elſaß, Baden, Württemberg, bei Heidelbergl, Mannheim, Pfalz bis Mainz, Coblenz, Bonn, Rdn bis in d. Niederlanden, Kreuznach, Trier, Luxemburg, Baiern, Weſtphalen, Harz, Berlin, Sachſen; Deſtr. bis in d. Lombardei. 6—9. ☉

19. *G. molle* L. K. syn. *G. pusillum* Fl. Wetter. Zäune, Wege, Aeckerränder im g. Geb. 5—8. ☉

20. *G. villosum* Tenore. Rechb. exc. Im südl. Geb., Dalmatien, Montenegro. 5—6. ☉

21. *G. lucidum* L. K. syn. Gebirgswälder, schattige Felsen, stellenw. bis in d. Boralpen; Südschweiz, Württemberg, Rheing., Pfalz am Donnersberg im Wildsteinerthale, am grauen Thurme, bei Steinbach, Hessen, Wetterau, Nahegeb., Rheingrafenstein bei Kreuznach, Lemberg, Sobernheim, Moselgeb., Nürnberg in d. Gifel, Thüringen, Sachsen, Hannover; Oestr. Krain, Tyrol, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardien. 5—8. ☉

22. *G. divaricatum* Ehrh. K. syn. *G. Winterli* Roth. *G. bohemicum* Krock. Bewachsene Geb., Weinberge, Zäune, stellenw. im Geb., Sachsen, Erzgebirge, am Schloßberg in Schwarzenberg, Frankfurt a. d. O., Bischofs a. d. Weide in Schlesien; südl. Alpenthäler d. Schweiz, Cant. Valais im Dorfe Vercoren unter Anniviers u. um Randa im Nicolaithale; Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen u. Piemont. 6—8. ☉

23. *G. purpureum* Vill. delph. Rechb. exc. et icon. Im südl. Geb. Dalmatien zw. Almissa und Duare. 5. ☉

24. *G. Robertianum* L. K. syn. Schattige, steinige Orte, Raine, Felsen, Mauern, Schutt, im g. Geb. 4—10. ☉

142. *Erodium l'Heritier* DC. (XVI. 1.) Reiherschnabel. K. syn. 155. Rechb. exc. p. 776. Comp. II. p. 105.

1. *E. cicutarium* l'Herit. K. syn. Geran. — L. *Erodium pilosum* Thuill. *E. Chaerophyllum* Cavan. Var. β . *maculatum*: *E. melanostigma* Martius. — γ . *E. pimpinellifolium* Smith. Hügel, aufgeschwemmtes Land, sandige Aecker, Wege, Schutt, im g. Geb. 4—10. ☉

2. *E. moschatum* l'Herit. K. syn. Geran. — L. Aecker, Wege, stellenw. im mittleren u. südl. Geb., Rheing., Luxemburg bei d. Grotte de Han, Westphalen bei Münster, Thüringen bei Erfurt, Jena, Sachsen; Tyrol, Rigbichel in

144 Geraniaceen. — Balsamineen. — Oxalideen.

Salzburg, Steyermark, Eittoral, Istrien, Lombardei, Venedig. 5—7. ☉

3. *E. ciconium* Willd. K. syn. *Geranium* — L. Grasige Orte, am südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Piemont, Ungarn, Schweiz im Cant. Wallis. 5—7. ☉

4. *E. malacoides* Willd. K. syn. *Geran.* — L. Aecker, Wege, Mauern, im südl. Eittoral, Istrien, Insel Cherso u. Veglio, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 5—7. ☉

5. *E. littoreum* Lmrk. Rchb. exc. Sandige Orte, Mauern, am südlichsten Eittoral, Piemont bei Nizza, Genua. 4—5. ☉

6. *E. maritimum* Smith. Rchb. exc. Seefüste in Belgien u. bei Nizza. 4—5. ☉

Vierundzwanzigste Ordnung.

Balsamineen.

A. Richard. K. syn. 156. K. Tschb. 107. *Papaverac. pars*
Rchb. exc. p. 702. et icon. f. 4483.

143. *Impatiens* L. (V. 1.) Springkraut. K. syn.
Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 420.

1. *I. Noli-tangere* L. K. syn. Paine, schattige, feuchte Gebüsche an Felsen, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

Fünfundzwanzigste Ordnung.

Oxalideen.

DC. K. syn. 157. K. Tschb. 107. Rchb. exc. p. 781.

144. *Oxalis* L. (X. 5.) Sauerflée. K. syn. Rchb.
exc. Comp. I. 2. p. 150.

1. *O. Acetosella* L. K. syn. Var. β . *parviflora*

Lejeun. F. Spa. Bälber, Haine, um Baumstämmen, dch. b. g. Geb. 4—5. 4

2. *O. villosa* M. v. Bieb. Rchb. exc. Cultivirte Orte u. an Mauern, im südlichsten Geb., Lombardei, Venedig, um Abano, Piemont bei Nizza, Genua. 5—7. ☉

3. *O. stricta* L. K. syn. *O. corniculata* Sturm. Auf cultivirtem Lande, stchw. dch. b. g. Geb. 7—10. ☉

4. *O. corniculata* L. K. syn. Gartenland, stchw. besonders im nördl. Geb., Rheing. bei Karlsruhe, Aachen bis Lüttich, Niederrhein, Westphalen, Sachsen bei Leipzig, Holstein, Hamburg, Hannover, Südschweiz; Destr. Südtirol, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 6—10. ☉

Sechszwanzigste Ordnung.

Zygophylleen.

Brown. K. syn. 158. K. Tschb. 108. Sapindae pars Rchb. exc. p. 768. et icon. t. 161. f. 4821.

145. *Tribulus* L. (X. 1.) Burzeldorn. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 51.

1. *T. terrestris* L. K. syn. Weingärten, Acker, Wege im südl. Geb., Littoral, Istrien bei Fiume, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 6—10. ☉

Siebenundzwanzigste Ordnung.

Rutaceen.

Juss. K. syn. 158. K. Tschb. 108. Rchb. exc. p. 763. et icon. t. 154—59. f. 4811—19.

146. *Ruta* L. (X. 1.) Raute. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 52.

1. *R. montana* Clus. Rchb. exc. *R. legitima* Jacq.

R. sylvestris Miller. *R. tenuifolia* Desf. Felsen an d. Küste d. adriatischen Meeres; Savoyen bei Montferrat um Casano, Valle della Stafora. 5—7. 4

2. *R. divaricata* Tenore DC. K. syn. *R. graveolens* α. L. *R. sylvestris* Math. *R. crithmifolia* Moric. Grasige Felsen, steinige Wiesen, Mauern, im südl. Vittorale, Krain, Istrien bei Triest, Görz, Dalmatien. 5—7. 4

3. *R. angustifolia* Pers. Rchb. exc. *R. chalepensis* Villars. Sonnige, steinige Orte im südlichsten Geb., Dalmatien, Insel Brazza, Lombardei, Nizza, Ligurien. 5—6. 4

4. *R. graveolens* L. K. syn. Sonnige, steinige Hügel, Südschweiz, Rheing., Insel Reichenau im Bodensee, Oberbaden am Kaiserstuhl, Hessen im Werrathale am Bundenstein; Südtirol bei Trient u. Roveredo, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. Sonst im Geb. in Gärten u. stellenw. verwildert. 6—7. 4

5. *R. bracteosa* DC. K. syn. Sonnige Felsen im südl. Vittoral, Istrien, Insel Cherso, Beglia, Osero bei Fimme u. Rovigno, Dalmatien u. Croatien. 5—6. 4

6. *R. linifolia* L. Port. enum. *Haplophyllum linifolium* Adr. Juss. Rchb. exc. et icon. Felsen im südl. Geb., Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen. 5—6. 4

7. *R. patavina* L. K. syn. *Haplophyllum patavinum* A. Juss. Rchb. exc. Aeder am südl. Vittoral, Istrien zw. Pavenzo u. Fontane, Dalmatien, Lombardei, Venedig an d. Enganeen. 5—6. 4

147. *Peganum* L. (XI. 1.) *Harmale*. Rchb. exc. p. 767. Comp. I. 2. p. 156.

1. *P. Harmala* L. Rchb. exc. Sandige Hügel in Ungarn, Bloßberg bei Ofen. 6—8. 4

148. *Dictamnus* L. (X. 1.) *Diptam*. K. syn. 159. Rchb. exc. p. 767. Comp. I. 2. p. 54.

1. *D. Fraxinella* Pers. K. syn. *D. albus* L. Var. β. *D. obtusiflorus* Koch. K. syn. not. in add. Gebirgs-

wälder, bewachsene Felsen, besonders auf Kalk, fast im g. südl. Geb., im mittl. stellw., Schweiz, Jura bei Basel, Elsaß, Ober-Baden, Radolfszell, auf d. Kaiserstuhl bei Engen, Württemberg, Pfalz, Rhein-, Nahe-, Glan- u. Moselgebirge, Boppard, Kreuznach, Simmern, Meisenheim, Fl. v. Trier, Westphalen, Hannover, Baiern, Sachsen, Jena, Preußen, Oestr. bis in d. Lombardei. Var. β . im südl. Littoral u. Südtirol. 5 — 7. 4

Achtundzwanzigste Ordnung.

Coriarieen.

DC. prodr. Rutaceae — Coriarieen. Rchb. exc. p. 767.

149. *Coriaria* L. (XXII. 9.) Gerberstrauch. Rchb. exc. Comp. II. 2. p. 739. et icon. t. 160. f. 4820.

1. *C. myrtifolia* L. Rchb. exc. Hügel im südlichsten Geb. in Ligurien, Gegend v. Genua. 5 — 6. 3

Zweite Unterklasse.

Calycifloren. (Kelchblüthige).

Koch. Taschb. 109.

Neunundzwanzigste Ordnung.

Celastrineen.

R. Brow. K. syn. 160. K. Taschb. 109. Sapindac. pars Rchb. exc. p. 796 — 825.

150. *Staphylea* L. (V. 3.) Pimpernuß. K. syn. Rchb. exc. p. 769. et icon. t. 161. f. 4823. Comp. I. 1. p. 533.

1. *St. pinnata* L. K. syn. Gebirgswälder, stellw. bis in d. Alpen, besonders im g. südl. Geb., Rheing., Bodenseegegend, Insel Mainau, Overbaden, Luxemburg; Schweiz u. längs d. Alpen nach Baiern, Destr. rc. Auch angepflanzt u. verwildert. 5—6. ‡

151. *Evonymus* L. (V. 1.) Spindelbaum. K. syn. Rchb. exc. p. 827. et icon. t. 309—10. f. 5134—36. Comp. I. 1. p. 419.

1. *E. europaeus* L. K. syn. *E. vulgaris* Scopol. *E. angustifolius* Villars. delph. Wälder, Gebüsche, Zäune, bch. d. g. Geb. 5—6. ‡

2. *E. verrucosus* L. Scopol. K. syn. Gebirgswälder, stellw. im Geb., Preußen Weichselgegend, Königsberg bis nach Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Krain, Eittoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen. 5—6. ‡

3. *E. latifolius* L. Scopol. K. syn. Gebirgswälder; Ostpreußen bei Königsberg; Molassegebirge in Württemberg im Laurentthale bei Weingarten, von da nach d. Bodenseegegend bei Bernegg, Schloßberg bei Bregenz; Schweiz u. längs d. Alpenkette nach Baiern, Destr. Steyermark, Kärnthen, Tyrol, Krain, Siebenbürgen, Lombardien, Piemont, Ligurien. 5—6. ‡

Dreißigste Ordnung. Rhamneen.

R. Brow. K. syn. 161. K. Taschb. 110. Rchb. exc. p. 486.

152. *Zizphus* Tournef (V. 1.) Judendorn. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 417.

1. *Z. vulgaris* Lamrk. K. syn. *Z. Jujuba* Mill. *Z. sativa* Desf. *Rhamnus Ziziphus* L. Aus Syrien, in Südytyrol u. bch. d. g. Destr. Eittoral, cultivirt u. verwildert. 6—8. ‡

153. *Paliurus Tournef* (V. 1.) *Stechdorn*. K.
syn. *Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 418.*

1. *P. aculeatus* Lamrk. K. syn. *P. australis* Gaertn.
Rhamnus Paliurus L. *Ziziphus* — Willd. Steinige Hügel,
an Zäunen im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin; Südtirol,
Krain, Vittoral, Istrien; Dalmatien, Ungarn, Kombarbei,
Venedig. 6—8. ‡

154. *Rhamnus* L. (V. 1.) *Wegeborn*. K. syn.
162. *Rchb. exc. p. 487. Comp. I. 1. p. 415.*

1. *R. cathartica* L. K. syn. *Waldränder, Gebüsch,*
Zäunen, Hecken dch. d. g. Geb. 5—6. ‡

2. *R. tinctoria* W. et Kit. K. syn. *Weingärten*
im südl. Geb., Destr. Südtirol, Croatien, Ungarn, Sieben-
bürgen. 5. ‡

3. *R. infectoria* L. K. syn. *R. saxatilis* β. *dioicus*
Roth. en. Hügel im südl. Vittoral, Istrien bei Fiume,
Dalmatien, Croatien, Ungarn, Ligurien. 5. ‡

4. *R. saxatilis* L. K. syn. *Bewachsene, steinige Orte,*
Felsen mehr im südl. Geb. Im Badener u. Würtemberger
Jura an d. Thalkapelle bei Engen, bei Ludwigsthal, Ober-
baiern; Südschweiz dch. Graubünden nach Tyrol, Steyer-
mark, Krain, Destr. bei Wien, Vittoral, Istrien bis in d.
Kombarbei. 5—6. ‡

5. *R. alpina* L. K. syn. *Boralpen, Schweiz bei Ba-*
sel auf d. Muttenser-Bergen an d. Wasserfall u. dch. d.
g. Alpenkette dch. Baiern nach Destr., Tyrol, Kärnthen,
Steyermark, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Galizien,
Siebenbürgen bis in d. Kombarbei u. nach Venedig. 5—6. ‡

6. *R. pumila* L. K. syn. *Felsen d. Alpen u. Bor-*
alpen, Schweiz, in d. Baierschen Alpen nach Tyrol, Salz-
burg, Kärnthen, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croa-
tien, Kombarbei. 4—6. ‡

7. *R. Alaternus* L. K. syn. Var. β. *R. Clusii* Willd.
Felsige Orte im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien, Kombar-
bei, Venedig; Genua, Piemont. 3—4. ‡

8. *R. rupestris* Scopoli K. syn. *R. pumilus* Wulf. *R. Wulfenii* Spreng. *Frangula Wulfenii* Rehb. exc. Steinige, felsige Orte im südl. Geb., Destr. Krain, Vittoral, Istrien bei Triest, Croatien, Dalmatien, Siebenbürgen. 6—7. ‡

9. *R. Frangula* L. K. syn. *Frangula vulgaris* Rehb. exc. Wälder, Gebüsche, Hecken, Zäune dch. d. g. Geb. 5—6. ‡

Einunddreißigste Ordnung.

Terebinthaceen.

DC. K. syn. 164. K. Taschb. 112. Rehb. exc. p. 489.

155. *Pistacia* L. (XXII. 5.) Pistatie. K. syn. Rehb. exc. Comp. II. p. 729.

1. *P. vera* L. Rehb. exc. Aus Syrien; im südl. Vittoral, Dalmatien, Lombardei, cultivirt u. verwildert. 5. ‡

2. *P. Terebinthus* L. K. syn. Steinige Hügel, Felsen, besonders am südl. Vittoral, Südtirol bei Bozen, Istrien bei Triest, Dalmatien, Croaten, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza. 4—5. ‡

3. *P. Lentiscus* L. K. syn. Steinige Orte, Zäune im südl. Vittoral, Istrien und Inseln, Dalmatien, Nizza. 4—5. ‡

156. *Rhus* L. (V. 3.) Sumach. K. syn. Rehb. exc. Comp. I. 1. p. 532.

1. *R. Cotinus* L. K. syn. Var. β . *pubescens*: *R. arenarium* Wierzb. Sonnige Hügel im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis; Destr. bei Wien, Baden, Steyermark, Südtirol, Vittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig u. 5. ‡

2. *R. Toxicodendron* L. K. syn. *R. radicans*

Schr. Aus Amerika; angepflanzt und in Böhmen bei Jungbunzlau verwildert. 6—7. 3

3. *R. Coriaria* L. Rchb. exc. Felsige Orte im südl. Geb., Südtirol, Dalmatien, Lombardien, M. Baldo, M. Pastello. 6—7.

Zweiunddreißigste Ordnung.

Papilionaceen.

Lin. XVII. Class. 10. Ordn. K. syn. 165. K. Taschb. 112. Rchb. exc. p. 490.

I. Gruppe. Podalyriceen Benth.

157. *Anagyris* L. Anagiris. Rchb. exc. p. 544.
Comp. II. p. 139.

1. *A. foetida* L. Rchb. exc. Steinige Orte in Dalmatien bei Trau, Spalato u. auf d. Insel Bra. 2—3. 4

II. Gruppe. Loteen DCand.

158. *Ulex* L. Hecksamen. K. syn. 165. Rchb. exc. p. 518. Comp. II. p. 139.

1. *U. europaeus* L. K. syn. Hügel, sandige Heiden, Felder, stellenw. dch. d. Geb., Rheing., Elsaß bei Belfort, Gebweiler, Weissenburg, Pfalz bei Zweibrücken, Homburg, Gl. v. Trier bei Meisenheim, Saarlouis; Luxemburg, Cleve a. Rheine; Württemberg, Holstein, Mecklenburg, Hamburg bei Blankenese, Bremen, Sachsen bei Pirna, Salungen; Tyrol, Lombardien, Südschweiz bei Genf. 5—6. 3

159. *Spartium* L. Pfriemen. K. syn. 165. Rchb. exc. p. 519. Comp. II. p. 139.

1. *S. junceum* L. K. syn. *Sparthianthus junceus* Lk. Rchb. exc. Steinige Bergstellen im südl. Geb., Tyrol, Steiermark, Eittoral, Istrien bei Trieste, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig. 5—6. 3

160. *Sarothamnus Wimmer*. Besenstrauch. K. syn. 166. Comp. II. p. 140.

1. *S. vulgaris* Wim. K. syn. *S. scoparius*. K. syn. edit. I. *Spartium scoparium* L. Rchb. exc. p. 519. Sandige Heiden, Wälder, stellenw. dch. d. g. Geb., Schweiz nur im Cant. Freiburg; Rheing. häufig. 6—7. ‡

161. *Genista* L. Ginster. K. syn. 166. Rchb. exc. p. 519. Comp. II. p. 140.

1. *G. diffusa* Willd. K. syn. *G. humifusa* Wulf. non Lin. *Spartium decumbens* Jacq. Grasstellen, Wiesen im südl. Geb., Krain, Littoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig. 5—6. ‡

2. *G. Halleri* Reyn. K. syn. *G. decumbens* Willd. Rchb. exc. *G. prostrata* Lamk. *G. pedunculata* l'Herit. Steinige Gebirgsstellen in d. westl. Schweiz, Cant. Bern u. Cant. Neuchâtel selten. 5—6. ‡

3. *G. procumbens* W. et Kit. K. syn. Felsen in d. südl. Kette; Schweiz im Cant. Waadt; Destr. Mähren, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. ‡

4. *G. pilosa* L. K. syn. *Spartium pilosum* Roth. Bergheiden dch. d. g. Geb., Schweiz nur im Jura u. in Böhmen gar nicht. 5—6. ‡

5. *G. pulchella* Visiani botan. Zeit. 1830 et Fl. Dalm. Comp. II. p. 142. Dalmatien, Insel Dissa u. Pago. 5. ‡

6. *G. cinerea* DC. Rchb. exc. *G. scoparia* Villars. *G. florida* Asso non DC. Sonnige Bergstellen in Dalmatien, Insel Pago; Piemont, Nizza. 5—6. ‡

7. *G. sericea* Wulf. K. syn. Gebirgsfelsen im südl. Geb., Krain, Littoral, Istrien bei Triest, Croatien, Dalmatien, Venedig, Nizza. 6—7. ‡

8. *G. scariosa* Viviani K. syn. *G. januensis* Viv. cat. Sprg. *G. genevensis* Pers. *G. triquetra* W. et Kit. *G. triangularis* Willd. *G. anxantica* Tenore neapol. Var. β.

ciliata Rochel. Felsen im südl. Geb., Destr. Tyrol, Krain bei Gottschee, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Genua. 6—7. ♀

9. *G. tinctoria* L. K. syn. *Spartium tinctorium* Roth. Var. β . *G. pubescens* Lang. — γ . *G. pratensis* Pollini. Trockene Waldstellen, Triften, Wiesen, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. ♀

10. *G. elatior* Koch. K. syn. *G. sibirica* Rehb. exc. *G. virgata* Willd. *G. tenuifolia* Lois. Trockene Wiesen im südl. Geb., Südtirol, Eittoral, Istrien, Ungarn, Piemont. 6—7. ♀

11. *G. ovata* W. et Kit. K. syn. *G. nervata* Kit. Rehb. exc. *G. Perrymondi* Lois. Grasige, trockene Hügel, im südl. Geb., Schweiz Cant. Waadt, Cant. Tessin; Steyermark, Tyrol, Krain, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei u. Oberitalien. 6—7. ♀

12. *G. mantica* Pollini Rehb. exc. Waldtriften, Lombardei. Benedig, Verona, Piemont bei Turin. 5. ♀

13. *G. germanica* L. K. syn. *Voglera spinosa* Fl. Wetterau Var. β . *inermis*. Waldränder, Gebüsche, stellw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., nördl. bis Thern. 5—6. ♀

14. *G. hispanica* L. Rehb. exc. Sonnige Felsen im südl. Eittoral, Dalmatien, Piemont, Nizza. 5—6. ♀

15. *G. anglica* L. K. syn. Etwas feuchte, torfhal- tige Heiden, stellw. dch. d. Geb., mehr im nördl. Rheing. am Niederrheine bei Bonn, Mühlheim bei Köln, Münster- eifel nach d. Sauergegend bei Trier, Luxemburg bis nach Aachen dch. Belgien nach d. Niederlanden, Westphalen, Ham- burg, Hannover, Braunschweig, Holstein, Mecklenburg, Lau- sig, Schlesien, Baiern, nicht in Destr. 5—6. ♀

16. *G. sylvestris* Scopoli K. syn. *G. hispanica* Wulf. *G. tricuspidata* Desf. Sonnige Felsen im südl. Geb. Steyermark, Krain, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien. 5—6. ♀

17. *G. arcuata* Koch. K. syn. Steinige Orte am südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Croatien. 5—6. ♀

18. *G. dalmatica* Bartling. K. syn. *G. hirsuta* Vahl
Felsen im südl. Eittoral, Istrien, Insel Cherso, Dsero, Dal-
matien bei Spalto. 6—7. ‡

19. *G. Lobelii* DC. Rchb. exc. *Spartium erinacoi-*
des Loisl. Im südl. Geb., Piemont, Ligurien bei Sarzana
u. 5—6. ‡

162. *Cytisus* L. Bohnenbaum. K. syn. 169. Rchb.
exc. p. 522. Comp. II. p. 146.

1. *C. Laburnum* L. K. syn. Var. β . *insubricus*
Gaud. helv. Gebirgswälder, Boralpen im südlichen Geb.,
Schweiz auf d. Salève bei Genf; Destr. Kärnthen, Steyer-
mark, Tyrol, Krain, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen,
Lombardei, Venedig. Häufig angepflanzt in Gärten u. An-
lagen. 4—5. ‡

2. *C. alpinus* Miller K. syn. *C. latifolius* Host. Var.
 β . *C. angustifolius* Mneh. Rchb. exc. Gebirgswälder, Boral-
alpen mehr im südl. Geb., südwestl. Schweiz; Kärnthen,
Steiermark, Tyrol, Krain, Dalmatien, Croatien, Ungarn,
Siebenbürgen, Lombardei. 5—6. ‡

3. *C. nigricans* L. K. syn. Steinige Waldstellen,
Heiden im g. südl. u. im mittlern Geb., Schwaben bei Ho-
henheim, Eßlingen, Heilbronn, Rheing. Constanx, Overbaben,
Ueberlingen, Engen u., Elsaß im Schloßwalde bei Münster,
Baiern, Thüringen, Jena, Sachsen, Lausitz, Schlesien,
Schweiz Basel, Bodensee, Schaffhausen; Destr. Böhmen,
Mähren bis in d. Lombardei u. 6—7. ‡

4. *C. ramentaceus* Sieber. K. syn. in add. p. 445.
C. Weldenii Visian. *C. fragrans* Welden. Bewaldete Hü-
gel im südl. Eittoral, Istrien bei Duino, Monfalcone, Dal-
matien bei Cattaro u. M. Biokovo. 5. ‡

5. *C. glabrescens* Sartorelli. K. syn. *C. emerifo-*
lius Rchb. exc. Gebirge in d. südl. Kette, Schweiz Cant.
Tessin, M. Calbege; Lombardei Comersee am Corni di Conza;
Dalmatien. 5—6. ‡

6. *C. sessilifolius* L. K. syn. Waldstellen, Heiden,

besonders auf Kalk, mehr im südl. Gebiete; Rheing., Oberbad. zw. Constanz u. Rudolfzell; Schweiz bei Willeneuve am Genfersee; Tyrol, Krain, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont Nizza, Genua u. Oberitalien. 5—6. ‡

7. *C. candicans* Lamrk. Rchb. exc. Sonnige Hügel in Piemont bei Nizza. 4—5. ‡

8. *C. triflorus* l'Herit. Rchb. exc. *C. villosus* Pourr. Ligurien am M. Guco. 4—5. ‡

9. *C. austriacus* L. K. syn. *C. canescens* Maly in Presl. Bergwälder, Destr. bei Wien, Böhmen, Mähren, Krain, Croatien, Galizien, Ungarn. 7—8. ‡

10. *C. leucanthus* W. et Kit. Rchb. exc. *C. pallidus* Schrader. *C. austriacus* β . *albiflorus* K. syn. Var. β . *obscurus* Rochel. bann. Weingärten, Wege. In Ungarn, Siebenbürgen u. Galizien. 5—7. ‡

11. *C. capitatus* Jacq. K. syn. Gebirgswälder, theilw. mehr im südl. Geb., Baiern bei Regensburg, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Galizien, Ungarn, Vittoral, Dalmatien, Lombardei. 7—8. ‡

12. *C. supinus* L. K. syn. Rchb. exc. *C. hirsutus* Jacq. *C. capitatus* Guimp. Heiden, Waldränder im g. südl. Geb., Destr. bei Wien, Mähren, Tyrol, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Lombardei u. 5. ‡

13. *C. prostratus* Scopoli K. syn. *C. bisflorens* Host. *C. supinus* DC. prodr. Var. β . *C. ciliatus* Wahlenb. Carp. Gebirgseisen im südl. Geb., Destr. Steyermark, Südtirol, Krain, Ungarn, Lombardei. 5—6. ‡

14. *C. hirsutus* L. Scopoli K. syn. Rchb. exc. *C. polytrichys* M. v. Bieb. *C. falcatus* W. et Kit. Rchb. exc. *C. virgatus* Vest. Var. β . *C. ciliatus* K. syn. Gebirgswälder, besonders im g. südl. Geb., Südschweiz Cant. Tessin bei Lugano; Destr. Böhmen, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 5—6. ‡

15. *C. elongatus* W. et Kit. Rchb. exc. Wälder im südl. Geb., Krain, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen. 5. ‡

16. *C. ratisbonensis* Schaefer K. syn. *C. biflorus* l'Herit. Rchb. exc. *C. supinus* Jacq. *C. supinus* β . L. Var. β . minor: *C. supinus* β . Wahlenb. *C. biflorus* W. et Kit. *C. cinereus* Host. Bergwiesen, grasige Hügel, stellw. im Geb., Baiern v. Augsburg nach Regensburg, Preußen Tilsit u. Osteroder Heide, Schlesien, Oest. Böhmen, Mähren, Ungarn. 5. ‡

17. *C. purpureus* Scopoli K. syn. Kalkgebirge im südl. Geb., Kärnthen, Tyrol, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig. 4—6. ‡

18. *C. argyreus* Rchb. exc. *C. spinescens* Sieber. K. syn. *C. spinosus* Sieber. *C. ramosissimus* Tenore. Gebirge, Felsen im südl. Vittoral, Istrien, Insel Cherso, Dalmatien Insel Pago. 5—6. ‡

19. *C. spinosus* Lamk. K. syn. *C. lanigerus* DC. *Spartium spinosum* L. *Sp. lanigerum* Desf. *Sp. villosum* Poiret *Calycotome spinosa* LK. *Genista* — Pollini. Gebirge, Hügel am südl. Vittoral, Istrien bei Urano, Insel Cherso; Dalmatien bei Spalato; Nizza, Genua. 5—6. ‡

20. *C. radiatus* Koch DC. K. syn. *Spartium radiatum* L. *Genista radiata* Scopoli Rchb. exc. Gebirge u. Voralpen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Sitten, Lens u. Saviege; Steyermark, Tyrol, Krain, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig. 5—6. ‡

21. *C. holopetalus* Fleischmann K. syn. in add. 441. *Genista holopetala* Rchb. exc. *G. radiata* β . *nana* Spach. in Walp. Rep. Gebirge, Voralpen in Krain bei Bhaun. 5—6. ‡

22. *C. argenteus* L. K. syn. *Cajanus* — Sturm. Steinige Gebirgsstellen im südl. Geb., Tyrol, Krain, Vittoral, Istrien, Triest, Monte Spaccato, Dalmatien, Lombardien, Venedig. 4—5. ‡

23. *C. sagittalis* Koch. K. syn. *Genista* — L. Rchb. exc. *Salzwedelia* — Fl. Wetter. *Spartium* — Roth. Bergheiden, Waldwiesen im g. südl. u. im mittleren Geb., besonders häufig in d. Schweiz u. in d. g. Rheing. 5—7. ‡

24. *C. divaricatus* l'Herit. Rchb. exc. *C. parvifolius* Lamk. *Spartium complicatum* Loisl. *Adenocarpus parvifolius* DC. prodr. Felsen in d. Combarbei, Valle Casprina am M. Baldo. 7—8. ‡

163. *Lupinus* L. Wolfssbohne. K. syn. 172. Rchb. exc. p. 539. Comp. II. p. 153.

1. *L. hirsutus* L. K. syn. Saatacker im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien. 5—6. ☉

2. *L. angustifolius* L. K. syn. *L. varius* Savi Var. *β. linifolius* Roth. Saatacker, Schweiz Cant. Waadt bei Affens. Auch stellw. cultivirt, besonders im südl. Geb. 5—6. ☉

3. *L. albus* L. Rchb. exc. Aus dem Orient, cultivirt, besonders im g. südl. Geb., auch in d. Rheing. 6—7 ☉

4. *L. varius* L. Rchb. exc. *L. semiverticillatus* Lamk. Saatacker im südl. Littoral, Istrien bei Dignano, Piemont, Nizza. 6—7. ☉

164. *Ononis* L. Hauhechel. K. syn. 173. Rchb. exc. p. 516. Comp. II. p. 154.

1. *O. minutissima* L. Rchb. exc. *O. barbata* Cavan. *O. saxatilis* Lamrk. Felsen, Hügel im südl. Geb., Südtirol, Dalmatien, Combarbei, Piemont Valle d'Aost, Ligurien, Nizza. 6—7. ☉

2. *O. Columnae* All. pedm. K. syn. *O. parviflora* Lamrk. non Thunb. *O. minutissima* Jacq. Austr. non Lin. *O. subocculta* Vill. Sonnige Kalkgebirge im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Tessin; Destr. bei Wien, Tyrol, Littoral, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Combarbei, Venedig. 5—6. ☉

3. *O. viscosa* L. Rchb. exc. Acker im südl. Geb., Dalmatien, Piemont bei Tenda. 4—5. ☉

4. *O. ramosissima* Visian. Rchb. exc. in add. p. 868. Im südl. Geb., Dalmatien, Insel Lissa u. Lefina, Piemont, Nizza. 6. ‡

5. *O. Natrix* Lamrk. K. syn. Var. β . *O. pinguis* L. Sonnige, steinige Orte im südl. Geb. bis in d. Alpen; Schweiz Cant. Wallis im Rhonethal; Südtirol, Krain, Littoral, Dalmatien, Kombarbei, Venedig. 6—7. 4

6. *O. hispanica* L. Rchb. exc. Im südl. Littoral, Dalmatien, Insel Vissa u. Tessina, Piemont, Nizza. 5—6. 4

7. *O. brevisflora* DC. prodr. II. p. 160. Maly enum. pl. austr. p. 348—398. In Dalmatien. 6. ☉

8. *O. ornithopodioides* L. DC. prodr. II. p. 160. Maly enum. pl. austr. p. 348—398. In Dalmatien. 5—6. ☉

9. *O. alopecuroides* L. Rchb. exc. Im südlichsten Geb., Piemont bei Oneglia, Ligurien. 5—6. ☉

10. *O. antiquorum* L. Rchb. exc. *O. spinosa* β . DC. prodr. Aecker im südl. Geb., Dalmatien, Kombarbei, Venedig, Ligurien. 7—8. 4

11. *O. spinosa* L. K. syn. *O. spinosa* β . L. *O. arvensis* β . Smith. *O. campestris* K. et Ziz. Triften, Brachäcker, Aeckerränder, Wege, Raine, stellenw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten. 6—7. 4

12. *O. repens* L. K. syn. *O. arvensis* Smith. Retz. *O. procurrens* Wallr. Var. β . *inermis*: *O. mitis* Gmel. bad. Trockene Wiesen, Triften, Felder, Aecker, besonders auf Sand, dch. d. g. südl. u. mitlere Geb., seltner im nördl., Rheing. häufig. 7. 4

13. *O. hircina* Jacq. K. syn. *O. arvensis* L. syst. nat. *O. altissima* Lamk. *O. foetens* All. pedm. *O. spinosa* α . *mitis* L. spec. plant. Feuchte Wiesen, Begestellen zerstreut, vom nördl. bis in d. südl. Geb., im mittlern selten; v. Holstein dch. Mecklenburg, Pommern, Preußen, Schlesien, Lausitz; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Galizien, Ungarn, bis in d. Kombarbei; Schweiz Cant. Wallis u. Tessin. 6—7. 4

14. *O. cenisia* L. Rchb. exc. *O. cristata* Mill. Bergtriften in Piemont, M. Genis, Novarese. 7. ☉

15. *O. reclinata* L. K. syn. *O. Cherleri* Rchb. exc. K. syn. edit. I. non L. *O. mollis* Lagasc. *O. pilosa* Bartl.

Sandige Orte, im südl. Littoral, Istrien bei Dignano, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza. 5—6. ☉.

16. *O. rotundifolia* L. K. syn. Felsige Orte d. Alpen u. Boralpen d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis, Cant. Graubünden, Tyrol, Vienzer Alpe im Oberinntale, Lombardei, Verona, Piemont u. 5—6. 4

17. *O. fruticosa* L. Rchb. exc. *O. purpurea* Miller. Felsen in Piemont, Valle Queiras. 7—8. ‡

165. *Anthyllis* L. Bunderlee. K. syn 174. Rchb. exc. p. 515. Comp. II. p. 158.

1. *A. tetraphylla* L. Rchb. exc. *Trifolium halicacabum* Camer. Bewachsene Orte im südl. Geb., Dalmatien, Piemont, Nizza, Ligurien. 5. ☉

2. *A. vulnerarioides* Bonjean. Rchb. exc. *Astragalus* — Allioni. In Piemont, auf d. M. Genis. 6—7. ☉

3. *A. Vulneraria* L. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *alpestris*: *A. alpestris* Hegetsch. Rchb. exc. — γ . *polyphylla*: *A. polyphylla* Kitaib. Rchb. exc. — δ . *maritima*: *A. maritima* Schweigg. Rchb. exc. — ϵ . *rubiflora*: *A. Dillenii* Schult. Trockene Wiesen, grasige Hügel, Felsen, bh. d. g. Geb. bis in d. Hochalpen; Hauptform überall; Var. β . Alpen, γ . Schweiz u. Ungarn, δ . am Seestrande d. Ost- und Nordsee, Königsberg, ϵ . besonders im südl. Geb. 5—6. 4

4. *A. Weldeniana* Rchb. exc. Bergstellen in Dalmatien, auf d. M. Biofovo. 5. 4

5. *A. montana* L. K. syn. Gebirge, grasige Felsen im südl. Geb., Schweiz bei Genf, M. Salève, Jura, M. Dolaz; Destr. bei Wien, Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Krain, Littoral, Croatien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, M. Balbo, Venedig, Piemont, Ligurien, Nizza. 5—6. 4

6. *A. aurea* Visian. Maly enum. pl. austr. p. 349. *A. polycephala* Rchb. exc. Geb. in Dalmatien, bei Ragusa u. Cattaro. 6. 4

7. *A. Barba-Jovis* L. Rchb. exc. Felsen im südl. Eittoral, Dalmatien, Insel Lissa, Ligurien, Nizza. 5—6. ☞

166. *Medicago* L. Schneckenflee. K. syn. 175. Rchb. exc. p. 501. Comp. II. p. 160.

Erste Rotte. *Falcago* Reichb. K. syn.

1. *M. sativa* L. K. syn. Var. β . *versicolor*: *M. media* Pers. Rchb. exc. Abhänge, Raine, Wiesen, Wege, Feldränder, im g. Geb., auch allgemein als Luzerne angebaut. 6—9. 24

2. *M. falcata* L. K. syn. Var. β . *versicolor*: *M. falcata* β . *hybrida* Gaud. helv. — γ . *major*: *M. procumbens* Besser Rchb. exc. *M. intermedia* Schult. Gräßige, trockene Hügel, Raine, Wiesen, Wege, besonders auf Kalk, dch. d. g. Geb. 6—9. 24

3. *M. glomerata* Balb. Rchb. exc. *M. falcata* δ . *glandulosa* K. syn. *M. declinata* Kitaib. *M. glutinosa* M. v. Bieb. Rchb. exc. *M. annularis* Besser. Steinige Wiesen, an Wegen, im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombard. 6—8. 24

4. *M. prostrata* Jacq. K. syn. Steinige Orte, Wege, im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombard. 6—8. 24

5. *M. marina* L. K. syn. Sandige Orte am südl. Eittoral, Istrien bei Monfalcone, Dalmatien, Venedig. 5—6 24.

Zweite Rotte. *Hymenocarpus* Ser. DC. K. syn.

6. *M. circinnata* L. K. syn. in add. 1020. *Hymenocarpus circinnatus* Savi Rchb. exc. p. 514. Sandfelder im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Insel Lissino, Nizza. 6—7. ☉

7. *M. radiata* L. K. syn. *Pecockia* — Trautv. *M. lunata* Rchb. exc. Acker, Felder im südl. Eittoral, Istrien, Nizza. 7—8. ☉

Dritte Rotte. *Spirocarpus* DC. K. syn.

8. *M. lupulina* L. K. syn. Var. α . *vulgaris* — β .

Willdenoviana: M. Willdenovii Boeningh. mon. M. corymbifera Schm. in Linnaea. Triften, Wiesen, Brachfelber, Wege, im g. Geb. 5—10. ☉

9. M. scutellata Allioni K. syn. M. polymorpha β . L. Grasige, uncultivirte Orte im südl. Eittoral, Istrien, Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Pavia, Ligurien, Nizza. 5—6. ☉

10. M. orbicularis All. K. syn. M. polymorpha α . L. Sonnige Abhänge, Wege im südl. Eittoral, Südtirol, Krain, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. 5—6. ☉

11. M. laevis Desf. DC. prodr. II. p. 174. Maly enum. pl. austr. p. 350. M. Helix Willd. Dalmatien a. d. Insel Tessina. 6. ☉

12. M. marginata Willd. K. syn. Cultiv. Orte u. an Wegen im südl. Eittoral, Istrien bei Fiume. 5—6. ☉

13. M. turbinata Willd. Rehb. exc. Im südlichsten Geb., auf Aeßer in Piemont bei Nizza. 6—7. ☉

14. M. tuberculata Willd. K. syn. Saatäcker im südl. Eittoral, Istrien bei Rovigno, Torre d'Orlando u. Valle Rovina. 5—6. ☉

15. M. tribuloides Lamrk. K. syn. Var. γ . M. Hornemanniana DC. prodr. M. pubescens Hornem. — γ . rigidula: M. rigidula Willd. — δ . truncatula: M. truncatula Gaertn. M. tentaculata Willd. Cultivirte Orte im südl. Eittoral, Istrien bei Fiume, Bendorthal, Insel Brioni, Dalmatien, Croatien, Oberitalien u. in Belgien bei Berviers. 5—6. ☉

16. M. praecox DC. prodr. II. p. 178. Moris. Fl. Sard. Maly enum. pl. austr. p. 350. In Dalmatien. 6. ☉

17. M. littoralis Rohde. K. syn. Sonnige Orte am südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 5—6. ☉

18. M. lappacea Lamrk. Rehb. exc. M. nigra Willd. M. hispida Gaertn. Im südl. Eittoral, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 6. ☉

19. *M. uncinata* Willd. Rchb. exc. *M. pentacyla* DC. Im südl. Eittoral, Dalmatien. 6. ○

20. *M. Gerardi* W. et Kit. K. syn. *M. rigida* Lamk. *M. polymorpha* s. *rigidula* L. Var. *M. villosa* DC. *M. rigidula* Thuill. — β . *cylindrica*: *M. villosa* β . DC. *M. hirsuta* Thuill. Abhänge, Raine, Felder im südl. Geb., Rheing., Berviers bei Aachen, in Belgien, Südtirol, Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Bombardei, Benedig. 5—6. ○

21. *M. aculeata* Willd. Rchb. exc. *M. Strumaria* Hornem. *M. ovata* Carmich. *M. spinulosa* DC. *M. crassispina* Visian. Im südl. Eittoral, Dalmatien Insel Crappano. 5—6. ○

22. *M. muricata* Allioni Rchb. exc. Trockene Hügel am südl. Eittoral, Croatien, Bombardei, Piemont, Nizza. 5—6. ○

23. *M. sphaerocarpa* Bertolon. Rchb. exc. Hügel im südl. Geb., Dalmatien, Oberitalien. 5—6. ○

24. *M. disciformis* DC. K. syn. Cultiv. Orte im südl. Eittoral, Istrien, Insel Dsero, Dalmatien, Croatien. 5—6. ○

25. *M. maculata* Willd. K. syn. *M. polymorpha* γ . *arabica* L. *M. arabica* Allioni. Saatacker, Wege, besonders im südl. Geb., Rheing., Elsaß bei Straßburg; an d. Mosel, oberhalb Trier bei Schengen, Aachen u. in d. Fl. v. Spa, Eittoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Croatien, Benedig, Nizza. 5—6. ○

26. *M. minima* Lamrk. K. syn. *M. hirsuta* Allion. *M. rigidula* Roth. *M. polymorpha* et *minima* L. Var. β . *M. molissima* Sprg. Rchb. exc. *M. graeca* Hornem. — γ . *viscida*: *M. minima* γ . *longiseta* DC. Sonnige Hügel, Raine, Ufer, Sandfelder, stellenw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., seltener im nördl. Geb. 5—6. ○

27. *M. coronata* Lamrk. K. syn. in add. 1020. *M. polymorpha* δ . *coronata* L. Weingärten im südl. Eittoral, Istrien, Insel Cossino, Dalmatien, Benedig, Oberitalien. 7—8. ○

28. *M. apiculata* Willd. K. syn. Var. β . *confinis*: *M. confinis* Koch. Saatäcker, stellw. dch. das Geb., Rheing., Elsaß, Trier bei Saarlouis, Malmedy u. Gl. v. Spa, Hessen, Thüringen bei Naumburg, Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien. 5—6. ☉

29. *M. denticulata* Willd. K. syn. *M. coronata* Gaertn. Acker, stellw. dch. d. Geb., Rheing. v. d. Schweiz dch. Baden bis Mannheim, Elsaß, Pfalz bei Frankenthal, Frankfurt, Oberstein an d. Nahe, Köln bis in d. Niederlande, Aachen, Malmedy, Thüringen, Harz; Littoral Istrien, Dalmatien, Venedig. 6—7. ☉

30. *M. Terebellum* Willd. K. syn. *M. aculeata* Gaertn. *M. muricata* Lejeun. *M. conica* Schkr. Var. β . *M. catalonica* Schrank. Cultivirte Orte, Rheing., Berviers bei Aachen, Flora v. Spa, u. in Dalmatien. 5—6. ☉

31. *M. laciniata* All. pedm. Rchb. exc. Acker im südlichsten Geb., Piemont um Nizza. 5—6. ☉

32. *M. carstiensis* Jacq. K. syn. *M. Noëcae* Balb. Bewachsene Bergstellen im südl. Geb.; Steyermark, Kärnthen, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien auf d. Resegone am Comersee, Venedig u. 5—6. 4

33. *M. Echinus* DC. *M. intertexta* Allion. Rchb. exc. Piemont Gegend um Nizza. 7—8. 4

34. *M. ciliaris* Willd. Rchb. exc. *M. hirsuta* Schkr. *M. intertexta* Willd. Acker im südlichsten Geb., Piemont Nizza. 7. ☉

167. *Trigonella* L. Hornflee. K. syn. 181. Rchb. exc. p. 500. Comp. II. p. 171.

1. *T. Foenum graecum* L. K. syn. Saatäcker u. Ackerränder im südlichsten Geb., Piemont, Nizza, dann dch. d. Anbau wohl nur verwildert; Rheing., Oberbaden bei Mülheim, Obergosel, Flora v. Trier bei Remich; Erfurt; Oestr. Mähren u. 6—7. ☉

2. *T. gladiata* Steven. K. syn. *T. Foenum graecum* β . L. *T. prostrata* DC. Acker, steinige Orte im südl. Geb.,

Ettoral, Istrien Insel Veglia, Dalmatien, Croatien, Piemont Nizza. 6—7. ☉

3. *T. monspeliaca* L. K. syn. *T. divaricata* Clairv. *Buceras monspeliaca* All. pedm. Sonnige Orte, Wege im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis um Sitten u. am Foully; Destr. zw. Himberg u. Moosbrunn bei Wien, Mähren bei Leitmeritz; Ettoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Kombardei, Venedig. 6—7. ☉

4. *T. polycerata* L. Rchb. exc. *Buceras* — All. B. *mutica* Moench. Gebirge in Ungarn; Piemont, Nizza. 6—7. ☉

5. *T. corniculata* L. K. syn. *Buceras* — All. B. *grandiflora* Mneh. *Melilotus lutea* Morison. Cultiv. Orte, an Wegen am südl. Ettoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Croatien, Kombardei, Venedig; Piemont, Nizza. 6—7. ☉

168. *Melilotus Tournef.* Lamk. Honigflee, Steinflee. K. syn. 182. Rchb. exc. p. 498. Comp. II. p. 173.

1. *M. dentata* Pers. K. syn. Rchb. exc. *M. Kochiana* Willd. Rchb. exc. *Trifolium dentatum* W. et Kit. Trif. *Melilot. dentata* Sturm. Trifol. *Kochiana* Hayne. Ufer, Wiesen, Wege zerstr. dch. d. Geb., Rheing. bei Basel, zw. Oppenheim u. Mainz; Thüringen, Sachsen, Preußen bei Danzig, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Dalmatien, Ungarn, Venedig. 7—9. ☉

2. *M. macrorrhiza* Pers. K. syn. *M. officinalis* Willd. Trifol. *Melilot. officinalis* L. Var. α . *genuina*: Trifol. *macrorrhizon* W. et Kit. Tr. *altissimum* Loisl. *Melilot. officinalis et macrorrhiza* DC. — β . *palustris*: *M. palustris* Rchb. exc. Trif. *palustre* W. et Kit. Etwas feuchte Ufer, Gräben, Wiesen, stellw. dch. d. g. Geb. Var. β . Salzführende Wiesen in Ungarn. 7—9. ☉

3. *M. alba* Desrousseaux. K. syn. *M. vulgaris* Willd. Host. *M. leucantha* Koch DC. Trif. *album*. L. Trif. *Melilot. officinalis* β . L. *M. arguta* Rchb. exc. Ufer, Raine, Wege, stellw. dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

4. *M. officinalis* Desrous. Koch. K. syn. *M. Petitpierrana* Rehb. exc. K. syn. edit. I. *M. effusa* Koch. *M. arvensis* Wallr. Trif. *Petitpierranum* Hayne. Acker Felber, Wege, Ufer im g. Geb. 7—9. ☉

5. *M. parviflora* Desf. K. syn. Trif. Melilot. indica J. L. Cultivirte Orte, Wege, besonders im g. südl. Geb., Rheing. auf Luzernacker in Nassau bei Weilburg, bei Coblenz u. Trier; Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Lombardie, Venedig, Piemont u. 6—7. ☉

6. *M. polonica* Gaertn. Rehb. exc. Trif. Melilot. polonica L. In Galizien um Eßlo. 7—8. ☉

7. *M. italica* Lamk. Rehb. exc. *M. rotundifolia* Tenore, Trif. Melilot. italica L. Weiden, Wiesen, Acker im südlichsten Geb., Dalmatien, Croatien, Lombardie, Sizilien, Oberitalien. 6—7. ☉

8. *M. sulcata* Desf. K. syn. *M. mauritanica* Willd. Trif. Melilot. italica γ. L. Cultiv. Orte am südl. Vittoral, Istrien bei Triest; Dalmatien; Ligurien. 6—7. ☉

9. *M. messanensis* Allioni. Rehb. exc. Saatacker in Dalmatien; Piemont, Novarese u. Oberitalien. 7—8. ☉

10. *M. elegans* Salzmann DC. prodr. II. 188. Maly enum. pl. austr. p. 352. In Dalmatien. 6—7. ☉

11. *M. gracilis* DC. K. syn. in add. p. 442. *M. neapolitana* Tenore Rehb. exc. Cultivirte Orte im südl. Vittoral, Istrien a. d. Insel Sansego. 5—6. ☉

12. *M. longifolia* Tenore. Rehb. exc. Olivenhaine, steinige Orte, Lombardie, Piemont um Sizilien, Ligurien, Cap Noli. 5—6. ☉

13. *M. caerulea* Lamk. K. syn. Trif. Melilot. caerulea L. *Trifolium caeruleum* Willd. *Trigonella* — Sering. Wiesen im südl. Geb., Krain in d. Bockstein, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardie; auch angebaut im Geb. Schweiz u. Tyrol u. 6—7. ☉

14. *M. procumbens* Besser Rehb. exc. *M. caerulea laxiflora* Rochel. Gräserige Orte, Ungarn im Banat. 5. ☉ et ☉

169. *Trifolium* L. Klee. K. syn. 184. Rchb. exc. p. 490. Comp. II. p. 177.

Erste Rotte. *Lagopus* Koch syn.

1. *T. pallidum* W. et Kit. K. syn. Wiesen, Wege im südl. Geb., Littoral, Istrien bei Triest, Insel Dsero, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Italien. 5—6. ☉

2. *T. pratense* L. K. syn. Rchb. exc. *T. heterophyllum* Lejeune, *T. glareosum* DuMort. Var. β . *T. sativum* Boeningh. Rchb. exc. *T. pensylvanicum* Willd. — γ . *T. nivala* Sieber, *T. pratense alpinum* Hoppe, *T. expansum* β . Rchb. exc. Wiesen, Triften, dch. d. g. Geb., Var. γ . auf Hochalpen. 5—9. ☉ u. 4

3. *T. expansum* W. et Kit. Rchb. exc. Wiesen im südl. Geb., Ungarn, Croatien, Lombard. 6—8. 4

4. *T. medium* L. K. syn. *T. flexuosum* Jacq. Trockene lichte Waldwiesen mehr in Gebirgen, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

5. *T. patulum* Tausch. Walp. Repert. t. 639. Maly enum. pl. austr. p. 352—399. In Dalmatien. 4

6. *T. alpestre* L. K. syn. Var. β . *T. alpest. bicolor* Rchb. Gebirgswälder, schattige Felsen bis in d. Alpen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. häufig. 6—8. 4

7. *T. rubens* L. K. syn. Gebirgswälder, besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Schweiz, dch. Württemberg, Baden bei Waghäusel, Käferthal, Elßaß, Pfalz, Donnersberg, Harbt bei Wachenheim, Dürkheim, Callstadt zw. Mainz u. Niederlingelheim, Nahegebirge, Kreuznach, Trier, Luxemburg, u. Mosel abwärts bis Coblenz, Mayenfeld u. Laager-Wald, Baiern, Sachsen, Preußen u. 6—7. 4

8. *T. noricum* Wulf. K. syn. *T. canescens* Willd. Hochalpen, Steyermark, Kärnthen Ruhweger-Alp, Südtirol bei Feudo u. in Krain. 7. 4

9. *T. pannonicum* Jacq. K. syn. *T. alopecuroides* Pers. Waldwege, Wiesen, im südl. Geb., Unterkrain auf d.

Gerjangberge nach Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

10. *T. armenium* Willd. Baumg. Transylv. Maly enum. pl. austr. p. 353—399. Bergwiesen in Siebenbürgen. 4

11. *T. ochroleucum* L. K. syn. Waldwiesen, Wiesen, stellenw. besonders dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., Rheing. nicht selten. 6—7. 4

12. *T. cinetum* DC. prodr. II. p. 193. Maly enum. pl. austr. p. 353—399. In Dalmatien. ☉

13. *T. alexandrinum* L. K. syn. Grasige Hügel, Wiesen, Brachfelder am südl. Littoral, Istrien bei Triest, Pantaleone u. Zante. 6—7. ☉

14. *T. maritimum* Huds. K. syn. *T. irregulare* Pourr. *T. rigidum* Savi *T. squarrosum* Savi. Feuchte Wiesen im südl. Littoral, Istrien bei Rovigno, Dalmatien, Oberitalien. 6—7. ☉

15. *T. procerum* Rochel. Rehb. exc. Sumpfige Wiesen am Donauufer in Ungarn. 6. ☉

16. *T. reclinatum* W. et Kit. Rehb. exc. Grasige Orte an d. Temmesfluß in Ungarn. 6. ☉

17. *T. purpurascens* Roth. *T. diffusum* Ehrh. Rehb. exc. Grasige Orte, Weingärten in Dalmatien, Ungarn u. Siebenbürgen. 6—7. ☉

18. *T. hirtum* Allioni pedm. Rehb. exc. *T. pictum* Roth. Rehb. exc. *T. hispidum* Desf. Im südlichsten Geb., Lombardei, Oberitalien. 5—6. ☉

19. *T. incarnatum* L. K. syn. *T. Noëanum* Fl. germ. exsicc. Var. β . Fl. alb. *T. Molinieri* Balb. Wiesen, Wege, im g. südl. Geb.; Südtirol, Littoral, Istrien bei Triest, Quino, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Venedig u. Südschweiz; an anderen Orten wie in d. Rheing. wohl nur dch. d. Anbau verwildert. 6—7. ☉

20. *T. stellatum* L. K. syn. Wiesen, Tristen, Brachfelder am g. südl. Littoral, Istrien, Quino, Osero,

Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont, Oberitalien. 6—7. ☉

21. *T. squarrosus* L. DC. prodr. II. 194. Maly enum. pl. austr. p. 353. *T. maculatum* Host. austr. In Dalmatien. 5—6. ☉

22. *T. angustifolium* L. K. syn. Wiesen, Wege, im südl. Littoral, Istrien bei Triest, bei St. Saba zw. Savola u. Zaulle, Görz, Fiume, Dalmatien bei Spalato, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 6—7. ☉

23. *T. lappaceum* L. K. syn. Sonnige Orte unter Gebüschen im südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Osero, Dalmatien, Lombardei, Piemont. 5—6. ☉

24. *T. Cherleri* L. K. syn. Sonnige Hügel, Wege im südl. Geb., Krain, Littoral, Istrien, Insel Osero, Dalmatien, Piemont, Nizza. 5—6. ☉

25. *T. arvense* L. K. syn. Var. β . strictius: *T. Brittingeri* Weitenweber. Brachfelder, Aecker, Wege im g. Geb. 7—9. ☉

26. *T. ligusticum* Balb. Rehb. exc. Im südlichsten Geb., Ligurien, um Savona u. 7—8. ☉

27. *T. succinctum* Visian. Fl. Dalm. Rehb. exc. Grasige Orte in Dalmatien bei Sebenico u. Salona. 5. ☉

28. *T. supinum* Savi. Rehb. exc. *T. alexandrinum* Willd. Hügel, Abhänge, Wege im südlichsten Geb., Dalmatien, Oberitalien. 5—6. ☉

29. *T. dalmaticum* Visian. Rehb. exc. Grasige Orte in g. Dalmatien. 2—6. ☉

30. *T. Bocconii* Savi. K. syn. Schattige Orte im südl. Littoral, Istrien Insel Brioni, Dalmatien. 6—7. ☉

31. *T. striatum* L. K. syn. Rehb. exc. *T. scabrum* Schreb. *T. conicum* Rehb. exc. Grasige, uncultivirte Orte, Brachfelder, Raine, stchw. dch. d. Geb., Südschweiz; Rheing., Elsaß an d. Fecht u. Lauch; Oberbaden bei Mühlheim, Mannheim, Pfalz bei Kaiserslautern, Homburg; Rothenberg bei Bingen, Flora v. Trier bei St. Wendel, Bertrich an d. Mosel, Eifel bei Mauderscheid, Gillenfeld beim Pulver-

maar zw. Daun u. Euzrath, Aachen, Jülich, Neuwied am Wernerseck, Westphalen dch. Hannover, Mecklenburg, Harz, Sachsen, Thüringen; Böhmen, Tyrol, Krain, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 6—7. ☉

32. *T. scabrum* L. K. syn. Trockene grasige Orte, stellw. im Geb., Rheing., Basel, Elsaß bei Cernay u. Straßburg; Oberbaden, Mannheim beim Relaihause, Thüringen bei Halle; Oestr. Littoral Istrien bei Fiume, Triest, Görz, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Venedig, Piemont; Schweiz Cant. Waadt bei Nyon u. Aelen. 5—6. ☉

33. *T. saxatile* Allion. K. syn. *T. thymiflorum* Vill. *T. glaciale* Reyn. Hochalpen d. Schweiz Cant. Wallis auf d. Matterhorn, um d. Finelenweiler, M. Stock im Nicolaithale, M. Simplon; Lombardei. 7—8. 4

34. *T. clypeatum* L. Rechb. exc. Im südlichsten Geb. Piemont bei Casal Borgogne. 6—7. ☉

Zweite Rotte. *Trychocephalum* Koch. syn.

35. *T. subterraneum* L. K. syn. Grasige Orte im südl. Geb., Littoral Istrien, Triest, Insel Dsero, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Verona, Piemont, Nizza u. in Belgien. 4—5. ☉

Dritte Rotte. *Fragifera* Koch syn.

36. *T. fragiferum* L. K. syn. Etwas feuchte Wiesen, Tristen, Ufer, stellw dch. d. g. Geb., Rheing. v. Basel bis zu d. Niederlanden nicht selten u. 6—9. 4

37. *T. resupinatum* L. K. syn. Grasige Orte am südl. Littoral, Istrien, Insel Dsero, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont, Nizza. 6—7. ☉

38. *T. tomentosum* L. K. syn. Grasige Orte im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien; Nizza. 5—6. ☉

39. *T. multistriatum* Koch K. syn. Grasige Orte am südl. Littoral, Istrien bei Triest, Dalmatien. 7—8. ☉

40. *T. vesiculosum* Savi Rechb. exc. *T. vesiculosum* et mutabile Host. austr. *T. recurvum* W. et Kit.

T. mutabile Portenschl. Bewachsene Orte in Dalmatien u. Ungarn unter d. Matra. 7—8. 4

Vierte Rotte. *Lupinaster* DC. prodr. K. syn.

41. *T. alpinum* L. K. syn. Hochalpen im Urgebirge, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Tyrol, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont etc. 6—8. 4

Fünfte Rotte. *Trifolium* DC. prodr. K. syn.

42. *T. montanum* L. K. syn. Gebirgswiesen, stellenw. dch. d. g. Geb. 5—7. 4

43. *T. parviflorum* Ehrh. K. syn. *T. strictum* Schreb. L. Sonnige Hügel, Abhänge, stellenw. im Geb., Thüringen bei Halle, Körlitz, Göttingen; Böhmen bei Prag, Dalmatien, Galizien, Ungarn. 6. ☉

44. *T. strictum* W. et Kit. K. syn. in add. 1020. Etwas feuchte, grasige Orte im südl. Geb., Vittoral, Istrien zw. Pola u. Barbana bei Altura, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont. 5—6. ☉

45. *T. glomeratum* L. K. syn. Bewachsene Bergstellen, an Wegen im südl. Vittoral, Istrien, Insel Brioni, Dalmatien, Lombardei, Piemont, Nizza, Oberitalien. 6—7. ☉

46. *T. suffocatum* L. K. syn. Sandige Orte im südl. Geb., Ungarn, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Piemont, Nizza. 4—5. ☉

47. *T. repens* L. K. syn. Var. β . minor: *T. prostratum* Biasol. *T. Biasolettianum* St. et Hochst. Wiesen, Triften, Wege, Aecker, Felder, dch. d. g. Geb. 5—9. 4

48. *T. pallescens* Schreb. K. syn. *T. caespitosum* Sturm. *T. glareosum* Schleich. Triften d. Hochalpen im Urgebirge; Schweiz Cant. Wallis im Saas- u. Nicolai-Thale am M. Moro, u. über Bermatten, Kärnten, Tyrol, Krain, Salzburg, Vittoral, Lombardei, Venedig. 7—9. 4

49. *T. caespitosum* Reynier K. syn. Triften u. tiefige Orte d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach

Steiermark, Tyrol im Pechthale bei Füssen, Krain, Istrien, Ungarn, Lombardien. 7—8. 4

50. *T. nigrescens* Visiani. K. syn. *T. hybridum* Savi. *T. polyanthemum* Tenore. Wiesen, Wege im südl. Geb., Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig. 5—6. ☉

51. *T. hybridum* L. K. syn. *T. Michelianum* Gaud. Etwas feuchte Wiesen, besonders auf Rhon, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. Oberbaden, vom Bodensee bei Salem u. bis Graben, Pfalz von Speier bis Dürkheim, Mainz, Bingen, Kreuznach, Trier, Coblenz, Aachen u., Hamburg, Thüringen u. 5—9. 4

52. *T. elegans* Savi. K. syn. *T. formosum* Savi. *T. decumbens* F. W. Schultz in litt. Bewachsene Gebirgsstellen, Hügel, Waldränder, besonders auf Mergel, Kalk u. Kohlen sandstein, stchw. im Geb., Rheing. bei Hagenau, Bitsch, Pfalz bei Zweibrücken, Kusel, St. Wendel, Waldmohr, im Glan- u. Bliesthale, Sachsen, Lausitz u., Destr. Vittoral, Istrien bei Trieste, Croatien, Ungarn, Lombardien. 6—7. 4

53. *T. Michelianum* Savi. Rehb. exc. K. syn. in adn. 193. *T. Vaillantii* Loisl. *T. fistulosum* Thuill. Feuchte Wiesen, Acker im südlichsten Vittoral, Lombardien, Oberitalien. 6—7. ☉

54. *T. angulatum* W. et Kit. Rehb. exc. Gräser, salzhaltiger Boden, im südl. Geb., Croatien, Ungarn, Siebenbürgen. 6. ☉

Sechste Rotte. *Chronosemium* Ser. DC. prodr.
K. syn.

55. *T. spadiceum* L. K. syn. Feuchte Torfwiesen, stchw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, Rheing., Oberbaden bei Billingen, Freiburg im Breisgau, Offenbach bei Frankfurt, Weilburg, Neuwied, Fl. v. Trier, Eifel bei Stadtkyll, Aremberg, Malmédy u.; Thüringen Jena, Baiern u. Wür-

temberg, Sachsen, Preußen u.; Destr. Böhmen, Mähren bis Ungarn u. in d. Lombardei. 7—8. ☉

56. *T. badium* Schreb. K. syn. *T. spadiceum* Vill. Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Vittoral, Galizien, Ungarn, Lombardei. 7—8. ☉ u. 4

57. *T. agrarium* L. K. syn. *T. aureum* Pollich. *T. campestre* Gmel. bad. Bergwiesen, Waldränder, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

58. *T. procumbens* L. K. syn. *T. agrarium* Pollich. Var. α . *majus*: *T. campestre* Schreb., *T. agrarium* Gmel. — β . *minus*: *T. procumbens* Schreb. *T. pseudoprocumbens* Gmel. Wiesen, Raine, Wege, Felder, Aecker dch. d. g. Geb. 5—9. ☉

59. *T. patens* Schreb. K. syn. *T. parisiense* DC. *T. aureum* Thuill. *T. chrysanthum* Gaud. helv. Gräßige Orte im südl. Geb., Schweiz Cant. Graubünden, Tessin, Veltlin; Tyrol, Steyermark, Krain, Vittoral, Istrien, Triest, Görz u., Venedig. 6—8. ☉

60. *T. filiforme* L. K. syn. *T. procumbens* Pollich. Gmel. *T. minus* Smith. Var. β . *minimum* Gaud. helv. Wiesen, Wegeränder, Aecker dch. d. g. Geb. 5—9. ☉

61. *T. micranthum* Vivian. K. syn. *T. filiforme* Smith. Wiesen im südl. Vittoral, Istrien bei Pola u. Fasana. 5—6. ☉

170. *Dorycnium* Tournef. Bockenklee. K. syn.

195. Rechb. exc. p. 507. Comp. II. p. 198.

1. *D. suffruticosum* Vill. delph. K. syn. *D. pentaphyllum* Rechb. exc. *D. monspeliense* Willd. *Lotus Dorycnium* L. Sonnige Bergtriften im g. südl. Geb., Baiern in d. Isarauen bei München; Schweiz im Cant. Graubünden; Destr. Türkenchanze bei Wien, Steyermark, Tyrol, Krain, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 5—6. 4

2. *D. herbaceum* Villars. K. syn. *D. sabaudum*.

Rchb. exc. *D. intermedium* Ledeb. Sonnige Bergtriften im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin; Oestr. Steyermark, Tyrol, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

3. *D. parviflorum* Seringe. DC. prodr. II. 208. Maly enum. pl. austr. p. 355—399. Im südl. Eittoral, Dalmatien, Lombardei. 4—7. ☉

4. *D. argenteum* DC. Rchb. exc. Im südlichsten Geb., Piemont um Nizza. 6—7. 5

171. Bonjeania Rchb. Bonjanie. K. syn. 196. Rchb. exc. p. 507. Comp. II. p. 199.

1. *B. hirsuta* Rchb. exc. K. syn. *Lotus hirsutus* L. *Dorycnium* — tum DC. Var. β . *incana*: *Lotus sericeus* DC. L. *tomentosus* Rohde. Steinige Orte im südl. Geb., Eittoral, Istrien, Insel Dsero, Cherso, Fiume, Südtirol, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza u. 5—6. 4

2. *B. recta* Rchb. exc. *Lotus rectus* L. *Dorycnium rectum* Seringe. Aecker im südlichsten Eittoral, Piemont, Nizza, Genua. 5—6. 5

172. Lotus L. Schotenflee. K. syn. 196. K. Taschb. 136. Rchb. exc. p. 505. Comp. II. p. 200.

1. *L. edulis* L. Rchb. exc. *Kroeckeria oligoceros* Moench. Steinige Orte, Olivengärten im südl. Eittoral, Istrien, Insel Sansego, Dalmatien; Piemont, Nizza, Dne-glia, Ligurien. 5—6. ☉

2. *L. ornithopodioides* L. K. syn. Bewachsene Orte, an Mauern, im südl. Eittoral, Istrien, Insel Dsero, Dalmatien, Ligurien. 4—6. ☉

3. *L. peregrinus* L. Rchb. exc. L. *Dioscoridis* All. pedm. L. *oligoceros* Lamk. Aecker im südlichsten Eittoral, Dalmatien auf d. Insel Solta; Piemont, Nizza. 5—6. ☉

4. *L. cytisoides* L. K. syn. Cultivirte Orte im

südl. Vittoral, Istrien, Insel Dsero, Dalmatien, Nizza. 5—6. 4

5. *L. hispidus* Desf. Rehb. exc. *L. odoratus* Schousby. Piemont, Nizza. 5—6. ☉

6. *L. gracilis* W. et Kit. Rehb. exc. *L. angustissimus* Host. austr. Salzhaltige Wiesen in Ungarn um Temeswar im Jachwalde. 6—8. ☉

7. *L. corniculatus* L. K. syn. *L. arvensis* Schkr. Var. β . *ciliatus*: *L. ciliatus* Tenore. Rehb. exc. — γ . *hirsutus*: *L. villosus* Thuill. Waldränder, Wiesen, Tristen, Ufer, Wege, im g. Geb., Var. β . im südlichen. 5—9. 4

8. *L. tenuifolius* Rehb. exc. K. syn. *L. corniculatus* γ . *tenuifolius* Pollich. *L. tenuis* Kitaib. *L. decumbens* Forst. *L. depressus* W. Wiesen, besonders auf salzführendem Boden, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Baden im Breisgau, bei Mühlheim, Rheinwiesen bei Karlsruhe, Pfalz bei Flormersheim, Dürkheimer Salinen, Frankenthal, Eifel, Fl. v. Trier, Jena, Thüringen, Sachsen u., Schweiz Cant. Valais, im Rhonethale, Destr. Ungarn, Siebenbürgen. 5—8. 4

9. *L. uliginosus* Schkr. K. syn. *L. major* Smith. Scopoli. *L. vindicatus* Boeningh. Sumpfige Wiesen, Teiche, besonders auf Torfboden, an Gräben, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

10. *L. angustissimus* L. K. syn. *L. diffusus* Smith. Wiesen am südl. Vittoral, Istrien bei Pola u. Fasana u. in Ungarn. 6—7. ☉

11. *L. creticus* L. Rehb. exc. Steinige Orte im südlichsten Vittoral, Piemont, Nizza. 5—6. 3

12. *L. coimbricensis* Brot. Comp. II. p. 203. *L. aristatus* DC. Gemüsegärten in Belgien. 7—8. ☉

173. *Tetragonolobus* Scopoli. Spargelerbse.

K. syn. 198. Rehb. exc. p. 506. Comp. II. p. 203.

1. *purpureus* Moench. K. syn. *Lotus Tetragonolobus* L. Steinige Orte im südl. Geb., Dalmatien, Combar-

bei, Piemont, Nizza, u. im übrigen Geb. cultivirt.
7 — 8. ☉

2. *T. siliquosus* Roth. K. syn. *T. prostratus* Mueh.
Lotus siliquosus L. Var. β . *maritimus*: *Lotus maritimus* L.
Nasse-Wiesen, Tristen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., an
Gräben v. Oberbaden, Constanx etc., fast auf d. g. Rhein-
fläche bis zur Ockenheimer Spitze bei Bingen, an d. Nahe
u. Lahn; Württemberg, Baiern, Sachsen, Jena, Thüringen,
Preußen bei Thorn; Oestr. u. Var. β . an salzhaltigen Orten,
Salinen, Pfalz an d. Salinen bei Dürkheim etc. 5—6. 4

174. *Psoralea* L. *Psoralea*. Rehb. exc. p. 539.

Comp. II. p. 204.

1. *P. bituminosa* L. Rehb. exc. Hügel, Weingärten,
Necker im südl. Geb., Dalmatien bei Spalato, Ligurien.
5—6. 4

2. *P. plumosa* Rehb. exc. in add. p. 869. Steinige
Orte im südl. Littoral, Dalmatien. 5—6. 4

175. *Glycyrrhiza* L. Süßholz. K. syn. 198. Rehb.
exc. p. 513. Comp. II. p. 205.

1. *G. glabra* L. K. syn. *Liquiritia officinalis* Mueh.
An Bäumen, im südl. Geb., Littoral, Istrien, Dalmatien,
Lombardien, Venedig; auch angepflanzt z. B. bei Bamberg etc.
6. 4

2. *G. glandulifera* W. et Kit. Rehb. exc. In Ge-
büschen auf d. Margarethen-Insel, in Ungarn u. Galizien.
5—6. 4

3. *G. spinescens* Sieber. Rehb. exc. Im südl. Lit-
toral, Istrien a. d. Insel Cherso. 5. 4

4. *G. echinata* L. Rehb. exc. Feuchte Wiesen, unter
Gebüschen am südl. Littoral, Dalmatien, Croatien, Ungarn
gegen d. Theiß u. an d. Donau. 6—8. 4

176. *Galega* L. Geißraute. K. syn. 198. Rehb. exc.
p. 513. Comp. II. p. 206.

1. *G. officinalis* L. K. syn. Sumpfige Wiesen, Gräben, Ufer, stellw. mehr im südl. Geb., Baiern, Jena, Sachsen an d. Elbe bei Dresden, Schlessien an d. Oder bis Frankfurt, Schweiz bei Luzern u. in Graubündten, Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Krain, Ungarn bis in d. Lombardei. 7—8. 4

177. *Robinia* L. Robinie. Rechb. exc. p. 514.

1. *R. Pseudo-acacia* L. Rechb. exc. Im g. Geb. angepflanzt u. stellw. verwildert. 5—6. 3

178. *Colutea* L. Blasenstrauch. L. K. syn. 199. Rechb. exc. p. 514. Comp. II. p. 207.

1. *C. arborescens* L. K. syn. *C. hirsuta* Roth. Bewachsene Geb., Anhöhen, Waldstellen, stellw. besonders im g. südl. Geb., Rheing., Oberelsaß, Oberbaden, Breisgau am Kaiserstuhl, Luxemburg, Thüringen, Jena, Weimar, Baiern bei Regensburg; Schweiz Cant. Graubündten; Destr. in allen Provinzen bis Venedig; auch stellw. im Geb. verwildert. 5—6. 3

2. *C. orientalis* Du Roi. K. syn. *C. cruenta* Ait. *C. humilis* Scopol. Hügel, Rulsdorf u. Hainstadt bei Halle, Dalmatien, u. am Rheinufer bei Coblenz verwildert. 6. 3

179. *Phaca* L. Berglinse. K. syn. 199. Rechb. exc. p. 507. Comp. II. p. 207.

1. *P. frigida* L. K. syn. *P. alpina* L. sp. *P. ochreatea* Crantz, *Astragalus pubescens* Schkr. *Colutea frigida* Poir. Triften d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. Tyrol, Ungarn bis in d. Lombardei. 7—8. 4

2. *P. alpina* Jacq. K. syn. *Colutea* — Lamk. Steinige Orte d. Alpen, Südschweiz nach Tyrol, Kärnthen, Salzburg, Krain, Galizien, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

3. *P. australis* L. K. syn. *P. Halleri* Vill. delph. *Colutea australis* Lamk. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Salzburg, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Galizien, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

4. *P. astragalina* DC. K. syn. *P. minima* All. pedm. *Astragalus alpinus* L. Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Kärnthen, Krain bis in d. Lombardei. 7—8. 4

5. *P. oroboides* DC. K. syn in add. 442. *Astragalus* — Hornem. Alpentriften in Obersteiermark a. d. Rothzugen u. in d. Karpathen. 7—8. 4

180. *Oxytropis* DC. Spitzfahne. K. syn. 200. Rchb. exc. p. 508. Comp. II. p. 200.

1. *O. Halleri* Runge. K. syn. *O. uralensis* DC. *Astragalus* — Jacq. *Phaca* — Wahlenb. Var. β . *velutinus*: *Astragalus velutinus* Sieber. Riesige Orte d. Alpen u. Bor-alpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis, Tyrol, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Karpathen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont. 5—7. 4

2. *O. campestris* DC. K. syn. *Astragalus* — L. *Phaca* — Wahlenb. Var. β . *sordida*: *O. sordida*, Gaud. *Phaca* — Wahlenb. *Astragalus sordidus* Willd. *A. uralensis* L. succ. *A. tyrolensis* Sieber. — γ . *caerulea*. Steinige, grasige Orte d. Alpen u. Bor-alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steiermark, Croatien, Ungarn, Lombardei. Var. β . Salzburg im Fuschertal. 7—8. 4

3. *O. foetida* DC. K. syn. *Astragalus foetidus* Villars, *A. Halleri* All. pedm. Hochalpen d. Schweiz im Cant. Wallis im Nicolaithale auf d. Matterhorn u. M. Staffel, Gornergletscher, Galenberg u. in d. Lombardei. 7—8. 4

4. *O. pilosa* DC. K. syn. *Astragalus pilosus* L. Sandfelsen, bewachsene Hügel, stellw. im Geb., Rheing., auf Porphyr u. Kohlen-sandsteingeb. an d. Nahe, Kreuznach auf d. Rothenfels u. v. da bis Norheim u. Schloß Böckelheim, Thüringen, Sachsen, Berlin, Preußen bei Thorn, Graudenz, Frankfurt a. d. O., Schlesien, Oestr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Lombardei. 6—7. 4

5. *O. lapponica* Gaud. K. syn. *Phaca* — Wahlenb.

helv. *P. montana* Wahlenb. lappon. *Astragalus valesiacus* Thom. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis, Nicolaithal über Bermatten bei Nufenen, am Schwarzeberg, auf d. Grise, Magineralpen, Tyrol, Lombardei. 7. 4

6. *O. montana* DC. K. syn. *Phaca* — Crntz. *Astragalus* — us L. Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Tyrol, Lombardei u. 8. 4

7. *O. cyanea* M. v. Bieb. K. syn. Triften der Hochalpen in d. Schweiz, Cant. Wallis, Nicolaithal über Bermatten, am Galenberg (Schwarzeberg). 7—8. 4

8. *O. triflora* Hoppe. K. syn. Steinige Triften d. Alpen, Kärnthen, auf d. Tauern d. Fleiß bei Heiligenblut, Steyermark, Salzburg, Tyrol u. Krainer Alpen. 7—8. 4

181. *Astragalus* L. Tragant. K. syn. 202. Rchb. exc. p. 509. Comp. II. p. 212.

1. *A. leontinus* Wulf. K. syn. Felsen d. Alpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis, im Nicolaithal über Bermatten, Bagnes-Thal u. Anniviers; Tyrol auf d. Lienzer u. Windau-Alpen, Krain, Dalmatien. 7—8. 4

2. *A. purpureus* Lamrk. K. syn. *A. bidentatus* Sant. Felsen d. Alpen, Südtirol, M. Schlehern, M. Prebajza, Dalmatien u. in d. Lombardei. 7—8. 4

3. *A. hypoglottis* L. mantis. K. syn. *A. epiglottis* L. syst. *A. arenarius* Pall. *A. danicus* Retz. *A. Onobrychis* Pollich. *A. microphyllus* Willd. non L. Wiesen, Triften, Sandfelder, stellw. dch. d. mittlere Geb., Rheing., Elsaß bei Straßburg, Pfalz bei Mannheim, Speyer, Dürkheim, Maxdorf bis Mainz, Laubenheim, Nierstein, Thüringen bei Jena, Hannover, Pommern bei Stettin, Frankfurt a. d. O., Schlesien, Böhmen, Mähren, Tyrol u. Ungarn. 5—6. 4

4. *A. Onobrychis* L. K. syn. Wiesen, Triften, Raine, Wege, im südl. Geb. bis in d. Alpen, Schweiz Cant. Wallis im Visp-Thale, Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Krain, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Vendeig, Piemont. 6—7. 4

5. *A. arenarius* L. K. syn. Nadelholzwälder, sandige Brachfelder, theilw. im Geb., Thüringen, Preußen, Memel, Danzig, Königsberg, Schlesien, Lausitz, Pommern, Brandenburg, Mecklenburg, Baiern bei Nürnberg, Böhmen, Ungarn.

6—7. 4

6. *A. chlorocarpus* Grieseb. Fl. Rum. Maly enum. pl. austr. p. 358—399. *A. Rochelianus* Heuffel, *A. Onobrychis* β . *banaticus* Rochel. Sonnige Felsen im Banat an d. Donau. 6. 4

7. *A. austriacus* Jacq K. syn. *A. dichopterus* Pall. Gräßige Hügel, Felser, Wiesen; Destr. Böhmen, Mähren, Krain, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

8. *A. sulcatus* L. K. syn. *A. leptostachys* Pallas. Gräßige, sumpfige Orte an Seen, Unterösterreich u. Ungarn. 6—7. 4

9. *A. argenteus* Bertolon. sec. Visian. K. syn. *A. Mülleri* Steud. et Hochst. *A. virgatus* Rehb. exc. *A. subulatus* Koch Flora. *A. vegliensis* Sadler. Felsen im südl. Eittoral, Istrien, Inseln Cherso, Dsero u. Veglia, Dalmatien. 5—6. 4

10. *A. virgatus* Pall Host. Fl. austr. II. 355. Maly enum. pl. austr. p. 358. Sandboden in Ungarn. 5—6. 4

11. *A. vesicarius* L. K. syn. *A. albidus* W. et Kit. *A. glaucus* M. v. Bieb. *A. dealbatus* Pallas. Kalkfelsen in d. südl. Kette, Schweiz in Graubünden zw. Glurens u. Prat; Südtirol, Krain M. Manas, Eittoral, Istrien bei Triest, Schaun, M. Spallato, Dalmatien, Ungarn, Venedig, Piemont. 5—6. 4

12. *A. Pastellianus* Pollini DC. prodr. II. 307. Maly enum. pl. austr. p. 359—400. Sonnige Felsen in d. Lombardei, M. Pastello unweit Verona. 5—6. 4

13. *A. sesameus* L. K. syn. *A. stellatus* Rivin. Unfruchtbare Orte am südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei. 4—6. ☉

14. *A. Cicer* L. K. syn. *A. microphyllus* Schübl. et Mart. Wiesen, Triften, Raine, Begeränder, theilw. bch.

b. Geb., Rheing., Elsaß, Baden im Breisgau, Heidelberg, Labenburg, Pfalz Speier, Frankenthal, Weisenau bei Mainz, Hanau bei Hochstetten, Coblenz bei Rübenach u. Bassenheim; Schwaben, Baiern, Thüringen Jena, Barby, Halle, Mecklenburg, Preußen Königsberg, Thorn, Graudenz; Destr. in allen Provinzen. 6—7. 4

15. *A. contortuplicatus* L. Rchb. exc. Salzboden, Felser, Seen in Ungarn bei Pesth gegen d. Theiß. 6—8. ☉

16. *A. hamosus* L. K. syn. *A. Buceras* Willd. Im südl. Eittorale, Istrien auf Veglia, Dalmatien, Lombard. 5—6. ☉

17. *A. glycyphyllos* L. K. syn. *A. rotundifolius* Presl. Waldränder, Bergwiesen, grasige Raine, Wegeränder, stchw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

18. *A. depressus* L. K. syn. *A. leucophaeus* Smith. Felsen d. Alpen, im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis u. um Aelen; Südtirol, Dalmatien, Venedig. 5—6. 4

19. *A. asper* Jacq. K. syn. *A. chloranthus* Pallas. Sandige Wiesen, Wege; Destr. bei Wien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. 4

20. *A. galegiformis* L. Rchb. exc. Wiesen in Siebenbürgen. 6—7. 4

21. *A. alopecuroides* L. Rchb. exc. Schweiz über d. St. Bernhard, Valle d'Aost im Cogneß-Thale. 6—7. ☉

22. *A. aristatus* l'Herit. K. syn. *A. sempervirens* Lamrk. Phaca *Tragacantha* All. pedm. Alpen d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis Nicolaithal über Bermatten, M. Foully, Waadt; Dalmatien M. Biokovo, Lombard, Piemont. 6—8. 5

23. *A. Poterium* Pall. Host. Fl. austr. II. 355. Maly enum. pl. austr. p. 359. Felsen in Dalmatien. 5

24. *A. illyricus* Bernh. Bluff et Fgh. Comp. II. p. 220. *A. coccineus* Bernh. Im südl. Eittoral, Istrien, Insel Veglia u. in Dalmatien. 5. 4

25. *A. monspessulanus* L. K. syn. *A. praecox* Baumg. Grasige Hügel, Abhänge im südl. Geb., Schweiz

Cant. Wallis im Vispachthale, bei Nelen, Graubünden bei Chur; Croatien, Dalmatien, Ungarn, Südtirol bei Bozetto, Lombardei, Piemont. 4—5. 4

26. *A. incurvus* Desf. Fl. Atl. Rchb. exc. K. syn. in add. 1021. *A. Wulfenii* Koch. K. syn. 207. *A. incanus* Wulf. Steinige Orte, Triften im südl. Vittoral, Istrien bei Triest u. auf d. Inseln, Dalmatien, Croatien. 5. 4

27. *A. exscapus* L. K. syn. Sandige Wiesen, Wald- u. Wegeränder aus d. Ebene bis in d. Boralpen, stello. Thüringen bei Frankenhäusen u. Halle; Böhmen bei Prag, Mähren, Tyrol, Ungarn, Lombardei; Schweiz Cant. Wallis, Vispachthal bei Stalten. 5—6. 4

28. *A. dasycanthus* Pallas Rchb. exc. *A. eriocephalus* W. et Kit. *A. pannonicus* Schult. Sandhügel im Fluglande, Ungarn, im Banat u. Siebenbürgen. 7. 4

III. Gruppe. Hedysareen DCand.

182. *Scorpiurus* L. Scorpionkraut. K. syn. 207. Rchb. exc. p. 541. Comp. II. p. 221.

1. *S. muricata* L. Rchb. exc. Bewachsene Orte im südl. Vittoral, Dalmatien, Piemont, Nizza. 5—6. ☉

2. *S. subvillosa* L. K. syn. Ackerländer, an Wegen im südl. Vittoral, Istrien, Insel Beglia u. St. Andreas, Croatien, Dalmatien, Nizza. 6. ☉

3. *S. vermiculata* L. Rchb. exc. Felder, Wege, in Piemont. 5—6. ☉

183. *Coronilla* L. Kronwicke. K. syn. 208. Rchb. exc. p. 541. Comp. II. p. 222.

1. *C. Emerus* L. K. syn. *Emerus major*. Miller. Gebirgswälder bis in d. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette dch. Boralberg nach Baiern, Tyrol, Destr., bis in d. südl. Vittoral; Rheing., Oberbaden am Kaiserstuhl, Oberelsaß, bei Hohenneuffen, in Württemberg etc. 5—7. 3

2. *C. vaginalis* Lamk. K. syn. *C. minima* Jacq.

Bergtriften bis in d. Boralpen u. Alpen; Thüringen, Würzburg; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Dalmatien nach Ungarn bis in d. Lombardei. 5—7. 4

3. *C. juncea* L. DC. prodr. II. 309. Maly enum. pl. austr. p. 360—400. In Dalmatien. 5

4. *C. minima* L. K. syn. *C. minima* α . Lamk. *C. coronata* minor. Rchb. icon. Var. β . *lotoides* Koch. *C. coronata* DC. *C. minima* β . Lamk. *C. Clusii* Dufour. Bergabhänge, trockene Hügel im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Varen u. Gieders; Lombardei. 7—8. 5

5. *C. montana* Scopoli. K. syn. *C. coronata* L. Host. Jacq. Bewachsene Kalkgebirge; in allen Juratheilen, in Oberbaden, Württemberg bei Mundelfingen am Randen, bei Hohenneuffen, Hessen bei Wildungen, Baiern bei Werthheim u. Würzburg, Schwäbische Alp bis Regensburg; Thüringen bei Jena; Destr. Steyermark, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Ungarn bis in d. Lombardei. 6. 4

6. *C. scorpioides* Koch K. syn. *Ornithopus* — L. *Arthrolobium* — DC. prodr. Rivin. Rchb. exc. Wein- u. Olivengärten, Felder am südl. Vittoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 5—6. ☉

7. *C. glauca* L. Rchb. exc. Felsen im südl. Geb., Dalmatien, Lombardei, Piemont, Nizza. 6—7. 5

8. *C. valentina* L. Rchb. exc. Felsen im südl. Geb. Dalmatien, Lombardei, M. Sumana bei Vicenza auf d. Montalbano bei Nizza. 6—7. 5

9. *C. cretica* L. K. syn. *C. parviflora* Moench. non Willd. Grasse Orte, an Wegen im südl. Vittoral, Istrien bei Fiume, Inseln Cherso u. Dsero, Dalmatien. 5—6. ☉

10. *C. varia* L. K. syn. Sonnige Hügel, Abhänge, Raine, Wiesen, Begeränder, Felder; stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten. 6—7. 4

184. *Ornithopus* L. Vogelfuß. K. syn. 209.

Rchb. exc. p. 540. Comp. II. p. 225.

1. *O. perpusillus* L. K. syn. Var. β . major: *O. intermedius* Roth. Sandboden, lichte Waldstellen, Heiden, Sandfelder, stellw. dch. d. Geb., Rheing. von Basel bis in d. Niederlanden u. Westphalen an vielen Orten, bis Preußen bei Danzig; dann in Tyrol, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Galizien, Siebenbürgen, Lombard. 5—6. ☉

2. *O. sativus* Brotero. *O. intermedius* Rchb. exc. non Roth. *O. roseus* Dufour, *O. perpusillus* β . DC. Grasige, sandige Orte im südlichsten Geb., Oberitalien. 5—7. ☉

3. *O. compressus* L. Rchb. exc. Wiesen im südl. Geb., Dalmatien; Piemont, Genua, Nizza u. 4—5. ☉

185. *Arthrolobium* Desf. Gelenkhülse. Rchb. exc. p. 540. Comp. II. p. 226.

1. *A. ebracteatum* DC. prodr. Rchb. exc. *Ornithopus* — Brotero. Grasige Orte in Piemont, Ligurien, Genua, bei Nizza. 4—5. ☉

186. *Hippocrepis* L. Hufeisenflee. K. syn. 210.

Rchb. exc. p. 540. Comp. II. p. 227.

1. *H. comosa* L. K. syn. Sonnige Gebirgsstellen, Felsen, besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. mittlere u. südl. Geb. bis in d. Alpen, Rheing. an vielen Orten von Basel bis Coblenz, Bonn, Trier, Luxemburg u. 5—6. 4

2. *H. unisiliquosa* L. K. syn. Felsen im südl. Geb., Tyrol, Vittoral, Istrien bei Saule, Dalmatien, Siebenbürgen, Piemont M. Balbo, Nizza, Ligurien, Oberitalien. 3—6. ☉

3. *H. biflora* Spreng. Rchb. exc. In Dalmatien bei Sebenico. 5—6. ☉

4. *H. flexuosa* Host. Fl. Austr. II. 348. Maly enum. pl. austr. p. 361. Ungarn auf d. Halbinsel Thrain. ☉

5. *H. ciliata* Willd. Rchb. exc. Im südl. Littoral, Dalmatien, Piemont, Nizza. 5. ☉

6. *H. multisiliquosa* L. Rchb. exc. Im südl. Littoral, Dalmatien bei Sebenico, Piemont, Nizza. 5. ☉

187. *Securigera* DC. Beilwiede. K. syn. 210. Comp. II. p. 228.

1. *S. Coronilla* DC. K. syn. *Bonaveria Securidaca* Rchb. exc. p. 541. *Coronilla* — *L. Securidaca lutea* Mill. *Securid. legitima* Gaertn. Aecker im südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Insel Veglia, Dalmatien, Figurien, Genua. 5—6. ☉

188. *Hedysarum* L. Süßflee. K. syn. 210. Rchb. exc. p. 543. Comp. II. p. 229.

1. *H. spinosissimum* L. Rchb. exc. Sandiger Seestrand im südl. Littoral; Figurien, Nizza. 6. ☉

2. *H. capitatum* Desf. Rchb. exc. *H. variegatum* Portenschl. Im südl. Littoral, Dalmatien, Insel Lefina. 6. ☉

3. *H. obscurum* L. K. syn. *H. alpinum* Gmel. Sib. *H. controversum* Crntz. Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. 2c. Schlessien in d. Sudeten, Böhmen, Mähren 2c. 7—8. 4

4. *H. coronarium* L. Rchb. exc. Wiesen im südlichsten Geb. in d. Lombardei, Piemont bei Rivoli 2c. 6—7. 4

189. *Onobrychis* L. Tournesf. Esparsettenflee. K. syn. 211. Rchb. exc. p. 542. Comp. II. p. 230.

1. *O. foveolata* DC. Rchb. exc. Sandige Orte in Dalmatien um Torno. 6. ☉

2. *O. Crista galli* Lamk. *Hedysarum* — *L. Malyenum*. pl. austr. p. 361. Aecker, Wege in Dalmatien. 6. ☉

3. *O. Caput galli* Lamk. Rchb. exc. *Hedysarum* — *L.* Sandboden, Felser am südl. Littoral, Dalmatien, Piemont, Nizza, Figurien. 6—7. ☉

4. *O. sativa* Lamk. K. syn. Rchb. exc. *O. viciaefolia* Scopol. *O. vulgaris* Gaud. *O. spicata* Moench. *Hedysarum Onobrychis* L. — Var. β . *montana*: *O. montana* DC. Rchb. exc. Bergwiesen, Hügel besonders auf Kalk im g. südl. u. mittleren Geb., Rheing. fast allenthalben; Var. β . Alpen u. Gebirge; Rheing. bei Zweibrücken, Saargemünd, Trier an d. Obermosel, Luxemburg u., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr., Tyrol u. 5—7. 4

5. *O. arenaria* DC. K. syn. *O. carnea* Schleicher. *O. supina* Gaud. *O. sativa* γ . D. Fl. *Hedysarum arenarium* Kitaib. *H. pallidum* Schleicher. *H. angustifolium* Thomas. Sonnige Kalkgebirge im südl. Geb., Vittoral, Istrien bei Triest, Ungarn, Lombardien, Schweiz im Cant. Wallis bei Sarnen unweit Leuk. 6—7. 4

6. *O. alba* Desf. Rchb. exc. *Hedysarum album* W. et Kit. Kalkfelsen in Dalmatien, Ungarn. 6. 4

7. *O. saxatilis* Allion. Rchb. exc. *O. tenuifolium* Moench. *Hedysarum saxatile* L. Host. Austr. Sonnige Hügel im südl. Geb., Südtirol; Piemont, Nizza. 6—7. 4

8. *O. petraea* Spreng. *Hedysarum petraeum* Host. Austr. Maly enum. pl. austr. p. 361. Auf d. Carpathen in Ungarn. 4

IV. Gruppe. Viciaen Bronn.

190. *Cicer* L. Richer. K. syn. 212. Rchb. exc. p. 532. Comp. II. p. 232.

1. *C. arietinum* L. K. syn. Saatacker im südl. Geb., Destr. Tyrol, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Venedig; auch angebaut besonders im südl. Geb. u. dort auch verwildert. 6—7. ☉

191. *Vicia* L. Wicke. K. syn. 212. Rchb. exc. p. 532. Comp. II. p. 232.

Erste Rotte. Erviliae Koch.

1. *V. pisiformis* L. K. syn. *Ervum pisiforme* Peterm. Fl. lip. Gebirgswälder, Paine, stellw. dch. d. g. Geb.

bis in d. Boralpen, Rheing., Oberbaden bei Stockach, Biel, St. Wolfgang, dch. Württemberg bis Baiern, Wertheim bis zum Taunus, Elsaß, Harbtgeb. bei Neustadt, Steinebach am Donnersberg, Nahegegend, Kreuznach, Cobernheim, Meisenheim, Trier a. d. Obermosel, Eifel a. d. First, dann am Mittelrheine, Raachersee am Krutter Ofen, bei St. Goar, Boppard, Coblenz, Neuwied u., Thüringen bei Jena, Sachsen, Preußen bei Wohlau, Stuhm u., Destr. bis in d. Lombardei. 5—6. 4

2. *V. sylvatica* L. K. syn. *Ervum sylvaticum* Peterm. *Wiggersia* — ca Fl. Wetter. Gebirgswälder, stchw. dch. d. Geb. bis in d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Boralpen u. Alpenkette, Rheing., vom Jura nach Oberbaden, Constanz, Stockach, bei Mundelfingen, Mergentheim, Niederrheing., Nideggen bei Düren unweit Aachen u. im Rörgeb. u., Württemberg, Baiern, Sachsen, Hannover, Preußen bei Marienwerder u., Destr. Böhmen, Steyermark, Tyrol, Vittoral, Istrien, Ungarn bis in d. Lombardei. 7—8. 4

3. *V. cassubica* L. K. syn. *Ervum cassubicum* Peterm. *V. multiflora* Pollich. *V. Gerardi* Jacq. *V. militans* Crntz. Waldwiesen, schattige Vorgebirge, stchw. dch. d. Geb., Rheing, Oberbaden, Pfalz im Harbtgebirge, Hartenburg bei Dürkheim, Kallstadt, Deidesheim, Baiern, Franken, Thüringen, Jena, Sachsen, Berlin, Ostpreußen, Königsberg, Tilsit, Memel, Graudenz, Hamburg, Mecklenburg, Destr. Böhmen, Tyrol, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 6—7. 4

4. *V. Orob* DC. K. syn. *V. cassubica* Fl. Dan. *V. cassubica* β . Sering. *Orob* sylvaticus L. Schattige Wiesen, Gebüsch; im Speßart am Fuße d. Winterbergs bei Orb u. in Siebenbürgen 5—6. 4

Zweite Rotte. *Vici* K. syn.

5. *V. dumentorum* L. K. syn. Gebirgswälder, Haine, Gebüsch, stchw. dch. d. Geb. bis in d. Boralpen, Rheing., Oberbaden, Constanz bei Salem, Engen, bei Fuß-

heim u. Wagheusel, Heidelberg bei Harrlaß, Niederrhein im Flammersheimer Walde bei Köln, bei Düren, bei Grefeld u. Goch, Württemberg, Baiern, Franken, Jena, Sachsen, Schweiz, Destr. in allen Provinzen bis in d. Lombardei. 7—8. 4

6. *V. Cracca* L. K. syn. Var. β . *V. Kitaibeliana* Rchb. exc. (excl. syn. Kit.) Gebüsch, schattige Ufer, Raine, Hecken, Wege, Wiesen, im g. Geb. 6—8. 4

7. *V. Gerardi* DC. K. syn. *V. Cracca* β . Gaud. *V. incana* Villars. *V. galloprovincialis* Poir. Gräßige Haine, Gebüsch im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis im Saas- u. Nicolaithale bei Grächen, Destr. Tyrol, Vittoral, Lombardei. 6—7. 4

8. *V. Bivonea* Raf. DC. prodr. II. p. 357. Maly enum. pl. austr. p. 362—401. *V. leucantha* Bertoloni Moris Sard. In Dalmatien. 4?

9. *V. polyphylla* Desf. Rchb. exc. Maly enum. pl. austr. p. 363. Wiesen d. Boralpen, in Siebenbürgen. 6—7. ☉

10. *V. tenuifolia* Roth. K. syn. Waldwiesen, buschige Triften, stellw. dch. d. g. Geb., besonders im südl. Geb., Rheing. an vielen Orten, Baden, Elsaß, Pfalz Harthgeb., Donnersberg bis Mainz, Nahegegend, Bingen, Kreuznach bis Trier, Luxemburg, Coblenz u., Württemberg, Baiern, Sachsen, Preußen bei Danzig, Graudenz, Destr. bis Venedig u. 6—8. 4

11. *V. villosa* Roth. K. syn. *V. polyphylla* W. et Kitt. Var. β . *glabrescens*: *V. polyphylla* Koch. bot. Zeit. *V. varia* Host. Saatäcker, stellw. dch. d. Geb., besonders im g. südl. Rheing., Oberbaden bei Staufsen u. Mühlheim, Baiern am Maine bei Würzburg, Holstein, dch. d. nördl. Deutschland nach Preußen, Königsberg, Danzig u. Schlesien, Lausitz Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol, Krain, Dalmatien, Vittoral, Croatien, Ungarn, Lombardei, Venedig, Südschweiz. 5—7. ☉

12. *V. Broteriana* Sering. DC. prodr. II. p. 357. Maly enum. pl. austriac. p. 363. *V. villosa* Broteri. *V. lanata* Visiani. Unter d. Saat in Dalmatien. 6. ☉

13. *V. onobrychioides* L. K. syn. Saatäcker im südl. Geb., Südschweiz, Cant. Wallis, Luxemburg bei Echternach.

nach, Tinant?, Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardien. 5—7. ☉

14. *V. Pseudo-Cracca* Bertolon. Rechb. exc. *V. tenuifolia* Tenore. *V. consentina* Sprg. anal. Waldtriften im südl. Geb., Dalmatien bei Zara, Oberitalien bei Pisa. 5. ☉

15. *V. biennis* L. Rechb. exc. *V. bicolor* Wulf. Gebüsch im südl. Geb., Dalmatien, Ungarn bei Pesth. 6—8. ☉

16. *V. ochroleuca* Tenore Rechb. exc. Gebüsch, Aecker in Dalmatien am Schloß Gliffa 5—7. ☉ et 4

17. *V. bithynica* L. K. syn. *Lathyrus bithynicus* Lamk. *L. turpidus* Lamk. *L. tumidus* Willd. spec. Grasse Orte, Aeckerränder im südl. Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig, Piemont, Nizza. 5—6. ☉

18. *V. Faba* L. K. syn. Rechb. exc. Var. β . *minor*. *V. equina* Rechb. exc. Im g. Geb. in vielen Varietäten angebaut. 6—7. ☉

19. *V. narbonensis* L. K. syn. Cultiv. Orte im südl. Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig, Piemont, Oberitalien. 5—6. ☉

20. *V. serratifolia* Jacq. Rechb. exc. *V. narbonensis* Schkr. *V. narbonensis* β . *serratifolia* K. syn. Grasse, salzhaltige Orte im südl. Geb., Littoral bei Triest, Ungarn am Neusiedlersee, Piemont. 5—6. ☉

21. *V. oroboides* Wulf. K. syn. *Orobus* Clusii Spreng. *O. vicioides* DC. Gebirgswälder, Boralpen in d. südl. Kette, Destr. Steyermark, Kärnten, Krain, Croatien, Ungarn. 6—7. 4

22. *V. tricolor* Sebast. et Maur. Fl. Rom. prodr. *V. triflora* Tenore Rechb. exc. Aecker, Wege im südlichsten Geb., Dalmatien, auf d. Radigne bei Dizmo. 4—5. ☉

23. *V. sepium* L. K. syn. *Wiggersia* — Fl. Wett. Var. β . *angustifolia*: *V. montana* Froehl. γ . *ochroleuca*: *V. sepium* β . *ochroleuca* Bast. DC. prodr. Gebüsch, Hecken, im g. Geb., Var. γ . seltener, z. B. bei Trier, Naheethal u. 4—6. 4

24. *V. truncatula* Fisch. DC. prodr. II. p. 364. Maly enum. pl. austr. p. 363—401. *V. chlorantha* Heuffel. Gebirgswälder, Ungarn im Banat. 5—6. ☉

25. *V. pannonica* Jacq. K. syn. Var. β . *purpurascens*: *V. striata* M. v. Bieb. *V. purpurascens* DC. h. monsp. *V. uncinata* Rchb. exc. Saatäcker, Brachfelder, im südl. Geb., Destr. Mähren, Steyermark, Istrien, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—7. ☉

26. *V. hybrida* L. K. syn. Acker, grasige Orte im südl. Geb., Südschweiz, Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig, Piemont, Ligurien. 6—7. ☉

27. *V. lutea* L. K. syn. *Wiggersia* — Fl. Wett. Var. β . *hirta*: *V. hirta* Balb. *V. lutea* β . *pallidiflora* DC. prodr. Saatäcker, mehr im südl. Geb., Südschweiz, Rheing., Oberbaden bei Hohentwiel, Elsass bei Straßburg, zw. Darmstadt u. Frankfurt, bei Fechenheim, Offenbach, Wetterau, Pfalz bei Kaiserslautern, Trier, Coblenz bei Braubach, Mayenfeld, Andernach, Neuwied, Schwaben, Baiern, Fl. v. Spa, Destr. in fast allen Provinzen bis Venedig. 6—7. ☉

28. *V. grandiflora* Scopoli K. syn. Rchb. exc. Var. α . *Scopolina* K. syn. — β . *Kitaibeliana*: *V. sordida* W. et Kit. Rchb. exc. — γ . *V. Biebersteiniana* Besser. *V. sordida* M. v. Bieb. Acker, grasige Orte im südl. Geb., Steyermark, Littoral, Istrien bei Fiume, Triest, Dalmatien, Croatien, Galizien, Ungarn, Lombardien. 5—6. ☉

29. *V. sativa* L. K. syn. Var. β . *V. leucosperma* Moench. Rchb. exc. — γ . *cordifolia* Taschb. d. Fl. v. Trier. Acker, Brachfelder, dch. d. g. Geb., besonders im südl. u. fast überall angebaut. 6. ☉

30. *V. angustifolia* Roth. K. syn. Var. β . *segetalis*: *V. sativa* β . Sering. *V. segetalis* Thuill. Sturm. Rchb. exc. *V. lughanensis* Schleich. — γ . *Bobartii*: *V. Bobartii* Foerst. *V. angustifolia* Smith. *V. sativa* δ . Sering. — δ . *Wirtgenii* Löhr Taschb. Fl. v. Trier. Acker, Felder, Brachen, dch. d. g. Geb.; Var. δ . bei Trier 1835. 5—6. ☉

31. *V. cordata* Wulf. K. syn. Saatacker, im südl. Geb., Südtirol, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Ungarn. 6. ☉

32. *V. peregrina* L. K. syn. Unter d. Saat im südl. Geb., Steyermark, Littoral, Istrien bei Fiume, Insel Veglia, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Ligurien, Oberitalien; Belgien bei Brüssel. 4—6. ☉

33. *V. lathyroides* L. K. syn. Gräßige Hügel, Triften, Wiesen, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten. 4—5. ☉

192. *Ervum* L. Linse. K. syn. 218. Rchb. exc. p. 525. Comp. II. p. 233—246.

1. *E. hirsutum* L. K. syn. *Vicia hirsuta* K. syn. edit. I. Saatacker, Felder, Ufer im g. Geb. 6—7. ☉

2. *E. tetraspermum* L. K. syn. *Vicia* — a K. syn. edit. I. *V. gemella* Crntz. Saatacker, Felder, sandige Orte, Ufer im g. Geb. 6—7. ☉

3. *E. dispernum* Roxb. Rchb. exc. *E. parviflorum* Bertolon. Rchb. exc. *Vicia parviflora* Loisl. *V. disperma* DC. Acker im südlichsten Geb., Ligurien, angebaut in Dalmatien. 6. ☉

4. *E. gracile* DC. K. syn. *E. tenuissimum* Pers. *E. tenuifolium* Lagasc. *E. longifolium* Tenore, *Vicia gracilis* Loisl. K. syn. edit. I. Acker, Brachfelder, stchw. dch. d. Geb., Rheing. zerstr. bis Westphalen, Elsaß bei Mühlhausen, Burweiler, Pfalz bei Bitsch, Saargemünd, Zweibrücken, Saarbrücken, Luxemburg, von Speier bis Mainz; Thüringen bei Weissensee, Hannover bei Dsnabrück; Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien. 6—7. ☉

5. *E. monanthos* L. K. syn. *Vicia* — K. syn. edit. I. *V. articulata* Willd. *V. multifida* Wallr. *Lathyrus monanthos* Willd. spec. Saatacker, mehr im südl. Geb., Rheing. Coblenz, Andernach u. auf d. Mayenfeld bei Mayen, Eöln, Trier bei Baumholder, Birkenfeld, Meisenheim, Thü-

ringen, Jena u.; Destr. Böhmen, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombard. 6—7. ☉

6. *E. Ervilia* L. K. syn. *Vicia Ervilia* Willd. K. syn. edit. I. Saatacker, Felder, stellw. dch. d. Geb., mehr im südl., Schweiz; Rheing. Oberbaden bei Mühlheim, Pfalz, Speier, Zweibrücken, Mainz, im Nahe- u. Glan-Thale, Kreuznach, Meisenheim, Moselgeg., Trier bei Tzel, Luxemburg, Belgien, Coblenz, Binningen, Bad Bertrich, Mayensfeld bei Mayen, Nassau, Württemberg, Baiern, Sachsen, Lausitz u.; Südtirol, Vittoral, Istrien, Lombard. 6—7. ☉

7. *E. Lens* L. K. syn. *Cicer* — Willd. *Lens esculenta* Mch. Allgemein angebaut u. stellw. verwildert. 6—7. ☉

8. *E. nigricans* M. v. Bieb. K. syn. *E. lentoides* Tenore. *E. soloniense* L. sp. Steinige Orte im südl. Vittoral, Istrien bei Monfalcone, Dalmatien. 4—5. ☉

9. *E. Lenticula* Schreb. K. syn. *Cicer ervoides* Brignol. *Erv. uniflorum* Tenore test. DC. Steinige Orte im südl. Geb., Kärnthen, Vittoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien. 5—6. ☉

10. *E. dalmaticum* Presl. Wald. Rept. I. 713. Maly enum. pl. austr. p. 364—401. In Dalmatien. ☉

193. *Pisum* L. Erbse. K. syn. 220. Rchb. exc. p. 532. Comp. II. p. 246.

1. *P. elatius* M. v. Bieb. K. syn. *P. elatum* DC. Gebüsch, Saune, am südl. Vittoral, Istrien. 6. ☉

2. *P. arvense* L. K. syn. Schübl. et Mart. Var. β . *P. quadratum* Mill. — γ . *P. leptolobum* Rchb. exc. Cultivirt. 5—7. ☉

3. *P. sativum* L. K. syn. Schübl. et Mart. Var. β . *macrocarpum* Sering. — γ . *P. umbellatum* L. Cultivirt. 5—7. ☉

4. *P. maritimum* L. K. syn. *Orobis maritimus* Rchb. exc. Küste d. Nord- u. Ostsee; Mecklenburg bei

Warnemünde, Rostock, Preußen Königsberg, Pommern u. im südl. Eittoral, Istrien. 6—8. 4

194. *Lathyrus* L. Platterbse. K. syn. 220. Rchb. exc. p. 533. Comp. II. p. 248.

1. *L. Aphaca* L. K. syn. *L. segetum* Lamrk. *Orob. Aphaca* Döll. rh. Fl. Neckar, Felder, besonders auf Kalk- u. Lehmboden, stchw. dch. d. g. Geb., mehr im g. südlichen; Rheing. auf d. g. Rheinfläche, von d. Schweizerstr. bis z. Mosel, Trier, Luxemburg, Saarbrücken, Coblenz, Singig bis Bonn; Schwaben, Baiern Wetterau, in d. Neckar-, Main- u. Mosel-Gegend; Thüringen Jena; Kärnthen, Tyrol, Krain, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Venedig. 6—7. ☉

2. *L. Nissolia* L. K. syn. *Orob. — Döll.* Neckar, besonders im südl. Geb., Westschweiz; Rheing. Oberbaden bei Binningen, Mundelfingen, Rork; Mühlhausen im Elsaß; Württemberg bei Dischingen, Neckar bei Reutlingen, Pfalz bei Langemeil, Otterberg, Saargemünd, Kaiserslautern, Saarbrücken, Trier, Meisenheim, Luxemburg bei Wormel- bang, Ephen u., Wetterau, Thüringen Warby, Halle; Schlessen; Tyrol, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardie. 5—7. ☉

3. *L. Ochrus* DC. K. syn. *Pisum — L. Ochrus uniflorus* Moench. *O. pallida* Pers. Neckar im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Ligurien, Nizza. 5—6. ☉

4. *L. articulatus* L. Rchb. exc. *L. speciosus* Hortul. Waldränder im südlichsten Geb., Piemont, Ligurien, Nizza. 6—7. ☉

5. *L. purpureus* Desf. Rchb. exc. *L. auriculatus* Bertoloni, K. syn. in add. p. 442. *L. alatus* Tenore, *L. tenuifolius* Loisl. *L. spurius* Willd. Neckar im südl. Eittoral, Istrien, Insel Unice, Hügel in Ligurien, um Genua, Pelurien. 6—7. ☉

6. *L. aristatus* Visian. Fl. Dalm. Comp. II. p. 250. Gebirgsräcker in Dalmatien. 4. ☉

7. *L. inconspicuus* L. K. syn. *L. parviflorus* Roth. Weingärten, im südl. Geb., Südtirol, Littoral, Istrien, Dalmatien. 6—7. ☉

8. *L. stans* Visian. K. syn. Saatäcker im südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Insel Dsero, Dalmatien bei Spalato, Croatien. 6—7. ☉

9. *L. sphaericus* Retz. K. syn. *L. coccineus* Allion. *L. axillaris* Lamk. *L. inconspicuus* Jacq. *Orobis coccineus* B. C. Grasige Orte, Acker im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Branson, Südtirol bei Bozen, Littoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Ungarn, Kombarbei, Venedig. 5—6. ☉

10. *L. Cicera* L. K. syn. *L. pilosus* Steud. et Hochst. Acker, Felber, im südl. Geb., Schweiz am Genfersee; Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Kombarbei, Venedig, Piemont, Nizza; auch stellw. cultivirt so im Luxemburgischen. 4—6. ☉

11. *L. sativus* L. K. syn. Acker, Felber, im g. südl. Geb., Destr. bis in d. Littoral nach Venedig; Rheing. in Weingärten bei Worms, Felber bei Coblenz, Trier, Luxemburg u. stellw. im Großen cultivirt. 5—6. ☉

12. *L. leptophyllus* Bartst. DC. prodr. II. p. 373. Maly enum. pl. austr. p. 365—400. In Dalmatien. ☉

13. *L. setifolius* L. K. syn. *L. prostratus* Brignol. Steinige Orte, Weingärten im südl. Geb., Südtirol, Littoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Ungarn, Kombarbei, Piemont, M. Baldo u. 4—5. ☉

14. *L. annuus* L. K. syn. Felber im südl. Littoral, Istrien, Insel Dsero, Kombarbei, Piemont u. 5—6. ☉

15. *L. angulatus* L. K. syn. Weingärten, Felber im südl. Geb., Belgien; Schweiz Cant. Wallis, bei Branson, Martinach; Littoral, Istrien bei Triest, Görz, Dalmatien, Croatien, Kombarbei, Nizza. 5—6. ☉

16. *L. hirsutus* L. K. syn. Saatäcker, stellw. dch. d. Geb., besonders im südlichen; Rheing., Oberelsaß, Oberbaden zw. Constanz u. Schaffhausen, Pfalz bei Otterbach,

Zweibrücken, Kaiserlautern, Saargemünd, Maing. v. Frankfurt bis Würzburg, Oberhessen; Fl. v. Trier bei Saarbrücken, Dudeldorf, Stadtkyll; Luxemburg bei Hollerich, Bettenburg, Fl. v. Spa, Belgien; Schweiz bei Luzern, Basel; Thüringen, Baiern, Sachsen, Schlesien; Littoral, Istrien, Ungarn, Dalmatien, Lombardie, Venedig *z.* 6—8. ☉

17. *L. tuberosus* L. K. syn. Hecker, Saatsfelder, besonders auf Kalk u. Lehm, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. zerstr. auf d. g. Rheinfläche im Main-, Neckar-, Nahe-, Glan-, Saar- u. Moseltale *z.*; Preußen bei Pölplin, Meve, Weichselgegend; Destr. bis in d. Lombardie. 7—8. ☉

18. *L. pratensis* K. syn. *Orob.* — Döll. Gebüsch, Ufer, Wiesen, Wege im g. Geb. 6—7. 4

19. *L. sepium* Scopoli K. syn. *L. Hallersteinii* Baumg. *L. pratensis* β . *grandistipulatus* Rochel. Hecken im südl. Geb., Krain, Görz, Littoral, Istrien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardie. 5—6. 4

20. *L. sylvestris* L. K. syn. Gebirgswälder, Gebüsch, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten. 7—8. 4

21. *L. latifolius* L. K. syn. Var. β . *angustifolius*: *L. ensifolius* Badarr. *L. sylvestris* α . *ensifolius* DC. Hecken, Gebüsch im südl. Geb., Destr. Littoral, Istrien bei Fiume, Croatien, Ungarn, Lombardie, u. im übrigen Geb. wohl nur verwildert. 7—8. 4

22. *L. heterophyllus* L. K. syn. *L. intermedius* Wallr. Wälder, Gebüsch, im mittleren u. nördlichen Geb., Schweiz bis in die Alpen, Rheing. bei Basel; Württemberg bei Lichtenstein, Tübingen, Blaubeuern, Baiern; Harz, Preußen, Schlesien; Tyrol, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

23. *L. platyphyllos* Retz. K. syn. in add. 443. *L. sylvestris* β . *platyphyllos* Wahlenb. *L. heterophyllus* β . *unijugus* K. syn. 224. Wälder, Gebüsch, sehr zerstr. im nördl. u. mittl. Geb., Thüringen, Sachsen, Preußen *z.* 7—8. 4

24. *L. palustris* L. K. syn. *Orob.* — Rchb. exc. *Lath. incurvus* Hochst. *L. viciaeformis* Wallr. Sumpfige Wiesen, stellw. dch. d. g. Geb., Straßburg, Baden bei Knielingen,

Pfalz, Speier, Marbors, Erpolsheim, Dürkheim, Forst bis Mainz; Fl. v. Trier bei Stadtkyll, Geilenkirchen, Wassenberg nach Westphalen u., Hamburg; Sachsen, Preußen bei Tilsit, Braunsberg, Weichselgegend, Schlesien; Oestr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Lombard. 7—8. 4

195. *Orob. L.* Walderbse. K. syn. 224. Rchb. exc. p. 536. Comp. II. p. 255.

1. *O. vernus L.* K. syn. Var. β . *gracilis. O. gracilis Gaud. O. setifolius Schleich. Lathyrus — Wimm.* Wälder, Gebüsch, stchw. d. d. Geb. bis in die Alpen, besonders im g. südl. Geb. bis in d. Lombard, nördl. bis Preußen, Königsberg, Rheing., Oberelsaß, Oberbaden, im Breisgau, bei Bruchsal, Heidelberg, Pfalz Speyer, Harbtgebirge, Donnersberg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Luxemburg, Aachen; Kreuznach, Ems, Mühlheim bei Cöln u. 4—5. 4

2. *O. flaccidus Kit. Rchb. exc. O. venosus Willd.* herb. *O. stipulaceus Hook. O. vernus β . flaccidus K. syn. O. flaccidus Radius? DC. prodr. p. 377.* Gebirgswälder im südl. Tyrol u. in Croatien. 4—5. 4

3. *O. variegatus Tenore. K. syn. O. multiflorus Sieb. O. rigidus Lang. O. vernus β . latifolius Rochel. O. pyrenaicus Scopol. O. venetus Mill. Rchb. exc.* Gebirgstriften im südl. Geb., Südtirol, Savethal bei Bogen, Krain bei Vermschja, Gora, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombard. 5—6. 4

4. *O. tuberosus L. K. syn. O. prostratus Host. Var. β . tenuifolius: O. tenuifolius Roth. O. linifolius Reichard. O. canescens Rchb. exc.* Wälder, Gebüsch bis in d. Gebirge im g. Geb. 4—5. 4

5. *O. alpestris W. et Kit. O. pallens β . alpestris Rchb. exc.* Gebirgswälder in Ungarn u. Croatien, Siebenbürgen. 6—7. 4

6. *O. canescens L. fil. Bluff. et Fgh. Comp. II. p. 257. O. filiformis Lamk. O. pallescens Sadler. M. v. Bieb. Rchb. exc.* Waldwiesen, Ungarn bei Ofen an d.

Schwabenberg, u. im Kammerwalb, Siebenbürgen, Kombarbei. 6—7. 4

7. *O. albus* L. K. syn. *O. montanus* Hoppe et Hornsch. *O. pannonicus* Kraem. *O. austriacus* Crntz. *O. asphodeloides* Gouan. Var. β . *O. lacteus* M. v. Bieb. Rchb. exc. — γ . *O. versicolor* Gmel. Rchb. exc. *O. varius* Sims. Soland. Gebirgswiesen besonders im g. südl. Geb., Württemberg am südl. Abhänge d. Hirschauer u. Wurmlinger Berge bei Tübingen; Destr. Böhmen, Krain, Mähren, Littoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Ungarn, Kombarbei. 5—6. 4

8. *O. luteus* L. K. syn. *O. montanus* Scopol. *O. laevigatus* W. et Kit. Gebirgswälder u. Alpen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis; Destr. Steyermark, Kärnthen, Tyrol, Salzburg, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien, Kombarbei, Piemont. 5—6. 4

9. *O. transylvanicus* Spreng. Host. Austr. 322. Maly enum. pl. austr. p. 366. *O. laevigatus* Baumgart. Bewachsene Gebirgsstellen in Siebenbürgen. 5—6. 4

10. *O. ochroleucus* W. et Kit. Rchb. exc. Wälder in Ungarn, Kammerwalb u. Piliserberg bei Ofen. 4—6. 4

11. *O. niger* L. K. syn. Wälder d. Ebenen bis in Gebirgsregion stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

12. *O. tristis* Lang. Rchb. exc. Laubwälder in Sachsen u. in Ungarn bei Ofen. 6—7. 4

V. Gruppe. Phaseoleen Bronn.

196. *Phaseolus* L. Bohne. K. syn. 226. Rchb. exc. p. 538. Comp. II. p. 259.

1: *P. multiflorus* Lamk. K. syn. Var. β . *P. coccineus* Lam. *P. vulgaris* β . *coccineus* L. Cultivirt dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *P. vulgaris* L. K. syn. *P. nanus* L. Cultivirt in vielen Varietäten. 7—8. ☉

3. *P. Caracalla* L. DC. prodr. II. p. 390. Maly enum. pl. austr. p. 367. Cultivirt in Dalmatien. 7. ☉

Dreiunddreißigste Ordnung.

Caesalpineen.

R. Brown. K. syn. 226. K. Taschb. 158. Cassieen.
Rchb. exc. p. 544.

197. *Ceratonia* L. (XVII. 10.) Johannisbrod.

K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 261.

1. *C. Siliqua* L. K. syn. Cultivirte, steinige Orte im südl. Littoral, Istrien bei Rovrana, Insel Cherso, Lombardien, Venedig u. 9—10. ‡

198. *Cercis* L. (XVII. 10.) Judasbaum. K. syn.

Rchb. exc. Comp. II. p. 261.

1. *C. Siliquastrum* L. Steinige Orte, Felsen im südl. Geb., Südtirol, Littoral Istrien u. Oberitalien. 4—5. ‡

Vierunddreißigste Ordnung.

Amygdaleen.

Juss. K. syn. 227. K. Taschb. 158. Rchb. exc. p. 642.

Icosandria monogynia Lin.

199. *Amygdalus* L. Mandelbaum. K. syn. Rchb.

exc. p. 646. Comp. I. 2. p. 167.

1. *A. communis* L. K. syn. *A. fragilis* Borkh. *A. amara* Hayne. Felsige, steinige Orte im südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien; Schweiz im Cant. Wallis verwildert u. stellw. im Geb. angepflanzt. 2—4. ‡

2. *A. nana* L. K. syn. Gebirgswälder, steinige Hügel; Baiern an d. Donau bis Destr. bei Wien, Ungarn, Siebenbürgen. 4. ‡

200. *Persica* Tournef. Pfirsichbaum. K. syn. Comp. I. 2. p. 168.

1. *P. vulgaris* Miller. K. syn. *Amygdalus Persica* L. Rehb. exc. p. 647. Var. β . *P. laevis* DC. Verwildert in Weingärten am südl. Eittoral, Istrien v. Fiume bis Südtirol u. in d. wärmeren Theilen d. Geb. cultivirt. 3—4. ‡

201. *Prunus* L. Pflaume, Kirsche. K. syn. 228. Rehb. exc. p. 642. Comp. I. 2. p. 168.

1. *P. Armeniaca* L. K. syn. Allgemein angepflanzt u. im südl. Theile d. Geb. in Weinbergen verwildert. 3—4. ‡

2. *P. spinosa* L. K. syn. *P. polymorpha* α . *spinosa* Fl. Frib. *P. spinosa* β . *coactanea* Fl. Sil. *P. fruticans* Weihe Rehb. exc. Waldstellen, Gebüsche, Hecken, Zäune im g. Geb. 4—5. ‡

3. *P. prostrata* Labill. Host. Fl. Austr. II. 4. Maly enum. pl. austr. p. 344. In Dalmatien auf d. höchsten Felsen d. M. Biofovo. 4—5. ‡

4. *P. insititia* L. K. syn. *P. polymorpha* β . Fl. Frib. *P. floribunda* Weihe. *P. vinaria* Bechst. Rehb. exc. Felsen in Ungarn, im übrigen Geb. angepflanzt u. an Hecken verwildert. 4—5. ‡

5. *P. domestica* L. K. syn. Im g. Geb. angepflanzt u. stellw. verwildert. 4—5. ‡

6. *R. cerasifera* Ehrh. K. syn. Unter d. Namen Kirschpflaume stellw. im Geb. angepflanzt. 4—5. ‡

7. *P. avium* L. K. syn. *Cerasus* — Moench. *C. dulcis* Borkh. Var. β . *C. Juliana* DC. Rehb. exc. — γ . *C. duracina* DC. Rehb. exc. Gebirgswälder bis in d. Boralpen, bch. d. g. Geb. auch angepflanzt. 4—5. ‡

8. *P. Cerasus* L. K. syn. *Cerasus vulgaris* Mill. Rehb. exc. *C. Caproniana* DC. *Prun. acida* Ehrh. Var. β . *Pr. semperflorens* Ehrh. *Pr. serotina* Roth. — γ . *Ceras. effusa* Host. Austr. — δ . *Ceras. intermedia* Host. — ϵ .

Ceras. Marasca Host. *P. Marasca* Rehb. exc. Allgemein in Obstgärten angepflanzt u. stellw. in Hecken verwildert. 4—5. ‡

9. *P. chamaecerasus* Jacq. K. syn. *Cerasus* — Host. austr. Var. β . *Ceras. humilis* Host. Gebirgswälder, Abhänge, Kraine, besonders auf Kalk u. im süddöstl. Geb., Rheing., auf d. Tertiärkalk, Pfalz, am Oppenheimersee Berge bis Alzen, um Worms, bei Rierstein, zw. Dienheim u. Mainz; Baiern, Franken, Thüringen bei Halle, Destr. bei Wien am Rahlberg, Böhmen, Mähren, Tyrol, Galizien, Ungarn. 4—5. ‡

10. *P. Mahaleb* L. K. syn. *Cerasus* — Miller. Gebirgswälder, schattige Felsen, stellw. bis in d. Boralpen, Südschweiz, Rheing., v. Basel dch. Elßaß, Oberbaden im Breisg. am Kaiserstuhl, in d. Gebirgen d. Rheins, d. Mosel, d. Saar, d. Nahe u. Glan, Bingen, Kreuznach, bis Saarbrücken, Trier, Eurenburg, Coblenz, Alrthel, Württemberg, Baiern, Oberlausitz, Schlesien, Destr. Südtirol, Krain, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 5. ‡

11. *P. Padus* L. K. syn. *Cerasus* — DC. prodr. *Padus vulgaris* Host. Wälder, Kraine, Gebüsch, schattige Ufer, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten. 6. ‡

12. *P. lusitanica* L. Rehb. exc. *Cerasus* — Lois. DC. prodr. Gebirge in d. Lombardei bei Vicenza. 5—6. ‡

Fünfunddreißigste Ordnung.

Rosaceen.

Juss. K. syn. 230. K. Taschb. 160. Rehb. exc. p. 588.

I. Gruppe. Spiraeaceen DC.

202. *Spiraea* L. (XII. 5.) *Spiraea* L. K. syn. Rehb. exc. p. 588.

1. *S. salicifolia* L. K. syn. Wäldchen an Bergströmen im g. südl. Geb., Destr. Böhmen, Mähren, Krain, Tyrol, Steyermark, Siebenbürgen, sonst im Geb. angepflanzt u. verwildert. 6—9. ‡

2. *S. carpinifolia* Willd. K. syn. in add. 1021. In einem sumpfigen Gehölze bei Hamburg. 7—8. 5

3. *S. obovata* W. et Kit. K. syn. in add. 1022. Rchb. exc. *S. crenata* Gouan. *S. hypericifolia* γ. DC. *S. acutifolia* Willd. Schweiz an Weinbergsmauern bei Neuchâtel, in Krain u. in Ungarn. 5. 5

4. *S. cana* W. et Kit. Rchb. exc. Felsen in Croatien a. d. Milanovo Jezero, Dalmatien, M. Belebit. 5. 5

5. *S. oblongifolia* W. et Kit. K. syn. in add. 1022. Rchb. exc. Gebirge, unter Gesträuchen im südl. Geb., Steyermark, Eittoral, Istrien, Croatien, Ungarn M. Metzsch bei Fünffirchen. 5—6. 5

6. *S. crenata* L. Rchb. exc. *S. hypericifolia* Schmidt. Gebirge Ungarns, im Banat u. Siebenbürgen. 5. 5.

7. *S. ulmifolia* Scopol. K. syn. *S. chamaedryfolia* Jacq. Gebirgswälder, Felsen, im südl. Geb., Kärnthen, Steyermark, Krain in d. Bochein, Idria, Görz, Dalmatien, Galizien, Ungarn, bei d. Herkulesbädern. 5—6. 5

8. *S. chamaedryfolia* L. K. syn. *S. media* Schmidt. Geb., im südl. Geb., Krain, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. 5

9. *S. decumbens* Koch K. syn. *S. flexuosa* Rchb. exc. *S. ulmifolia* Suffren. Alpen u. Boralpen, im südl. Geb., Krain, zw. Resciuto u. Ponteba, Valle della Piave, zw. Perarollo u. Longarone, Dalmatien, Lombardei. 5—6. 5

10. *S. Aruncus* L. K. syn. Gebirgswälder an Bächen, feuchten Orten, bis in d. Boralpen, stchw. dch. d. Geb., Rheing. bei Weissenburg, Annweiler, Neustadt a. d. Hardt, Zweibrücken, Würzburg, Bliesskastel, St. Ingbert, Heidelberg, unterhalb Mannheim, Bergstraße am Melibokus, bei Trarbach a. d. Mosel, Schwaben, Franken, Sachsen, Hessen u., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. bis in d. südl. Eittoral, Lombardei u. 6—7. 4

11. *S. Ulmaria* L. K. syn. Var. α. *denudata* Hayne. — β. *discolor*: *S. glauca* Schultz. Nasse, schattige Orte, Gräben, Teiche u. Bachufer, im g. Geb. 6—7. 4

12. *S. quinqueloba* Baumg. Transylv. II. p. 47. Maly enum. pl. austr. p. 343—398. Feuchte, schattige Waldstellen in Siebenbürgen. 6—7. 4

13. *S. Filipendula* L. K. syn. Wiesen, Weiden, Triften, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Elsaß, Baden im Breisgau, bei Karlsruhe, Schwegingen, Pfalz Landau, Speier, Mardorf, Dürkheim, am Donnersberg, Bingen, im Rheing., Mosel u. Saarthale, Hochwald, Eifel bei Prüm, Coblenz bis Bonn, Köln u., Württemberg, Baiern, Sachsen, Preußen bei Königsberg, Danzig, Memel, Schlesien nach Destr. u. 6—7. 4

II. Gruppe. Dryadeen Koch.

203. *Dryas* L. (XII. 6.) Dryade. K. syn. 232. Rchb. exc. p. 599. Comp. I. 2. p. 186.

1. *D. octopetala* L. K. syn. *Geum chamaedryfolium* Crntz. Triften d. Alpen u. mit den Flüssen, Bächen in d. Thälern; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette bis ins südlichste Geb., auch in Hessen auf d. Meisner. 7—8. 4

204. *Geum* L. (XII. 6.) Geum. K. syn. 232. Rchb. exc. p. 597. Comp. I. 2. p. 186.

Erste Rotte. Caryophyllata K. syn.

1. *G. urbanum* L. K. syn. *Caryophyllata urbana* Scopol. *C. officinalis* Mnch. Etwas feuchte, schattige Orte, Waldränder, Gebüsche, an Hecken, Zäunen, im g. Geb. 7—8. 4

2. *G. intermedium* Ehrh. K. syn. *G. rivale* β. Fl. Würtb. *Caryophyllata sylvestris* Fuchs. *G. dubium* Hornem. Var. β. *G. rubifolium* Lej. rev. Haine, feuchte Gebüsche, stellw. dch. d. Geb., Rheing., im Elsaß, Fl. v. Trier bei Malmedy, Fl. v. Spa; Thüringen bei Jena, Hannover nach Hamburg, Holstein, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Preußen bei Königsberg, Schlesien, Oberbaiern bei Rothenbusch, Schweiz bei Bregenz, Rheineck u. St. Gal-

len, Böhmen, Tyrol, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei.
5—6. 4

3. *G. rivale* L. K. syn. *Caryophyllata rivalis* Scopol.
C. aquatica Lamrk. Var. β . *monstrum*: *G. hybridum*
Wulf. Feuchte, schattige Wiesen, an Bächen, stellenw. dch. d.
g. Geb., bis in d. Alpen, Rheing., an vielen Orten. 5—6. 4

4. *G. hispidum* Fries., Fl. d. Prov. Preussen. *G.*
strictum Ait. ? Grasplätze in Ostpreußen, Königsberg,
Rastenburg. 7. 4

5. *G. inclinatum* Schleicher K. syn. *G. pyrenai-*
cum Willd. Ramond. K. syn. edit. I. *G. sudeticum* Tausch.
Feuchte Wiesen auf d. höchsten Abhängen d. Sudeten u. Al-
pen, Schweiz im Cant. Wallis über Ber auf d. M. Bovanz-
naz, Tyrol. 6—7. 4

Zweite Rotte. *Oreogalum* Koch. syn.

6. *G. reptans* L. K. syn. *Sieversia* — Willd. Rchb.
exc. Felsen u. Gerölle d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis,
M. Ravyll, Salzburg, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Titto-
ral. 7—8. 4

7. *G. montanum* L. K. syn. *Sieversia* — a Willd.
Rchb. exc. *Caryophyllata* — a Scopoli. Alpen u. Boralpen,
Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Oestr. bis in
d. Sudeten. 6—8. 4

205. *Waldsteinia* Willd. (XII. 5.) Waldsteinie.

Rchb. exc p. 597. Comp. I. 2. 186.

1. *W. geoides* Willd. Rchb. exc. Gebirgswälder in
Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen. 5. 4

2. *W. trifolia* Rochel. Maly enum. pl. austr. p. 338.
W. sibirica Tratt. Comaropsis — DC. prodr. An Bächen
in Siebenbürgen gegen d. Moldau hin. 4

206. *Rubus* L. (XII. 6.) Brombeere. K. syn. 233.

Rchb. exc. p. 599. Comp. I. 2. p. 189—199.

1. *R. Chamaemorus* L. K. syn. Torfgründe, Moore,

mehr im nördl. Geb., Hessen a. d. Meißner, Pommern a. d. Halbinsel Darß, Preußen bei Königsberg, Böhmen in d. Sudeten. 6—7. 4

2. *R. saxatilis* L. K. syn. Comp. Fl. germ. Bergwälder, schattige Felsen, stellenw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, Rheing. an vielen Orten, dch. Elsaß, Baden, Pfalz bis Trier, Coblenz bis in d. Niederlande u. 6—7. 4

3. *R. Idaeus* L. K. syn. Comp. Gebirgswälder, Gebüsch, dch. d. g. Geb. 5—6. 5

4. *R. caesius* L. K. syn. Comp. Var. α . *palustris*. — β . *agrestis*. — γ . *pseudo-caesius*. — δ . *pseudo-idaeus*. Bruchäcker, Felder, Raine, Ufer, in Wäldern, dch. d. g. Geb. 6—8. 5

5. *R. dumetorum* W. et Nees. Comp. 190. *R. corylifolius* Smith. *R. nemorosus* Willd. Var. β . *tomentosus*: *R. bifrons* Vest. — γ . *ferox*: *R. horridus* Schultz. Säune, Hecken im g. Geb. 7—8. 5

6. *R. fruticosus* L. K. syn. Comp. p. 191; a. *R. plicatus* W. et Nees. b. *R. fastigiatus* W. et N. *R. suberectus* Anders. c. *R. affinis* W. et N. *R. falcatus* Kaltenbach Fl. v. Aachen. d. *R. nitidus* W. et N. *R. corylifolius* Guimp. Waldränder, Hecken, Säune, im g. Geb. 6—8. 5

7. *R. thyrsoides* Wimmer Comp. p. 192. a. *R. candicans* Weihe. *R. fruticosus* Nees et W. *R. geniculatus* Kaltenb. Fl. v. Aachen. b. *R. rhamnifolius* W. et N. *R. grandis* Trag. c. *R. cordifolius* W. et N. Waldränder, Gebüsch, besonders in Gebirgsgegenden, dch. d. g. Geb. 6. 5

8. *R. tomentosus* Borkh. Comp. p. 192. *R. triphyllus* Bell. *R. canescens* DC. *R. argenteus* Gmel. Gebirgsstellen im südl. u. mittleren Geb., Rheing. nicht selten. 6—7. 5

9. *R. vulgaris* W. et N. Comp. p. 193. a. *R. sylvaticus* W. et N. b. *R. carpinifolius* W. et N. c. *R. macrophyllus* W. et N. d. *R. Schlechtendalii* W. et N. e. *R. villicaulis* Koehler. f. *R. macrocanthos* W. et N. g. *R.*

pubescens W. et N. h. R. argenteus W. et N. i. R. discolor W. et N. k. R. infestus W. et N. R. Reichenbachii W. et N. R. radula Weihe. Wälder, Gebüsche, Hecken, Zäune, dch. d. g. Geb. 6—7. ‡

10. R. hirsutus Wirtgen. Fl. v. Coblenz. Wälder, Hecken, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Coblenz, Trier u. 7. ‡

11. R. Sprengelii W. et N. Kaltenb. Fl. v. Aachen p. 280. Waldränder, Gebüsche, Rheing., Coblenz, Trier, Aachen u. 7—8. ‡

12. R. caliculatus Monheim. Fl. v. Aachen p. 283. Selten im Aachener Walde. 7—8. ‡

13. R. teretiusculus Kaltenb. Fl. v. Aachen. Am Rande d. Aachener Waldes. 7—8. ‡

14. R. glandulosus Bellard. Comp. p. 193. R. Bellardi Günth. R. hirtus W. et N. Schattige Gebirgsstellen, Abhänge, stchw. dch. d. Geb. 7—8. ‡

15. R. hirtus N. et W. Comp. R. Bellardi Weihe. Waldränder, Hecken, dch. d. Geb. 7—8. ‡

16. R. Güntheri N. et W. Comp. Waldränder, Gebüsche, Schlesien in d. Sudeten. 7—8. ‡

17. R. scaber Weihe Comp. Gebüsche, Hecken, Rheing., Aachen u. 7—8. ‡

18. R. Menkei Weihe Comp. p. 196. Gebirgsgegenden in Westphalen. 6—7. ‡

19. Koehleri Weihe Comp. p. 198. a. R. apiculatus W. et N. b. R. fusco-ater W. et N. c. R. fuscus W. et N. d. R. pallidus W. et N. e. R. foliosus W. et N. f. R. infestus W. et N. g. R. rudis Weihe. Waldränder, Gebüsche, Hecken, Zäune, stchw. dch. d. g. Geb. 6—7. ‡

20. R. Lejeunii W. et N. Comp. p. 194. a. R. vestitus Weihe. b. R. rosaceus W. et N. c. R. thyrsoflorus W. et N. d. R. grandiflorus Kaltenb. Gebirgswälder, Felsen, Hecken, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Fl. v. Coblenz, Bonn, Aachen, Trier u. 7—8. ‡

21. R. Schleicheri W. et N. Comp. p. 198. R. glandulosus Guimp. R. sylvestris Kaltenb. Waldränder,

Gebüſche, Hecken, ſtellw. bch. d. Geb., Rheing., Fl. v. Coblenz, Bonn, Aachen, Trier u. 7—8. 3

22. *R. hybridus* Kaltenb. Fl. v. Aachen p. 278.

Junge Waldbſchläge im Aachener Walde. 7—8. 3

23. *R. humifusus* Weihe. Comp. p. 198. Hecken in Weſtphalen u. 6—7. 3

24. *R. pygmaeus* W. et N. Comp. p. 199. Waldränder, Hecken, bch. d. Geb., 6—7. 3

25. *R. Lingua* W. et N. Comp. p. 199. Hecken, Rheing., bei Aachen, Weſtphalen u. 6—7. 3

207. *Fragaria* L. (XII. 6.) Erdbeere. K. syn. 234.

Rehb. exc. p. 596. Comp. I. 2. p. 199.

1. *F. vesca* L. K. syn. *F. sylvestris* Duchesn. Var. β . *F. efflagellis* Duchesn. — γ . *F. monophylla* Duchesn. — δ . *F. semperflorens* Duchesn. Waldränder, Gebüſche, Hecken, im g. Geb. auch cultivirt. 5—6. 4

2. *F. elatior* Ehrh. K. syn. *F. vesca* β . *pratensis* L. Gebirgswälder, graſige Hügel unter Gebüſche, beſonders auf Kalk, ſtellw. bch. d. g. Geb., Rheing., vom Jura bch. Elſaß, Baden bis Zweibrücken, Kreuznach, bch. d. Naheſthal bis Meiſenheim, Trier, Aachen u., Würtemberg, Baiern bei Baireuth, Ruggendorf, Mecklenburg, Schleſien, Preußen; Deſtr. u. 5—6. 4

3. *F. Hagenbachiana* Lang. K. syn. in add. 443. *F. Majaufea* Sering.? *F. collina* β . *Hagenbachiana* Schultz Fl. d. Pfalz. Steinige Hügel in Oberbaden um Zünzingen bei Mühltſheim. 5—6. 4

4. *F. collina* Ehrh. K. syn. Trockene, ſonnige, graſige Hügel, Waldränder, Heiden, Begeraine, beſonders auf Kalk, ſtellw. bch. d. g. Geb., Rheing., häufig v. Mannheim bis Mainz, Bingen, im Naheſthale bis Trier, Luxemburg, Moſel bis Winningen, Coblenz u. 5—6. 4

5. *F. grandiflora* Ehrh. K. syn. In Gärten cultivirt. 5—6. 4

6. *F. chiloensis* Ehrh. K. syn. In Gärten. 5—6. 4

7. *F. virginiana* Ehrh. K. syn. In Gärten. 5—6. 4

208. *Comarum* L. (XII. 6.) Siebenfingerkraut.

K. syn. 235. Rchb. exc. p. 596.

1. *C. palustre* L. K. syn. *Potentilla palustris*. Scopol. *P. Comarum* Nesl. Moorboden, Heiden, Gräben, torfhal-
tige, nasse Wiesen, stchw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

209. *Potentilla* L. (XII. 6.) Fünffingerkraut.

K. syn. 235. Rchb. exc. p. 589. Comp. I. 2. p. 200.

Erste Rotte. *Potentilla* K. syn.

1. *P. supina* L. K. syn. Etwas feuchte, uncultivirte
Orte, an Ufern, Wegen, stchw. dch. d. südl. u. mittlere,
seltener im nördlichen Geb., Schweiz selten, Rheing., Baden
von Mannheim bis Coblenz, Bonn, Düsseldorf, Wesel,
Luxemburg an d. Oermosel, Hamburg, Jena, Schwaben,
Baiern bei Würzburg, Sachsen, Berlin, Wittenberg, Lausitz,
Preußen an d. Weichsel; Destr. Böhmen, Mähren nach d.
Lombardei bis Venedig. 6—9. ☉

2. *P. norvegica* L. K. syn. *P. dichotoma* Moench.
P. ruthenica Willd. *P. diffusa* Willd. Sandige, feuchte
Orte unter Gesträuchen, stchw. im Geb., Württemberg bei
Wangen; Hamburg, Holstein bei Trittau, Pommern, Bran-
denburg, Schlesien, Preußen bei Königsberg, Lausitz, Dres-
den; Destr. Böhmen, Tyrol, Galizien, Ungarn, Lombardei.
6—7. 4

3. *P. rupestris* L. K. syn. Schattige Bergwiesen,
Felsen, Waldränder besonders im südl. u. mittleren Geb. bis
in d. Alpen; Rheing. von Constanz dch. Baden nach d. Pfalz,
Hardtgebirge und im Rhein-, Mosel- u. Nahegebirge bis
Coblenz, Maiefeld, Andernach im Brohlthal, Trier u.;
Schwaben, Baiern, Sachsen, Schlesien, Preußen bei Kö-
nigsberg, Marienwerder; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol,
Krain, Ungarn nach d. Lombardei bis Venedig. 6—9. 4

4. *P. multifida* L. K. syn. Var. β . *P. geranioides*
Gmel. Alpen d. Südschweiz, Cant. Wallis im Nicolai- u.

Bagnès-Thale, M. Stock und Matterhorn; Dalmatien.
7—8 4

5. *P. anserina* L. K. syn. Var. β . *sericea*. — γ . *viridis*. — δ . *geminiflora*. Sandige Ufer, Wege, Triften, im g. Geb. 6—7. 4

6. *P. recta* L. K. syn. Var. β . *P. obscura* Willd. — γ . *P. laciniosa* Lehm. monogr. Sonnige, bewachsene Hügel, steinige, lichte Waldstellen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. Oberelsaß, Oberbaden im Hegau bei Moeskirch, Stühlingen, Pfalz zwischen Saar- u. Zweibrücken, Siegen, Bonn, Köln, Aachen bis Lüttich, Würtemberg bei Tübingen, Donaunördth, Baiern, Wertheim, Würzburg, Sachsen, Lausitz, Schlesien, Hamburg, Holstein; Destr. in allen Provinzen bis in d. Littoral, Südschweiz im Beltlin. 5—7. 4

7. *P. hirta* L. K. syn. *P. laeta* Rehb. exc. test. Bertol. Var. β . *P. angustifolia* DC. — γ . *P. pedata* Willd. *S. pilosa* DC. Fl. fr. *P. rubens* Allion. pedm. Gräßige Orte im südl. Geb., Littoral, Istrien, Fiume, Triest, Dalmatien, Croatien, Galizien, Ungarn, Lombardei, Benedig. 7—8. 4

8. *P. pilosa* Willd. K. syn. Sonnige Hügel, stellw. im Geb., Rheing. im Elsaß bei Colmar, Thüringen bei Arnstadt, Hamburg am Elbufer bei Flottbeck; Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. 4

9. *P. Sadleri* Rehb. exc. p. 594. In Ungarn. 4

10. *P. inclinata* Villar. K. syn. *P. canescens* Bess. Rehb. exc. *P. adscendens* Willd. *P. intermedia* Wahlenb. *P. recta* Jacq. Trockene, sonnige Hügel, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Elsaß, Baden im Breisgau, Bonn auf d. Muffendorfer Höhe, Fl. v. Trier Bad Bertrich, Lüttich, Westphalen; Baiern, Main bei Würzburg, Erzgebirge, Schlesien; Schweiz; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Lombardei. 5—7. 4

11. *P. argentea* L. K. syn. Var. β . *P. impolita* Wahlenb. carp. Sonnige uncultivirte Orte, Wege, Raine, Waldränder, Abhänge, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

12. *P. collina* Wib. werth K. syn. *P. Güntheri*

Pohl. Host. *P. Wiemanniana* Günth. Rchb. exc. *P. sordida* Fries. *P. collina* Lehm. Trockene Orte, Abhänge, Raine, stchw. dch. d. Geb., Baiern bei Wertheim, Hanau; Rheing. Leyerberg bei Coblenz, Arththal oberhalb Bonn; Schlesien bis Frankfurt a. d. Oder, bei Grüneich, Karlowitz, Wildschütz; Preußen u.; Oestr. Böhmen, Tyrol, Siebenbürgen. 5. 4

13. *P. patula* W. et Kit. K. syn. Sonnige Hügel, Schlesien bei Leobschütz; Mähren bei Geiz, Böhmen, Galizien, Dalmatien, Ungarn. 5. 4

14. *P. intermedia* L. K. syn. Nestl. heptaphylla Mill. *P. Nestleriana* Tratt. Felsige, grasige Orte, Schweiz im Cant. Wallis, Waadt u. Tessin; Siebenbürgen u. Lombard. 5—6. 4

15. *P. thuringiaca* Bernh. K. syn. *P. parviflora* Gaud. *P. adscendens* Wolf. Walbige, steinige Orte, stchw. im Geb., Thüringer Wald am Südbahange bei Suhl, Römhild hinter Eisfeld; Schweiz im Cant. Wallis bei Martigny u. im Engadin; Ungarn im Banat. 5—6. 4

16. *P. Chrysantha* Trevir. Rchb. exc. excl. Synon. *P. Buquoyana* Knaf. Flora 1847. p. 181. Schattige Felsen in Böhmen bei Komotau u. an d. Donau in Ungarn, im Banat. 5—6. 4

17. *P. micropetala* Rchb. exc. *P. Heuffeliana* Steudel. Ungarn in Wäldern beim Eisenstein am Bogshan im Comitat Krassó. 6. 4

18. *P. reptans* L. K. syn. Var. β . *glabra*. Feuchte, grasige Orte im g. Geb. Var. β . Oberbaden bei Mühlheim. 6—8. 4

19. *P. mixta* Nolte. Rchb. exc. K. syn. Grasige Triften in Holstein. 7—8. 4

20. *P. procumbens* Sibth. K. syn. *P. nemoralis* Nestler. *Tormentilla reptans* L. Schattige Waldstellen, stchw. dch. d. Geb., Rheing. im Odenwalde, Eupen bei Aachen, von da nach d. Niederlanden, Westphalen, Mecklenburg, Brandenburg, Schlesien, Pausig, Sachsen, Thüringer

Walb., Sachsen, Halle, Berlin, Baiern bis Würzburg u.; Schweiz bei Belp im Cant. Bern; Destr. Böhmen, Ungarn, Venedig. 6—7. 4

21. *P. Tormentilla* Sibthorp. K. syn. *P. tetrapetala* Hall. fil. *P. sylvestris* Nestl. *Tormentilla erecta* L. *T. officinalis* Smith. Wälder, Gebüsch, Triften dch. d. g. Geb. bis in die Alpen. 6—7. 4

22. *P. aurea* L. K. syn. *P. Halleri* Sering. mus. Grafige Orte d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Salzburg, Steyermark, Krain, Litztal bis in d. Lombardei; Baden im Breisgau auf d. Feldberge, in Schlesien auf d. Sudeten, in Böhmen, Mähren. 7—8. 4

23. *P. alpestris* Hall. fil. K. syn. *P. salisburgensis* Haenke. *P. crocea* Hall. fil. *P. rubens* Vill. *P. aurea* Smith. *P. dubia* Suter. *Fragaria villosa* Crntz. Var. α . firma: *P. aurea* β . firma Gaud. *P. sabauda* DC. Schleicher. *P. affinis* Host. — β . gracilior: *P. aurea* α . *crocea* Gaud. *P. filiformis* DC. *P. alpestris* Host. austr. — γ . *debelis* Schleich. Hochalpen, Schweiz dch. d. Alpenkette mit voriger nach Destr. Tyrol, Kärnthen, Steyermark, Krain, Galizien, Lombardei, Venedig; in d. Vogesen auf d. Hoheneck u. in d. Sudeten. 6—8. 4

24. *P. ambigua* Gaud. helv. K. syn. *P. intermedia* Hegetsch. *P. alpestris* var. Hall. fil. *P. aurea* γ . *pectinata* Sering. *P. geranioides* Schleich. Schweizeralpen, Cant. Wallis über Zermatten am Matterhorn. 7. 4

25. *P. verna* L. K. syn. Var. β . *crocea*: *P. verna aestiva* Gaud. — γ . *P. pusilla* Host. — δ . *P. Lindenackeri* Tausch. Sonnige, grasige Orte, Waldränder, Abhänge, Raine, Wege im g. Geb. 4—6. 4

26. *P. cinerea* Chaix. K. syn. *P. subacaulis* Lehm. *P. incana* Moench. *P. opaca* Villars. delph. *P. arenaria* Borkh. *P. ovata* Poir. Var. β . *trifoliata*: *P. subacaulis* Wulf. Kalk- u. Sandboden, Wälder, Heiden, Triften, Raine, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Baden, Schwäb.

gen, Hessen-Darmstadt, Pfalz, Speier, Dürkheim, Marbort, Mainz, Niederingelheim auf d. Heide, Bingen, Nahe aufwärts nach Kreuznach zc., d. Var. β . südl. d. Alpen. 4—5. 4

27. *P. Neumanniana* Rehb. exc. *P. Neumannii* Opitz. Sonnige Orte auf Lehmboden; Sachsen bei Dresden; Böhmen bei Benatek. 5. 4

28. *P. opaca* L. K. syn. Steinige Hügel, Felsen, dürre Heiden, Walbränder, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Oberbaden von Rastatt bis Frankfurt, Pfalz am Donnersberg, Dürkheim an d. Hardt bis Bingen u. in d. Nahegegend bis Kreuznach zc., Schwaben, Baiern, Franken, Thüringen Jena, Sachsen, Preußen zc. 4—5. 4

29. *P. grandiflora* L. K. syn. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

30. *P. nivea* L. K. syn. Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz im Cant. Wallis an d. Matterhorn d. Rötsherberge; Tyrol bei Rißbichel an d. Geisstein, kleinen Rothenstein u. in d. Lombardei. 6. 4

31. *P. minima* Hall. fil. K. syn. *P. Brauniana* Hoppe. *P. verna* α . *alpestris* Wallr. Triften u. Felsen d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette. 7—8. 4

32. *P. frigida* Villar. K. syn. *P. glacialis* Hall. fil. *P. helvetica* Schleich. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis, St. Bernhard, Matterhorn, Nicolai-Thal über Zermatten, Cant. Glarus auf d. Zutreibstock, Sandgrath, Oberengadin; Tyrol Wormserjoch, Windalp, Steyermark auf d. Hochgolling, Lombardei. 7—8. 4

33. *P. fruticosa* L. Rehb. exc. Holland, Dünen d. Nordsee bei Harlem; Piemont über Zenda. 6. 3

Zweite Rotte. *Fragariastrum* K. syn. DC.

34. *P. alba* L. K. syn. *P. nitida* Scopol. Nadelholzwälder, Heiden, Triften, stellw. dch. d. g. Geb., besonders im nördl. Geb., Rheing., Elsaß, Baden, Pfalz, Neustadt, Mann-

heim, Speyer, Kaiserslautern, Darmstadt, Mainz, Nieder-
ingelheim, Bingen u. 5—6. 4

35. *P. splendens* Ramond. K. syn. *P. Vaillantii*
Nestl. *P. hybrida* Wallr. Richte Bergwälder, Rheing., Gebirge
d. Nahe an d. Lemberg u. a. d. Hellberg bei Sobernheim,
Thüringen im Steiger bei Erfurt. 5—6. 4

36. *P. Fragariastrum* Ehrh. K. syn. *P. Fragaria*
Smith. *P. fragarioides* Vill. *P. fragariaefolia* Gmel. *Fra-*
garia sterilis L. *Comarum fragarioides*. Roth. Gebirgs-
wälder an lichten Stellen, Waldränder, grasige Hügel,
Waldbiesen, stchw. d. d. g. Geb. 4—5. 4

37. *P. micrantha* Ramond. K. syn. *P. breviscapa*
Vest. *P. Fragaria* β . Nestl. Bergwälder, an lichten, steini-
gen Orten, stchw. im Geb., Rheing., Pfalz auf Porphyr-
u. Trappfelsen bei Kusel, an d. Nahe bei Oberstein u. auf
allen vulkanischen Gebirgen bei Coblenz um d. Saacher See
im Tonnissteiner- u. Brohl-Thale, im Pollicher Wald bei
Mayen, Jacobsberg bei Boppard, Schweiz bei Nyon u. a.
d. M. Generoso; Steyermark a. d. Donatiberg, Südtirol,
Lombardei. 4—5. 4

38. *P. petiolulata* Gaud. helv. K. syn. *P. cau-*
lescens β . *petiolulata* Sering. Schweiz Felsen d. M. Salève
bei Genf. 7—8. 4

39. *P. caulescens* L. K. syn. Felsen d. Boralpen,
Schweiz d. d. g. südl. Alpenkette nach Baiern, Tyrol u.
Destr. 7—8. 4

40. *P. Clusiana* Jacq. K. syn. Felsen d. Hochalpen,
Baiern, Destr. Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Salzburg nach
Krain, Vittoral Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen. 7—8. 4

41. *P. Valderia* L. Rehb. exc. Felsen d. Alpen im
südlichsten Geb., Piemont über Zenda u. 7. 4

42. *P. nitida* L. K. syn. *P. terglaviensis* Hacq.
Felsen d. Hochalpen, Tyrol M. Schleern, Kirchbaumeralp,
Steyrmark M. Hohenschwab, Kärnthen, Vittoral, Lombardei,
Venedig. 7—8. 4

43. *P. speciosa* Willd. DC. prodr. II. p. 586.

Maly enum. pl. austr. p. 342—397. Felsenspalten in Dalmatien an d. Ulzi-Drien. 4

210. *Sibbaldia* L. (XII. 6.) Sibaldie. K. syn.

244. Rchb. exc. p. 588. Comp. I. 2. p. 212.

1. *S. procumbens* L. K. syn. *Potentilla Sibaldia* Grieslich. Steinige Orte, Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Oestr. bis in d. Lombardei; dann in d. Bogesen auf d. Hohenecf. 7—8. 4

211. *Agrimonia* L. (XI. 2.) Odermennig. K.

syn. 244. Rchb. exc. p. 611. Comp. I. 2. p. 157.

1. *A. humilis* Wallr. Beitr. 3. Bot. Walp. Rep. II. p. 38. Maly enum. pl. austr. p. 342—398. In Dalmatien bei Castel nuovo. 4?

2. *A. Eupatoria* L. K. syn. Walbränder, Gebüsch, schattige Raine, Wegeränder u. im g. Geb. 6—8. 4

3. *A. odorata* Ait. K. syn. *A. procera* Wallr. Gebirgswälder, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Baden im Breisg., im Bogesen sandstein d. Pfalz, Coblenz bei Bad Ems, Dierdorf, Bonn, Bensberg bei Köln, Düsseldorf; Hamburg; Krain u. Siebenbürgen. 6—8. 4

4. *A. repens* L. Rchb. exc. Baumg. Transylv. Maly enum. pl. austr. p. 342. Schattige Gebirge im südlichsten Geb., Italien u. in Siebenbürgen. 6—7. 4

212. *Agrimonia* Necker (XI. 2.) Aremonie. K.

syn. 245. Rchb. exc. p. 611. Comp. I. 2. p. 157.

1. *A. agrimonioides* Neck. K. syn. *Agrimonia* — *L. Amonia* — Nestl. Spalanzania — Roth. Gebirgswälder im südl. Geb., Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Ungarn. 5—6. 4

IV. Gruppe. Rosaceen DCand.

213. *Rosa* L. (XII. 6.) Rose. K. syn. 246. Rchb.

exc. p. 612. Comp. I. 2. p. 217.

1. *R. lutea* Mill. K. syn. *R. Eglanteria* L. Gaud. *R. chlorophylla* Ehrh. *R. foetida* Herm. *R. vulpina* Wallr. Var. β . *R. punicea* Miller. *R. bicolor* Jacq. In Hecken, an Bäumen, hin u. wieder besonders im südl. Geb. verwildert; auch in Gärten angepflanzt. 6—7. ‡

2. *R. pimpinellifolia* DC. Rehb. exc. *R. spinosissima* Smith. *R. campestris* Wallr. Var. α . *R. pimpinellifolia* L. — β . *R. spinosissima* L. Rehb. exc. — γ . *R. myriacantha* DC. Lindl. monogr. — δ . *lejosyla*: *R. microcarpa* Bess. *R. melanocarpa* Lk. enum. *R. Besseri* Tratt. mongr. — ϵ . *R. mitissima* Gmel. bad. — ζ . *rosea* *R. pimpinellifolia* Willd. *R. spinosissima* β . *ciphiana* Smith. — η . *R. affinis* Sternb. Steinige Hügel, Raine, Wegeränder besonders auf Kalk, stellw. dch. d. Geb., Rheing. Elsaß dch. Baden nach d. Pfalz, Neustadt, Worms, Oppenheim bis Mainz nach Bingen, Boppard bis gegen Bonn im Ahrthale, Nahegegend v. Kreuznach bis Meisenheim, Mosel bis Luxemburg, Malmédy, Westphalen, Hannover bis an d. Nord- u. Ostsee; Sachsen, Baiern, Thüringen, Jena u.; Destr. dch. alle Provinzen bis in d. Lombardei. 5—6. ‡

3. *R. gentilis* Sternb. K. syn. *R. rubella* Lindl. Felsen im südl. Littoral Istrien, Triest. 5—6. ‡

4. *R. reversa* W. et Kit. K. syn. Felsen im südl. Geb., Krain, Istrien an d. M. Slavonik bei Triest, Ungarn M. Matra. 5. ‡

5. *R. alpina* L. K. syn. *R. rupestris* Crntz. *R. inermis* Miller. *R. pendulis* Aiton Rehb. exc. Var. β . *pubescens*: *R. reversa* Presl. — γ . *R. pyrenaica* Gouan. Rehb. exc. *R. monspeliaca* Gouan. Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Destr. Böhmen; Schlesien u. auf d. Vogesen u. in Oberbaden auf d. Feldberge u. 6—7. ‡

6. *R. lucida* Ehrh. K. syn. in add. 444. *R. baltica* Roth. Meerufer bei Rostock, Elbe bei Hamburg. ‡

7. *R. cinnamomea* L. K. syn. *R. collincola* Ehrh. *Rosa majalis* Herm. *R. spinosissima* Wahlenb. *R. mutica*

et *R. fluvialis* Fl. Dan. *R. orthosepala* γ . *majalis* Spenn. frib. Var. β . *R. foecundissima* Münchh. Waldbige Hügel, Gebüſche mehr im g. ſüdl. Geb. bis in d. Alpen, Schweiz; Rheing. Baſel bei Kallenſtuch u. Rheinfelden, Breiſg., Baiern bei Nürnberg zc., Schwaben, Franken, Sachſen, Hamburg, Schleſien, nach Deſtr. dch. d. Donauthal nach Böhmen, Mähren, Ungarn bis in d. Lombardei u. ſtellw. verwildert Pfalz, Trier, Coblenz zc. 5—6. ‡

8. *R. turbinata* Aiton. K. syn. Var. β . *plena*: *R. francfurtana* Münchh. *R. turbinata* Jacq. *R. campanulata* Ehrh. Hecken in Baiern; Deſtr. am Rahlenberg bei Wien. 6. ‡

9. *R. rubrifolia* Villars K. syn. *R. glaucescens* Wulf. *R. glauca* Desf. *R. rubicunda* Hall. fil. *R. orthosepala* α . Spenn. frib. Var. β . *livida*: *R. livida* Host. *R. rubrifolia* Jacq. *R. guttensteinensis* Jacq. — γ . *pubescens* K. syn. Felsen d. Boralpen u. Gebirge, beſonders im g. ſüdl. Geb., Württemberg an Waldrändern bei Kalbingen, Elſaß auf d. Sulzer Ballon, Sachſen; Thüringen Jena; Deſtr. bis in d. Littoral, Iſtrien, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 6. ‡

10. *R. glandulosa* Bellard. K. syn. *R. Reynieri* Hall fil. *R. glabrata* Vest. *R. montana* Murrith. *R. rubrifolia* β . *montana* Gaud. helv. *R. rubrifolia* γ . *glandulosa* Sering. Boralpen, in d. ſüdl. Kette; Oberelſaß; Schweiz Cant. Wallis, Nicolaithal über Zermatten, M. Genis; Steyermark, Südtirol, Krain. 6. ‡

11. *R. spinulifolia* Dematra K. syn. Schweiz in Hecken, Cant. Freiburg u. bei Obergelſten in Wallis. 6—7 ‡

12. *R. canina* L. K. syn. *R. polymorpha* Spenn. Frib. *R. Cynarrhodon* Wallr. Var. *R. canina nitida* Fries. *R. nitens* Merat. *R. opaca* Fries, *R. senticosa* Achar. — Var.

α . *vulgaris*: *R. venosa* Sw. *R. sarmentacea* Sw. Woods. *R. dumalis* Bechst. *R. surculosa et nuda* Woods. *R. glaucescens* Lej. *R. balsamica* Willd.

R. calycina M. v. Bieb. *R. glauca* Schott, *R. malmundariensis* Lej. *R. aciphylla* Rau. *R. canina* Host.
 β. *dumetorum*: *R. dumetorum* Thuill. *R. collina* DC. *R. corymbifera* Borkh. *R. agrestis et sepium* Sw. *R. caesia*, *Borreri*, *dumetorum*, *collina*, *bractescens* et *hibernica* Woods. *R. Forsteri* Sm. *R. platyphylla*, *sepium*, *affinis et dumetorum* Rau. *R. frutetorum*, *solstitialis et uncinella* Besser. *R. umbellata*, *collina fastigiata*, *dumetorum et leucantha* Lej. *R. sylvestris* Schultz. *R. caesia* Host. *R. corymbifera* Sadler. Pelshin.

γ. *collina*: a. *R. collina* Jacq. Rau. *R. campestris* Sw. *R. saxatilis* Stev. *R. Boreykiana*, *Ratomschiana* et *humilis* Besser. *R. caucasica* M. v. Bieb. — b. *R. sempervirens* Rau. *R. Ravi* Tratt. *R. andegavensis* Bast. *R. ambigua* Lej. — c. *R. psilophylla* Rau. *R. trachyphylla* Rau. — e. *R. flexuosa* Rau. *R. nitidula*. *jundzilliana* et *glandulosa* Besser. *R. Andrzejowskiana* Stev. *R. fastigiata* Bast. *R. leucantha* M. v. B. — f. *R. alba* L.

δ. *sepium*: *R. sepium* Thuill. *R. myrtifolia* Hall. fil. *S. sepium et rubiginosa* DC. *R. glutinosa* Schultz. *R. Kluckii* Besser. *R. stylosa* γ. *glandulosa* DC. prodr. Wälder, Gebüſche, Hecken, Zäune, im g. Geb. 6. ‡

13. *R. coriifolia* Fries K. syn. 252. Sonder. Fl. v. Hamburg. In Hecken, Hamburg in d. Befenhofst. 7. ‡

14. *R. rubiginosa* L. K. syn. *R. Eglanderia* Miller, *R. suavifolia* Lightf. Var. *R. agrestis* Savi, Pollini, *R. umbellata* Leers, *R. sempervirens* Roth, *R. tenuiglandulosa* Merat., *R. rubiginosa* γ. *parvifolia* Willd. DC. *R. micrantha* DC. Smith. *R. resinosa* Lej. Fl. Spa. *R. nemorosa* Libert. *R. Libertiana* Tratt. Gebirgswälder, steinige Heiden, in Hecken, d. d. g. Geb. 6. ‡

15. *R. tomentosa* Smith. K. syn. *R. marginata* Wallr. *R. villosa* Ehrh. Pollich. Var. *R. molissima* Willd.

Borkh. *R. hispida* Borkh. *R. Borkhausenii* Tratt. *R. farinosa* Bechstein *R. dimorpha et terebinthinacea* Besser. *R. cuspidata* M. v. Bieb. *R. pseudorubiginosa* Lej. *R. scabriuscula*, *villosa*, *heterophylla*, *pulchella*, *caesia et tomentosa* Woods. *R. mollis* *R. subglobosa* Smith, *R. dubia* Wib. Wälder, Gebüſche, dch. d. g. Geb., Rheing. von Baden bis Mainz, Trier, Aachen, Coblenz u. 6. ‡

16. *R. pomifera* Hermann K. syn. *R. villosa* Wulf. DC. *R. cretica* Vest. *R. gracilis* Woods. Gebüſche der Gebirge u. Boralpen, ſtellw. dch. d. Geb., Rheing., Elſaß im Münſterthale, Pfalz bei Annweiler, im Rhein-, Mosel-, Lahn-, Saar-, Sauer- u. Uhr-Thale, Coblenz, Trier, Saarbrücken, Luxemburg u.; Hamburg am Eppendorfer Moor, Schweiz Cant. Wallis; Deſtr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Vittoral, Ungarn, Lombardei u. 6. ‡

17. *R. ciliato-petala* Besser. K. syn. *R. resinosa* Sternb. *R. molissima* Fries non Willd. Gebirge u. Boralpen, in d. ſüdl. Kette, Deſtr. Steyermark, Tyrol, Krain. 6—7. ‡

18. *R. systyla* Bastard. K. syn. *R. stylosa* Lamk. DC. *Rchb. exc.* Var. α . *R. Desvauxiana* Sering. *R. stylosa* Desv. *R. collina* Smith. — β . *R. leucochroa* Desv. *R. brevistyla* DC. Boralpen, Gebirge, Rheing., Oberelſaß, Luxemburg; Schweiz bei Nyon; Steyermark. 6. ‡

19. *R. arvensis* Huds. K. syn. *R. sylvestris* Herm. *R. repens* Wib. Scopol. Roth. *Rchb. exc.* *R. scandens* Wallr. pr. part. *R. serpens et herporrhodon*. Ehrh. Var. β . *glauca*: *R. glauca* Dierbach. Wälder, Hecken, Raine, Wiesen u. Wegeränder ſtellw. dch. d. g. Geb. 6. ‡

20. *R. sempervirens* L. K. syn. *R. scandens* Miller. *R. balearica* Pers. *R. atrovirens* Vivian. *R. scandens* var. Wallr. Var. β . *lejustyla*: *R. prostrata* Desv. — γ . *micrantha*: *R. sempervirens* β . *microphylla* DC. h. monsp. Felsen, ſteinige Orte im ſüdl. Vittoral, Iſtrien, bei Triest, Krain, Dalmatien, Venedig, Piemont. 6. ‡

21. *R. gallica* L. K. syn. *R. austriaca* Crntz. *R.*

Chamaerhodon Wallr. *R. pumila* Jacq. Clus. Host. *R. agrestis* Gmel. *R. arvina* Rau. *R. germanica* Maerkl. *R. centifolia simplex*. Auct. germ. *R. geminata* Rau. Var. a. *R. hybrida* K. et Z. *R. Czachiana* Bess. — b. *R. hybrida* Schleicher. — c. *R. Axmanni* Gmel. — d. plena: *R. gallica* L. *R. basilica* Rössig — e. plena micrantha: *R. parvifolia* Ehrh. *R. remensis* DC. *R. burgundica* Rössig. — f. *R. cordifolia* Host. — g. *R. Polliniana* Spr. Pollin. veron. — h. *R. pygmaea* M. v. Bieb. *R. humilis* Tausch. Waldränder, Haine, Heiden, Abhänge, Sandacker, stellenw. besonders dch. d. g. südl. Geb., Rheing., Heidelberg, Mannheim bis Frankfurt, Landau bis Boppard, Thüringen bei Jena u. im mittleren Geb. nach g. Destr. 2c. 6—7. 3

22. *R. centifolia* L. K. syn. In Gärten u. Anlagen cultivirt. 6. 3

Sechshunddreißigste Ordnung.

Sanguisorbeen.

Lindl. K. syn. 256. K. Taschb. 177. Rosaceen Rechb. exc. p. 609.

214. *Achemilla* L. (IV. 1.) Frauenmantel. K. syn. Rechb. exc. Comp. I. 1. p. 259.

1. *A. vulgaris* L. K. syn. *A. glaberrima* Schm. *A. hybrida* Web. Hoffm. Var. β . *A. truncata* Tausch. — γ . *subsericea*: *A. montana* Willd. *A. vulg.* γ . *hybrida* Willd. *A. alpina* β . *hybrida* L. spec. Wiesen, Triften, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 5—7. 4

2. *A. pubescens* M. v. Bieb. K. syn. Triften d. Hochalpen, Destr. Kärnthn Pasterze, Tyrol Seiseralpe, Krain. 6—7. 4

3. *A. fissa* Schummel. K. syn. *A. minor* Tausch., Host. *A. palmatifida* Tausch. *A. pyrenaica* Dufour. Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Destr. Tyrol, Littoral u. in d. Subeten. 7—8. 4

4. *A. alpina* L. K. syn. Var. β . *Hoppeana*: *A. alpina* Sturm. Triften, Geröde d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Destr. 2c. bis in d. Lombardei, Rheing. in d. Vogesen a. d. Rösberg u. Rotabac, Oberbaden im Breisgau a. d. Feldberg u. Schlesien in d. Sudeten. 6—8. 4

5. *A. pentaphylla* L. K. syn. Feuchte, grasige Orte d. Hochalpen an Gletscherrändern, Schweiz, W. Ravn, Grimsel, Gemmi 2c., Tyrol, Wormserjoch, Madritsch-Gletscher, Lombardei. 7—8. 4

6. *A. arvensis* Scopoli. K. syn. *A. Aphanes* Leers. *Aphanes arvensis* L. Aecker, Brachfelder, im g. Geb. 6—8. 4

215. *Sanguisorba* L. (IV. 1.) Wiesenknopf.

K. syn. 257. Rchb. exc. p. 610. Comp. I. 1. p. 258.

1. *S. officinalis* L. K. syn. Var. β . *auriculata*: *S. auriculata* Scopoli. Rchb. exc. Wiesen dch. d. g. Geb.; Var. β . stellw. auf sehr fetten Wiesen im südl. Geb. Krain. 6—8. 4

2. *S. dodecandra* Moretti K. syn. Grassige Orte im südl. Geb. Schweiz, Veltlin im Umbria = Thale, u. in d. Lombardei. 7. 4

216. *Poterium* L. (XXI. 5.) Becherblume. K. syn.

258. Rchb. exc. p. 610. Comp. II. p. 668.

1. *P. Sanguisorba* L. K. syn. *Pimpinella* — Gaertn. *Sanguisorba minor* Scopoli. Var. β . *Pot. guestphalicum* Boeningh. — γ . *P. glaucescens* Rchb. exc. Wiesen, Triften im g. Geb. 6—7. 4

2. *P. polygamum* W. et Kit. K. syn. Bewachsene Gebirge, im südl. Geb., Kärnten, Steyermark, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Venedig. 6—7. 4

3. *P. spinosum* L. Rchb. exc. Gebirge im südl. Geb., Dalmatien, bei Spalato, Piemont. 5—7. 3

Siebenunddreißigste Ordnung.

Pomaceen.

Lindl. K. syn. 258. K. Taschb. 178. Rchb. exc. p. 627.

217. *Crataegus* L. (XII. 2.) Weißdorn. K. syn. Rchb. exc. p. 628. Comp. I. 2. p. 180.

1. *C. Oxyacantha* L. K. syn. *Mespilus* — Scopol. Gaertn. Var. β . *obtusata*: *C. oxyacanthoides* Thuill. Wälder, Gebüsche, Hecken, Zäune, im g. Geb. 5—6. $\frac{1}{2}$

2. *monogyna* Jacq. K. syn. *Mespilus* — us Willd. *M. Oxyacantha* Scopol. *C. kyrtostyla* Fingh. Wälder, Gebüsche, Hecken, Zäune, dch. d. g. Geb. 6—7. $\frac{1}{2}$

3. *C. Azarolus* L. K. syn. Bewachsene Hügel im südl. Geb., Südtirol, Krain, Vitoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Piemont, Nizza. 5. $\frac{1}{2}$

4. *C. pentagyna* Kit. Rchb. exc. Host. Fl. Austr. Wälder in Ungarn. 5. $\frac{1}{2}$

5. *C. nigra* W. et Kit. Rchb. exc. *Mespilus* — Roth. Im südl. Geb. Croatien u. a. d. Donauinseln in Ungarn u. in Siebenbürgen. 5. $\frac{1}{2}$

6. *C. Pyracantha* Pers. Rchb. exc. Hecken, Zäune im südl. Geb., Dalmatien bei Ragusa, Genua, Savoyen u. 5. $\frac{1}{2}$

218. *Cotoneaster* Medik. Lindl. (XII. 2.) Steinapfel. K. syn. 259. Rchb. exc. p. 629. Comp. I. 2. p. 179.

1. *C. vulgaris* Lindl. K. syn. *Mespilus Cotoneaster* L. Bewachsene Bergstellen, Felsen bis in d. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette u. Gebirgen, Rheing., Baden im Breisgau, Feldberg u., Pfalz, Donnersberg, bis zur Nahe u. Mosel, Bingen, Kreuznach, Meisenheim, Trier, Luxemburg, Eifel, Mosel abwärts bis Coblenz, Berncastel, Trarbach u., Boppard bis Siebengebirge u. Ahrthal u., Würtemberg, Baiern, Sachsen, Thüringen, Oestr. 4—5. $\frac{1}{2}$

2. *C. tomentosa* Lindl. K. syn. *Mespilus* — Aiton,

Roth. *M. coccinea* W. et Kit. *M. pygmaea* Baumg. Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Oestr. Tyrol, Krain, Littoral bis Venedig. 5. ‡

319. *Mespilus* L. (XII. 2.) Mispel. K. syn. 259.

Rehb. exc. p. 630. Comp. I. 2. p. 180.

1. *M. germanica* L. K. syn. *M. vulgaris* Rehb. exc. Bewachsene Gebirgsstellen im südl. Geb., Croatien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig u., Südschweiz, diesseits d. Alpen, am Rhein, Donau, Mosel u. wohl nur verwildert, u. auch häufig angepflanzt. 5. ‡

220. *Cydonia* L. (XII. 2.) Quitte. K. syn. 260.

Rehb. exc. p. 631. Comp. I. 2. p. 175.

1. *vulgaris* L. K. syn. *Pyrus Cydonia* L. Var. *C. maliformis* Mill. *C. oblonga* Mill. *C. lusitanica* Mill. Felsen, Ufer, im südl. Geb., Südschweiz, Oestr. an d. Donau bis in d. Littoral, Istrien bei Fiume, Lombardei u., sonst wohl nur verwildert u. allgemein angepflanzt. 5. ‡

221. *Pyrus* L. (XII. 2.) Birnappelbaum. K. syn.

260. Rehb. exc. p. 630. Comp. I. 2. p. 173.

1. *P. communis* L. K. syn. *P. Achras* Gaertn. Var. α . *glabra*. — β . *tomentosa*: *P. Polliveria* Lej. Fl. Spa. *P. communis* γ . *dasyphylla* Tausch. *P. communis* β . *Pyraster* Wallr. *P. communis* γ . *sativa* Wallr. Wälder, Gebüsche im g. Geb. u. allgemein angepflanzt. 4—5. ‡

2. *P. nivalis* Jacq. K. syn. *P. amygdaliformis* β . *nivalis* K. Taschb. Gebirgswälder in Oestreich. 4. ‡

3. *P. amygdaliformis* Vill. delph. K. syn. Sonlige Hügel im südl. Geb., Littoral, Istrien bei Gimino u. St. Vicenti, Dalmatien. 4. ‡

4. *P. salviaefolia* DC. prodr. II. p. 634. Maly enum. pl. austr. p. 333. In Dalmatien angepflanzt. 4. ‡

5. *P. eriopleura* Rehb. exc. In Dalmatien. 4. ‡

6. *P. Malus* L. K. syn. Var. α . *glabra*: *P. M. au-*

stera Wallr. *P. acerba* DC. — *β. tomentosa*: *P. Malus β. mitis* Wallr. *P. Malus* DC. Wälder, Gebüſche, im g. Geb. u. allgemein angepflanzt. 5. ‡

222. *Aronia* Pers. (XII. 2.) Felsenbirne. K. syn. 261. Rchb. exc. p. 629. Comp. I. 2. 178.

1. *A. rotundifolia* Pers. K. syn. *Ar. Amelanchier* Rchb. exc. *Mespilus* — *L. Pyrus* — Willd. *Amelanchier vulgaris* Moench. Var. *β. tomentosa*: *Ar. cretica* Auct. germ. Gebirgsabhänge, Felsen dch. d. g. Alpenkette bis in d. Gebirge, Rheing. v. Basel bis Coblenz in d. Neckar-, Main-, Rahe-, Mosel- u. Saargebirgen bis ins Uhrthal; Thüringen, Baiern, Schwaben, Harz; Schweiz dch. d. Alpen nach Baiern, Destr. bis in d. Eittoral. 4—5. ‡

223. *Sorbus* L. (XII. 2.) Eberesche. K. syn. 262. Rchb. exc. p. 627. Comp. I. 2. p. 175.

1. *S. domestica* L. K. syn. *Pyrus Sorbus* Gaertn. *Pyrus domestica* Smith. Var. *β. lanuginosa* W. et Kit. Bewaldete Gebirgsstellen, Weinberge, mehr im südl. Geb., Rheing. in d. Rhein-, Rahe- u. Moselgebirgen, Trier, Eurenburg, Baiern, Schwaben, Hannover, Preußen bis Memel, Harz, Thüringen, Schweiz im Jura; Destr. Krain, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Tyrol, Lombardien, Venedig u. 5—6. ‡

2. *S. aucuparia* L. K. syn. *Pyrus* — Gaertn. Wälder, Gebüſche, Hecken dch. d. g. Geb. 5—6. ‡

3. *S. hybrida* L. K. syn. *Pyrus* — Smith. *P. pinnatifida* Ehrh. DC. *P. semipinnata* Roth. *Crataegus Aria β. Gaud. helv.* Gebirgswälder u. an d. südl. Abhängen Thüringens, an d. Cinger- u. Billinger-Bergen, Schwarzbürg-Rudolstadt, Coburg; Schweiz im Jura auf d. Creux du Bau; Dalmatien, Ungarn. 5. ‡

4. *S. scandica* Fries. K. syn. in add. *S. intermedia* Rchb. exc. *Pyrus* — Ehrh. *Aria Hostii* Jacq. Cra-

taegus Aria β . scandica L. Pyrus Aria Smith. Wälder in Ostpreußen, Danzig bei Neblau. 5. ‡

5. S. Aria Crantz. K. syn. Pyrus — Ehrh. Crataegus — L. Gebirgswälder, Felsen, stellenw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen; Rheingebirge u. in allen Nebenthälern. 5—6. ‡

6. S. latifolia Pers. K. syn. Pyrus intermedia β . latifolia DC. Crataegus latifolia Lamk. C. dentata Thuill. Laubwälder, Württemberg an d. Neubinger Höhe bei Ludwigsbürg; Willinger-Berge bei Stadt-Ilm in Schwarzbürg-Rudolstadt, Thüringen; Destr. 5. ‡

7. S. torminalis Crantz. K. syn. Crataegus — L. Pyrus — Ehrh. Var. β . tomentosa: S. Tommasinii Hladnik. Gebirgswälder dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, nördl. bis Preußen, Marienwerder, Rheing., Elsaß, Baden, Pfalz, Coblenz, Trier, Luxemburg, Ahrthal; Var. β . in Krain. 5. ‡

8. S. Chamaemespilus Crantz. K. syn. Mespilus — L. Pyrus — DC. Aria — Host. Aronia — Rchb. exc. Var. β . Pyrus sudetica Tausch. Abhänge, Felsen d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Destr. Krain, Ungarn, Lombardei; in d. Vogesen auf d. Hohenack u. M. Rotabac, Sudeten um d. Teufelsgarten d. Elbgrundes. 6—7. ‡

Achtunddreißigste Ordnung.

Granateen.

Don. K. syn. 263. K. Taschb. 181. Onagreae pars.
Rchb. exc. p. 638.

224. Punica L. (XII. 1.) Granatbaum. K. syn.
Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 166.

1. P. Granatum L. K. syn. Felsen in Dalmatien bei Spalato; u. cultivirt im südl. Littoral, Südtirol, Croatien, Lombardei, Venedig; Südschweiz Cant. Wallis bei Sitten. 6—7. ‡

Neununddreißigste Ordnung. Onagrarien.

Juss. K. syn. 264. K. Taschb. 181. Rchb. exc. p. 633.

I. Gruppe. Onagreen DC.

225. *Epilobium* L. (VIII. 1.) Weidenröschen.

K. syn. Rchb. exc. p. 634. Comp. I. 2. p. 16.

Erste Rotte. *Chamaenerion* Tausch. K. syn.

1. *E. angustifolium* L. K. syn. *E. spicatum* Lamk. *E. Gesneri* Vill. *Chamaenerion angustifolium* Scop. Var. β . *E. latifolium* Roth. — γ . *albiflorum*: *E. album* Rchb. exc. Junge Waldschläge, Gebüsche, bch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen. 7—8. 4

2. *E. Dodonaei* Villars. K. syn. *E.* — Var. α . Gaud. helv. *E. rosmarinifolium* Haenke. *E. angustissimum* Lamk. *E. angustifolium* γ . L. sp. *E. angustifolium* Lam. *Chamaenerion palustre* Scopoli. Var. β . *serratulum*: *E. angustissimum* Ait. Rchb. icon. W. et Kit. Kiefige, feuchte Orte, Ufer d. Alpen, Schweiz u. bch. d. g. Alpenkette, besonders an d. südl. Abhängen bis in d. Thäler nach Baiern, Oberschwaben an d. Urger, Rheing. am Oberrheine bei Bamlach, Steinenstatt, Neuburg, zw. Klieben u. Kleinhüningen u. an d. Weinberg bei Krenzach; Destr. Mähren, Tyrol, Steyermark, Krain, Galizien, Ungarn bis in d. südl. Eitthal, Lombardie u. 7—8. 4

3. *E. Fleischeri* Hochst. K. syn. *E. Dodonaei* β . Gaud. helv. *E. denticulatum* Wenderoth, *E. angustissimum* Rchb. exc. *E. crassifolia* Lehm. Thäler d. Hochalpen an Gletscherrändern; Schweiz M. Bovannaz, M. Wetterhorn; Tyrol am Orteles im Sulbenthale. 7—8. 4

Zweite Rotte. *Lysimachion* Tausch. K. syn.

4. *E. hirsutum* L. K. syn. *E. grandiflorum* Allion. *E. ramosum* Huds. *E. amplexicaule* Lamk. *E. aquaticum*

Thuill. Var. β . subglabrum. — γ . villosissimum: E. hirsutum β . intermedium DC. E. intermedium Merat. Sumpfige, schattige Orte, Ufer, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

5. E. parviflorum Schreber. K. syn. E. molle Lamk. E. hirsutum β . L. E. hirsutum Allion. E. pubescens Roth, E. villosum Aiton. Var. β . subglabrum: E. rivulare Wahlenb. Rechb. exc. Sumpfige, schattige Orte, Ufer, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

6. E. montanum L. K. syn. Var. β . verticillatum. — γ . lanceolatum: E. nutans Lej. E. nitidum Host. — δ . collinum: E. collinum Gmel. E. montanum β . ramosissimum DC. E. mont. β . minus Wim. et Grab. Gebirgswaldungen, Haine, Gebüſche, bis in d. Alpen dch. d. g. Geb. 6—8. 4

7. E. lanceolatum Sebastian et Maur. Flor. rom. prodr. K. syn. in add. 1022. Gebirgswälder, in d. Flora von Coblenz, im Elzthale an d. Straße u. am Schlosse Elz, auf d. Straße v. Trier nach Coblenz, Bad Bertrich nach Euzerath u. bei Strogbüsch in d. Eifel u. 6—8. 4

8. E. hypericifolium Tausch. K. syn. Bergwälder in Böhmen nur am Donnersberg. 6—7. 4

9. E. palustre L. K. syn. Var. β . pilosum: E. simplex Tratt. — γ . E. Schmidtianum Rostkow. Torfhaltige, sumpfige Wiesen, Gräben dch. d. g. Geb. 7—8. 4

10. E. virgatum Fries. K. syn. 268. et in add. 1023. E. Lamy F. W. Schultz? Fl. d. Pfalz p. 154. E. chordorrhizum Fries. E. obscurum Rechb. Gräben, mehr im nördl. Geb., Rheing., Pfalz, Trarbach am Trohnhof, Fl. v. Trier, Coblenz im Chausseegraben an d. Karthaus, Aachen am Frankenberg, Collinshof u. Weise Mühle; Lauenburg, Hamburg u. in der Neumark. 7—8. 4

11. E. tetragonum L. K. syn. Chamaenerion obscurum Schreber Rechb. Naſſe Orte, Bäche, Gräben, feuchte Felsen, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., Elsaß, Baden, Hessen, Pfalz bis Coblenz, Trier, Eöln, Aachen bis in d. Nie-

berlande, nach Westphalen, Hamburg, Hannover, Thüringen, Preußen u. in g. Destr. 6—7. 4

12. *E. roseum* Schreber. K. syn. Fries. *E. nudum*. Schumach. Rchb. exc. Sumpfige, feuchte Orte, an Gräben, Bachufern im g. Geb. 7—8. 4

13. *E. trigonum* Schrank. K. syn. *E. montanum* β. *alpestre* Jacq. *E. alpestre* Rchb. exc. Feuchte Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Destr., u. in d. Geb. v. Schlesien, Böhmen, Mähren, auf d. Vogesen, in Oberbaden auf d. Feldberg. 7—8. 4

14. *E. organifolium* Lamk. K. syn. *E. alsinifolium* Villars delph. *E. alpestre* Schmidt bohm. Bäche, Quellen d. Alpen u. höheren Gebirge, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr., Rheing., auf d. Vogesen, Oberbaden, Breisgau auf d. Feldberg, Schlesien; Böhmen, Mähren u. 7—8. 4

15. *E. alpinum* L. K. syn. *E. anagallidifolium* Lamk. Var. β. *E. nutans* Tausch. Schmidt. Feuchte Orte d. Alpen u. Boralpen u. Gebirge; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Krain, Littoral. Auf d. Vogesen u. Feldberg in Oberbaden, Harz auf d. Brocken, Schlesien, Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

226. *Oenothera* L. (VIII. 1.) *Nachtkerze*. K. syn. 268. Rchb. exc. p. 637. Comp. I. 2. p. 15.

1. *O. biennis* L. K. syn. *Onagra* — Scopoli Var. β. *parviflora*. Ufer, Weidengebüsch, Felder, Wege, dch. d. g. Geb. 6—8. ☉

2. *O. muricata* L. K. syn. *O. parviflora* Gmel. bad. Fluß- u. Bachufer, Rheing., Oberbaden bei Mülheim, Breisg. an d. Dreisam bei Freiburg, Elsaß bei Colmar; Mecklenburg an d. Elbe, Holstein u. in Croatien. 6—8. ☉

II. Gruppe. Jussieen DC.

227. *Isnardia* L. (IV. 1.) *Isnardie*. K. syn. 268.

Rechb. exc. p. 634. Comp. I. 1. p. 258.

1. *I. palustris* L. K. syn. Stillfließende Wasser, an Gräben, stellw. im Geb., Rheing., Bodensee bei Friedrichshafen, Basel dch. Elsaß, Baden bei Dackland bis Mannheim, Wetterau, Westphalen, Hamburg bis Holstein; Schweiz bei Genf, Neuffchatel; Kärnthn, Steyermark, Tyrol, Krain, Croatien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

III. Gruppe. Circaeen. DC.

228. *Circaea* L. (II. 1.) *Herzenkraut*. K. syn

269. Rechb. exc. p. 637. Comp. I. 1. p. 41.

1. *C. lutetiana* L. K. syn. Schattige, feuchte Orte, Wälder, Haine, Gebüsche, Hecken, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *C. intermedia* Ehrh. K. syn. *C. lutetiana* β . *intermedia* DC. prodr. *C. alpina* Kroch. Sil. *C. alpina* α . *major* Pollini veron. Gebirgswälder, schattige Thäler an Gebirgsbächen zw. Felsen, stellw. dch. d. Geb. bis in d. Boralpen, Rheing., Schweiz v. Tura dch. d. Vogesen, Schwarzwald, Baden, Breisg., Pfalz bei Zweibrücken, Fl. v. Trier auf d. Hochwalde, bei Baumholder, in d. Eifel, Coblenz, Bonn, Köln, Aachen, Düsseldorf nach Westphalen, Hannover bis Preußen, Baiern, Sachsen zc.; Destr. Böhmen, Steyermark, Tyrol, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

3. *C. alpina* L. K. syn. Schattige Gebirgswälder stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen, Rheing., Vogesen, Schwarzwald, Baden im Breisg., Pfalz bei Zweibrücken, Trier, Luxemburg, Coblenz bei Grenzau; Thüringen, Hamburg, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Sachsen, Preußen zc., nach Destr. zc. 6—7. 4

IV. Gruppe. Hydrocaryen Link.

229. *Trapa* L. (IV. 1.) Wassernuß. K. syn. 269.

Rchb. exc. p. 633. Comp. I. 1. p. 257.

1. *T. natans* L. K. syn. Stehende u. stillfließende Wasser stellw. dch. d. Geb., besonders im mittleren u. im g. südl. Geb., Rheing. bei Gernsheim, Germersheim, Frankenthal, Saarbrücken, Flora v. Trier; v. Bodensee dch. Baden u. Elsaß, besonders in d. Altwasser u., Destr. bis in d. Lombardei. 6—7. ☉

Vierzigste Ordnung. Halorageen.

R. Brown. K. syn. 269. K. Taschb. 185. Rchb. exc. p. 632.

230. *Myriophyllum* L. (XXI. 5.) Tausendblatt.

K. syn. 270. Rchb. exc. Comp. II. p. 669.

1. *M. verticillatum* L. K. syn. Var. α *pinnatifidum* Wallr. — β . *intermedium* K. syn. *M. verticill.* β . *pinnatum* Wallr. — γ . *pectinatum* Wallr. *M. pectinatum* DC. Stehende Wasser, Gräben, Teiche dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *M. spicatum* L. K. syn. Stehende Wasser, Gräben, seichte Orte d. Flüsse, Bäche u. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

3. *M. alternifolium* DC. K. syn. Teiche, stehende Wasser mit Quellen, stellw. im Geb., Rheing., Pfalz zw. Kaiserslautern, Schopp u. Zweibrücken im Bliesthale, Flora v. Trier im Saarthale bei Saarbrücken, Randerath, Naunheim, in Westphalen bei Bentheim, Oldenburg, Braunschweig, Hamburg an d. Elbe u. Alster, Holstein. 7—8. 4

Einundvierzigste Ordnung.

Hippurideen.

Link. K. syn. 270. K. Taschb. 185. Halorageae pars.

Rchb. exc. p. 632.

231. *Hippuris* L. (I. 1.) Tannenwedel. K. syn.

Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 1.

1. *H. vulgaris* L. K. syn. Stehende u. stillfließende Wasser, Gräben, Teichen, Bächen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. Constanz dch. Elsaß, Baden bei Rastatt u. bis Darmstadt, Pfalz bei Germersheim, Speyer bis Worms, Saarbrücken, Luxemburg; Eöln, Rüppersteg bei Rheindorf, Düsseldorf u. bis Preußen u. Destr. 7—8. 4

2. *H. maritima* Heller. Rechb. exc. DC. prodr. *H. vulgaris* β . *maritima* Wahlenb. K. syn. *H. lanceolata* Retz. *H. tetraphylla* L. Küste d. Nord- u. Ostsee u. im südl. Littoral. 5—6. 4

Zweiundvierzigste Ordnung.

Callitrichineen.

Link. K. syn. 271. K. Taschb. 185. Rutaceae pars.
Rechb. exc. p. 753. et icon. t. 129—30. f. 4746—49.

232. Callitriche L. (I. 1.) Wasserstern. K. syn.

Rechb. exc. Comp. I. 1. p. 2.

1. *C. stagnalis* Scopol. K. syn. *C. verna* Pollich. Stehende u. stillfließende Wasser dch. d. g. Geb. 5—10. 4

2. *C. platycarpa* Kütz. K. syn. *C. verna* Pollich. *C. intermedia* Hoffm. Mit d. Vorhergehenden stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten; Destr. Dalmatien. 5—10. 4

3. *C. vernalis* Kütz. K. syn. *C. verna* Pollich. Stehende u. stillfließende Wasser dch. d. g. Geb. 5—10. 4

4. *C. hamulata* Kütz. K. syn. *C. autumnalis* Pollich. Rechb. Kütz., Döll. Var. β . *minima*: *C. minima* Hoppe. *C. caespitosa* Schultz, *C. stellata* Hoppe, *C. intermedia* et *C. angustifolia* Hoppe. Mit d. Vorhergehenden. 5—10. 4

5. *C. autumnalis* L. K. syn. Stehende u. stillfließende Wasser besonders im südl. u. einzeln im nördl. Geb., Rheing. Flora v. Trier bei Randerath, Hamburg in d. Bille, Mecklenburg bei Neubrandenburg, Preußen; Destr. in allen Provinzen. 7—10. 4

Dreiundvierzigste Ordnung.

Ceratophylleen.

Gray. K. syn. 272. K. Taschb. 186. Rchb. exc. p. 150.

233. *Ceratophyllum* L. (XXI. 5.) Hörnerblatt. K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 671.

1. *C. submersum* L. K. syn. *C. muticum* Chamisso. Stehende Wasser, Seen, Teiche, Gräben, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Pfalz bei Germersheim, Philippsburg, Speyer, Lambsheim, v. Schwellingen bis Darmstadt; Flora v. Trier bei Saarbrücken, Luxemburg, Aachen nach Westphalen bei Münster, Oldenburg, Hamburg in d. Elbe, Holstein u., Thüringen bei Jena, Sachsen u.; Destr. Kärnthen, Tyrol, Siebenbürgen, Lombard. 6—7. 4

2. *C. demersum* L. K. syn. *C. oxyacanthum* Chamisso, *C. apiculatum* Chamisso. Stehende u. langsamfließende Wasser, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

3. *C. platycanthum* Chamisso. K. syn. Stehende u. stillfließende Wasser bei Berlin. 7—8. 4

Vierundvierzigste Ordnung.

Lythrarieen.

Juss. K. syn. 273. K. Tschb. 186. Rchb. exc. p. 639.

234. *Lythrum* L. (XI. 1.) Weiderich. K. syn. Rchb. exc. p. 640. Comp. I. 2. p. 154.

1. *L. Salicaria* L. K. syn. Var. β . *longistylum*: *L. Salicaria* β . *gracilis* DC. — γ . *canescens*: *L. Salicaria* γ . *tomentosum* DC. — δ . *bracteolatum* Fl. v. Trier. Feuchte Orte, Gräben, Ufer, dch. d. g. Geb. 7—9. 4

2. *L. tomentosum* Miller. Rchb. exc. *S. dubium* Schult. Austr. Schattige Ufer, Gräben, mehr im südl. Geb., Rheing., an d. Aachener = Straße bei Trier; Fl. v.

Spa; Destr., Schönbrunn bei Wien, Mähren am Thönißer See u. in Dalmatien. 7—8. 4

3. *L. virgatum* L. K. syn. *L. acuminatum* Willd. *L. austriacum* Jacq. Feuchte Orte, Gräben, mehr im südl. Geb., Rheing., Luxemburg an d. Semoi bei Boullion, Bernier bei Aachen, Fl. v. Spa; Destr., Donauinseln, Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 6—7. 4

4. *L. Thymifolia* L. Rehb. exc. *L. tribracteatum* Salzm. Feuchte, sandige Ufer, im südlichsten Geb., in d. Lombardei u. Piemont am Paillon bei Nizza. 7—8. ☉

5. *L. Hyssopifolia* L. K. syn. *L. parviflorum* Bad. Feuchte Triften, Wiesen, Felder, Gräben, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., vom Bodensee bei Constanz, stellw. dch. Baden bei Mühlheim, Rastatt bis Mannheim, Pfalz bei Speyer, Kreuznach, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Coblenz, Württemberg, Baiern, Thüringen, Sachsen 2c., u. im g. südl. Geb., Desterreich bis in d. Lombardei u. Venedig. 7—9. ☉

6. *L. geminiflorum* Bertolon. Fl. ital. V. p. 16. Maly enum. pl. austr. p. 332. In d. Lombardei bei Mantua. 7—8. ☉

7. *L. Graefferi* Tenore. Rehb. exc. Feuchte Ufer im südlichsten Geb. bei Nizza u. in Ligurien. 5—6. ☉

235. *Peplis* L. (VI. 1.) Austerquendel. K. syn. 274. Rehb. exc. p. 639. Comp. I. 1. p. 625.

1. *P. Portula* L. K. syn. Feuchte, nasse Orte, Triften, Aecker, Gräben, dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

236. *Ammania* L. (IV. 1.) Ammanie. Rehb. exc. p. 639. Comp. I. 1. p. 257.

1. *A. verticillata* Lamk. Rehb. exc. *Cornellia* — Host. austr. Im südlichsten Geb., Lombardei bei Mantua, Verona, bei Padua am Lago di St. Orsola. 7—8. ☉

237. *Suffrenia Bellardi* (II. 1.) Rchb. exc. p.

639. Comp. I. 1. p. 12.

1. *S. filiformis* Bell. Rchb. exc. Rasse Gräben d. Reisfelder in d. Lombardei bei Pavia, Verona, bei Venedig u. in Piemont. 8—9. ☉

Fünfundvierzigste Ordnung.

Tamariscineen.

Desv. K. syn. 274. K. Tschb. 187. Rchb. exc. p. 587.

238. *Tamarix* L. (V. 3.) Tamariske. K. syn.

Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 535.

1. *T. gallica* L. K. syn. *T. pentandra* Pallas, *Tamariscus* — Lamk. *T. gallicus* Allion. pedm. Sandboden, Felsen, im südl. Eittoral, Istrien bei Monfalcone, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Nizza. 7. ☽

2. *T. africana* Poir. K. syn. Feuchte, sandige Orte, im südl. Eittoral, Istrien, Insel Dsero, Dalmatien, Oberitalien. 7. ☽

239. *Myricaria* Desv. (V. 3.) Myrikarie.

K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 535.

1. *M. germanica* Desv. K. syn. *Tamarix* — L. Bach- u. Flußfließ d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Oestr., u. mit d. Rheine u. d. Donau in d. Niederungen, Rheing., v. Bodensee nach Basel bis Pforzheim, Rastatt u. einzeln bis Mannheim; Schwaben, Oberschlesien, Preußen an d. Weichsel; Mähren, Galizien, Ungarn, Krain bis in d. Lombardei. 5—6. ☽

2. *M. squamosa* Desv. Rchb. exc. Am südlichsten Eittoral, Lombardei, Venedig u. in Oberitalien bei Menton. 7. ☽

Sechshundvierzigste Ordnung.

Philadelphéen.

Don. K. syn. 275. K. Tschb. 187. Rchb. exc. p. 561.

240. *Philadelphus* L. (XII. 1.) Pfeilstrauch.

K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 165.

1. *P. coronarius* L. K. syn. *Syringa alba* Bauhin. *S. suaveolens* Moench. Gebirgsfelsen, unter Gebüschen, im südl. Geb., Destr., Südtirol, Steyermark bei Weiß, Krain, Siebenbürgen, Venedig, u. außerdem stellenw. im Geb., in Hecken verwildert, auch in Gärten angepflanzt. 5—6. ☞

Siebenundvierzigste Ordnung.

Myrtaceen.

R. Brow. K. syn. 275. K. Tschb. 188. Rchb. exc. p. 641.

241. *Myrtus* L. (XII. 1.) Myrte. K. syn. 276.

Rchb. exc. p. 641. Comp. I. 2. p. 166.

1. *M. communis* L. K. syn. Sonnige, steinige Orte, im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Duino, Fiume, Dalmatien, Lombardien, Venedig. 7—8. ☞

Achtundvierzigste Ordnung.

Cucurbitaceen.

Juss. K. syn. 276. K. Tschb. 188. Rchb. exc. p. 294.

242. *Cucurbita* L. (XXI. 7.) Kürbiß. K. syn.

Rchb. exc. Comp. II. p. 687.

1. *C. maxima* Duchesn. Rchb. exc. Cultivirt, im südl. Geb. 6—8. ☉

2. *C. Pepo* L. K. syn. Cultivirt, im südl. Geb. 6—8. ☉

3. *C. Melopepo* L. K. syn. Kürkenbund, dch. d. Geb., in Gärten cultivirt. 6—8. ☉

243. *Cucumis* L. (XXI. 7.) Gurke. K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 688.

1. *C. sativus* L. K. syn. Allgemein cultivirt. 5—8. ☉

2. *C. Melo* L. K. syn. Cultivirt, mehr im südl. Geb. 5—8. ☉

3. *C. cantalupensis* Haberle. Rchb. exc. Cultivirt, wie die Melone im südl. Geb. 5—8. ☉

4. *C. Citrullus* Sering. Rchb. exc. Cultivirt im südl. Geb. 5—8. ☉

244. *Bryonia* L. (XXI. 7.) Zaunrübe. K. syn. 277. Rchb. exc. p. 294. Comp. II. p. 690.

1. *B. alba* L. K. syn. Zaune, Hecken, stchw. im g. nördl. u. im südl. Geb., seltener im mittleren, Rheing. nur bei Rehl u. Wertheim; Westphalen, Hannover, Berlin, Preußen 2c.; Destr. Böhmen, Kärnthen, Steyermark, Dalmatien, Galizien, Mähren, Ungarn bis in d. Lombardei. 6—7. 4

2. *B. dioica* Jacq. K. syn. Hecken, Zaune, stchw. dch. d. g. mittlere u. südl. Geb., Rheing. gemein. 6—7. 4

245. *Ecballion* Richar. (XXI. 7.) Spitzgurke. K. syn. 277. Rchb. exc. p. 294. Comp. II. p. 689.

1. *E. Elaterium* Rich. K. syn. Momordica — L. *Ecballion agreste* Rchb. exc. *Elaterium cordifolium* Moench. Hecken an Wegen im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Oberitalien. 7—9. ☉

246. *Sicyos* L. (XXI. 7.) Haargurke. Rchb. exc. p. 294. Comp. II. p. 690.

1. *S. angulatus* L. Rchb. exc. An Zäunen, in Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 8—9. ☉

Neunundvierzigste Ordnung. Portulaceen.

Juss. K. syn. 277. K. Tschb. 188. Rchb. exc. p. 575.

247. *Portulaca* L. (XI. 1.) *Portulak*. K. syn.
Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 155.

1. *G. oleracea* L. K. syn. *P. oleracea* α . *sylvestris* DC. prodr. Cultivirte Orte, an Wegen, dch. d. g. Geb. 6—9. ☉

2. *P. sativa* Haw. K. syn. *P. oleracea* β . *sativa* DC. prodr. *P. latifolia* Hornem. Cultivirt. 6—9. ☉

248. *Montia* L. (III. 1.) *Montie*. K. syn. 278 et in add. 445. Rchb. exc. p. 575. Comp. I. 1. p. 62.

1. *M. minor* Gmel. K. syn. *M. fontana* Sturm. *M. font.* α . *minor*. Koch. *M. font.* β . *erecta* Pers. *M. aquatica minor*. Michel. *M. arvensis* Wallr. Feuchte, sandige Ufer, Acker, Gräben, dch. d. g. Geb. 4—6. ☉

2. *M. rivularis* Gmel. K. syn. in add. *M. fontana* β . *major* K. syn. *M. repens*. Gmel. *M. aquatica major* Michel. Gebirgsbäche, in kaltem Quellwasser, stchw. dch. d. g. Geb. 4—6. 4

Fünfzigste Ordnung. Paronychieen.

A. St. Hil. DC. prodr. K. syn. 279. K. Tschb. 189. *Portulacae pars* Rchb. exc. p. 563.

I. Gruppe. Telephieen DC. Bartling.

249. *Telephium* L. (V. 3.) *Telephie*. K. syn.
Rchb. exc. p. 574.

1. *T. Imperati* L. K. syn. Felsen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Sitten, Genèvey; Südtirol im Winchgau, Lombardei, Piemont bei Biavenna, Nizza. 7. 4

250. *Corrigiola* L. (V. 3.) Hirschsprung. K. syn.
Rchb. exc. p. 574. Comp. I. 1. p. 536.

1. *C. littoralis* L. K. syn. Flußfließ, feuchte, sandige Orte u. an d. Seefüsten, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. am g. Rheine bis in d. Niederlande u. in d. Nebenthälern nicht selten zc. 7—8. ☉

II. Gruppe. Illecebreen DC. Bartl.

251. *Herniaria* L. (V. 2.) Bruchkraut. K. syn.
Rchb. exc. p. 564. Comp. I. 1. p. 454.

1. *H. glabra* L. K. syn. Sandige, kiesige Triften, Heiden, Felder, Wege, Ufer zc., dch. d. g. Geb. 5—10. 4

2. *H. rotundifolia* Visiani Rchb. exc. Grasige Orte im südl. Eittoral, in Dalmatien, Insel Iossin. 4. 4

3. *H. hirsuta* L. K. syn. *H. vulgaris* Spreng. Kiesige Sandfelder, Ufer, Weinberge, Wege, stchw. dch. d. mittlere Geb. und im g. südl., Rheing., Elsaß, Baden bei Freiburg, Rastatt, Karlsruhe, Schwellingen bis Frankfurt, Hanau, Pfalz Speier, Maxdorf, Dürkheim, Boppard, Coblenz, Eöln, Düsseldorf, Fl. v. Trier an d. Obermosel, Luxemburg, Schwaben, Sachsen, Baiern zc., Destr. in allen Provinzen. 7—10. 4

4. *H. incana* Lamk. K. syn. Sonnige Orte im südl. Eittoral, Istrien bei Fiume, Insel Veglia, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardci. 5—6. 4

5. *H. alpina* Villars. K. syn. Felsen d. Hochalpen, Schweiz, Cant. Wallis Nicolaithal über Zermatten, M. Stock, M. Gries u. in d. Lombardci. 7—8. 4

6. *H. fruticosa* Desf. Host. Fl. austr. I. 318. Maly enum. pl. austr. p. 291. Sonnige Felsen in Dalmatien. 5

252. *Illecebrum* L. (V. 1.) Knorbelblume. K. syn. 280. Rchb. exc. p. 563. Comp. I. 1. p. 413.

1. *J. verticillatum* L. K. syn. *Paronychia* — Lamk.

Feuchter Sand- und Schlamm Boden, besonders in Dorfgegenden
 stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., dch. Baden, Elsaß nach Bilsch,
 Saarlouis, Luxemburg, Bonn, Mühlheim bei Köln, Düsseldorf,
 bis in d. Niederlande, v. d. nach Westphalen, Ham-
 burg, Hannover, Sachsen, Schlesien, Baiern; Oestr. bis in
 d. Lombardei, Südschweiz u. 7—8. 4

253. *Paronychia* Tournef. (V. 1.) Nagelkraut.

K. syn. 280. Rchb. exc. p. 564. Comp. I. p. 414.

1. *P. polygonifolia* DC. Rchb. exc. *Illecebrum* —
 Villars. Gebirge im südl. Geb., Dalmatien bei Ragusa, Pie-
 mont auf d. M. Genis. 5. 4

2. *P. argentea* Lamk. Rchb. exc. *P. hispanica* DC.
Illecebrum Paronychia L. Felsen, steinige Orte am südl.
 Littoral, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Westligurien.
 4—5. 4

3. *P. capitata* Lamk. K. syn. *P. serpyllifolia* M. et K.
Illecebrum capitatum L. *I. cephalodes* M. v. B. Var. β .
serpyllifolia: *P. serpyllifolia* DC. Rchb. exc. *Illecebrum* —
 lium Villars. I. Kapela Haq. Sonnige Felsen im südl.
 Littoral, Istrien, Fiume, Insel Dsero, Beglia, Croatien,
 Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 5. 4

4. *P. imbricata* Rchb. Rchb. exc. In Dalmatien
 um Rona. 5. 4

III. Gruppe. Polycarpeen DC.

254. *Polycarpon* L. (III. 3.) Saamling. K. syn.

281. Rchb. exc. p. 566. Comp. I. 1. p. 210.

1. *P. tetraphyllum* L. K. syn. Sonnige Sandstellen,
 besonders im südl. Geb., Rheing., Baden bei Karlsruhe,
 Graben, Waghäusel, Mannheim, Pfalz bei Speier, Schlesien
 bei Breslau u. Ohlau, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lom-
 bardei, Venedig, Veltlin. 8—9. ☉

2. *P. alsinefolium* DC. K. syn. in add. 1023.
 Rchb. exc. Hagea — a Riv. Lahaya et Mollia — Schultz.

Holosteum tetraphyllum Thunb. Sandige Orte im südl. Litoral. Istrien, a. d. Insel San Pier di membri bei Cossino, Ligurien, Genua. 5—6. ☉

255. *Ortegia* L. (III. 1.) *Ortegie*. Rchb. exc. p. 565.
Comp. I. 1. p. 63.

1. *O. hispanica* L. Rchb. exc. In der Lombardie auf d. M. Baldo. 5. ☉

2. *O. dichotoma* L. Rchb. exc. In Piemont bei Biavena. 5—4. ☉

Einundfunfzigste Ordnung. Sclerantheen.

Link. K. syn. 281. K. Taschb. 190. Rchb. exc. p. 565.

256. *Scleranthus* L. (X. 2.) *Knaut*. K. syn.
Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 76.

1. *S. annuus* L. K. syn. Var. β . *S. verticillatus* Tausch. Rchb. exc. *S. polycarpus* L. — γ . *S. intermedius* Kittel. Sandige, cultivirte Orte, Brachfelder, dch. d. g. Geb. 6—9. ☉

2. *S. perennis* L. K. syn. Var. β . *fallax* Boeningh. *S. fasciculatus* Hochst. Sandfelder, Tristen, Brachen, steinige Orte, Felsen, dch. d. g. Geb. 5—10. 4

3. *S. neglectus* Rochel. Rchb. exc. Alpen, Ungarn, im Banat, M. Harara u. in Siebenbürgen. 7—8. 4

Dreiundfunfzigste Ordnung. Crassulaceen.

DC. K. syn. 282. K. Taschb. 190. Corniculatae pars
Rchb. exc. p. 546.

257. *Tillaea* L. (III. 3.) *Tillää*. K. syn. Rchb. exc.
Comp. I. 1. p. 211.

1. *T. muscosa* L. K. syn. Feuchte Sandäcker, stellenw. im Geb., Rheing., zw. Xanten u. Cleve hinter d. Fasanengarten zc., Westphalen bei Godesfeld, Haltern, Marienbaum u. in d. Lombardei. 5—6. ☉

258. *Bulliarda* DC. (IV. 4.) Bulliarde. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 275.

1. *B. aquatica* DC. K. syn. *B. prostrata* M. et K. *Tillaea aquatica* L. *T. prostrata* Schkr. Stehende Wasser, sandige Ufer, stellenw. im Geb., Westphalen bei Burgsteinfurt, Dönnabrück, Wittenberg, Berlin, Preußen am Teichrande bei Rauschen, Böhmen bei Trebon. 8—9. ☉

2. *B. Vaillantii* DC. K. syn. *Tillaea* — Willd. *T. aquatica* Lamk. Feuchte, schattige Orte a. d. Donauinseln bei Ruffdorf, Bürgeln in Destr. 7—8. ☉

259. *Rhodiola* L. (V. 5.) Rosenwurz. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 143.

1. *R. rosea* L. K. syn. *Sedum roseum* Scopoli S. *Rhodiola* DC. Felsen d. Alpen, Schweiz, u. dch. d. g. Alpenfette nach Baiern u. allen Provinzen Destr. excl. Dalmatien, Rheing., in d. Vogesen an d. Hohenack u. in d. Sudeten. 7—8. 4

260. *Crassula* L. (X. 5.) Dickblatt. K. syn. 283. Rchb. exc. p. 546. Comp. I. 1. p. 550.

1. *C. rubens* L. K. syn. *Sedum* — Scopol. non Haenke. *S. rubens* β . *pentandrum* DC. prodr. III. Acker, Weinberge, Raine, stellenw. im Geb., Rheing., bei Basel, in Oberbaden, um Trier u. bei Euren, Schweiz bei Genf u. Nyon, Tyrol, Lombardei, Benedig. 5—6. ☉

2. *C. Magnolii* DC. Fl. fr. K. syn. *C. caespitosa* Cav. *Tillaea rubra* Gouan. *T. erecta* Sauv. monsp. *Sedum caespitosum* DC. prodr. Sonnige Hügel im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien. 4. ☉

261. *Sedum* L. (X. 5.) *Fett henne*. K. syn. 283.
 Rchb. exc. p. 547. Comp. I. 2. p. 142.

Erste Rotte. *Thelephium* Koch syn.

1. *S. maximum* Suter Fl. helv. K. syn. *S. Thelephium* δ . et ϵ . L. *S. latifolium* Bertolon. *S. Thelephium* Sturm. *Anacampseros maxima* Haw. Gebirgswälder, Abhänge, Felsen, Raine stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., v. Sura dch. Elsaß, Baden bis Frankfurt, Pfalz Speier, Dürkheim bis Mainz, Bingen bis Trier, Kreuznach, Stromberg, Meisenheim, Boppard, Winingen, Urththal u., Destr. 8—9. 4

2. *S. purpurascens* Koch. K. syn. *S. Thelephium* Smith. Rchb. icon. K. syn. edit. I. *S. lividum* Bernh. *S. Thelephium* β . *purpureum* L. *Thelephium purpurascens* Fuchs. Var. β . *albiflorum*. Wälder, Gebüsch, schattige Felsen, Mauern, Wege, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., dch. Elsaß, Württemberg, Baden bis in d. Niederlanden, Westphalen, Hamburg, Holstein, Hessen, Schwaben, Baiern, Sachsen; Destr. Ungarn. 7. 4

3. *S. Fabaria* Koch. K. syn. *S. purpureum* Tausch. *S. Thelephium* Rchb. exc. *S. Thelephium* γ . L. *S. Thelephium purpureum minus* C. Bauh. Gebirgen, Felsen, stellw. im Geb., Rheing., Nahethal bei Kreuznach, Berterich an d. Mosel, Eifel auf d. Hohen-Acht Flora v. Coblenz; Schlesien an d. Bavia Gora, Destr. Böhmen an d. Eger, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

4. *S. Anacampseros* L. K. syn. Felsen d. Alpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis, bei Foully, Alesse, St. Bernhard, Südtirol, Lombardei u. Piemont. 7. 4

Zweite Rotte. *Cepaea* Koch syn.

5. *S. stellatum* L. K. syn. Felsen, Mauern, im südl. Geb., Südschweiz, Dalmatien, Lombardei, Piemont 6—7. ☉

6. *S. Cepaea* L. K. syn. *S. galioides* Allion. *S. paniculatum* Lamk. *S. spathulatum* W. et Kit. Bewachsene Felsen im südl. Geb., Südschweiz bei Genf, Südtirol, Bel-

gien bei Maftrich, M. St. Peter, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Piemont, Novarese, Seeküste in Holland. 6—7.

⊙ u. ⊙

7. *S. monregalense* Balbis. Rchb. exc. *S. cruciatum* Desf. DC. prodr. Alpen in Piemont. 6—7. 4

8. *S. hispanicum* L. K. syn. *S. Guettardi* Gmel. bad. Var. β . *glaucum*: *S. glaucum* W. et Kit. *S. sexfidum* M. v. Bieb. Gebirge u. Boralpen, Schweiz Cant. Glarus u. Schwyz, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Galizien, Ungarn, Lombardei. 7. 4

9. *S. villosum* L. K. syn. Feuchte, torfhaltige Wiesen, Gebüsche, stellenw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen nach Schwaben, Thüringen, Baiern u., Rheing. an vielen Orten, Elsaß, Baden, Bergstraße, Pfalz, Trier, Saarbrücken, Coblenz, Westphalen, Sachsen, Schlesien u.; Destr. Böhmen, Kärnthen, Dalmatien, Tyrol, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

10. *S. hirsutum* Allion pedm. Rchb. exc. Felsen im südlichsten Geb., in Dalmatien a. d. Insel Solta, Piemont. 7—8. ⊙

11. *S. atratum* L. K. syn. *S. haematotes* Scopol. *Crassula rubens* Sturm. Var. β . *carinthiacum* Hoppe. Sonnige Felsen d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. u. in d. Lombardei; Var. β . in Krain. 7—8. ⊙

12. *S. annuum* L. K. syn. *S. saxatile* Wiggers DC. Willd. *S. aestivum* Allion. pedm. *S. rupestris* Oeder, *S. Oederi* Retz. Felsen, Mauern d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach d. Vogesen, M. Belchen, Oberbaden im Breisgau u. auf Sandhügeln bei Presß in Holstein. 6—8. ⊙

Dritte Rotte. *Sedum* Koch.

13. *S. album* L. K. syn. Felsen, Mauern, steinige Orte, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

14. *S. dasyphyllum* L. K. syn. *S. glaucum* Lamk. Felsen d. Alpenthäler, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach

Baiern, Oestr., auf d. Vogesen im Thal St. Amarin, Oberbadern im Breißg. auf d. Blauen u. Belchen, Dalmatien, Combardei u. wohl verwildert bei Mannheim u. Hanau. 2c. 6—7. 4

15. *S. anglicum* Huds. Rchb. exc. *S. Guettardi* Villars. Felsen im südl. Geb., Dalmatien, Piemont u. Savoyen. 6. 4

16. *S. acre* L. K. syn. Sandfelder, Wege, Mauern, Felsen, Raine, im g. Geb. 6—7. 4

17. *S. sexangulare* L. K. syn. et in add. 1024. Mit d. Vorhergehenden stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

18. *S. boloniense* Lois. Rchb. exc. K. syn. in add. *S. schistosum* Lej. Fl. de Spa. Mit d. Vorhergehenden stellw. besonders in d. Rheing., Coblenz, Trier, Aachen 2c., Thüringen, Belgien 2c. 6. 4

19. *S. repens* Schleicher K. syn. *S. rubens* Haenke. *S. alpestre* Vill. delph. *S. saxatile* Allion pedm. Felsen d. Alpen u. hohen Gebirgen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, d. Vogesen auf d. Hohenack, Schlesien in d. Sudeten a. d. Schneekuppe, d. Altwater, d. Babia Gora nach Böhmen, Mähren, Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Salzburg, Croatien, Galizien, Combardei. 7—8. 4

20. *S. anopetalum* DC. K. syn. Kalkfelsen, Mauern im südl. Geb., Schweiz bei St. Claud, St. Maurice u. im Anzascathale, Vittoral, Istrien, bei Triest, Dalmatien, Combardei. 7—8. 4

21. *S. altissimum* Poir. Rchb. exc. *S. ochroleucum* Vill. *Sempervivum* sediforme Jacq. Gebirge im südl. Geb., Dalmatien, Croatien, Piemont, Nizza. 7. 4

22. *S. reflexum* L. K. syn. *collinum* Wim. et Grab. Var. α . *viride*: *S. reflexum* L. Rchb. *S. crassicaule* Link. — β . *glaucum*: *S. rupestre* L. Willd. *S. reflexum* Fries. *S. collinum* et *recurvatum* Willd. *S. glaucum* Smith. Sandfelder, Triften, sandige, dürre Waldstellen, Sandfelsen dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten, besonders häufig bei Trier mit d. Var. β . 7—8. 4

23. *S. elegans* Lej. Fl. de Spa. K. syn. *S. rupestre*

Smith. Felsen, Mauern, besonders im südl. Geb., Rheing., an d. Sandfelsen d. Obermosel, bei Trier selten, Belgien bei Mastrich, Tyrol, Vittoral, Dalmatien, Croatien, Lombardei. 2—8. 4

262. *Sempervivum* L. (XI. 4.) Hauswurz.

K. syn. 288. Rchb. exc. p. 550. Comp. I. 2. p. 160.

Erste Rotte. *Sempervivum genuinum* Koch. syn.

1. *S. tectorum* L. K. syn. *Sedum* — *Scopoli carn.* Granit- u. Kalkfelsen d. Alpen u. Boralpen, in d. südl. Kette; Schweiz M. Gotthardt u. andere hohe Gebirge; Destr. im südl. Vittoral, Krain im Tsonzothale, Istrien u., im übrigen Geb., auf Dächer u. Mauern wohl nur verwilbert. 7—8. 4

2. *S. Wulfenii* Hoppe. K. syn. *S. globiferum* Wulf. Jacq. Sturm. Granitfelsen d. Hochalpen, Tyrol, Kärnthen, Steyermark, Galizien, Lombardei. 7—8. 4

3. *S. globiferum* L. Koch. Fl. 1835. K. syn. in not. p. 289. bei *S. Wulfenii*. Maly ennm. pl. austr. p. 242. Kalkfelsen in Siebenbürgen, im Karpathengebirgszuge. 7—8. 4

4. *S. Funkii* Braun. Koch. K. syn. Granitfelsen d. Alpen, Kärnthen, Steyermark, Tyrol Salzburg, Malnitzer Tauern, Krain. 7—8. 4

5. *S. montanum* L. K. syn. Granitfelsen d. Alpen u. Hochgebirge, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Destr. bis in d. südl. Vittoral; Schlesien in d. Sudeten an d. Babia Gora. 7—8. 4

6. *S. Braunii* Funk. K. syn. Felsen d. Hochalpen; Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Pasterze u. Großglockner. 7—8. 4

7. *S. arachnoideum* L. K. syn. Felsen d. Alpen, Boralpen u. Gebirge, besonders auf Granit; Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

8. *S. Doellianum* C. B. Lehmann Flora 1850. p.

449. Alpen, Schweiz im Unterhasli, Kärnthén bei Heiligenbluth. 7—8. 4

Zweite Rotte. Jovis-barba Koch syn.

9. *S. hirtum* L. K. syn. Felsen d. Alpen u. Gebirge; Schlessien nach Destr. Böhmen, Mähren, Kärnthén, Steyermark, Tyrol, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

10. *S. soboliferum* Sims. K. syn. *S. globiferum* Rehb. exc. et pl. crit. *S. hirtum* Koch et Z. Felsen d. Alpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette; Böhmen, Mähren an d. Polauer = Bergen, Rheing., steinige Orte, alte Mauern, angepflanzt u. verwildert; Preußen bei Tilsit, Brunsberg, Danzig. 7—8. 4

11. *S. arenarium* Koch. K. syn. Waldboden, Südtirol im Puster-Thale, bei Antholz im Brauneckerthale. 7—8. 4

263. *Umbilicus* DC. (X. 5.) Nabelkraut. K. syn.

291. Comp. I. 2. p. 150.

1. *U. pendulinus* DC. K. syn. *Cotyledon Umbilicus* L. Huds. Rehb. exc. Felsen, Mauern, im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin bei Belgirate am langen See, Vittoral, Istrien am Kloster d. Stadt Beglia, Dalmatien, Piemont, Ligurien. 6—7. 4

Dreiundfunfzigste Ordnung.

Cacteen.

DC. K. syn. 291. K. Taschb. 196. Ribesiaceae pars.
Rehb. exc. p. 563.

264. *Opuntia* Tournef. (XII. 1.) Fackeldistel.

K. syn. Rehb. exc. Comp. I. 2. p. 167.

1. *O. vulgaris* Miller. K. syn. *Cactus Opuntia* L. Aus Amerika; sonnige Felsen, im südl. Geb., Schweiz im Cant. Wallis bei Sitten; Südtirol, Dalmatien u. in d. Lombardei. 7. 5

Vierundfunfzigste Ordnung.

Grossularieen.

DC. K. syn. 292. K. Taschb. 196. Ribesiaceae pars.
Rchb. exc. p. 561.

265. *Ribes* L. (V. 1.) Johannis- u. Stachelbeeren.

K. syn. Rchb. exc. Comp. I. p. 402.

1. *R. Grossularia* L. K. syn. Var. α . glanduloso-setosum: *R. Grossularia* L. — β . pubescens: *R. Uva-crispa* L. — γ . glabrum: *R. reclinatum* L. Steinige Orte, Felsen, Mauern, im g. Geb., Var. γ . in Gärten angepflanzt. 4—5. ‡

2. *R. alpinum* L. K. syn. Gebirgige, steinige Orte, Walbränder, Hecken, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 5—6. ‡

3. *R. nigrum* L. K. syn. Feuchte, walbige Orte, Torffümpfe, an Bächen, stellw. dch. d. Geb., mehr im nördlichen; Rheing., im Elsaß bei Hagenau, Pfalz, Haslocher Wald bei Harbhausen; Elsaßer bei Mosbach, am Königstuhl auf d. Donnersberg, Trier u. und allgemein in Gärten angepflanzt. 4—5. ‡

4. *R. rubrum* L. K. syn. Var. β . *R. sylvestre* Lamk. Feuchte Walbstellen, Hecken, Wiesenränder, mehr im nördl. Geb., seltener im mittleren u. südl. Geb., stellw. bis in d. Boralpen; allgemein angepflanzt u. auch hin u. wieder verwildert. 4—5. ‡

5. *R. petraeum* Wulf. K. syn. Feuchte Felsen d. Boralpen; Rheing. in d. Vogesen auf d. Hoheneck, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Schlesien, Böhmen, Mähren, Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien. 4—6. ‡

6. *R. multiflorum* Kitaib. *R. spicatum* Schult. Rchb. exc. *R. vitifolium* Host. Bewachsene Gebirgsstellen, im südl. Geb., Dalmatien, Croatien. 5. ‡

7. *R. carpaticum* Kitaib. Rehb. exc. *R. acerrimum* Rochel. In den Karpathen. 5. 3

Fünfundfunfzigste Ordnung.

Saxifrageen.

Vent. K. syn. 293. K. Taschb. 197. Corniculatae pars. Rehb. exc. p. 551.

266. *Saxifraga* L. (X. 2.) Steinbrech. K. syn. Rehb. exc. p. 552. Comp. I. 2. p. 56.

Erste Kotte. *Aizoonia* Tausch. K. syn.

1. *S. Cotyledon* L. K. syn. *S. pyramidalis* Lapeyr. Var. β . *pauciflora* L. — γ . *Oederiana* Fl. D. Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz Teufelsbrück am Gotthard, Cant. Wallis, Tessin, Veltlin; Obersteiermark Alpe Reichenstein, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

2. *S. Aizoon* Jacq. K. syn. *S. Cotyledon* ϵ . Lin. *S. intacta* Willd. Var. α . *major*: *S. recta* Lapeyr. — β . *minor*: *S. Aizoon* Lapeyr. *S. Aizoon* β . *minor brevisfolia* Sternb. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch d. g. südl. Alpenkette; Schwaben, Baiern 2c.; Rheing., auf d. Vogesen, d. Schwarzwalde, auf d. Porphyre u. Mandelstein, Trapp-Gebirge d. Nahe von Kreuznach bis Oberstein, Schlesien; Destr. in allen Provinzen. 7—8. 4

3. *S. elatior* M. et K. K. syn. *S. longifolia* Host. Roth. *S. longifolia* β . *media* Sternb. *S. Hostii* Tausch. Rehb. exc. Felsen d. Alpen u. Boralpen, im südl. Geb., Schweiz am Umbrail bei Bormio; Destr. Tyrol, Kärnthen, Steyermark, Krain im Tsongo-Thale, Vittoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

4. *S. crustata* Vest. K. syn. *S. longifolia* Sturm. *S. longifolia* γ . *minor*. Sturm. DC. prodr. Kalkfelsen d. Alpen u. Boralpen; Tyrol, Kärnthen, Steyermark, Krain, Vittoral, Dalmatien, Galizien, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

5. *S. lingulata* Bellard. Rchb. exc. Felsen im südl. Geb., Piemont, in d. Novarese. 6. 4

6. *S. cochlearis* Rchb. Rchb. exc. Im südlichsten Geb., Piemont auf d. Col di Tenda 6. 4

7. *S. florulenta* Moretti. Rchb. exc. Gebirge in Piemont um Nizza. 6. 4

8. *S. mutata* L. K. syn. Felsen d. Alpen, Boralpen u. Gebirge; in d. nördl. Schweiz, dch. Vorarlberg nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Kärnthen, Steyermark, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

9. *S. luteo-purpurea* Lapeyr. Rchb. exc. Host. Fl. austr. Maly enum. pl. austr. p. 243. *S. luteo-viridis* Schott et Kotschy. Bot. Zeit. 1851. Felsen d. Alpen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. 4

10. *S. Burseriana* L. K. syn. Kalkfelsen d. Alpen, Destr. Steyermark, Kärnthen, Salzburg, Tyrol, Eittoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

11. *S. Vandellii* Sternberg. K. syn. *S. pungens* Clair. Felsen d. Alpen in d. südl. Kette; Schweiz im Unterengadin, Tyrol, Wormser-Joch, a. d. Rangkofel, Lombardei. 6—8. 4

12. *S. diapiensoides* Bellard. K. syn. Alpen d. südl. Schweiz im Vagnesthale, St. Bernhard, M. Rosa gegen d. Bermatten-Thal. 6—7. 4

13. *S. aretioides* Lapeyr. Rchb. exc. K. syn. in not. Kalkalpen, Eiscapelle am Königsee bei Berchtesgaden; Schweiz bei Vareges. 5. 4

14. *S. squarrosa* Sieber. K. syn. M. et K. *S. imbricata* Bertol. *S. caesia* Scopol. Kalkfelsen d. Alpen, Tyrol M. Schleeren, M. Orteles, M. Hargasser, M. Duron im Fassa-Thale, Steyermark, Krain an d. Steineralp, Eittoral, Istrien. 7—8. 4

15. *S. caesia* L. K. syn. *S. recurvifolia* Lapeyr. Felsen d. Alpen u. Boralpen, mit d. Flüssen in d. Thälern; Schweiz, u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr., Galizien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

16. *S. Rocheliana* Sternb. Rchb. exc. *S. pseudo-caesia* Rochel. Felsen in Ungarn, an d. Hercules-Bädern, Siebenbürgen. 4—5. 4

17. *S. patens* Gaud. helv. K. syn. Alpen d. Schweiz, M. Fouly; Tyrol bei Mittenwalde. 7. 4

Zweite Rotte. *Porphyrium* Tausch. K. syn.

18. *S. retusa* Gouan. K. syn. Felsen d. Hochalpen, Schweiz an d. M. Rosa; Steyermark an d. Hochgolling, Judenburger-Alpen, Siebenbürgen. 7—8. 4

19. *S. oppositifolia* L. K. syn. *S. caerulea* Pers. *S. retusa* Sternb. Felsen d. Alpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Destr. bis in d. Littoral, dann am Bodensee bei Friedrichshafen, Constanz. 5—6. 4

20. *S. Rudolphiana* Hornsch. K. syn. *S. oppositifolia* Reiner. u. Hohenw. Hochalpen, in Destr., Kärnthen bei Heiligenblut, Steyermark, Judenburger-Alpen. 7—8. 4

21. *S. biflora* Allion. pedm. K. syn. Felsen d. Hochalpen, an Gletscherrändern, Schweiz Cant. Wallis u., Tyrol, Salzburg Kärnthen, Steyermark, Krain, Lombardei, Ungarn. 7—8. 4

22. *S. Kochii* Hornung. K. syn. Hochalpen in d. südl. Kette; Schweiz Cant. Wallis, von Leuf über d. Gletscher ins Lütchthal, Oberwallis im Zehnden Gomb; Destr. Salzburg, Zwing bei Zell, Kärnthen. 7—8. 4

Dritte Rotte. *Trachyphyllum* Gaud. K. syn.

23. *S. aspera* L. K. syn. Feuchte Felsen d. Alpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Kärnthen, Krain, Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

24. *S. bryoides* L. K. syn. *S. aspera* β . *uniflora* M. et K. Gaud. helv. Felsen u. kessige Orte d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Destr. u. bis in d. Sudeten, kleine Schneegrube u. 7—8. 4

25. *S. tenella* Wulf. K. syn. *S. arenarioides* Brig.

nol. Felsen d. Alpen; Steyermark, Kärnthen, Krain in d. Bochein, Vittoral. 7—8. 4

26. *S. aizoides* L. K. syn. *S. autumnalis* L. Scop. carn. Var. β . *S. atrorubens* Bertoloni. Feuchte, kieselige Orte d. Alpen, Boralpen u. Gebirge, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. u., mit d. Flüssen in d. Niederungen zw. Rheinfelden u. Augst, an d. Schwarzwalde, im Badischen Jura bei Füssen; im südl. Vittoral bis Venedig, u. in Ungarn, Siebenbürgen u. Galizien. 7—8. 4

Vierte Rotte. *Hirculus* Tausch. K. syn.

27. *S. Hirculus* L. K. syn. Sumpfige Moorgründe, besonders im nordöstl. Geb., Schweiz v. Jura nach Oberschwaben, im Würzacher Torfmoor, bei Leutkirch, bei Minnerbach u. Mößern, Oberbaiern; Mecklenburg, Holstein, Hamburg, Brandenburg, Preußen bei Königsberg, Weichselgegend, Pommern, Schlesien, Salzburg, Mähren, Galizien. 7—8. 4

Fünfte Rotte. *Arabida* Tausch K. syn.

28. *S. stellaris* L. K. syn. Var. β . *hispidula* Rochelban. Feuchte, kieselige Orte d. Alpen u. Boralpen, besonders auf Kalk, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Schwaben bis in d. höheren Vogesen, u. im Schwarzwalde bis Rippoldsau, Destr. bis in d. Vittoral, Ungarn u. Siebenbürgen. 7—8. 4

29. *S. Clusii* Gouan. K. syn. *S. leucanthemifolia* Lapeyr. Rehb. exc. *S. ferruginea* Grab. *S. stellaris* Hocker. Feuchte Orte der Alpenthäler, Destr. Tyrol, im Pinzgau, Deßthal, Rachenkogel, auf d. Süfen. 7—8. 4

Sechste Rotte. *Hydaticea* Tausch K. syn.

30. *S. cuneifolia* L. K. syn. *S. punctata* W. et Kit. Var. β . *S. apennina* Bertolon. Schattige Felsen d. Alpen, Südschweiz; Tyrol, Kärnthen, Steyermark, Krain, Vittoral, Lombardien, Venedig, Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont. 6—7. 4

31. *S. umbrosa* L. Rchb. exc. K. syn. Feuchte, grasige Orte d. Gebirge, Schlessien im Gesenke in d. Sudeten, Mähren hinter Goldenstein, Salzburg, Combardei. 7. 4

32. *S. hirsuta* L. Rchb. exc. S. Geum Scopoli. Gebirgswiesen, Destr. Tyrol, Krain. 5—6. 4

33. *S. Geum* L. Rchb. exc. Gebirge in Krain, Croatien u. Siebenbürgen. 6. 4

Siebente Rotte. *Dactyloides* Tausch K. syn.

34. *S. pedemontana* Allioni. K. syn. *S. heterophylla* Sternb. *S. cymosa* W. et Kit. Hochalpen, Schweiz M. Rosa, M. Moro im Cant. Wallis, Ungarn, Siebenbürgen u. in d. Combardei. 7. 4

35. *S. ajugaefolia* L. Host. Fl. austr. I. 518. Maly enum. pl. austr. p. 245. In den Carpathen. 6—7. 4

36. *S. muscoides* Wulf. K. syn. *S. caespitosa* Scop. *S. pyrenaica* Villars. Var. α . *compacta*: *S. acaulis* Gaud. helv. — β . *intermedia*. — γ . *laxa*. — δ . *integri-folia*: *S. pygmaea* Haw. — ϵ . *S. moschata* Wulf. — ζ . *S. atropurpurea* Sternb. — η . *S. crocea* Gaud. Felsen d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. bis in d. Sudeten u. in d. südl. Eitthal. 6—7. 4

37. *S. exarata* Villars. K. syn. Var. α . *compacta*: *S. caespitosa* Wahlenb. helv. Gaud. *S. hypnoides* Allion. *S. nervosa* Sternb. *S. exarata* Allion. *S. intrigata* Lapeyr. *S. striata* Hall. fil. — β . *laxa*: *S. nervosa* Lapeyr. *S. intermedia* Gaud. Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Destr. Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Krain, Combardei.

38. *S. caespitosa* L. K. syn. Smith. *S. decipiens* Ehrh. *S. palmata* Sm. brit. Var. α . *compacta*: *S. groenlandica* L. sp. non Lapeyr. et DC. — β . *laxa*. *S. palmata* Panz. *S. Sternbergii* Willd. *S. media* et *S. Steinmannii* Tausch. *S. villosa* Willd. *S. uniflora* Sternb. Felsen u. steinige Gebirgsabhänge, besonders auf Kalk, stchw. im Geb., Rheing., in d. Vogesen, Franken in d. Gebirgen v. Hersbrück,

Hessen, Westphalen, Harz, Sachsen, Schlesien, Böhmen, Mähren u. Siebenbürgen. 5—6. 4

39. *S. sponhemica* Gmel. K. syn. *S. condensata* Gmel. bad. *S. palmata* et *S. confusa* Lej. *S. bohémica* Panz. *S. flavescens* Sternb. *S. hypnoides* β . *angustifolia* DC. prodr. Gebirge, Rheing., Oberelsaß, schattige Felsen d. Pfalz auf d. Winterseite, d. Mandelstein-, Trapp- u. Porphyrgeb. im Nahe- u. Glanthal, Grünbach, Erzweiler, Oberstein, Niedere Alpen, Burgsponheim, Winterburg, Runkel im Lahnthale, Flora v. Spa u. in den Subeten. 5—6. 4

40. *S. hypnoides* L. K. syn. *S. sponhemica* Panz. *S. aggregata* Lej. Gebirgsabhängen, Felsen, Ufer, stellw. im Geb., Rheing., Luxemburg bei Diekirch u. Vianden, Böhmen an d. Bernau bei Tetin, Worlich u. Carlstein, Siebenbürgen. 6—7. 4

41. *S. stenopetala* Gaud. helv. K. syn. *S. aphylla* Sternb. rev. Kalkfelsen der Hochalpen, Schweiz Cant. Appenzell auf d. hohen Riberi etc., Glarus auf d. Sandalp u. in Graubünden, Destr. Tyrol im Algau, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Littoral, Lombardei, Venedig, Siebenbürgen. 7—8. 4

42. *S. crocea* Gaud. helv. Rehb. exc. In der südl. Hochalpenkette in Savoyen. 7—8. 4

43. *S. sedoides* L. K. syn. *S. trichodes* Scopol. *S. sedoides* α . *flavida* DC. prodr. Felsen d. Alpen, Baiern; Destr. Steyermark, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Littoral, Lombardei, Venedig, Siebenbürgen. 7—8. 4

44. *S. Hohenwarthii* Sterb. K. syn. *S. sedoides* β . *Hohenwarthii* Koch. Taschb. DC. prodr. Felsen d. Alpen in Steyermark, Kärnthen M. Baba u. M. Stoi, Krain. 7—8. 4

45. *S. planifolia* Lapeyr K. syn. *S. tenera* Suter helv. *S. muscoides* Allion. Felsen d. Hochalpen, an Gletschern, Schweiz Cant. Wallis, M. Schönebühl über Bagnes, M. Rouge Ege an d. Gemmi, Oberengadin; Destr. Kärnthen,

Salzburg, Tyrol bei Gastein, auf d. Rathhausberg am Boßbart, im Fuschertthale, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

46. *S. Fachinii* Koch. K. syn. in add. 445. *S. planifolia* β . *atropurpurea* K. syn. p. 303. Kalkfelsen d. Hochalpe, Tyrol, Spitze d. Geiseralp, auf d. Plattkofel, Contria-Alp in Fassa. 7—8. 4

47. *S. Segueri* Spreng. K. syn. *S. planifolia* γ . *Segueri* Sternb. Granitfelsen d. Hochalpen an d. Schneesgrenze, Schweiz auf d. Hauptalpenkette nach Tyrol auf d. Wormser-Joch, Roßkogel, Oberinntal u. in d. Lombardei. 7—8. 4

48. *S. androsacea* L. K. syn. *S. pyrenaica* Scopol. Var. β . *S. depressa* Sternb. Feuchte Felsen d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. u. in d. Lombardei. 7—8. 4

Achte Rote. *Nephrophyllum* Gaud. helv. K. syn.

49. *S. controversa* Sternb. K. syn. *S. adscendens* L. *S. petraea* Gouan. norv. *S. hypnoides* Scopol. *S. Belardi* Allion. Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. stchw. dch. d. Alpenkette nach Destr. Tyrol, Mähren, Steyermark, Kärnthen, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Siebenbürgen. 6—8. ☉

50. *S. tridactylites* L. K. syn. Sonnige Orte, Felsen, Mauern im g. Geb. 4—5. ☉

51. *S. petraea* L. K. syn. *S. Ponae* Sternb. Jacq. *S. rupestris* Willd. *S. geranioides* Host. Gebirgsfelsen in d. südl. Rette, Tyrol, Kärnthen, Krain Grotte beim Hausberg, Krainburg, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Venedig 5—6. ☉

52. *S. granulata* L. K. syn. Wiesen, grasige Hügel, Raine 2c., dch. d. g. Geb. 5—6. 4

53. *S. bulbifera* L. K. syn. Grasige Hügel, Tristen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis um Branson u. Genoz; Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol, Dalmatien, Ungarn, Galizien bei Lemberg, Lombardei. 5—6. 4

54. *S. cernua* L. K. syn. Feuchte Felsen d. Alpen, Schweiz Cant. Bern bei Sanen, Cant. Wallis über Lenz u. Bellalui, Steyermark bei Eisengut, Kärnthen Mollthaleralp u. Großfragant, Tyrol, Siebenbürgen. 7—8. 4

55. *S. rotundifolia* L. K. syn. Var. β . *S. repanda* Willd. Sternb. Feuchte Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz, u. bch. d. g. Alpenkette bis zum Bodensee nach Baiern, Destr. Dalmatien, Lombardei, Ungarn. 6—7. 4

56. *S. arachnoidea* Sternb. K. syn. *S. sibirica* Poll. veron. Bewachsene Kalkfelsen, Südtirol im Ampalathale. 7—8. 4

57. *S. carpatica* Rehb. Rehb. exc. *S. sibirica* L. Wahlb. *S. rivularis* Towns. Host. Sumpfige Gebirgsstellen in d. Carpathen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. 4

58. *S. nivalis* L. K. syn. Böhmen in d. Sudeten in d. kleinen Schneegrube. 7. 4

59. *S. hieracifolia* W. et Kit. K. syn. Torfgründen u. an Bächen der Alpen, Steyermark an d. Reichart in d. Judenburger Alpen, an d. Wand über d. Puzenthalsee bei Schladming, Lautscher Alp bei Grätz, Galizien v. Schmer u. Kásmarker, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

267. *Zahlbrucknera* Rehb, (X. 2.) Zahlbrucknere. K. syn. 306. Rehb. exc. p. 551. Comp. I. 2. p. 55.

1. *Z. paradoxa* Rehb. K. syn. *Saxifraga* — Sternb. Feuchte Felsen, an Alpenbächen, Kärnthen im Oberlavantthale, Steyermark im Laßnitz, Tyrol u. in d. Lombardei. Geb. 7—8. 4

268. *Chrysosplenium* L. (X. 2.) Milzfäut. K. syn. 306. Rehb. exc. p. 551. Comp. I. 2. p. 55.

1. *Ch. alternifolium* L. K. syn. Nasse, schattige Orte, Wiesenränder, Felsen, Quellen, Bächen, bch. d. g. Geb. 3—4. 4

2. *Ch. oppositifolium* L. K. syn. Nasse, schattige

Felsen, in Gebirgswälder, an Quellen, Bächen, stchw. dch.
d. g. Geb. 5—6. 24

Sechshundfünfzigste Ordnung.

Umbelliferen.

Juss. K. syn. 307. K. Taschb. 207. Rchb. exc. p. 440.
Pentandria Dygynia Lin. Comp. I. 1. p. 455.

I. Gruppe. Hydrocotyleen Spreng. K. Taschb. 207.

269. *Hydrocotyle* L. Wassernabel. K. syn.
Rchb. exc. p. 481. Comp. I. 1. p. 532.

1. *H. vulgare* L. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *H.*
Schkuriana Rchb. exc. Sumpfige, überschwemmte Orte,
besonders Torfboden, Ufer d. Seen, Teiche, stchw. dch. d. g.
bis ins nördlichste u. südlichste Geb. 7—8. 24

II. Gruppe. Saniculeen K. K. Taschb. 207.

270. *Sanicula* L. Sanikel. K. syn. Rchb. exc. p.
482. Comp. I. 1. p. 528.

1. *S. europaea* L. K. syn. *S. vulgaris* K. *S. offi-*
cinalis Gouan. *Astrantia diapiensia* Scopol. *Caucalis Sani-*
cula Crntz. Schattige Laubwälder dch. d. g. Geb. 5—6. 24

271. *Hacquetia* Necker. Hafquetie. K. syn. 308.
Rchb. exc. p. 482. Comp. I. 1. p. 531.

1. *H. Epipactis* DC. K. syn. *Astrantia* — L. Don-
dia — Spreng. *Dondisia* — Rchb. Gebirgswälder u. Vor-
alpen; Schweiz am Fuße d. St. Bernhards, Schlesien in d.
Sudeten nach Mähren, Steyermark, Kärnthen, Krain,
Istrien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen. 4—5. 24

272. *Astrantia* L. Astantie. K. syn. 308. Rchb.
exc. p. 482. Comp. I. 1. p. 527.

1. *A. minor* L. K. syn. Granit- u. Kalkfelsen d.

Hochalpen, Schweiz u. dch. d. g. südl. Alpenkette nach Tyrol u. in d. Eittoral. 7—8. 4

2. *A. pauciflora* Bertolon. Rchb. exc. Dürre Orte in Italien an d. Apuanen. 7. 4

3. *A. gracilis* Bartling. K. syn. Alpen in Kärnthen, u. Krain. 7—8. 4

4. *A. carniolica* Wulf. K. syn. *A. minor* Scopol. *A. major* β . *carniolica* R. et Sch. Thäler d. Alpen u. Boralpen; Baiern bei Kreuth, Tyrol, Steyermark, Krain in d. Bochein, Eittoral. 7—8. 4

5. *A. major* L. K. syn. Var. β . *involucrata*: *A. intermedia* M. v. B. Rchb. exc. *A. pallida* Presl. *A. carinthiaca* Hoppe. Gebirgswiesen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, oft bis in d. Niederungen; Rheing., Elsaß bei Sulzbach, Oberbaden bei Billingen, Schwaben, Baiern bei Würzburg, Franken, Jena, Hannover, Erzgebirge, Harz, Preußen Königsberg, Braunsberg, Schlesien; Destr. bis in d. Eittoral. 7—8. 4

273. *Eryngium* L. Mannstreue. K. syn. 309.

Rchb. exc. p. 483. Comp. I. 1. p. 529.

1. *E. campestre* L. K. syn. Hügel, Raine, Wege, Brachfelder u., stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *D. amethystinum* L. K. syn. Sonnige Orte im südl. Geb., Südtirol, Krain, Eittoral bei Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

3. *E. dichotomum* Pers. Bertol. Fl. italic. III. t. 106. Maly enum. pl. austr. p. 220. In Dalmatien. 4

4. *E. dilatatum* Lamk. Rchb. exc. *E. Bourgati* Host. austr. *E. purpurea* Smith, *E. australe* Wulf. Gebirgsefelsen in Dalmatien. 7—8. 4

5. *E. creticum* L. Rchb. exc. *E. cyaneum* Sibth. *E. microcephalum* Schkr. In Dalmatien. 7—8. 4

6. *E. maritimum* L. K. syn. Seefüste d. Ost- u. Nordsee; Belgien; Holstein, Pommern, Preußen bei Ad-

nigsberg, Danzig, Rügen, im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien, Venedig u. 6—8. 4

7. *E. alpinum* L. K. syn. Triften d. Alpen in d. südl. Kette d. westl. u. südl. Schweiz, M. Pilatus u., Kärnten, Krain in d. Bochein, Croatien, Lombardei. 7—8. 4

8. *E. planum* L. K. syn. Sandige, trockene Orte, Wiesen, Felser, stellw. im Geb., Schlesien, Frankfurt a. d. Oder, Preußen im Weichselgeb. v. Thorn bis Danzig u., Königsberg; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Littoral, Istrien, Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. 4

III. Gruppe. Ammineen Koch. Koch Taschb. 209.

274. *Cicuta* L. Wasserschiefeling. K. syn. 310.

Rchb. exc. p. 479. Comp. I. 1. p. 517.

1. *C. virosa* L. K. syn. *Coriandrum virosum* Roth, *Cicutaria aquatica* Lamk. Var. β . *tenuifolia*: *C. tenuifolia* Froel. *C. angustifolia* Kit. *C. virosa* β . *stricta* Schult. austr. Sumpfige, moorige Orte, versumpfte Bäche, Gräben, Teiche, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

275. *Apium* L. Sellerie. K. syn. 310. Rchb. exc. p. 472. Comp. I. 1. p. 516.

1. *A. graveolens* L. K. syn. *Seseli* — Scop. carn. Sumpfige, salzhaltige Orte, an Salinen; an d. Küsten d. Ost- u. Nordsee u. im südl. Littoral, Rheing., in d. Pfalz bei Dürkheim, Hamburg u. 7—9. ☉

276. *Petroselinum* Hoffm. Petersilie. K. syn. 311. Rchb. exc. p. 472. Comp. I. 1. p. 515.

1. *P. sativum* Hoffm. K. syn. *Apium Petroselinum* L. Var. β . *crispum*: *Apium crispum* Mill. An Felsen im südl. Littoral, Istrien, Insel Veglia; sonst im g. Geb. cultivirt. 6—7. ☉

2. *P. segetum* Koch. K. syn. *Sison* — L. Rchb. exc. p. 474. Feuchte Brachäcker, nur in d. Schweiz im Erguel-Thale. 7—8. ☉

277. *Trinia Hoffm. Trinie.* K. syn. 311. Rchb. exc. p. 473. Comp. I. 1. p. 514.

1. *T. vulgaris* DC. K. syn. *T. Henningii* M. et K. *T. glauca* L. Rchb. exc. *T. pumila* Rchb. exc. *Pimpinella glauca* L. P. *pumila* Jacq. Var. β . *Henningii*: Trin. *Henningii* Hoffm. Sonnige Kalkhügel, Föhrenwälder, stellw. dch. d. Geb., Südwestschweiz; Rheing., Oberbaden, Hohentwiel, dch. d. Rheinthäl bis Landau, Dürkheim, Kallstadt, Oppenheim bis Bingen, im Naethale bis Kreuznach u. Sobernheim, Württemberg, Baiern im Mainthale bei Würzburg; Destr. Mähren, Tyrol, Krain, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Lombardien, Venedig 2c. 4—5. ☉

2. *T. Kitaibelii* M. v. Bieb. K. syn. in add. 445. *T. ramosissima* Treviran. Rchb. exc. *Seseli pumilum* L. *Pimpinella glauca* W. et Kit. Trockene, grasige Orte; Destr. Mähren zw. Göding u. Mutenitz; Vitorral, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 6. ☉

278. *Helosciadium Koch. Sumpffschirm.* K. syn. 312. Rchb. exc. p. 475. Comp. I. 1. p. 513.

1. *H. nodiflorum* Koch. K. syn. *Sium* — L. *Seseli* — Scop. Wiesenbäche, an quellenreichen Orten, Teichen, Gräben, stellw. dch. d. mittlere u. im südl. Geb.; Rheing., Elsaß, Baden u. dch. d. g. Rheinthäl u. in d. Seitenthäler, Bretten, Pfalz Kaiserslautern, Zweibrücken, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Kreuznach, Coblenz bis in d. Niederlande; Tyrol, Krain, Dalmatien, Lombardien, Venedig. 7—8. 4

2. *H. repens* Koch. K. syn. *Sium* — L. Schlammige, sumpfige Orte, stehende Wasser, an Gräben, stellw. dch. d. Geb., Rheing. besonders auf d. Alluvium, Elsaß bei Straßburg, Baden bei Friedrichshafen, Mannheim, Pfalz bei Speier, Frankenthal, Worms, Dürkheim, Mainz, Hana, Kreuznach, Westphalen bei Dülmen im Süßenbruch, Goesfeld, Bentheim nach Oldenburg, Bremen, Holstein,

Hamburg, Mecklenburg, Baiern bei Regensburg; Oestr. Kärnthén, Ungarn u. einzeln in d. Schweiz. 7—9. 4

3. *H. inundatum* Koch. K. syn. *Sison* — *L. Meum* — Spreng. *Hydrocotyle* — Smith. *Sium* — Roth. Sümpfen, Gräben, auf torfhaltigem Sandboden, stellw. im Geb., Rheing., Meerheim bei Edln, Goch am Niederrheine, dch. Westphalen nach Oldenburg, Hannover, Hamburg, Bremen, Holstein u. in Galizien. 6—7. 4

4. *H. leptophyllum* DC. prodr. IV. p. 105. *Maly enum. pl austr.* p. 221. *Aethusa Ammi* Spreng. *Sison Ammi* Jacq. Im südl. Geb., Krain, Dalmatien. 6. ☉

279. *Ptychotis* Koch. Faltenohr. K. syn. 312. *Rchb. exc.* p. 474. *Comp. I. 1.* p. 512.

1. *P. heterophylla* Koch. K. syn. *Bunias* — *Rchb. exc. Critamus* — us *M. et K. Comp. Fl. germ.* *Aethusa Bunias* Murr. *Carum Bunias* L. *Seseli Saxifragum* L. *Pimpinella genevensis* Vill. *Seseli Bunias* Villars. *Meum heterophyllum* Moench. *Sium Saxifragum* Roth. Sonnige, steinige Kalkhügel, Felsen, im südl. Geb., Schweiz auf d. Sande am Genfersee bei Nyon, Südtirol bei Trient, Lombardei. 7—8. ☉

2. *P. ammoides* Koch. K. syn. *P. verticillata* DC. *Critamus ammoides* Koch. com. *Seseli* — Gouan. *Host. S. verticillatum* Desf. *S. corsicum* Link, *S. pusillum* Brot. Necker, Weingärten, im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien. 5. ☉

280. *Falcaria* Host. Sichelbolde. K. syn. 313. *Rchb. exc.* p. 475. *Comp. I. 1.* p. 512.

1. *F. Rivini* Host. K. syn. DC. *Sium Falcaria* L. *Drepanophyllum sioides* Wib. Dr. *agrestre* Hoffm. *Critamus* — *tis* Besser *Comp. Fl. germ. Cr. Falcaria* *Rchb. exc. Sium falcatum* Duby. Necker, Begeränder, Raine, Weinberge, besonders auf Kalk- u. Lehmboden, dch. d. g.

Geb., Rheing. fast überall, Preußen bei Marienwerder, Memel, Thorn u., Schweiz nur bei Basel. 7—8. ☉ et 4

2. *F. latifolia* Koch. K. syn. *Hladnikia pastinacifolia* Rehb. exc. p. 476. Ralkfelsen in Krain auf d. Berge Bhaun. 6. ☉

281. *Sison* L. *Sison*. K. syn. 314. Rehb. exc. p. 474. Comp. I. 1. p. 512.

1. *S. Ammomum* L. K. syn. *Seseli* — Scopol. *Sium* — *S. aromaticum* Lamk. *Cicuta Ammomum* Crntz. *Smyrinium heterophyllum* Moench. Feuchte Orte, an Bäumen, im südl. Geb., Schweiz bei Genf u. Châtelaine; Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei. 7—8. ☉

282. *Ammi* L. *Ummi*. K. syn. 314. Rehb. exc. p. 475. Comp. I. 1. p. 512.

1. *A. majus* L. K. syn. *Apium Ammi* Crantz. Hecker, im südl. Geb., Rheing. bei Trier 1840, Belgien bei Lüttich; Oestr. bei Wien, Vittoral, Istrien bei Fiume, Triest, Dalmatien, Croatien, Lombardei. 7—8. ☉

283. *Aegopodium* L. *Geißfuß*. K. syn. 314. Rehb. exc. p. 476. Comp. I. 1. p. 512.

1. *A. Podagraria* L. K. syn. *Ligusticum* — Crntz. *Sison* — Spr. *Carum* — Roth *Seseli Aegopodium* Scopol. *Pimpinella angelicaefolia* Lamk., *Tragoselinum Angelica* Lamk. Schattige Orte, Bäume, Hecken bis in d. Boralpen dch. d. g. Geb. 5—7. 4

284. *Carum* L. *Rümmel*. K. syn. 314. Rehb. exc. p. 476. Comp. I. 1. p. 509.

1. *C. Carvi* L. K. syn. *Ligusticum* — Roth, *Apium* — Crntz. *Bunium* — M. v. Bieb. *Seseli Carum* Scopol. Wiesen, Triften, Graßgärten, dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen. 4—5. ☉

2. *C. rigidulum* Koch. umb. Comp. I. 1. p. 509.

Selinum — Visian. fragm. *S. appianum* Pers. *S. apuanum* Visian. *Seseli pimpinelloides* L. Hügel am südl. Eittoral, Dalmatien bei Ragusa, Piemont bei Genua. 6—7. 4

3. *C. Bulbocastanum* Koch. K. syn. *Bunias* — L. Rchb. exc. *Sium* — Spreng. Aecker, Weinberge, Wiesen, auf Kalk-, Sand- u. Lehmboden, im westl. u. südl. Geb., Schweiz, Rheing., auf d. Alluvium bei Schriesheim, Pfalz bei Dürkheim bis Mainz, Bingen, Zweibrücken, Kaiserlautern, im Nahe-, Glan-, Saar- u. Moselthale bis Trier, dch. d. Eifel bis Aachen, Coblenz, Bonn u. einzeln bis in d. Niederlanden, Frankfurt a. M., Hessen; Krain, Dalmatien, Lombardien, Siebenbürgen. 6—7. 4

4. *C. divaricatum* Koch. K. syn. *Bunium* — Cesati non Bertol. Aecker im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien. 6—7. 4

5. *C. verticillatum* Koch. K. syn. *Sison* — L. Trockene Wiesen in d. Rheing. um Heinsberg bei Aachen. 7—8. 4

285. *Bunium* L. Knollendolde. K. syn. 315. Rchb. exc. p. 477. Comp. I. 1. p. 510.

1. *B. montanum* Koch. K. syn. *B. divaricatum* Bertolon. Saatfelder im südl. Eittoral, Istrien, M. Maggiore, um Fiume, Croatien. 5—6. 4

2. *B. alpinum* W. et Kit. Rchb. exc. *Wallrothia tuberosa* Spreng. Roth. Kalkfelsen d. Alpen im südl. Eittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien. 7—8. 4

3. *B. denudatum* DC. Comp. I. 1. p. 510. *B. majus* Gouan. Rchb. exc. *B. flexuosum* Smith. *B. Bulbocastanum* Huds. *Myrrhis Bunium et ammoides* Spreng. *M. capillifolia* Gusson. Steinige, sonnige Orte in Dalmatien. 7. 4

286. *Pimpinella* L. Bibernell. K. syn. 316. Rchb. exc. p. 477. Comp. I. 1. p. 507.

1. *P. magna* L. K. syn. *P. glabra* Rosk. *P. major*

Jacq. Var. β . rosea: *P. rubra* Hoppe. — γ . laciniata Wallr. *P. orientalis* Gouan. *P. media* Hoffm. — δ . dissecta: *P. dissecta* Retz. Wiesen, grasige Orte im g. Geb.; Var. β . in d. Boralpen. 5—6. 4

2. *P. Saxifraga* L. K. syn. *P. major* Wallr. Var. β . dissectifolia Wallr. *P. hircina* Leers. — γ . poteriifolia. — δ . alpestris Spreng. *P. alpina* Host. Waldränder, Tristen, Wege, Raine, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 7—8. 4

3. *P. nigra* Willd. K. syn. in add. 446. *P. Saxifraga* E. *nigra* K. syn. 316. Steinige Hügel, besonders im nördl., selten im mittlern Geb., im südlichsten in Destr. Tyrol, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

4. *P. anisoides* Brign. Bertol. Fl. ital. Maly enum. pl. austr. 233. Im südlichsten Geb., Dalmatien auf d. Insel Iesina. 6. 4

5. *P. Tragium* Villars. Rchb. exc. Allion. *Tragium Columnae* Spr. Felsen im südlichen Geb., Dalmatien u. in Oberitalien. 6. ☉

6. *P. peregrina* L. K. syn. *Tragium peregrinum* Spr. Sonnige Hügel im südl. Eittoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien bei Ragusa, Croatien, Nizza. 6—7. ☉

7. *P. anisum* L. K. syn. *Anisum vulgare* Gaertn. Cultivirt im Großen besonders im südl. Geb., dann in Thüringen u. Elsaß u. 7—8. ☉

287. *Berula* Koch. Berle. K. syn. 317. Rchb. exc. p. 478. Comp. 1. p. 506.

1. *B. angustifolia* Koch. K. syn. *Sium* — *ium* L. Rchb. exc. S. *Berula* Gouan. S. *erectum* Huds. S. *nodiflorum* Fl. Dan. Gräben, Bäche, an Teichen, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

288. *Sium* L. Merf. K. syn. 317. Rchb. exc. p. 478. Comp. I. 1. p. 505.

1. *S. latifolium* L. K. syn. *Coriandrum* — Crntz. *Cicuta* — *ia* Fl. Wett. *Drepanophyllum palustre* Hoffm.

Sium longifolium Presl. Stehende und stillfließende Wasser, stellw. dh. d. g. Geb., Rheing., Baden, Elsaß, Pfalz bei Speier, Neckarau, Frankenthal, Worms, Mainz, Bingen, auf d. Rheinwiesen, Eöln, Nahethal bei Kreuznach, Beerweiler, Saarbrücken, Meisenheim, Luxemburg, Aachen, Thüringen, Jena, Hamburg bis Königsberg in Preußen; Destr. Böhmen, Mähren bis in d. Lombardei. 7—8. 4

2. *S. Sisarum* L. K. syn. Cultivirt, stellw. im Geb. besonders im südl. 7—8. 4

289. *Bupleurum* L. Hasenohr. K. syn. 318. Rehb. exc. p. 479. Comp. I. 1. p. 500.

1. *B. glaucum* Rob. et Castelli. Rehb. exc. Im südlichsten Vittoral, Piemont, bei Nizza. 6—7. ☉

2. *B. tenuissimum* L. K. syn. *B. junceum* Pollich. Gmel. *B. Pollichii* Gmel. bad. *B. Gerardi* Fl. Wett. *Odontites tenuissima* Spreng. Var. β . *nanum* DC. prodr. Salzhaltige Orte, Wiesen, Dämme, Raine, stellw. dh. d. Geb., Rheing., Mannheim, Pfalz Dürkheim, Oggersheim, Wetterau, Saline bei Nauheim. Hessen bei Huttelborn, Darmstadt, Luxemburg, Schwaben, Mansfeld, Halle, Staßfurt, Holstein; Destr. Vittoral, Istrien, Böhmen, Mähren, Tyrol, Dalmatien, Ungarn, Benedig. 7—8. ☉

3. *B. semicompositum* L. K. syn. *Odontites — ta* Spreng. *O. luteola* Hoffm. Am südl. Vittoral, Istrien, Triest, Dalmatien, Piemont, Nizza. 7—8. ☉

4. *B. affine* Sadler. K. syn. *B. Gerardi* var. Rehb. pl. crit. *B. junceum* M. v. *B. Necker* in Destr. bei Wien, Ungarn bei Pesth. 7—8. ☉

5. *B. Gerardi* Jacq. K. syn. Steinige Orte, Weingärten, Ackerländer im südl. Geb., Destr. Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8 ☉

6. *B. junceum* L. K. syn. *B. baldense* W. et Kit. Steinige Orte unter Gesträuche, besonders im südl. Geb., Rheing., nicht fern v. Aachen in Belgien bei Dolhain u. Werviers; Kärnthen, Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume,

Dalmatien, Croatien, Lombardei, Ungarn, Siebenbürgen.
7—8. ☉

7. *B. aristatum* Bartl. K. syn. *B. Odontites* Host. non Lin. *Odontites luteola* Spreng. Sonnige, steinige Hügel, Aecker im südl. Geb., Südtirol, Krain, Vittoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

8. *B. Odontites* L. DC. *Rechb. exc. B. baldense* Turra. *B. Fontanesii* Gusson. Im südl. Vittoral, Dalmatien, Piemont, Genua, Nizza. 6—7. ☉

9. *B. Sibthorpiatum* Smith. *Rechb. exc.* In Dalmatien an d. M. Biokovo. 7. 4

10. *B. falcatum* L. K. syn. Gebirgsabhänge, Felsen, Waldränder, Hecken, Zäune, besonders auf Kalk u. Lehmboden, stchw. bch. d. g. Geb., Rheing. fast überall. 7—10. 4

11. *B. exaltatum* M. v. B. K. syn. *B. rigidum* Freyer. *B. baldense* Willd. Felsen im südl. Vittoral, Krain, Istrien M. Slavnik. 7—8. 4

12. *B. ranunculoides* L. K. syn. *B. angulosum* Spreng. Var. α . *humilius*: *B. angulosum* et *B. ranunculoides* *Rechb. exc.* — β . *latius*: *B. gramineum* Vill. delph. *B. caricifolium* Willd. *B. Burserianum* Schleich. — γ . *B. diversifolium* Rochel bann. Triften d. Hochalpen, stchw. bch. d. Alpenkette, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnten, Krain, Croatien, Galizien, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

13. *B. graminifolium* Vahl. K. syn. *B. petraeum* Wulf. Villars. Felsen d. Alpen u. Hochgebirge im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin am Comersee, Südtirol, Kärnten, Steyermark, Krain, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

14. *B. petraeum* L. *Rechb. exc. B. bicalyculatum* Bellard. Alpen d. Schweiz über Ber. 7—8. 4

15. *B. stellatum* L. K. syn. Granit- u. Kalkfelsen d. Alpen, Schweiz an d. Gotthard, bei Airolo, M. Schöllinen an d. Teufelsbrücke, Dent de Midi, Tyrol, Krain, Piemont. 7—8. 4

16. *B. pyrenaicum* Gouan. *Rechb. exc. B. amplexi-*

caule Clairv. *B. pyrenaicum* Willd. Alpen, Schweiz nach Haller, später nicht mehr aufgefunden, Pyrenäen. 7—8. 4

17. *B. longifolium* L. K. syn. Gebirgswälder u. Boralpen, stchw. dch. d. Geb., Schweiz im Jura, Rheing., Oberbaden, Osterberg bei Desingen, Wogesen an d. Hoheneck, Hessen bei Bugbach, Thüringen, Hannover, Sachsen, Preußen, Schlesien; Oestr. Mähren, Böhmen, Steyermark, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

18. *B. protractum* Link. K. syn. *B. subovatum* Lk. Acker, Weingärten im südl. Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardien. 6—7. ☉

19. *B. rotundifolium* L. K. syn. *B. perfoliatum* Lamk. Saatäcker auf Kalk- und Lehmboden, stchw. dch. d. südl. u. mittlere Geb., Rheing., v. Basel bis in d. Niederlanden an vielen Orten. 6—7. ☉

IV. Gruppe. Seselineen Koch. K. Taschb. 216.

290. *Oenanthe* L. Rebendolde. K. syn. 321. Rchb. exc. p. 463. Comp. I. 1. p. 494.

1. *O. fistulosa* L. K. syn. *O. Tabernamontani* Gmel. bad. Sumpfige Wiesen, Gräben, an sumpfigen Teichen, in Sümpfen, stchw. dch. d. g. bis in d. südlichste Geb., nördl. nur bis an d. Ober, Rheing., besonders am Ober- u. Niederrhein, nicht selten auch im Rheinz., Saar- u. Moselthal, Kreuznach, Saarbrücken, Trier, Eifel, Bonn, Düsseldorf u. 6—7. 4

2. *O. Lachenalii* Gmel. bad. K. syn. *O. pimpinelloides* Pollich. Smith. *O. rhenana* DC. *O. megapolitana* Willd. *O. michelsfeldensis* Lachenal. *O. gymnorrhiza* Brign. Var. β . *O. approximata* Merat. DC. Rasse, etwas sumpfige Wiesen, Triften, stchw. im Geb., Rheing., auf d. Rheinfläche v. Basel bis Mainz, bei Straßburg, Speier, Dürkheim, Mardorf, Oppenheim, Alzei, v. Holstein dch. Mecklenburg nach Pommern; Westschweiz; Vittoral, Istrien, bei Monfalcone u. in d. Lombardien. 6—7. 4

3. *O. peucedanifolia* Pollich. K. syn. *O. Pollichii* Gmel. bad. *O. peucedanoides* Roth. *O. patens* Moench.

O. filipenduloides Thuill. Früchte, fette Wiesen, stellw. im Geb. Schweiz, Rheing., Pfalz bei Speier, Forst, Mardorf, im Nahe-, Saar- und Moselthale, Kreuznach, Saarbrücken, Luxemburg, Trier, Coblenz bei Boppard, Hessen, Thüringen, Württemberg, Oldenburg, Mecklenburg; Destr. Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 6—7. 4

4. *O. silaifolia* M. v. Bieb. K. syn. *O. virgata* Koch. *O. prolifera* Host. *O. peucedanifolia* Smith. Sümpfe, nasse Orte im südl. Geb., Krain bei Laibach, Littoral, Istrien bei Pola, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Ungarn. 6—7. 4

5. *O. pimpinelloides* L. K. syn. *O. chaerophylloides* Pourr. Var. β . *rapacea*: *O. pimpinelloides* β . *pimpinellaefolia* DC. *O. virgata* Poir. Sumpfige Wiesen, im südl. Geb., Destr. Krain, Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Ungarn, Mähren. 6—7. 4

6. *O. Karstia* Hacq. Rehb. exc. *O. australis* Wulf. *O. pimpinelloides* α . *chaerophylloides* DC. prodr. Im südl. Geb., Krain bei Vipizza an d. Karst. 7. ☉

7. *O. crocata* L. Rehb. exc. *O. apiifolia* Brot. Sumpfige Orte, Tyrol, Galizien, Lombardei bei Como, Piemont; Belgien bei Antwerpen. 7. 4

8. *O. globulosa* L. Rehb. exc. Gouan. Nasse Wiesen im südl. Geb., Dalmatien, Piemont, Nizza. 7. 4

9. *O. prolifera* L. Rehb. exc. Host. Fl. austr. Sümpfe, im südl. Geb., Krain, Dalmatien. 7. 4

10. *O. Phellandrium* Lamk. K. syn. *Phellandrium aquaticum*. L. *Ligusticum Phellandrium* Crntz. Sümpfe, stehende Wasser, Gräben, Teiche, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

291. *Aethusa* L. Gleise. K. syn. 323. Rehb. exc. p. 465. Comp. I. 1. p. 497.

1. *A. Cynapium* L. K. syn. Var. β . *pygmaea*: *A. β . agrestis* Wallr. *A. segetalis* Boeningh. Cultivirte Orte, Brachfelder u. auf Schutt etc., im g. Geb. 6—10. ☉

2. *A. cynapioides* M. v. Bieb. K. syn. In Wäldern, an Wegen, im südl. Geb., Destr. Böhmen, Tyrol. 6—8. ☉

292. *Foeniculum* Hoffm. K. syn. 323. Rehb. exc. p. 465. Comp. I. 1. p. 498.

1. *F. officinale* Allion. K. syn. *F. vulgare* Gaertn. *Anethum Foeniculum* L. *A. segetum* Jacq. *Meum Foeniculum* Spreng. *Ligusticum* — Roth. Steinige Hügel, Felsen, Weingärten, besonders im südl. Geb., Oberelsaß, Südschweiz; Destr. Steyermark, Tyrol, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig, Ungarn, Siebenbürgen u. dch. d. g. Geb. cultivirt u. stellw. verwildert. 6—7. ☉

2. *F. dulce* C. Bauh. Rehb. exc. Felsen, Hügel, Acker, im südl. Vittoral, Lombardien bei Pavia, Piemont, Nizza, Ligurien. 6. ☉

3. *F. piperitum* DC. Rehb. exc. *Anethum* — Bertolon. *Meum* — R. et Schlt. In Piemont. 6—7. ☉

293. *Kundmannia* Scopoli. Kundmannie. Rehb. exc. p. 465. Comp. I. 1. p. 499.

1. *K. sicula* DC. Rehb. exc. *Sium siculum* L. Jacq. *Ligusticum belearicum* L. *Brignolia pastinacaefolia* Bertolon., *Cambdaria sicula* Lag. *Sium graecum* L. Cliff. Sonnige Hügel, im südlichsten Geb., Pavia u. Genua. 6. 4

294. *Seseli* L. Sesel. K. syn. 324. Rehb. exc. p. 466. Comp. I. 1. p. 490.

1. *S. Hippomarathrum* L. K. syn. *S. articulatum* Crantz., *Sium Hippomar.* Roth. *Hippomarathrum pelvisforme* Fl. Wett. *H. vulgare* Röhl. Steinige Bergabhänge, Felsen, stellw. dch. d. westl. u. südl. Geb., Rheing., Oberbaden am Kaiserstuhl, Elsaß im Castelwalde u. bei Mischburg, Nahethal, Kreuznach an d. Rothenfels, Norheim u. an d. Gebirgen bei d. Salinen bei d. Ebernburg; Baiern, Schwaben, Sachsen, Thüringen bei Halle; Destr. Böhmen, Mähren, Krain, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

2. *S. tomentosum* Visiani. stirp. Dalm. Rchb. exc. Sonnige, steinige Hügel, im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien zw. Sebenico u. Cattaro. 7—8. 4

3. *S. globiferum* Visian. bot. Zeit. 1830. p. 50. Comp. I. 1. p. 491. Felsen, Mauern, im südl. Geb., in Dalmatien. 8. 4

4. *S. rigidum* W. et Kit. Rchb. exc. Host. Fl. austr. Athamantha — da Roth. Kalkfelsen im südl. Geb., Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn bei Szašna. 7—8. 4

5. *S. leucospermum* W. et Kit. Rchb. exc. Sonnige, grasige Kalkfelsen im südl. Geb., Croatien, Adlersberg bei Ofen in Ungarn. 8—9. ☉

6. *S. gracile* W. et Kit. Rchb. exc. Kalkfelsen im südl. Geb., Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn. 7. 4

7. *S. Gouani* Koch. K. syn. *S. elatum* Gouan. DC. prodr. Felsen d. Kalkgebirgs, besonders im g. südl. Eittoral, Südtirol, Krain, Istrien v. Görz bis Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig, Ungarn, Siebenbürgen. 8—9. ☉

8. *S. glaucum* Jacq. K. syn. *S. osseum* Crntz. *S. montanum* β. *glaucum* DC. prodr. Steinige, grasige Kalkhügel, mehr im südl. Geb., Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Kärnten, Südtirol bei Brixen, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn, Piemont, Nizza, Oberitalien. 7—8. ☉

9. *S. varium* Treviran. K. syn. *S. elatum* Wahlenb. *S. glaucum* M. v. Bieb. *S. tauricum* Link. *S. decipiens* Ledeb. Sonnige steinige Orte, stchw. im südl. Geb., Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. ☉

10. *S. montanum* L. K. syn. *S. multicaule* Jacq. *S. montanum* γ. *multicaule* DC. prodr. Kalkgebirge, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Schweiz v. Jura nach Basel, Elsaß bei Wasleheim, Mömpelgard, Flora v. Erier bei Eurenburg; Tyrol, Steyermark, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Ungarn. 7—8. 4

11. *S. tortuosum* L. K. syn. Felsige, sonnige Orte, im südl. Geb., Südtirol, Eittoral, Istrien, Triest, Fiume, Dalmatien, Piemont, Galizien. 7—8. 4

12. *S. coloratum* Ehrh. K. syn. *S. bienne* Crntz. *S. annuum* L. *S. tortuosum* Pollich. palat. Gebirgswiesen, grasige Hügel, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. Elsaß, Baden im Breisgau, Karlsruhe, Waghäusel, Mannheim, Pfalz Maxdorf, Worms bis Bingen, Kreuznach, Eurenburg, Coblenz, Schwaben, Baiern, Sachsen, Thüringen, Preußen bei Thorn u.; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol bis in d. südl. Eittoral u. 7—8. 4

295. *Libanotis* Crantz. Heilwurz. K. syn. 325. Rehb. exc. p. 468. Comp. I. 1. p. 494.

1. *L. montana* Allioni. K. syn. *L. vulgaris* DC. *L. daucoides* Scopol. *L. athamantica* Fl. Wett. *Athamantica Libanotis* L. Seseli — Koch. var. *Libanotis Riviniana* Scopol. *L. vulgaris* DC. prodr. *Crithmum pyrenaicum* L. *Athamanta* — ca Jacq. Var. β . minor: *Lib. vulgaris* β . pubescens DC. Seseli *Libanotis* β . pubescens M. et K. *Athamanta pubescens* Retz. Gebirgswälder, besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Oberbaden an d. Saar, Bogesen, Elsaß bei Mompelgard, Sulz, in d. Porphyr- u. Trappgebirgen d. Nahe- u. Glan-Gegend, Sobernheim, Oberstein, Niederalteln, Grumbach, Eurenburg, Thonschiefer d. Moselgebirge, Trarbach, Eifel bei Prüm, Schloß Elz, Coblenz, Burg Hammerstein, Urththal u., Schwaben, Baiern, Franken, Thüringen, Sachsen bis Preußen bei Stuhl u.; Destr. außer Dalmatien u. Croatien in allen Provinzen bis in d. Lombardei. 7—8. ☉

2. *L. athamantoides* DC. prodr. K. syn. *L. daucifolia* Rehb. exc. *Ammi* — ium Scopol. Seseli *Libanotis* β . M. et K. *Ligusticum athamantoides* Spreng. Gebirge u. Boralpen, im südl. Geb., Krain bei Idria auf d. Berge Zhaun. 7—8. ☉

3. *L. gracilis* Rehb. Rehb. exc. Boralpen in Tyrol. 7—8. 4

4. *L. sibirica* Koch. K. syn. *L. vulgaris* E. sibirica DC. prodr. *Seseli Libanotis* J. M. et K. *S. athamantoides* C. A. Meyer. *Athamanta sibirica* L. Waldbstellen in Preußen bei Danzig, Marienwerder. 7—8. ☉

296. *Cnidium Cussoni* Brenndolde. K. syn. 326.

Rehb. exc. p. 468. Comp. I. 1. p. 489.

1. *C. Monnieri* Cuss. K. syn. *C. confertum* Moench. *Selinum Monnieri* L. Jacq. *S. peregrinum* Willd. *Ligusticum minus* Lamk. *Cicuta sinensis* Zuccg. Gebüsch, Felsen, im südl. Littoral, Istrien bei Görz, Südfrein, Dalmatien. 7—8. ☉

2. *C. apioides* Spreng. K. syn. *Ligusticum* — Lamk. *Lig. cicutaefolium* Villars. *Laserpitium silaefolium* Jacq. Gebirge, Felsen, im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin, im Veltlin; Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardien, Piemont. 7—8. 4

3. *C. venosum* Koch. K. syn. *C. palustre* Rehb. exc. *Selinum turfosum* Baumg. *S. sylvestre* L. *S. lineare* Schum. *S. Chabraei* Kunth. Fl. Berol. *S. palustre* Spreng. Fl. Hal. *Seseli Saxifragum* Scholl. *Ses. tortuosum* Willd. *Ses. dubium* Schkr. *Ses. venosum* Hoffm. Schattige, feuchte Wiesen, Wälder, mehr im nördl. Geb., Rheing., Jura bis Basel. Pfalz bei Speier, Mutterstadt. Haßlocher Wald, Ellerstadt, Maxdorf bis Eppstein; Thüringen bei Halle; Hannover, Holstein, Hamburg, Mecklenburg, Neu-märk, Pommern, Preußen bei Thorn, Schlesien; Mähren, Böhmen, Siebenbürgen. 7—8. 4

297. *Trochiscanthes* Koch. Quirldolde. K. syn. 327. Rehb. exc. p. 469. Comp. I. 1. p. 488.

1. *T. nodiflorus* Koch. K. syn. *Ligusticum nodiflorum* Villars. *Smyrnum* — All. *Angelica paniculata* Lamk. *Laserpitium verticillatum* W. et Kit. *Imperatoria nodi-*

flora Lamk. Steinige Waldstellen, Felsen, im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis zw. St. Moriz u. Martinach; Südtirol, Vittoral, Istrien, Croatien, Lombardei. 7—8. 4

298. *Athamanta* Koch. umb. Nagenwurz. K. syn. 327. Rehb. exc. p. 470. Comp. I. 1. p. 486.

1. *A. cretensis* L. K. syn. *A. multicaulis* Lamk. *Libanotis cretensis* Scopol. *L. hirsuta* Lamk. Var. β . *mutellinoides* DC. *A. cretensis* γ . *glabra* Gaud. *A. Matthioli* Suter helv. *A. mutellinoides* Lamk. *A. rupestris* Villars. delph. Felsige, kiesige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. bis in d. südl. Vittoral. 7—8. 4

2. *A. Matthioli* Wulf. K. syn. *A. rupestris* Rehb. exc. *Libanotis* — Scopol. Felsen, steinige Orte im südl. Geb., Destr. auf d. Schneeberg bei Gattenstein, Steyermark, Südtirol, Krain, Vittoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Ungarn. 7—8. ☉

3. *A. macedonica* Spreng. DC. prodr. IV. p. 155. *Maly enum. pl. austr.* p. 227. *Rubon* — L. Mauern in d. Lombardei bei Venedig auf d. Insel Murano. 6. 4

4. *A. ramosissima* Portenschl. Rehb. exc. Host. austr. *A. verticillata* Portenschl. Am südl. Vittoral, Dalmatien bei Ragusa u. Spalatro. 6. ☉

299. *Ligusticum* L. Liebstöck. K. syn. 328. Rehb. exc. p. 470. Comp. I. 1. p. 485.

1. *L. ferulaceum* Allion. pedm. K. syn. *L. Seguieri* Villars, *Laserpitium dauricum* Jacq. Alpen, Schweiz auf d. Jura, M. Thoiry, M. Calève, Piemont, Lombardei bei Como. 6—7. ☉

2. *L. Seguieri* Koch. K. syn. *Selinum* — L. fil. Host. *Imperatoria* — Spreng. umb. *Selinum pyrenaicum* Gouan. *Seguier* Ver. II. t. 13. Gebirge u. Boralpen im südl. Geb., Südschweiz M. Generoso im Cant. Tessin; Süd-

tyrol, Krain, Littoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Siebenbürgen. 7—8. 24

300. *Silau* Besser. *Silau*. K. syn. 328. Rchb. exc. p. 471. Comp. I. 1. p. 486.

1. *S. pratensis* Bess. K. syn. *Peucedanum* S. L. *P. pratense* Lamk. *Cnidium* — Spreng. *Seseli selinoides* Jacq. *Sium Silau* Roth. Fette, fruchtbare Wiesen, Triften, lichte Waldstellen, stchw. dch. d. g. Geb. 6—8. 24

2. *S. carvifolius* C. A. Meyer. Griesb. Fl. Rum. 362. *Maly enum. pl. austr.* p. 227. *Bunium peucedanoides* M. v. B. Sandige Hügel, Ungarn im Banat, in Gebüsch bei Bawicz. 6—8. 24

3. *S. virescens* Walp. Rep. V. p. 869. *Maly enum. pl. austr.* p. 227. *Bunium virescens* DC. prodr. *Selinum Rochelii* Heuffel. Schattige Bergwiesen, Ungarn im Banat, Siebenbürgen. 6. 24

301. *Meum* Tournef. *Bärmurz*. K. syn. 329. Rchb. exc. p. 471. Comp. I. 1. p. 484.

1. *M. athamanticum* Jacq. K. syn. *Athamanta Meum* L. *Aethusa* — Murr. *Ligusticum* — Crntz. L. *capillaceum* Lamk. *Seseli Meum* Scopol. Triften d. Alpen, Boralpen u. Gebirgen, Rheing., Bogesen, Schwarzwald bis unterhalb Forbach im Murgthale in Baden, Flora v. Trier in d. Hocheifel, oberhalb Prüm bis über Montjoie hinaus auf Wiesen u. an Wegen nach Aachen, Thüringen, Tena, Sachsen, Schlesien, Böhmen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Steyermark, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8 24

2. *M. Mutellina* Gaertn. K. syn. *Phellandrium* — L. *Ligusticum* — Crntz. Triften d. Alpen, Boralpen u. höheren Gebirgen, Rheing., Oberbaden an d. Belschen u. Feldberg, Bogesen bei St. Amarin, Schwarzwald, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Böhmen, Mähren, Schlesien in den Sudeten. 7—8. 24

302. *Gaya Gaud. helv. Gaya*. K. syn. 329. Rchb. exc. p. 471. Comp. I. 1. p. 485.

1. *G. simplex* Gaud. K. syn. *Ligusticum* — Allion. *Pachypleurum* — Rchb. exc. p. 471. *Laserpitium* — L. *Laserp. mutellinoides* Crntz. Triften der Hochalpen, Schweiz M. Grimsel, M. Gemmi, M. Niesen u.; Destr. Tyrol, Steyermark, Kärnthén, Salzburg, Krain, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien, Piemont. 7—8. 4

303. *Crithmum* L. *Bazille*. K. syn. 329. Rchb. exc. p. 472. Comp. I. 1. p. 483.

1. *C. maritimum* L. K. syn. *Cachrys* — Spreng. Felsen im südl. Eittoral, Istrien, Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Venedig; auf d. Dünen d. Nordsee in Belgien u. Seeland. 7—8. 4

304. *Conioselinum* Fischer. *Schirlingsfilge*. K. syn. 329. Rchb. exc. p. 461. Comp. I. 1. p. 482.

1. *C. Fischeri* Wim. et Grab. K. syn. *C. tataricum* Fisch. *Selinum* Gmelini Bray, *Angelica chaerophyllea* Lottermoser, *Ligusticum vaginatum* Spreng. non Lin. *Lig. Gmelini* Chamis. et Schlechtenth. Etwas feuchte Gebirgshaine mehr im nördl. Geb., Preußen bei Rastenburg, in Schlesien, Sudeten auf d. Kesselwinkl., kleinen Keilig im Gesenke; Böhmen auf d. Gläser Schneeberg, Alpen in Siebenbürgen bei Rodna u. in Steyermark am Schlosse Winbisch-Landsberg angepflanzt u. dadurch verwildert. 7—8. 4

V. **Gruppe.** *Angeliceen* Koch. K. Taschb. 221.

305. *Levisticum* Koch. *Liebstockel*. K. syn. 330. Rchb. exc. p. 463. Comp. I. 1. p. 483.

1. *L. officinale* Koch. K. syn. *L. vulgare* Moris. Rchb. exc. *Legusticum Levisticum* L. *Angelica* — Allion. pedm. *A. paludapifolia* Lamk. Gebirgstriften, Boralpen, stellenw. besonders im südl. Geb., Rheing. unweit Aachen bei

Limburg u. Berviers in Belgien; Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Piemont, Ligurien; auch häufig in Gärten, besonders Bauerngärten d. Gebirges cultivirt. 7—8. 4

306. *Selinum* L. Hoffm. *Silge*. K. syn. 330. Rchb. exc. p. 461. Comp. I. 1. p. 482.

1. *S. Carvifolia* L. K. syn. *S. angulatum* Lamk. *S. Pseudo-Carvifolia* Allion. *Angelica Carvifolia* Spreng. *Mylinum* — Gaud. helv. *Laserpitium selinoides* Scopol. Schattige Wälder, Gebüsche, Abhänge, Felsen, Torf- u. Heidewiesen, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. d. g. Rheinthäl bis in d. Nebenthäler nicht selten. 7—8. 4

307. *Ostericum* Hoffm. *Mutterwurz*. K. syn. 331. Rchb. exc. p. 455. Comp. I. 1. p. 481.

1. *O. palustre* Besser. K. syn. *O. pratense* Hoffm. *Imperatoria palustris* Besser. *Selinum odoratum* Bernh. *Angelica pratensis* M. v. Bieb. Nasse, sumpfige, torfige Wiesen, Sümpfe, stchw. im Geb., Thüringen bei Erfurt, Arnstadt, Halle, Preußen, Thorn bei Wieczorkowo u.; Böhmen, Galizien, Siebenbürgen. 7—8. 4

308. *Angelica* L. *Angelica*. K. syn. 331. Rchb. exc. p. 462. Comp. 1. p. 480.

1. *A. sylvestris* L. K. syn. *Imperatoria* — DC. *Imp. Angelica* Fl. Wett. *Selinum* — Roth, *S. sylvestre* Crntz, *S. pubescens* Moench. Schattige, feuchte Wiesen, Waldbüche, Wälder, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *A. montana* Schleich. K. syn. *A. sylvestris* β . *elatio*r Wahlenb. *A. Razoulii* Allion. *Imperatoria montana* DC. *Imp. flavescens* Bess. Feuchte Wiesen, Triften d. Vor-alpen, Schweiz im Jura M. Chasseral, Creux du Van u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Oestr. Tyrol, Krain, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

3. *A. pyrenaica* Spreng. K. syn. *Seseli* — cum L. *Selinum* — Gouan. *S. Lachenalii* Gmel. bad. Wiesen,

Triften auf d. höchsten Stellen d. Vogesen, im Rheingeb.
zw. Gerardmer, Hohenack u. St. Leonhard. 7. 4

309. Archangelica Hoffm. Engelmurz. K. syn.

332. Rchb. exc. p. 462. Comp. I. 1. p. 479.

1. *A. officinalis* Hoffm. K. syn. *Angelica* — Moench.
A. Archangelica L. *A. sativa* Mill. Alpenhöhlen an Bächen,
nahe, schattige Orte besonders im nördl. Geb., Seeküste von
Preußen bei Königsberg, Thorn, Hamburg, Holstein, Schlesien
im Riesengebirge, Böhmerwald, Schweiz im Jura u. im Welt-
lin; Steyermark, Kärnten, Krain bei Görz, Ungarn. 7—8. 4

2. *A. littoralis* Rchb. exc. *Angelica* — Wahlenb.
Felder, Ufer, auf d. Carpathen in Ungarn. 7. 4

VI. Gruppe. Peucedaneen DC. Koch. Taschb. 222.

310. Ferulago Koch. Birkenwurz. K. syn. 332.

Ferula Rchb. exc. p. 460. Comp. I. 1. p. 478.

1. *F. galbanifera* Koch. K. syn. *F. nodiflora* Koch.
umb. *Ferula Ferulago* L. Rchb. exc. *Ferula galbanifera*
Lobel. *Ferula nodiflora* Jacq. Trockene Wiesen, steinige,
felsige Orte im g. südl. Geb., Südtirol, Krain, Littoral,
Istrien bei Triest, Fiume, Croatien, Dalmatien, Lombardien,
Venedig, Oberitalien, Galizien, Siebenbürgen. 6—7. 4

2. *F. sylvatica* Rchb. Rchb. pl. crit. IV. 555. *Ferula Ferulago* β . *commutata* Rochel. *Ferula sylvatica*
Besser. Rchb. exc. *Ferula nodiflora* Rochel bannat. Wald-
wiesen im südl. Geb., Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn,
Galizien. 7—8. 4

3. *F. sulcata*. * *F. nodiflora* Koch. umb. 98. *Ferula*
— Spreng. *Ferula sulcata* Desf. Rchb. exc. *Ferula Barre-*
lieri Tenor. *Ferula campestris* Besser. *Ligusticum luteum*
Poir. Trockene, sonnige Hügel in Dalmatien. 7—8. 4

311. Ferula Koch. Steckenfraut. Rchb. exc. p. 460.

Comp. I. 1. p. 479.

1. *F. communis* L. Rechb. exc. *F. nodiflora* Sibth. Fl. graec. Sonnige Hügel in Dalmatien. 7—8. 4

2. *F. glauca* L. DC. prodr. Maly enum. pl. austr. p. 229. *F. communis* Gouan. h. monsp. Sonnige Hügel im südl. Littoral in Dalmatien. 4

3. *F. Heuffelii* Grieseb. Maly enum. pl. austr. p. 229. Gebirge an d. Donau, an d. Felsen Kazan im Banat. 6. 4

312. *Opopanax* Koch. umb. *Opopanax*. Rechb. exc. p. 459. Comp. I. 1. p. 479.

1. *O. Chironium* Koch. Rechb. exc. *Pastinaca Opopanax* L. Ferula — Spreng. Selinum — Crntz. Hecken, Zäune, im südlichsten Littoral, Dalmatien, Croatien, Piemont, Nizza. 6—7. 4

313. *Peucedanum* L. Haarstrang. K. syn. 333. Rechb. exc. p. 459. Comp. I. 1. p. 471.

1. *P. officinale* L. K. syn. Selinum *Peucedanum* Roth. Wigg. Fette, schattige Wiesen, Walbwiesen, stellenw. dch. d. Geb., Baiern, Werthheim, Würzburg, Regensburg, Ingolstadt, Thüringen bei Barby, Jena, Sachsen bei Leipzig, Holstein, Preußen auf d. Memelinsel bei Tilsit, Danzig; Rheing., von d. Schweiz dch. Baden, Elsaß bis Mainz, Frankfurt, Bingen, Coblenz, Bonn u.; Oestr. Tyrol, Steyermark, Dalmatien, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

2. *P. italicum* Miller. Rechb. exc. Hügel, im südl. Geb., Ungarn bei Miskolcz, Lombardei bei Pavia, Piemont bei Tenda. 6—7. 4

3. *P. longifolium* W. et Kit. Rechb. exc. Kalkfelsen in Dalmatien, Ungarn im Banat. 6—7. 4

4. *P. coriaceum* Rechb. Rechb. exc. in add. p. 866. *P. Petteri* Visian. *Pastinaca* — Visian. olim. Wiesen im südl. Littoral, Dalmatien bei Spalatro. 4

5. *P. ruthenicum* M. v. Bieb. Rechb. exc. *P. tauricum* Spr. spec. *Ferula ruthenica* Spr. prodr. Gräßige

Birkenwälder, in Ungarn bei Karansebes u. Ruen, in Siebenbürgen. 8—9. 4

6. *P. arenarium* W. et Kit. Rchb. exc. Sandige Hügel, Ungarn bei Pesth, Fünfkirchen, Siebenbürgen. 8—10. ☉

7. *P. sibiricum* Willd. Rchb. exc. Ferula — ca Spr. Host. *F. Sadleriana* Ledeb. *F. tatarica* Fisch. Kalkfelsen, in Ungarn M. Szanto bei Pesth, M. Piliser, Siebenbürgen. 6—7. 4

8. *P. parisiense* DC. Fl. Fr. K. syn. Gaud. *P. officinale* Thuill. *P. gallicum* Pers. Wiesen, im südl. Littoral, Istrien, Triest an d. M. Maggor. 7—8. 4

9. *P. Chabraei* Rchb. in Moesler. K. syn. Gaud. *P. carvifolium* Vill. delph. *Selinum Chabraei* Jacq. *S. podolicum* Besser. *S. Carvifolia* Crntz. *Pteroselinum Chabraei* Rchb. exc. p. 453. *Imperatoria pimpinelloides* Boeningh. *Imp. Chabraei* Spreng. Palimbia — DC. prodr. Fette Wiesen, stellw. mehr im südl. u. mittl. Geb., Schweiz Jura nach Basel, Schwaben, Rheing., Elsaß bei Straßburg bis Coblenz, Bonn, Grefeld, böh. d. g. Bliëz, Saar u. Moselthal, Bliëzranzbach, Saarbrücken, Trier bis Berncastel u. Coblenz, Nahethal bei Kirn u., Baiern bis Regensburg, mit d. Donau nach Destr. bei Wien, Steyermark Tyrol, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardien, Piemont. 7—9. 4

10. *P. Schottii* Bess. DC. prodr. K. syn. *Pteroselinum glaucum* Rchb. exc. p. 453. *Pastinaca glauca* Scop. *Imperatoria* — Bartl. I. *Chabraei* Besser. Var. β . *petraeum* Noë. *P. petraeum* K. syn. edit. I. Gebirge, Felsen, im südl. Geb., Südtirol, Krain im Sonzothale, Littoral, Istrien, Triest, Fiume, Croatien. 7—8. 4

11. *P. heterophyllum* Visian. Comp. II. in add. p. 750. *Pastinaca selinoides* Vis. bot. Zeit. 1829. Wiesen in Dalmatien bei Vertica. 8—10. ☉

12. *P. Cervaria* Lapeyr. K. syn. *Athamanta* — L. *Ligusticum* — Spreng. *Selinum* — Crntz., *Cervaria* Ri-

vini Gaertn. Rchb. exc. p. 455. *C. glauca* Gaud. helv. *C. rigida* Moench. Gebirgswälder, trockene, steinige Grasstellen, an Abhängen, Nadelholzwälder, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., von d. Schweiz dch. Baden, Elsaß bis zum Mittelrheine im Nahe- u. Moselthale, Coblenz, Kreuznach, bis Trier, dch. d. Eifel nach d. Urthale, Bonn zc. nach Norden u. Süden. 7—8. 4

13. *P. Oreoselinum* Moench. K. syn. *Athamanta* — *L. Selinum* — *Scopol. Cervaria* — Gaud. helv. *Oreoselin. legitimum* M. v. Bieb. Rchb. exc. p. 455. Trockene Wiesen, Triften, Heiden, nördl. bis Königsberg zc., südl. Gebirgswälder, besonders Nadelholz, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

14. *P. alsaticum* L. K. syn. *Pteroselinum* — Rchb. exc. p. 454. *Cnidium* — Spr. *Selinum* — Crntz. Roth. *Cervaria alsatica* Gaud. Steinige, bewachsene Hügel, Felsen, Abhänge, Dämme, Gebüsche, stellw. dch. d. südl. u. mittl. Geb., Rheing., Oberbaden bei Leopoldshafen, Elsaß bei Ruffach, Colmar, Weissenburg, Pfalz, Landau, Speier, Mannheim, Heidelberg, Oppau, Freinsheim, Dürkheim, Bergstraße bis Mainz, Bingen, Laubenheim, Kreuznach u. im g. Naethal bis Oberstein, Baiern, Würzburg, Thüringen; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Ungarn, Galizien, Lombardien, Schweiz. 7—8. 4

15. *P. venetum* Koch. K. syn. *Selinum* — Spreng. *P. alsaticum* β . *albiflorum* DC. prodr. Gebirge, Felsen, im südl. Geb., Südschweiz Cant. Wallis; Südtirol, Eitzoral, Istrien, Triest, Fiume, Croatien, Venedig. 7—8. 4

16. *P. austriacum* Koch. K. syn. *Selinum* — Jacq. *S. argenteum* Crntz. *S. nigrum* Lamk. *Pteroselinum austriacum* Rchb. exc. p. 454. *Oreoselinum* — Hoffm. Var. β . *P. montanum* Koch. umb. *Selinum* — Schleicher. *S. nigricans* Gaud. *S. polymorphum* Spreng. Steinige Orte, unter Gebüschen, mehr im südl. Geb., Rheing., Elsaß bei Bruyeres, Aßweiler u. im nahen Lothringen bei Eßelstein; Südschweiz Cant. Waadt, Wallis u. Graubünden im Mi-

forer = Thale; Destr. Böhmen, Kärnthen, Krain, Vittoral, Istrien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

17. *P. latifolium* DC. prodr. IV. p. 181. Maly enum. pl. austr. p. 230. *Selinum latifolium* M. v. Bieb. In Siebenbürgen bei Clausenburg. 7. 4

18. *P. rablense* Koch. K. syn. *Ferula* — Wulf. *Selinum* — Spr. R. et Schtes *S. elegans* Balb. *S. lineare* R. et Schtes. *Oreoselinum rablense* Hoffm. *Pteroselinum* — Rehb. exc. p. 454. Alpen u. Boralpen, in d. südl. Alpenkette, Südschweiz M. Generosa bei Bormio; Kärnthen im Raibeltale, Krain in d. Wochein, Vittoral, Lombardei. 7—8. 4

314. *Tommasinia Bertoloni*. Tommasinie. Koch. syn. 336. K. Taschb. 224.

1. *T. verticillaris* Bertol. Fl. italic. K. syn. *Peucedanum* — Koch. umb. *Ostericum* — Rehb. exc. p. 455. *Angelica* — Lin. Jacq. *Imperatoria* — DC. Boralpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis, Graubünden, Tessin; Piemont; Destr. Steyermark, Tyrol, Vittoral, Istrien, Monfalcone, Duino, Krain um Görz, Lombardei. 7—8. 4

315. *Thysselinum Hoffm.* Dtsenif. K. syn. 326. Rehb. exc. p. 453. Comp. I. 1. p. 474.

1. *T. palustre* Hoffm. K. syn. *T. Plinii* Spr. *Selinum palustre* L. *S. sylvestre* Jacq. *S. Thysselinum* Crntz. *Peucedanum palustre* Moench. Comp. I. 1. *P. sylvestre* DC. Var. β . *T. sylvestre* Rehb. exc. *Selinum intermedium* Bess. galiz. — γ . *T. angustifolium* Rehb. exc. *Selinum Schievereckii* Bess. Sümpfe, Teiche, nasse Torfwiesen u. Wälder, stellw. dch. d. g. Geb., β . u. γ . in Galizien. 7—8. ☉

2. *T. baicalense* * *Peucedanum baicalense* Koch. umb. Comp. I. 1. *Pteroselinum sibiricum* Rehb. exc. p. 454. *Selinum baicalense* Redowsk. *S. terebinthinaceum* Treviran. *S. collinum* Kitaib. In Ungarn. 6—7. ☉

316. *Imperatoria* L. Meisterwurz. K. syn. 336.

Rchb. exc. p. 456. Comp. I. 1. p. 477.

1. *I. Ostruthium* L. K. syn. *Peucedanum* — Koch. umb. *Selinum Imperatoria* Roth. Gebirgswiesen, Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr.; Rheing., Oberbaden bei Fürstenberg an d. Zellerberg, Sigmaringen, Vogesen a. d. Hoheneck u. Krabbenfelsen, Hohe Bann bei Malmedy Flora v. Trier, Thüringerwald, Erzgebirge, Westphalen, Belgien, Schlesien in d. Sudeten, Pommern u. stellw. cultivirt. 6—7. 4

2. *I. angustifolia* Bellardi. Rchb. exc. *Angelica* — Hoffm. *Peucedanum imperatorioides* Link. Triften d. Alpen in d. südlichsten Kette, Schweiz im Cant. Wallis, Piemont. 6—7. 4

317. *Anethum* L. Dill. K. syn. 337. Rchb. exc. p. 459. Comp. I. 1. p. 470.

1. *A. graveolens* L. K. syn. *Pastinaca Anethum* Spr. R. et Schult. *Selinum* — Roth. Unter d. Saat im südl. Geb., Vittoral, Istrien, Ungarn, Siebenbürgen. Auch in Gärten cultivirt u. verwildert. 7—8. ☉

2. *A. segetum* L. Rchb. exc. *Meum* — Gusson. Stellw. im Geb. cultivirt. 6—7. ☉

318. *Pastinaca* L. Pastinak. K. syn. 337. Rchb. exc. p. 458. Comp. I. 1. p. 470.

1. *P. sativa* L. K. syn. *P. pratensis* Fl. Dan. *Selinum Pastinaca* Crntz. *Anethum* — Wibel Werth. Steinnige Hügel, Wiesen, Raine, Wegeränder, dch. d. g. Geb., Rheing. gemein, auch angepflanzt. 7—8. ☉

2. *P. opaca* Bernh. K. syn. *P. sylvestris* Mill. *P. sativa* β . *sylvestris* DC. prodr. *P. sativa* β . *elator* Rochel. bann. Wiesen, Triften, im südl. Geb., Vittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Fiume, Südtyrol, Lombardien, Ungarn im Banat, Ufer d. Czerna, Quellen bei Mehadia, Siebenbürgen. 7—8. ☉

3. *P. Fleischmanni* Hladnik. K. syn. *P. selinoides* Visian. Rchb. exc. Steinige Orte, im südl. Geb., Krain am Schloßberg bei Laibach, Dalmatien bei Vertica. 7—8. ☉

319. *Heracleum* L. Bärenflau. K. syn. 338. Rchb. exc. p. 456. Comp. I. 1. p. 467.

1. *H. Spondylium* L. K. syn. *H. proteiforme* Crntz. *Spondylium branca-ursina* Hoffm. Var. β . *elegans*: *H. elegans* Jacq. *H. Panaces* Rchb. exc. non Lin. *H. flavescens* Willd. *H. cordatum* Presl. Wiesen, Waldwiesen, Baumgärten, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, d. Var. β . stchw. im Rheing., Baden im Murgthale bei Forbach, Heidelberg, Trier, Wesel, Baiern, Sachsen, Preußen bei Königsberg u. 6—9. ☉ et 4

2. *H. longifolium* Jacq. Rchb. exc. Host. austr. *H. sibiricum* β . *longifolium* K. syn. *H. palmatilobum* DC. *H. flavescens* Besser. Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Destr. Steyermark, Böhmen in d. Sudeten. 7—8. ☉

3. *H. sibiricum* L. K. syn. *H. flavescens* α . *latifolium* L. Var. β . *H. angustifolium* Jacq. Rchb. exc. Triften d. Alpen u. Boralpen, Rheing. zw. Rorschach u. Rheineck, Thüringen Jena; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Böhmen a. d. Sudeten, Krain, Lombardei, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—9. ☉

4. *H. Panaces* L. K. syn. Bertol. *H. asperum* M. v. Bieb. *H. montanum* Schleich. *H. palmatum* Baumg. Rchb. exc. Wälder d. Boralpen, Schweiz im Jura, Baiern Tegernsee am Wallberg u. dch. Salzburg, Tyrol nach Destr., Steyermark, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. ☉

5. *H. pyrenaicum* Lamk. Rchb. exc. *H. amplifolium* Pollini, *H. Pollinianum* Bertol. Fl. ital. *H. setosum* Lapeyr. Triften d. Hochalpen, Südtirol Ball d'Isa bei Trient; Croatien, Lombardei, Savoyen. 6—7. 4

6. *H. alpinum* L. K. syn. Gebirgswälder u. Vor-alpen, Rheing. Oberbaden zw. Dardtlingen u. Hohenfrähen; Schweiz dch. d. Jura u. im Cant. Wallis; Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

7. *H. austriacum* L. K. syn. *Sphondylium* — *Scopol.* Var. β . *H. siifolium* Rehb. exc. *Tordylium* — *Scopol.* Triften d. Alpen u. Vor-alpen, Destr. Steyermark, Kärnthn Salzburg, Tyrol. 7—8. 4

320. *Tordylium* L. Zirmet. K. syn. 339. Rehb. exc. p. 452. Comp. I. 1. p. 466.

1. *T. maximum* L. K. syn. Steinige, uncultivirte Orte, schattige Abhänge, Gebüsch, stchw. dch. d. Geb., mehr im südl. Rheing., Oberelsaß bei Bergheim, Trier, Oberstein an d. Nahe Weg nach d. Felsenkirche, St. Wendel; Baiern Würzburg, Thüringen, Halle, Barby, Dresden; Schweiz Cant. Waadt; Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol, Vittoral Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. ☉

2. *T. officinale* L. Host. Fl. austr. K. syn. in add. 1024. *T. apulum* Rivin. Hügel u. Ackerländer im südl. Vittoral, Istrien, Insel Vossino u. in Dalmatien. 6. ☉

3. *T. apulum* L. K. syn. Host. austr. *T. grandiflorum* Moench. *T. humile* Desf. *T. officinale* DC. Rehb. exc. *Condycarpus apulus* Hoffm. Sonnige Orte im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien. 4—5. ☉

VII. Gruppe. Silerineen Koch. K. Taschb. 226.

321. *Siler* Scopol. Roskümme. K. syn. 340. Rehb. exc. p. 452. Comp. I. 1. p. 465.

1. *S. trilobum* Scopol. K. syn. Crntz. *S. aquilegifolium* Gaertn. *Angelica* — *lia* DC. *Laserpitium* — *Jacq.* *L. trilobum* L. Gebirgswälder stchw. dch. d. Geb., Rheinhessen, Wetterau bei Buszbach, Baiern bei Regensburg, Harz, Hannover; Destr. bei Wien, Steyermark, Tyrol, Croatien, Lombardei, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

VIII. Gruppe. Thapsieen Koch. K. Taschb. 227.

322. *Laserpitium* L. *Lasferkraut*. K. syn. 340.

Rehb. exc. p. 449. Comp. I. 1. p. 455.

1. *L. latifolium* L. Jacq. K. syn. Var. α . *glabrum* Crntz. DC. *L. Libanotis* Lamk. *L. latifolium* Gmel. bad. — β . *asperum*: *L. asperum* Crntz. *L. Cervaria* Gmel. Gebirgswälder u. Boralpen stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. d. g. Jura-Kette nach Bregenz, Constanz, in d. Vogesen: zuge zw. Johanniscreuz u. Appenthal, bei Bilsch, Steinbach, Ludwigswinkel, Obersteinebach, auf d. Donnersberg, Pfalz bei Kusel im Odenwalde, Luxemburg u., Schwaben, Baiern, Sachsen, Jena, nördl. bis Preußen bei Osterode, Sensburg u. u. südl. bis an d. Vittorale. 7—8. 4

2. *L. alpinum* W. et Kit. K. syn. *L. trilobum* L. Crntz. *L. aquilegifolium* Murr. DC. Wälder u. Gebüsche im südl. Geb., Krain zw. Kletsch u. Altlag, an d. Fahrwege der v. Gottschee über Seisenburg nach Weichselburg führt, Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

3. *L. marginatum* W. et Kit. K. syn. Schattige Gebirgsstellen im südl. Vittorale Krain, Istrien, an d. Krimm bei Laibach, Monte Maggiore, Croatien. 7—8. 4

4. *L. Gaudinii* Moretti K. syn. *L. luteolum* Gaud. Gebirge u. Boralpen im südl. Geb., Schweiz Cant. Graubündten am Hinterrheine, Cant. Tessin an d. M. Generoso; Südtirol nördl. bis Deutschhofen, Lombard. 7—8. 4

5. *L. Siler* L. K. syn. *L. montanum* Lamk. *Siler montanum* Crntz. Gebirge u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern u. auf d. Alp im Schwarzwalde; Destr. Tyrol, Kärnthen, Steyermark, Lombard. 7—8. 4

6. *L. gallicum* L. Rehb. exc. *L. trifurcatum* Lamk. *L. cuneatum* Moench. Sonnige Bergstellen im südl. Geb., Ungarn, Lombard. bei Pavia, Piemont. 7—8. 4

7. *L. peucedanoides* L. K. syn. *L. angustifolium* L. sp. Scopol. Gebirge u. Boralpen in d. südl. Kette;

Schweiz Cant. Tessin; Tyrol, Steyermark, Krain, Vittoral, Istrien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei. 6—7. 4

8. *L. hirsutum* Lamk. K. syn. *L. Halleri* Allion. *L. Panax* Gouan. Abhänge d. höchsten Granitalpen in d. südl. Kette; Schweiz St. Gotthard, an d. Teufelsbrücke, Cant. Wallis u., Südtirol an d. Seiseralp u., Krain, Lombardei, Piemont, Savoyen. 7—8. 4

9. *L. nitidum* Zantedesch. K. syn. *L. hirtellum* Gaud. helv. Kalkfelsen d. Gebirge u. Voralpen im südl. Geb., Schweiz im Weltlin; Südtirol, Lombardei. 8. 4

10. *L. Archangelica* Wulf. Jacq. K. syn. Gebirgswälder u. Voralpen, Schlessien im Riesengebirge südl. Lehne d. Altva-ters, im Gesecke a. d. Peterstein; Mähren, Tyrol, Krain, M. Slavinza, Friedrichsberg bei Gottschee, Croatien, Ungarn. 7—8. 4

11. *L. prutenicum* L. K. syn. *L. selinoides* Crntz. *L. gallicum* Scopol. *L. hispidum* Rehb. exc. Var. β . *glabrum* Rochel. Feuchte Waldwiesen und lichte Stellen d. Wälder, stelm. dch. d. Geb., Rheing., Bodenseegegend bei Feldkirch u. Rothis, Pfalz bei Speier, Schifferstadt, Otterstadt, Ingelheim, Mannheim a. d. Rehbach, Dorf Waldsee, an d. Griesheimer Tanne, Thüringen, Jena, Hamburg, Schwaben, Baiern, Sachsen, Schlessien, Preußen bei Königsberg, Tilsit, Danzig u.; Destr. in allen Provinzen bis in d. Vittoral, Lombardei, Venedig, Piemont; Var. β . in Piemont u. im Banat. 7—8. 4

12. *L. verticillatum* W. et Kit. K. syn. in addent. 1025. Bergwiesen im südl. Vittoral Istrien, M. Maggiore u. M. Sio. 7—8. 4

323. *Thapsia* L. Thapsie. Rehb. exc. p. 451. Comp. I. 1. p. 455.

1. *T. villosa* L. Rehb. exc. Waldige Hügel im südlichsten Geb., Piemont, Nizza. 7—8. ☉

IX. Gruppe. Daucineen Koch. K. Tschb. 228.

324. *Orlaya* Hoffm. Breitsame. K. syn. 343. Rehb exc. p. 448. Comp. I. 1. p. 460.

1. *O. grandiflora* Hoffm. K. syn. *Caucalis* — L. *Platyspermum* — M. et K. *Daucus* — Scopol. Roth. Aecker, Felser, besonders auf Kalk- und Thonboden, stellenw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., Schweiz u. dch. d. Rheinthal bis Coblenz, Bonn, Trier u., nördl. bis Hannover, südl. dch. Oestr. bis in d. Lombardei. 7—8. ☉

2. *O. platycarpus* Koch. K. syn. *Caucalis* — L. Aecker im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Piemont. 6—7. ☉

3. *O. maritima* Koch. Rchb. exc. *Daucus* — Gaertn. *Caucalis* — Gouan. *C. pumila* Moris. Küste des südl. Vittorals, Piemont, Nizza. 5—6. ☉

325. *Daucus* L. Mohrrübe. K. syn. 343. Rchb. exc. p. 448. Comp. I. 1. p. 458.

1. *D. Carota* L. K. syn. Wiesen, Triften, Raine, Wege u. Waldränder im g. Geb. u. cultivirt. 6—10. ☉

2. *D. Gingidium* L. Rchb. exc. DC. prodr. *D. lucidus* L. suppl. *D. mauritanicus* Salzm. Im südl. Vittoral, Dalmatien auf d. Insel Lissa, Piemont, Ligurien, Genua. 6—9. ☉

3. *D. mauritanicus* Allion. pedm. Rchb. exc. DC. prodr. Wiesen, grasige Orte im südl. Vittoral, Dalmatien auf d. Insel Lefina, Piemont, Nizza, Novarese. 6—7. ☉

4. *D. hispanicus* Gouan. Rchb. exc. *D. maritimus* Sm. Felsen, Mauern im südlichsten Vittoral, Nizza, Genua. 6—7. ☉

5. *D. hispidus* Desf. Rchb. exc. Felsen im südl. Vittoral, Dalmatien Insel Lefina. 7—8. ☉

6. *D. littoralis* Sibth. Rchb. exc. *D. muricatus* β . DC. prodr. Küste d. Nordsee in d. Niederlanden, Belgien u. Holland. 7—8. ☉

7. *D. muricatus* L. Rchb. exc. *Platyspermum* — Koch. Aecker im südlichsten Vittoral, Lombardei, Venedig. 6—7. ☉

X Gruppe. Caucalineen Koch. K. Taschb. 229.

326. *Caucalis* Hoffm. *Haftdolde*. K. syn. 343.

Rechb. exc. p. 446. Comp. I. 1. p. 461.

1. *C. daucoides* L. K. syn. *C. leptophylla* Pollich. *Daucus platycarpus* Scopol. Saatäcker, Brachfelder, besonders auf Thon- u. Kalkboden, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

5. *C. muricata* Bischoff. cat. Heidelb. K. syn. Saatäcker in Destr., Wien bei Kenndorf u. in Ungarn. 6—7. ☉

3. *C. leptophylla* L. K. syn. *C. humilis* Jacq. *C. parviflora* Lamk. *Daucus leptophylla* Scopol. Acker unter d. Saat, stellw. besonders im südl. Geb., Rheing., bei Basel, bei Eurenburg, Belgien bei Lüttich, Hannover, Göttingen bei Eljeshausen, Schweiz im Wallis, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei u. 6—7. ☉

327. *Turgenia* Hoffm. *Turgenie*. K. syn. 344. Rechb.

exc. p. 447. Comp. I. 1. p. 462.

1. *T. latifolia* Hoffm. K. syn. *Caucalis* — L. syst. *Tordylium* — L. spec. Saatäcker, Felder, besonders auf Lehm- u. Kalkboden, stellw. dch. d. Geb., Rheing., v. Oberbaden dch. Elsaß bis nach d. Niederlanden, Trier häufig, dch. Schwaben, Oberbaiern, Franken, Thüringen bis Hannover; Destr. Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei. 7—8. ☉

2. *T. multiflora* DC. prodr. Maly enum. pl. austr. p. 234. Am südl. Littoral, Dalmatien bei Ragusa. 7. ☉

328. *Torilis* Adans. Hoffm. *Borstdolde*. K. syn.

344. Rechb. exc. p. 447. Comp. I. 1. p. 463.

1. *T. microcarpa* Besser. DC. prodr. IV. p. 218. Maly enum. pl. austr. p. 234. Im Banat auf d. Felsen Ragan an d. Donau. ☉

2. *T. Anthriscus* Gmel. K. syn. *Tordylium* — L. *Caucalis* — Roth. Scopol. *Toril. rubella* Moench. Wiesen, Wege, Bäume, Hecken, dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

3. *T. neglecta* R. et Schult. K. syn. *T. infesta* Hoffm. Rchb. exc. *Scandix* — Jacq. Aecker, Waldränder, im südl. Geb., Südschweiz; Oestr. Tyrol, Dalmatien, Lombardien, Ungarn. 6—7. ☉

4. *T. helvetica* Gmel. bad. K. syn. *T. infesta* M. et K. *Caucalis helvetica* Jacq. *Scandix infesta* L. *Caucalis* — Curtis *C. arvensis* Huds. Saatäcker, Brachfelder, Weinbergen, besonders auf Lehm u. Kalk, im g. südl. u. mittl. Geb., Rheing., dch. d. g. Rheinthäl an vielen Orten, häufig bei Trier u. 7—8. ☉

5. *T. heterophylla* Gusson prodr. Fl. sicil. K. syn. Aecker, Saune, im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien. 4—6. ☉

6. *T. nodosa* Gaertn. K. syn. *Tordylium* — L. Jacq. *Caucalis* — Scopol. *C. nodiflora* Allion. pedm. Aecker, an Wegen, Weingärten, besonders im südl. Geb., Rheing., 1843 auf einem Kleeacker bei Trier; Belgien; Mecklenburg bei Warel, Hannover; Südtirol, Littoral, Istrien bei Trieste, Insel Dsero, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Ungarn, Siebenbürgen. 4—5. ☉

XI. Gruppe. Scandicineen. Koch. K. Taschb. 230.

329. *Scandix* L. Nadelkerbel. K. syn. 345. Rchb. exc. p. 442. Comp. I. 1. p. 523.

1. *S. Pecten veneris* L. K. syn. *Myrrhis* — Allion. *Chaerophyllum rostratum* Lamk. Saatäcker, Felder, dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

2. *S. australis* L. K. syn. *Myrrhis* — All. *Wylia* — Hoffm. Saatäcker, im südl. Littoral, Istrien Insel Dsero, Dalmatien, Lombardien. 5—6. ☉

3. *S. grandiflora* L. Rchb. exc. *Chaerophyllum* — um Lamk. *Wylia* — Hoffm. Im südl. Littoral, Dalmatien bei Fossin = Piccolo. ☉

330. *Anthriscus* Hoffm. Klettenkerbel. K. syn. 346. Rchb. exc. p. 443. Comp. I. 1. p. 521.

1. *A. sylvestris* Hoffm. K. syn. *Chaerophyllum* — tre L. Rchb. exc. Var. α . *A. sylvestris* DC. — β . *A. alpestre* Wim. et Grab. — γ . *tenuifolia*: *A. torquata* Thom. *Chaerophyllum alpinum* Villars. Wiesen, Hecken, Zäune, Ufer, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 5—6. 4

2. *A. torquata* Duby DC. prodr. *Chaerophyllum torquatum* DC. Fl. fr. Rchb. exc. p. 444. *Myrrhis bulbosa* Allion. *M. torquata* Spreng. Alpen in d. südlichsten Kette, Piemont. 6—7. 4

3. *A. memorosa* M. v. Bieb. K. syn. *Chaerophyllum* — um M. v. Bieb. Rchb. exc. *A. sylvestris* γ . M. et K. Schattige Orte, besonders im südöstl. Geb., Schlesien, Frankfurt a. d. Oder; Destr. Krain, Ungarn. 5—6. 4

4. *A. fumarioides* Spreng. K. syn. *Scandix* — W. et Kit. Var. β . *Chaerophyllum Hladnikianum* Rchb. Fl. ger. exsicc. Gebirge u. Boralpen, besonders im südl. Kalkgebirgszüge in Krain, M. Nanaß u. M. Planina, Littoral, Istrien, Monte Maggiore, Dalmatien, Croatien. 5—6. 4

5. *A. Cerefolium* Hoffm. K. syn. *Scandix* — L. *Chaerophyllum sativum* Lamk., *Cerefolium* — Besser. Hecken, Weingärten, stchw. im südlichsten Geb.; im übrigen cultivirt u. auf Schutt verwildert. 5—6. ☉

6. *A. trichosperma* Schultes syst. K. syn. *A. Cerefolium* β . M. et K. *Chaerophyllum trichospermum* Schult. oestr. Fl. Zäune. besonders im südl. Geb., Böhmen, Destr. Dalmatien, Ungarn. 5. ☉

7. *A. vulgaris* Pers. K. syn. *A. Caulalis* M. v. Bieb. *Scandix Anthriscus* L. *Torilis* — Gaertn. *Caulalis Scandix Scopoli*. *C. scandicina* Roth. *C. aequicolorum* Allion. Cultivirte Orte, Zäune, Raine, Wege um Dörfer, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. Elsaß, Baden bei Rastatt, Heidelberg, Mannheim, Pfalz bei Speier, Worms bis Mainz, Kreuznach, Coblenz, Trier, Luxemburg, Berlin; Destr. Böhmen, Mähren, Lombardien. 5—6. ☉

331. *Physocaulos* Tausch. Blasenstengel. K.

syn. 348. Rchb. exc. p. 444. Comp. I. 1. p. 521.

1. *P. nodosus* Tausch. K. syn. *Scandix* — *L. Anthriscus* — Pers. Rchb. exc. *Chaerophyllum* — Lamk. *Torilis macrocarpa* Gaertn. *Biasolettia nodosa* Bertolon. Weinberge, Gebüſche, im ſüdl. Geb., Vittoral, Iſtrien bei Fiume, Dalmatien bei Spalato, Ungarn. 5—6. ☉

332. *Chaerophyllum* L. Kälberkopf. K. syn.

348. Rchb. exc. p. 444. Comp. I. 1. p. 516.

1. *Ch. temulum* L. K. syn. *Myrrhis temula* Spreng. *Scandix* — Scopol. Roth. uncultivirte, ſhattige Orte, Wiefen, Hecken, dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

2. *Ch. bulbosum* L. K. syn. *Myrrhis bulbosa* Spr. *Scandix* — Roth. Hecken, Wege, Ufer, ſtellw. dch. d. g. nördl. u. mittl. Geb., ſeltener im ſüdl., Rheing., in d. Höhgau an d. Ach, dch. Elſaß, Baden bei Kehl, Mannheim, Worms bis Mainz, Coblenz, Bonn; Nahe-, Saar- u. Moselthal, Kreuznach bis Sobernheim, Saarbrücken, Saarlouis, Trier, Eurenburg, Aachen u., Schwaben, Heſſen, Baiern, Sachſen, Thüringen, Hamburg, Hannover; Preußen; Deſtr. 6—7. ☉

3. *Ch. coloratum* L. Rchb. exc. *Myrrhis* — ta Spreng. In Gebüſchen, an Hecken in Dalmatien. 6. ☉

4. *Ch. aureum* L. K. syn. *Myrrhis aurea* Spreng. *Scandix* — Roth. Var. β . *glabriusculum*: *Ch. maculatum* Willd. Rchb. exc — γ . *glabrum*: *Ch. monogonum* Kitaib. ap. Link. DC. Walb- u. Wiefenränder, unter Gebüſchen, an Zäunen, ſtellw. dch. d. Geb. bis in d. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. ſüdl. Geb. bis in d. Lombardei; Rheing., Rheinthal bei Embs u. Markdorf, vom Jura nach d. Schwarzwalde mit d. Murg bis Raſtatt, einzeln bis Speier, häufig bei Deidesheim, Mußbach bei Worms, Alzen, im Neckar-, Tauber- u. Mainthale, Kreuznach, Schwaben, Baiern, Heſſen, Thüringen, Sachſen, Harz; Deſtr. u. 6—7. 4

5. *Ch. nitidum* Wahlenb. carp. p. 85. Maly enum. pl. austr. p. 236. Schattige Orte in d. Carpathen. 6. 4

6. *Ch. elegans* Gaud. helv. K. syn. *Ch. hirsutum* γ. *elegans* DC. prodr. Felsen d. Alpen, Schweiz an d. Gießbächen, am Fuße d. St. Bernhards u. in d. Lombardei. 7—8. 4

7. *Ch. Villarsii* Koch. K. syn. *Ch. Cicutaria* Rchb. exc. *Ch. hirsutum* Vill. Schattige Wiesen, Gebüsche, Ufer, in d. Alpen, Schweiz M. Gemmi u. stellw. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Destr. Steyermark, Tyrol, Vittoral, Lombardei; Galizien, Ungarn. 6—7. 4

8. *Ch. hirsutum* L. K. syn. *Ch. palustre* Lamk. *Ch. Cicutaria* Vill. delph. *Myrrhis hirsuta* Spreng. Scandix — Scopol. Roth. Var. β. *glabrum* Rohr et Meyer. Nahe Wiesen, Wälder, stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen; Rheing. vom Jura nach Baden, bei Billingen a. d. Schwarzwalde, d. Vogesen, d. Taunus, Werthheim, Gießen, Jena, Coblenz, Luxemburg; nördl. bis Danzig; Destr. in allen Provinzen. 7—8. 4

9. *Ch. aromaticum* L. K. syn. *Myrrhis* — ca Spreng. Walbwiesen, Haine, stellw. dch. d. Geb., Sachsen, Dresden, Meissen nach Schlesien, Frankfurt a. d. Oder; Preußen; Destr. Mähren, Böhmen, Tyrol, Galizien, Ungarn. 7—8. 4

333. *Biasolettia* Koch. *Biasolettie*. K. syn. 350. K. Taschb. 233.

1. *B. tuberosa* Koch. K. syn. *Myrrhis cynapioides* Gusson. M. Bunium α. Tenore. *Bunium cynapioides* Bertol. Freyera *tuberosa* Rchb. ap. Kitaib. Gebirge, im südl. Vittoral, Istrien Monte Maggiore, Dalmatien bei Spalto. 7—8. 4

334. *Myrrhis* Scopol. Süßholde. K. syn. 350. Rchb. exc. p. 446. Comp. I. 1. p. 525.

1. *M. odorata* Scopol. K. syn. *Scandix* — L. *Chaerophyllum odoratum* Hoffm. Thäler d. Alpen, Triften d. Boralpen u. Gebirge, Baiern, Schwaben, Rheing., in d. Vogesen, Trier in d. Eifel bei Malmédy u. Blankenheim,

Heffen auf d. Meißner, Holstein, Schlesien in d. Sudeten, Mähren, Böhmen; Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Kärnten, Krain, Vittoral, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Siebenbürgen. 6—7. 4

335. *Molopospermum* Koch. Striemensame.

K. syn. 350. Rchb. exc. p. 446. Comp. I. 1. p. 488.

1. *M. cicutarium* DC. prodr. *M. peloponnesiacum* Koch. *Ligusticum* — L. Roth. *Lig. cicutarium* Lamk. *Molospermum* — Koch. Taschb. 234. Steinige Orte d. Alpen u. Gebirge in d. südl. Kette; Schweiz Cant. Wallis, Graubünden, Tessin M. Generoso, Bellin, Südtirol, Krain M. Santo u. Matajur, Vittoral, Lombardei, Venedig, Piemont. 7—8. 4

XII. Gruppe. Smyrneen Koch. K. Taschb. 234.

336. *Echinophora* L. Stachelbolde. K. syn.

351. Rchb. exc. p. 440. Comp. I. 1. p. 527.

1. *E. spinosa* L. K. syn. Auf d. Sande, im südl. Vittoral, Istrien bei Aquileja, Dalmatien, Venedig. 6—7. 4

337. *Prangos* Lindl. DC. prodr. IV. p. 239. Maly enum. pl. austr. in add. p. 412.

1. *P. ferulacea* Lindl. DC. prodr. Bertoloni Fl. ital. III. p. 459. Maly enum. pl. austr. *Cachrys alata* Tenore. Grasse Orte d. Hochgebirge in Dalmatien. 4

338. *Conium* L. Schierling. K. syn. 351. Rchb. exc. p. 441. Comp. I. 1. p. 526.

1. *C. maculatum* L. K. syn. *Cicuta maculata* et *C. major* Lamk. *Coriandrum Cicuta* Crntz. *Coriand. maculatum* Roth. Var. β . viride: *Conium croaticum* W. et Kit. — γ . *strictum* Tratt. Auf Schutt, an Mauern, Zäunen, Wegen, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

339. *Pleurospermum* Hoffm. Rippensame.

K. syn. 351. Rchb. exc. p. 441. Comp. I. 1. p. 525.

1. *P. austriacum* Hoffm. K. syn. *Ligusticum* — Lin. L. *Gmelini* Villars., *Physospermum Gussonii* Lagas. Alpen u. Noralpen, Südschweiz u. dch. d. Alpenkette nach Destr. bis zum Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig; nördl. Hessen, Thüringerwald, Erfurt, Arnstadt, Jena, Preußen bei Elbing, Danzig, Schlesien u. in d. Sudeten nach Böhmen, Mähren, Ungarn. 7—8. 4

340. *Malabaila* Tausch. *Malabaile*. K. syn. 351.

Rchb. exc. p. 441. Comp. I. 1. p. 526.

1. *M. Hacquetii* Tausch. K. syn. *Hladnikia golacensis* Koch syn. edit. I. *Athamanta Golaka* Hacq. *Ligusticum Sprengellii* Sieb. L. *carnolicum* Host. *Pleurospermum Golaka* Rchb. exc. Hochgebirge im südl. Geb., Südtirol, Alpe Campogrossa, Krain M. Golač, v. Raibach bis Idria, Istrien 6—7. 4

341. *Physospermum* Gusson. *Blasensame*.

Rchb. exc. 442. Comp. I. 1. p. 526.

1. *P. aquilegifolium* Koch. Rchb. exc. DC. prodr. *P. commutatum* Roth. *Ligusticum aquilegifol.* Willd. *Dan-naea* — Allion. D. *sylvatica* Lag. *Smyrnum nudicaule* M. v. Bieb. Hügel im südl. Geb., Lombardei, Pavia, Turin, Oberitalien. 6—8. 4

2. *P. acteaefolium* Presl. DC. prodr. IV. p. 247. *Maly enum. pl. austr.* p. 237. Im südl. Eittoral, Istrien, Wiesen auf d. Monte Maggiore. 6—8. 4

342. *Smyrnum* L. *Smyrnum*. K. syn. 352.

Rchb. exc. p. 442. Comp. I. 1. p. 524.

1. *S. perfoliatum* Mill. K. syn. *S. Dioscorides* Spreng. Bergwälder, Waldwiesen, Zäune, am südl. Eittoral, Istrien, Fiume im Walde bei Lippiza, Triest, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Ungarn; Novarese. 4—5. ☉

2. *S. Olusatrum* L. Rchb. exc. Schattige Orte, an

Zäunen, am südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien bei Spalato, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza. 5—6. 4

XIII. Gruppe. Coriandreen Koch. K. Taschb. 235.

343. *Bifora* Hoffm. *Bifore*. K. syn. 352. Rchb. exc. p. 440. Comp. I. 1. p. 524.

1. *B. radicans* M. v. Bieb. K. syn. Thonige Acker im südl. Geb., Eittoral, Istrien, Triest, Dalmatien, Südtirol, Siebenbürgen, Lombardei; Schweiz Cant. Graubünden bei Morbegno, Bestlin. 6—7. ☉

2. *B. flosculosa* M. v. Bieb. *B. testiculata* Spreng. Rchb. exc. *B. dicocca* Hoffm. *Biforis testiculata* Roth. *Coriandrum* — tum Lin. Saatäcker im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Siebenbürgen. 7—8. ☉

344. *Coriandrum* L. *Koriander*. K. syn. 353. Rchb. exc. p. 440. Comp. I. 1. p. 464.

1. *C. sativum* L. K. syn. Saatäcker im südl. Geb., Eittoral Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Oberitalien, Galizien; im übrigen Geb., stchw. cultivirt u. verwilbert. 6—7. ☉

Siebenundfunfzigste Ordnung.

Araliaceen.

Juss. K. syn. 353. K. Taschb. 235. Rchb. exc. p. 485.

345. *Hedera* L. (V. 1.) *Epheu*. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 401.

1. *H. Helix* L. K. syn. Schattige Felsen, Mauern, alte Baumstämme dch. d. g. Geb. 10. 5

Achtundfunfzigste Ordnung.

Corneen.

DC. prodr. K. syn. 354. K. Taschb. 235. Rchb. exc. p. 202.

346. *Cornus* L. (IV. 1.) Hornstrauch (Hartriegel).

K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 256.

1. *C. sanguinea* L. K. syn. Wälder, Gebüsche, Hecken, Zäune dch. d. g. Geb. 5—6. ‡

2. *C. mas* L. K. syn. *C. mascula* L. Rchb. exc. Sonnige, steinige Hügel, besonders im südl. Geb., stellw. im mittleren Rheing. auf d. Muschelfalk bei Bilsch u. Saargemünd, Waldstellen bei Trier u. an d. Obermosel, Baiern bei Regensburg u., Sachsen, Thüringen; Oest. Böhmen, Tyrol, Krain u. auch an Zäunen, Hecken angepflanzt u. verwildert. 3—4. ‡

3. *C. suecica* L. K. syn. Schattiger Moorgrund im nördl. Geb., Oldenburg, Holstein, Ostfriesland, Jever, Helgoland, Preußen Danzig. 6—7. ‡

Neunundfunfzigste Ordnung.

Loranthaceen.

Don. K. syn. 354. K. Taschb. 235. Rchb. exc. p. 203.

347. *Viscum* L. (XXII. 3.) Mistel. K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 725.

1. *V. album* L. K. syn. Var. β . *polycoccon* Gaud. Schmarotzerpflanze besonders auf Obsthäusern, seltener auf Pappeln, Eichen, Lindenu. Nadelhölzern dch. d. g. Geb. 3—4. ‡

2. *V. Oxycedri* DC. K. syn. *Arcanthobium* — M. v. Bieb. *Razoumowskia caucasica* Hoffm. Im südl. Littoral, schmarotzend auf d. Ästen v. *Juniperus Oxycedrus*, Istrien, Insel Cherso, Dalmatien bei Spalato, Südungarn. ‡

348. *Loranthus* L. (VI. 1.) *Niemenblume*. K.

syn. *Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 624.*

1. *L. europaeus* Jacq. K. syn. Schmarogerpflanze mehr im südl. Geb. auf d. Aesten d. Eichen, Oestr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Krain, Littoral, Istrien, Kombarbei, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien. 4—5. ‡

Sechzigste Ordnung. Caprifoliaceen.

Juss. K. syn. 355. K. *Taschb. 236. Rchb. exc.*

p. 200 — 484.

I. Gruppe. Sambuceen Koch. K. *Taschb. 236.*

349. *Adoxa* L. (VIII. 4.) *Bisamkraut*. K. syn.

Rchb. exc. p. 484. Comp. I. 2. p. 34.

1. *A. Moschatellina* L. K. syn. Etwas feuchte Gebüſche, Haine, ſhattige Wiesen, Feld- u. Wegeränder ſtellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 3—4. ‡

350. *Sambucus* L. (V. 3.) *Hollunder*. K. syn.

356. Rchb. exc. p. 200. Comp. I. 1. p. 534.

1. *S. Ebulus* L. K. syn. Bruchfelder, Waldränder, Gebüſche, ſtellw. dch. d. g. Geb. 7—8. ‡

2. *S. nigra* L. K. syn. Var. β . *virens*: *S. virescens* Desf. — γ . *leucocarpa* K. syn. — δ . *laciniata*: *S. laciniata* Mill. Hecken, Zäune, Gebüſche, Wälder im g. Geb. 6—7. ‡

3. *S. racemosa* L. K. syn. Var. β . *laciniata* Koch. Gebirgswälder, an feſtigen, ſteinigen Orten, Abhänge, an Bachufern, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen; Var. β . in d. Pfalz. 3—5. ‡

351. *Viburnum* L. (V. 3.) *Schneeball*. K. syn.

356. Rchb. exc. p. 201. Comp. I. 1. p. 533.

1. *V. Tinus* L. K. syn. Steinige Orte, im g. ſüdl. Lit-

toral, Istrien zw. Triest u. Duino, Rovigno u. d. Inseln, Dalmatien bei Spalato, Piemont, Nizza. 3—4 u. 8—9. ‡

2. *V. Lantana* L. K. syn. Gebirgswälder, Gebüsche, besonders auf Thon- u. Kalkboden, dch. d. g. Geb. 5. ‡

3. *V. Opulus* L. K. syn. Var. *β. roseum* L. Etwas feuchte Waldungen, Gebüsche, Hecken, dch. d. g. Geb. 5. ‡

II. Gruppe. Lonicereen R. Br. K. Taschb. 237.

352. *Lonicera* L. (V. 1.) Lonicere. K. syn. 357
Rehb. exc. p. 201. Comp. I. 1. p. 399.

Erste Rotte. *Caprifolium* DC. K. syn.

1. *L. Caprifolium* L. K. syn. Var. *β. L. pallida* Host. — *γ. albida*: *Caprifolium italicum* R. et Schult. *Periclymenum* — Mill. Waldränder, Gebüsche, im g. südl. Geb., Destr. Südtirol, Krain u., Südschweiz; im mittl. u. nördl. Geb. wohl nur verwildert, wie besonders in d. g. Rheing. von Bregenz dch. Baden, Pfalz bis Trier, Coblenz u. 5—6. ‡

2. *L. implexa* Ait. K. syn. Var. *β. L. balearica* Viviani. Steinige, bewachsene Orte, im südl. Eittoral, Istrien bei Cilla nova, Dalmatien, Ligurien, Nizza 5. ‡

3. *L. etrusca* Savi, Santi Viagg. K. syn. Schattige Orte, in Zäunen, Hecken, im südl. Geb., Schweiz Cant. Valais; Eittoral, Istrien, Triest, Insel Veglia, Dalmatien, Combarbei, Venedig. 7—8. ‡

4. *L. Periclymenum* L. K. syn. *L. etrusca* Lej. *Periclymenum vulgare* Mill. Var. *β. L. Periclym. quercifolia* Ait. Waldränder, Gebüsche, Hecken, Zäune, dch. d. g. südl. u. mittl. Geb. in d. g. Rheing. gemein. 6—8. ‡

Zweite Rotte. *Xylosteum* DC. K. syn.

5. *L. pyrenaica* L. Rehb. exc. Gebüsche d. Vor-alpen, Südtirol Brixen bei di Ravenolo u. in Piemont. 6—7. ‡

6. *L. Xylosteum* L. K. syn. Wälber, Walbränder, Gebüſche, Hecken, dch. d. g. Geb. 5—6. ‡

7. *L. nigra* L. K. syn. Boralpen, in d. g. ſüdl. Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Bregenz, Wolfegg, Isny, Rheing. bei Stuhlingen, a. d. Belchen, Felsberg u. Kandel in Oberbaden, Württemberg bei Lauterbad, Urnagold u. Wildbad, Franken, Thüringen Sachsen zc., Destr. bis Venedig. 4—5. ‡

8. *L. caerulea* L. K. syn. Gebirge u. Boralpen, dch. d. g. ſüdl. Geb., Rheing., Breisg. a. d. Kaiſerſtuhl, Schneckenberg bei Achtfarren, bei Kleinlimburg, Bogesen im Elſaß, an d. Sulzer-Ballon im Ried bei Meiningen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Destr. Steyermark, Krain, Ungarn, Croatien, Lombardei, Oberitalien. 4—5. ‡

9. *L. alpigena* L. K. syn. Schattige Orte d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Destr. u. mit d. Flüssen in d. Niederungen bei Bregenz, Isny, Laurethal, dch. d. g. Surazug bis Basel zc. 4—5. ‡

353. *Linnaea* Gronow. (XIV. 2.) *Linnaea*. K. syn. 358. Rchb. exc. p. 201. Comp. I. 2. p. 444.

1. *L. borealis* L. K. syn. Sandige Nadelholzwälder, im Moose kriechend, besonders im nördl. Geb., Holstein dch. Mecklenburg, Pommern, Preußen, Marienwerder, Elbing, Brandenburg, Berlin bei Tegel, Lausitz, Schlesien; Böhmen, Mähren, Lombardei; Alpen, Schweiz Cant. Graubünden, Cant. Wallis, im Saasthale von Zerschmitten nach Saas, Tyrol, Salzburg. 5—6. 4

Einundsechzigste Ordnung. Stellateen.
Lin. K. syn. 358. K. Taschb. 238. Rubiaceae Rchb. exc. p. 204. Tetrandria — Monogynia Lin.

354. *Putoria* Pers. Stinkstrauch. Bl. et Fgh. Comp. I. 1. p. 254.

1. *P. calabrica* Pers. Comp. I. 1. *Ernodea montana* Rchb. exc. p. 210. *Asperula calabrica* L. *Pavetta foetisissima* Cyrill: *Sherardia foetida* Lamk. Felsen in Dalmatien bei Ragusa. 5. 5

355. *Sherardia* L. *Sherardie*. K. syn. Rchb. exc. p. 210. Comp. I. 1. p. 237.

1. *S. arvensis* L. K. syn. Aecker, Brachfelder u. uncultivirte Orte, dch. d. g. Geb. 6—10. ☉

356. *Asperula* L. *Waldmeister*. K. syn. Rchb. exc. p. 204. Comp. I. 1. p. 238.

1. *A. arvensis* L. K. syn. *A. ciliata* Moench. Aecker, Weinberge, besonders auf Kalk- u. Thonboden, dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Rheing. vom Bodensee nach Basel dch. d. Rheinfläche bis Bingen, stchw. bei Landau, Dürkheim, Callstadt, Grünstadt, Oppenheim, Kreuznach, Zweibrücken, Meisenheim, Trier, Luxemburg u. einzeln bis Gdn; Thüringen Jena; Baiern, Schlesien; Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol, Krain, Ungarn, Vittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 5—6. ☉

2. *A. laevigata* L. Rchb. exc. Bergwälder, im südlichsten Geb., Lombardei, Ligurien. 7—8. 4

3. *A. taurina* L. K. syn. *A. trinervia* Lamk. Gebirgswälder u. Boralpen, besonders im südl. Geb., Rheintal bei Embs, Schweiz Cant. Bern bei Lauterbrunnen, Boralberg, Tyrol, Steyermark, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Vittoral, Istrien bei Monfalcone, Görz, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Piemont u. 5—6. 4

4. *A. longiflora* W. et Kit. K. syn. *A. flaccida* Tenore. Bewachsene Felsen d. Boralpen, an alten Mauern im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Cant. Tessin; Südtirol, Steyermark, Kärnten, Krain, Vittoral, Istrien, Fiume, Görz, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

5. *A. Staliana* Visian. Fl. Dalm. II. Maly enum. pl. austr. p. 164. Meeresfelsen auf d. Insel Lesina in Dalmatien. 4

6. *A. scutellaris* Visian. Fl. Dalm. *A. rupestris* Rchb. exc. p. 205. *Galium rupestre* Visian. Fl. 1829. Felsen im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien bei Sabionello, M. Biokovo. 6—7. 4

7. *A. tomentosa* Tenore Bertolon. Fl. italic. Maly enum. pl. austr. p. 164. *A. commutata* R. et Schult. In Krain. 6. 4

8. *A. canescens* Visian. Fl. 1829. K. syn. in add. 446. Var. β . *hirta*; — γ . *semiglabra*; — δ . *glabra*. Steinige Orte im südl. Eittoral, Istrien, Insel Cosino, Dalmatien. 9. 4

9. *A. cynanchica* L. K. syn. *A. pyrenaica* Suter, *Galium cynanchicum* Scopoli. Sonnige Hügel, lichte Waldstellen, trockene Heiden, Triften besonders auf Kalk u. Sand, stellw. dch. d. Geb., Rheing. nicht selten. 6—7. 4

10. *A. montana* W. et Kit. Rchb. exc. *A. cynanchica* var. K. syn. Gebirgsstellen stellw. im Geb., Schweiz; Destr. Böhmen, Ungarn, Croatien, Lombard. 6—7. 4

11. *A. tinctoria* L. K. syn. *Galium tinctorium* Scopol. *Asterophyllum* — Spenner. Steinige Orte unter Gesträuche, bewachsene Felsen, Heiden, Nadelholzwälder stellw. dch. d. Geb., Rheing., Overbaden, Constanz, Maienbühl, Hechingen, an d. Schwärze bei Mühlheim, Pfalz Dürkheim, Grünstadt, Griesheim, Rierstein bis Mainz, Gonsenheim, Niederingelheim bis Bingen, Frankfurt am Schwengelbrunnen, Wertheim. Taunus, fehlt am Niederrheine; Schwaben Baiern, Thüringen, Sachsen, Preußen, Königsberg u., Schweiz selten; Destr. Böhmen, Galizien, Ungarn, Krain, Lombard, Venedig. 6—7. 4

12. *A. ciliata* Rochel. Rchb. exc. Ungarn auf d. Domuglettberg im Banat. 6—7. 4

13. *A. galioides* M. v. Bieb. K. syn. *A. glauca* Besser. *Galium glaucum* L. *G. montanum* Pollich. *G. campanulatum* Villars. Steinige Hügel an Waldrändern, Gebüsch, Hecken, besonders auf Kalk u. Sand, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Overbaden bei Engen, Hohentwiel, Basel,

Baden bei Mühlheim, Heidelberg, Elfaß, Pfalz bei Neustadt, Forst, Wachenheim, Dürkheim, Callstadt, Grünstadt, Oppenheim bis Mainz, Bingen u. Rhein abwärts bei St. Goarshausen u. Neuwied; auf dem Porphyr- u. Kohlengebirge d. Nahe u. d. Glan, Kreuznach bis Sobernheim u. Meisenheim, Luxemburg, im Mainthale bis Würzburg, Gebirge in Franken, Jena, Baiern, Regensburg, Sachsen, Harz; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig. 5—7. 4

14. *A. hexaphylla* Allion. pedm. Rchb. exc. *A. Allionii* Baumg. *A. capitata* Kitaib. Felsen d. Kalkgebirge, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont. 7—8. 4

15. *A. odorata* L. K. syn. Schattige Wälder, Gebüsche, Hecken, besonders in d. Gebirgen, im g. südl. u. mittleren Geb., im nördl. seltener, Preußen bei Königsberg, Danzig u. 5—6. 4

16. *A. Aparine* Schott. M. v. Bieb. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *A. rivalis* Sibth. Rchb. exc. Feuchte Gebüsche, Bachufer, stellw. im Geb., Schlesien bei Kleschau, Oberufer bei Ottwitz am Damm u., Mähren an d. Zwittza bei Brünn, Galizien, Ungarn. 7—8. 4

357. *Crucianella* L. Kreuzblatt. K. syn. 360. Rchb. exc. p. 204. Comp. I. 1. p. 237.

1. *C. latifolia* L. Rchb. exc. Var. β . *C. monspeliaca* L. Sandige Orte im südl. Eittoral, Dalmatien. 6—7. ☉

2. *C. angustifolia* L. K. syn. Sandboden im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien. 6—7. ☉

3. *C. molluginoides* M. v. Bieb. K. syn. *Asperula* — Rchb. exc. p. 206. Steinige Gebirgsstellen im südl. Geb., Krain an d. Rahlenberg bei Laibach, Ungarn. 7—8. 4

358. *Rubia* L. Färberröthe (Krapp). K. syn. 361. Rchb. exc. p. 210. Comp. I. 1. p. 255.

1. *R. tinctorum* L. K. syn. Fäune, Mauern im südlichsten Geb. u. stellw. im mittleren verwildert, Schweiz

Cant. Wallis bei Sitten, Rheing., Elsaß, Pfalz bei Speier u. stchw. angebaut. 6—7. 4

2. *R. peregrina* L. K. syn. *R. tinctorum* Scopol. *R. anglica* Huds. *R. Bocconi* Portenschl. Hecken, Zäune im südl. Littoral, Istrien bei Rovigno u. d. Inseln, Dalmatien, Venedig, Genua. 5—6. 4

359. *Galium* L. Labkraut. K. syn. 361. Rchb. exc. p. 206. Comp. I. 1. p. 241.

Erste Rotte. *Cruciata* Tournef. K. syn.

1. *G. Cruciata* Scopol. K. syn. *G. cruciatum* Smith, *Vailantia Cruciata* L. *V. ciliata* Opitz. Presl. *V. chersoniensis* Willd. Var. β . *laevipes*: *Vail. Cruciata* Willd. Presl. Baldwiesen, Wiesenränder, Zäune, Hecken, Raine im g. Geb. 4—5. 4

2. *G. vernum* Scopol. K. syn. *G. Bauhini* R. et Schult. *Vailantia glabra* L. *G. Halleri* R. et Schult. Var. β . *ramosum* Rochel bann. Etwas feuchte, schattige Wälder, Wiesen im südl. u. westl. Geb., Thüringen, Jena an d. Leuchtenberg; Schlesien nach Destr. Mähren, Galizien, Ungarn, Kärnthen, Südtirol; Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen. Lombardei, Schweiz Cant. Tessin, Venedig, Oberitalien. 5—6. 4

3. *G. pedemontanum* Allion. K. syn. *Vailantia* — a Bellard. *V. hispida* Lumn. Var. β . *G. retrorsum* DC. Son- nige Sandstellen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Bettlin bei Cleven; Destr. am Dornbach bei Wien, Littoral, Istrien, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn, Lombardei, Venedig, Piemont. 5—6. ☉

Zweite Rotte. *Aparine* Koch. syn.

4. *G. murale* All. pedm. Rchb. exc. *G. minimum* R. et Schult. *Sherardia muralis* L. Im südl. Littoral, Dalmatien an d. Insel Vessina, Lombardei, Venedig. 4—5. ☉

5. *G. saccharatum* All. pedm. K. syn. *G. verru-*

cosum Smith. *G. Vailantia* Web. Host. *Vailantia* Aperine L. *V. saccharata* Gmel. bad. Aecker, Weinberge, mehr im südl. Geb., im mittleren stellw., Rheing. bei Basel, Jena, Thüringen, Halle, Wansleben u. Kölsme, Merseburg, Bennstädt, Braunschweig; Destr. Böhmen, Dalmatien, Ungarn. 6—7. ☉

6. *G. tricornis* Withering. K. syn. *G. spurium* Roth, Schrad. *G. Vailantia* Wigg. *V. Aparine* Pollich, *V. tricornis* Roth, *V. biflora* Lamk. . Saatäcker besonders auf Kalk u. Thonboden, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten, von Basel bis Bingen, Coblenz, Köln, im Nahe-, Blies-, Saar- u. Moselthale, Kreuznach bis Trier, Zweibrücken, Saarbrücken, Luxemburg u. 6—9. ☉

7. *G. trifidum* L. K. syn. Schlammige Torfgründe in Obersteyermark am Bürgersee, im Seethale bei Judenburg. 7—8. 4

8. *G. Aparine* L. K. syn. Var. β . *G. Valantii* DC. *G. infestum* W. et Kit. *G. agreste* α . *echinospermum* Wallr. — γ . *G. spurium* L. *G. hispidum* Roth, *G. agreste* β . *lejospermum* Wallr. Aecker, an Säunen, Hecken, dch. d. g. Geb.; Var. γ . auf Kalk- u. Thonboden, Aecker stellw., Rheing., Coblenz, Trier u. 6—9. ☉

9. *G. tenerum* Schleich. Gaud. helv. K. syn. edit. I. Rechb. exc. Stellw. im Geb., Rheing., auf d. höchsten Gebirgen d. Vogesen sandsteins zw. Weissenburg, Pirmasens u. Bitsch, auf d. Hinterfelsen u. d. Erlenkopf; F. Schulz; Hochalpen d. Schweiz, Cant. Bern, M. Gemmi, Cant. Wallis, Nicolaithal bei Zermatten. 6—7. ☉

10. *G. parisiense* L. Tausch. K. syn. *G. gracile* M. et K. Var. α . *trichocarpum* Tausch. *G. parisiense* L. *G. litigiosum* DC. *G. minutiflorum* Brot. — β . *lejocarpum* Tausch. *G. anglicum* Huds. *G. gracile* Wallr. *G. rubrum* Pollich. *G. anglicum* α . K. syn. edit. I. Aecker, unter d. Saat besonders auf Kalk u. Lds, im südl. u. westl. Theile d. Geb., Rheing., Oberbaden, Elsaß bei Hünningen, Breisg. auf d. Kaiserstuhl, Mannheim, Pfalz bei Kallstadt, Stetten bei Kirchheimboland, Westhofen, Freinsheim, Worms, Mainz,

zw. Bingen u. Ockelheim, Coblenz bei Kettig, Brachfelder auf d. Mayenfeld bei Dichtendung, Mayen, Obermosel bei Erier, Thüringen Jena, nördl. bei Hamburg; Südschweiz, Vittoral, Istrien um St. Daniel, Dalmatien, Kombarbei. 6—8. ☉

11. *G. setaceum* Lamk. DC. prodr. Maly enum. pl. austr. p. 162. *G. capillare* Cavan. Waldstellen in Dalmatien auf d. Insel Lesina. 7. ☉

12. *G. divaricatum* Lamk. Rehb. exc. *G. tenue* Vill. delph. *G. parisiense* γ. *divaricatum* K. syn. in add. 1025. Sandboden im südl. Vittoral, Dalmatien, Croatien, Istrien, Venedig, Ungarn. 7—8. ☉

13. *G. uliginosum* L. K. syn. Feuchte, moosige oder torfhaltige Wiesen, Gräben, Sümpfe, dch. d. g. Geb. 5—7. 4

14. *G. palustre* L. K. syn. Sumpfige, moorige Orte dch. d. g. Geb. 5—7. 4

Dritte Rotte. *Platygalium* DC. K. syn.

15. *G. rotundifolium* L. K. syn. *G. decipiens* Ehrh. Var. β. *G. ellipticum* Willd. enum. *G. rotundifolium* Jacq. Schattige Wälder, Haine, stellw. dch. d. mittlere u. südl. Geb. bis in d. Boralpen, Rheing. bei Wolfegg, Rislegg, Wangen, Pforzheim in Württemberg, Baden bei Karlsruhe, Franken bei Werthheim, Schweiz längst d. Alpenkette bis Bregenz, Vogesen, Thüringen, Jena, Schlesien dch. Mähren, Böhmen, nach Destr. Galizien, Ungarn, Kombarbei. 7—8. 4

16. *G. boreale* L. K. syn. Var. β. *intermedium*. — γ. *hyssopifolium*: *G. hyssopifolium* Hoffm. *G. rubioides* Pollich. — δ. *G. diffusum* Schrad. Wälder, Waldwiesen, Heiden, bewachsene Felsen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. Bregenz, Lindau am Bodensee, Pforzheim, Hagenau, Speier, Pfalz, Hasloch, Forst, Marbors, Bitsch, Niederbronn, Eppstein, Kaiserslautern, Bingen bei Rempten, Gaulsheim, St. Goar, Berncastel a. d. Mosel u. 7—8. 4

17. *G. rubioides* L. K. syn. Waldwiesen, Waldbrän-

der im südl. Geb., Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Lombard. 5—6. 4

Vierte Rotte. *Eugaliu*m DC. K. syn.

18. *G. Mollugo* L. K. syn. Var. β . *G. aristatum* DC. — γ . *G. scabrum* Withering. *G. tyrolense* Willd. Waldstellen, Saune, Wiesen, Begeränder, Raine, bch. b. g. Geb. 5—8. 4

19. *G. firmum* Tausch. Comp. I. p. 217. In Dalmatien. 4

20. *G. aureum* Visian. Fl. Dalm. Maly enum pl. austr. p. 162. Steinige Orte in Dalmatien. 4

21. *G. nitidum* Willd. Rchb. exc. *G. Kitaibelianum* R. et Schult. Sonnige Gebirgsstellen in Ungarn u. Siebenbürgen. 4

22. *G. lucidum* Allion. pedm. K. syn. Rchb. exc. *G. erectum* Huds. DC. *G. rigidum* Vill. delph. *G. cinereum* Schleich. Var. β . *angustifolium*: *G. tenuifolium* Allion. Wulf. *G. corrudaefolium* Vill. — γ . *cinereum*: *G. cinereum* Allion. pedm. Rchb. exc. Steinige, uncultivirte Orte besonders im südl. Geb., Schweiz im Unterwallis, Belgien; Destr. Südtirol, Steyermark, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombard, Venedig, Ungarn, Piemont, Nizza, Oberitalien. 5—6. 4

23. *G. ochroleucum* Kitaib. Rochel. bann. Maly enum. pl. austr. p. 163. *G. vero* — *Mollugo* Comp. I. 1. p. 250. Steinige Orte an d. Donau in Ungarn. 5—7. 4

24. *G. insubricum* Gaud. K. syn. 365. et add. 1025. Steinige Orte in d. südl. Schweiz Cant. Tessin. 6—8. 4

25. *G. rubrum* L. K. syn. Var. β . *G. obliquum* Vill. Wulf. Trevir. *G. mucronatum* Lamk. Trockene Gebirgswiesen im südl. Geb., Schweiz in d. südl. Thälern d. Cant. Graubünden, Cant. Tessin; Destr. Südtirol, Littoral, Lombard, Venedig, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont. 6—7. 4

26. *G. aristatum* L. K. syn. *G. laevigatum* Lin. sp. *G. polymorphum* β . *angustifolium* Knaf. Var. α . *scabrius-*

culum: *G. aristatum* Gaud. — β . *laevigatum*: *G. lini-folium* Lamk. DC. Schattige Gebirgsstellen im südl. Geb., Südschweiz bei Genf u. Lugano; Destr. Steyermark, Kärnthen, Tyrol bei Bogen, Vittoral, Istrien, Kombarbei, Ungarn, Piemont u. 7—8. 4

27. *G. capillipes* Rehb. exc. p. 847. In Ungarn, Comit. Krasso im Banat. 7. 4

28. *G. sylvaticum* L. K. syn. *G. laevigatum* Vill. delph. Var. β . *pubescens* DC. Wälder dch. d. g. Geb. 6—7. 4

29. *G. intermedium* Schult. oestr. Fl. Maly enum. pl. austr. p. 163. *G. Schultesii* Vest. *G. sylvaticum* Besser galic. Schattige Orte, unter Gesträuchen in Galizien. 4

30. *G. verum* L. K. syn. Var. β . *G. ochroleucum* Wolf. Wiesen, Triften, Wald: u. Wegeränder im g. Geb. 6—10. 4

31. *G. purpureum* L. K. syn. *G. rubrum* DC. Fl. fr. Roth. Sonnige, steinige Orte im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin; Südtirol, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Kombarbei, Venedig. Ungarn, Oberitalien. 7—8. 4

32. *G. sylvestre* Pollich. K. syn. *G. multicaule* Wallr. *G. decipiens* Roth enum. Var. α . *glabrum* Schrad. *G. affine* Roth, *G. multicaule* α . *polyphyllum* Wallr. *G. sylvestre vulgatum* Gaud. *G. umbellatum* α . Lamk. *G. pusillum* Smith. *G. laeve* Thuill. *G. anisophyllum* et *G. montanum* Vill. — β . *alpestre* Gaud. *G. alpestre* R. et Schult. DC. prodr. *G. argenteum* Villars. — γ . *hirtum*: *G. sylvestre* III. *pubescens* Schrad. *G. multicaule eriophyllum* Wallr. *G. sylvestre* III. Bocconi Gaud. helv. *G. Bocconi* Allion. pedm. DC. prodr. *G. umbellatum* β . Lamk. *G. scabrum* Pers. *G. nitidulum* Thuill. *G. asperum* Schreb. — δ . *supinum* Gaud. helv. *G. sylvestre* ϵ . *supinum* M. et K. *G. supinum* Lamk. Waldländer, Heiden, Triften bis in d. Alpen, stellenw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

33. *G. pumilum* Lamk. K. syn. *G. trichophyllum* Allionii, Wulf. Var. β . *G. hypnoides* Vill. delph. — γ . *hirtum*: *G. pusillum* L. *G. pumilum* δ . *pubescens* DC.

prodr. *G. pumilum* β . *hirtellum* Gaud. — δ . *caespitosum*: *G. Jussieui* Vill. — ϵ . *G. sudeticum* Tausch. Sonnige, steinige Gebirgsstellen, Destr. Calvariberg bei Wien, auf d. Alpen in Steyermark, Krepenseralp bei St. Lambert, Südtirol, Vittoral, Piemont, Südschweiz. 6—7. 4

34. *G. saxatile* L. K. syn. *G. hercynicum* Weigel. *G. montanum* Huds. *G. corsicum* Tausch. Feuchte, steinige Orte, Triften im mittleren u. westl. Geb., auf Torfheiden im nördl. Rheing., v. Oberelsaß u. Oberbaden bis in d. Niederlanden, Coblenz, Trier, Aachen, Eöln, Düsseldorf, dch. Westphalen nach dem nördl. Deutschland, Harz, Saufiß, Schlesien; Destr. Böhmen, Steyermark, Tyrol, Schweiz u. 7—8. 4

35. *G. helveticum* Weigel. K. syn. *G. badense* Spreng. *G. saxatile* Suter, Lamk. *G. rupicola* Bertoloni. Riefige Orte d. Alpen an Felsen, Schweiz auf d. Jura, M. Weifenstein, M. Foully u. Enzeindaz, Alpen in Baiern u. auf Isarbänken, Tyrol an d. Radstädter Tauern, Steyermark, Kombarbei, Venedig. 7—8. 4

36. *G. pyrenaicum* Gouan. Rchb. exc. *G. muscoides* Lamk. Auf d. Apuanischen Alpen. 6—7. 4

37. *G. maritimum* Rchb. exc. Sonnige Felsen am Meerufer, Piemont bei Nizza. 6—7. 4

38. *G. pubescens* Schrad. Rchb. exc. *G. hirsutum* Ait. In Ungarn bei Ofen an d. Gerhardsberg. 6—7. 4

360. *Vailantia* DC. *Vailantie*. K. syn. 368. Rchb. exc. p. 206. Comp. I. 1. p. 254.

1. *V. muralis* L. K. syn. Steinige Orte, an Mauern im südl. Vittoral, Istrien u. d. Inseln, Dalmatien, Croatien, Venedig. 5—6. ☉

2. *V. hispida* L. Rchb. exc. Sandige Wiesen an Zäunen im südl. Vittoral, Piemont, Pannonien. 5—6. ☉

Zweihundsechzigste Ordnung.

Valerianeen.

DC. prodr. K. syn. 369. K. Taschb. 244. Rchb. exc. p. 197.
Triandria — Monogynia Lin.

361. *Valeriana* L. *Baldrian*. K. syn. Rchb. exc.
p. 199. Comp. I. 1. p. 55.

1. *V. exaltata* Mikan. K. syn. *V. officinalis* β . *altissima* K. syn. edit. I. *V. altissima* Hornem. *V. multiceps* Wallr. Feuchte Wälder, schattige Ufer. stellw. dch. d. Geb., Rheing., Bodensee bei Seefeldern u., in Baden bei Durlach, Heidelberg, Mannheim, u. stellw. bis z. Niederrheine; Baiern, Sachsen, Jena, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Krain, Siebenbürgen, Lombardien. 7—8. 4

2. *V. officinalis* L. K. syn. Var. α . *major*: *V. officinalis* β . *media* K. syn. edit. I. *V. procurrens* Wallr. — β . *angustifolia* Tausch. *V. collina* Wallr. *V. officinalis* β . *minor* Koch. Wälder, Gebüsche, feuchte, schattige Orte, Ufer im g. Geb. 5—6. 4

3. *V. sambucifolia* Mikan. K. syn. Var. β . *elatior*: *V. repens* Host. Feuchte Gebüsche, Haine, stellw. im Geb., Rheing. v. Bingen, Coblenz u. bis in d. Niederlanden, Baiern, an d. Elbe bei Hamburg, Preußen bei Königsberg, Danzig, Schlesien im Elbegrund d. Sudeten u. bei Frankfurt a. d. O.; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Ungarn. 6—8. 4

4. *V. Phu* L. K. syn. In Gebüschen stellw. im Geb., Rheing. zw. Verviers u. Limburg unweit Aachen, in Belgien, an Fischteichen in d. Sudeten, im südl. Geb. in d. Novarese Valle Tanoblana, Alpen d. Schweiz bei Chateaubun u.; auch in Gärten u. stellw. im Geb. verwildert. 6—7. 4

5. *V. dioica* L. K. syn. Var. β . *simplicifolia* Rchb. Nasse, sumpfige, grasige Orte, Waldstellen dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 5—6. 4

6. *V. tuberosa* L. K. syn. Sonnige, grasige Hügel

im südl. Geb., Südkrain, Littoral, Istrien, Triest, Dalmatien, Lombardei, M. Balbo, Piemont, Oberitalien. 5. 4

7. *V. tripteris* L. K. syn. Var. β . *V. intermedia* Vahl. Hoppe. — γ . *V. heterophylla* Baumg. Alpen, Vor-alpen, Hochgebirge u. mit d. Flüssen in d. Niederungen, stellenw. dch. d. südl. u. westl. Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Würtemberg, Schwarzwald, Vogesen, M. Beldchen, Hoheneck, mit d. Furzug nach Basel in d. Rheing., Oberbadern, Hohentwiel, auf d. Feldberg u. in d. Hölle im Breisg., Baiern, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren u. allen Provinzen Oestreichs. 5—8. 4

8. *V. montana* L. K. syn. Alpen, Boralpen u. Hochgebirge mit d. Vorhergehenden, aber nicht in Schlesien; Schweiz besonders dch. d. g. Furzug, Rheing. nur bis Basel. 6—8. 4

9. *V. italica* Lamk. Rehb. exc. in add. 6. p. 847. Gebirgen Piemont, Ligurien, Genua. 7—8. 4

10. *V. supina* L. K. syn. Feuchte, tiefige Orte d. südl. Alpenzuges; Schweiz Cant. Graubünden an d. Bernina u. Fraelen; Südtirol M. Schlehren, Kirchbaumeralp, Steyermark, Kärnthén, Littoral Istrien, Lombardei, Benedig. 7—8. 4

11. *V. saliunca* Allion. pedm. K. syn. Hochalpen im südl. Alpenzuge; Schweiz Cant. Wallis auf d. Foully über d. See, Cant. Freiburg auf d. Mortais; Savoyen, Piemont, Lombardei. 7—8. 4

12. *V. saxatilis* L. K. syn. Kalkfelsen d. Boralpen Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Carpathen in Mähren, Krain, Littoral, Istrien, Siebenbürgen bis in d. Lombardei. 6—7. 4

13. *V. elongata* Jacq. K. syn. Kalkfelsen d. Hochalpen, in d. südl. Kette; Destr. Steyermark nach Kärnthén, Tyrol M. Schlehren nach Krain, Littoral, Istrien, Siebenbürgen. 6—7. 4

14. *V. celtica* L. K. syn. Granitfelsen d. Hochalpen, in d. südl. Kette, Südschweiz Cant. Wallis im Saasthale

an d. Monte Rosa, M. Moro am Gletscher im Gerölle;
Oestr. Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Obersteiermark in d.
Zugspitze, Alpen, Lombardei, Piemont, Oberitalien. 7—8. 4

362. *Centranthus* DC. Spornblume. K. syn.

371. Rchb. exc. p. 197. Comp. I. 1. p. 57.

1. *C. angustifolius* DC. K. syn. *Valeriana* — a. Mill. *V. rubra* β. L. *V. monandra* Vill. delph. Steinige Orte, Gebirgsstellen; Schweiz im Jura auf d. Creux du Bau; Savoyen, Piemont. 7—8. 4

2. *C. ruber* DC. K. syn. *Valeriana* — a. L. Felsen, Mauern im südl. Geb. Schweiz Cant. Wallis am Schloß Tourbillon bei Sitten; Südtirol bei Bogen, Eittoral, Istrien, Triest, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. 6—8. 4

3. *C. Calcitrapa* DC. Rchb. exc. *Valeriana* — L. Steinige, sonnige Orte, im südlichsten Geb., Piemont um Nizza. 4—5. ☉

363. *Valerianella* Pollich. palat. Feldsalat.

K. syn. 371. K. Taschb. 246. Rchb. exc. p. 198.
Comp. I. 1. p. 58.

1. *V. olitoria* Pollich. K. syn. *Valeriana* — Willd. Sturm. *V. Locusta* Smith. *V. Locusta-olitoria* L. *Fedia olitoria* Vahl. *F. striata* Steven, *F. Locusta* Rchb. pl. crit. Var. β. *lasiocarpa* Rchb. icon. Cultivirte Orte, an Rainen, Felbrändern u., dch. d. g. Geb. 4—5. ☉

2. *V. carinata* Loisl. K. syn. *Fedia* — DC. Cultivirte Orte, Brachfelder, Weinberge, Raine u., dch. d. g. besonders im südl. u. mittl. Geb., in d. g. Rheing. nicht selten. 4—5. ☉

3. *V. costata* Betke. Rchb. exc. *Fedia* — Steven. Hecker bei Gölleba in Thüringen. 4—5. ☉

4. *V. echinata* DC. K. syn. *F.* — Vahl. *Valeriana* — L. Cultivirte u. uncultivirte Orte im südl. Eittoral, Krain, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 4—5. ☉

5. *V. eriocarpa* Desv. K. syn. *Fedia* — Rchb.

icon. *F. campanulata* Presl. *F. rugulosa* Steven. *F. muricata* R. et Schult. Var. β . *lasiocarpa*. Cultivirte Orte, besonders im südl. Geb., Rheing., Elsaß bei Benfeld, Boppard, Coblenz bei Moselweis, Sachbach bei Ems, Trier, Luxemburg; Ungarn, Vitorral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig. 4—5. ☉

6. *V. pumila* DC. *V. membranacea* Loisl. Rchb. exc. *V. multifida* Gouan. *Fedia pumila* Vahl. Rchb. icon. *Valeriana* — Willd. Ungarn a. d. Gerhardt-Berg bei Ofen. 5. ☉

7. *V. Stevenii* * *Fedia tridentata* Steven. Koch syn. in not. *V. Auricula* p. 373. Im südl. Geb., Weingärten, in Piemont um Nizza. 4—5. ☉

8. *V. Morisonii* DC. K. Taschb. 247. *V. dentata* Pollich. Fries. K. syn. Var. β . *lejocarpa*: *V. Morisonii* β . DC. *Fedia dentata* Vahl. — β . *lasiocarpa*: *V. Morisonii* α . DC. *V. mixta* Dufresn. *V. pubescens* Merat. *V. microcarpa* Loisl. *Fedia dentata* β . M. et K. *F. dentata* *dasicarpa* Rchb. *F. dasicarpa* Steven. *F. Morisonii* Spreng. Wallr. Hecker, besonders unter d. Saat, Weinberge, stchw. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

9. *V. pubercula* DC. prodr. Bertol. Fl. ital. I. p. 189. Maly enum. pl. austr. p. 104. *Fedia microcarpa* Rchb. pl. erit. Cent. II. f. 224. Im südl. Geb., Dalmatien. 6. ☉

10. *V. Auricula* DC. K. syn. Rchb. exc. *Fedia* — M. et K. Rchb. icon. *F. olitoria* Gaertn. Var. β . *nana*: *V. laxiflora* Dufresn. R. et Schult. — γ . *lasiocarpa*: *Fedia Auricula* β . *dasicarpa* Rchb. — δ . *dentata*: *V. dentata* DC. prodr. K. syn. edit. I. *V. rimosa* Bast. *Fedia tridentata* Rchb. non Steven. *Valerianella tridentata* Rchb. exc. Saatacker, besonders auf Kalk- u. Thonboden u. auf kalkhaltigem Sande, stchw. dch. d. g. Geb. Var. δ . in Sachsen zw. Dresden u. Meissen; Stammart in d. Rheing. an vielen Orten, Pfalz Dürkheim, Oggersheim, Worms bis

Mainz, Bingen, Coblenz u., Kreuznach bis Trier, Luxemburg u. 7—8. ☉

11. *V. discoidea* Loisl. Rchb. exc. Fedia — Vahl. *Valerianella coronata* β . *discoidea* DC. prodr. Dalmatien bei Spalato. 4—5. ☉

12. *V. coronata* DC. Fl. fr. K. syn. Fedia — Rchb. pl. crit. Vahl. *Valeriana Locusta* γ . *coronata* L. Var. β . *integrifolia*: *V. hamata* Bast. DC. prodr. Rchb. exc. Cultivirte Orte, besonders im südl. Geb., Rheing. auf Divrit am östlichen Fuße d. Donnersberges, Hannover, Göttingen, Stettin; Südtirol, Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig, Ungarn; Belgien bei Lüttich. 4—6. ☉

13. *V. lasiocephala* Betke. Maly enum. pl. austr. p. 104. Fedia — Rchb. pl. crit. Grasige Hügel in Ungarn. ☉

14. *V. vesicaria* Moench. K. syn. Fedia — Vahl. *Valeriana Locusta* β . *vesicaria* L. Unter d. Saat in Dalmatien u. in Belgien um Lüttich. 5—7. ☉

Dreihundsechzigste Ordnung.

Dipsaceen.

DC. K. syn. 374. K. Taschb. 248. Rchb. exc. p. 192.

364. *Dipsacus* L. (IV. 1.) Karden. K. syn. Rchb. xc. p. 197. Comp. I. 1. p. 216.

1. *D. Botteri* Maly. Maly enum. pl. austr. p. 105 et in App. p. 377. Sumpfige Orte an d. Narenta in Dalmatien. 7. ☉

2. *D. sylvestris* Mill. K. syn. *D. fullonum* Pollich. *D. fullonum* α . Lin. *D. vulgaris* Gmel. Var. β . *pinnatifidus* K. syn. Feuchte Felser, Begeränder, Gräben, Raine, Dämme, Bäume, stellenw. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉ et ☉

3. *D. laciniatus* L. K. syn. Feuchte Tristen, an Gräben, stellenw. dch. d. Geb., Schweiz bis Basel, Rheing. dch. Oberelsaß bei Lauterberg, Baden Mannheim, Pfalz bei Marx-

dorf, Lambshheim, Lomersheim, Oggersheim, Worms, Frankfurt a. M., Luxemburg, Limburg unweit Aachen; Baiern Sachsen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Krain, Oberitalien. 7—8. ☉

4. *D. fullonum* Mill. K. syn. Cultivirt u. stellw. im Geb. verwildert. 7—8. ☉

5. *D. ferox* Loisl. Rehb. exc. Im südl. Vittoral, Piemont, Corsika, angebl. in Destr.? 7—9. ☉

6. *D. pilosus* L. K. syn. *Cephalaria appendiculata* Schrad. Feuchte Waldstellen, an Gräben, Ufern, Hecken, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., dch. Elsaß, Baden im Breisg., Rastatt, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Bergstraße bis Frankfurt, Nassau, Nahe, Kreuznach, Winterburg bis Meisenheim, Moselthal, Luxemburg, Trier bis Coblenz, Brohlthal, Ahrthal bis ins Siebengebirge zc., besonders im südl. u. mittleren Geb., im nördl. bis Westpreußen zc. 7—8. ☉

365. *Cephalaria* Schrad. (IV. 1.) *Cephalarie*.

K. syn. 375. *Succisa* Rehb. exc. p. 196. Comp. I. 1. p. 217.

1. *C. alpina* Schrad. K. syn. *Scabiosa* — L. *Succisa* — Spr. Rehb. exc. Alpen d. südwestl. Schweiz, Helener-Alpen, auf d. Gryon über Ber, im Jura auf d. Salève bei Genf, Piemont. 6—7. 4

2. *C. transylvanica* Schrad. K. syn. *Scabiosa* — L. *Succisa* — Spr. Hecken, Weinberge, Aefferränder, im südl. Geb., Vittoral, Istrien, im Walde v. Vipizza, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 7—8. ☉

3. *C. leucantha* Schrad. K. syn. *Scabiosa* — L. *Sc. Trenta* Haecq. *Succisa leucantha* Spr. Rehb. exc. Sonlige, grasige Gebirgsstellen im südl. Geb., Krain, Monte Trenta, Vittoral, Istrien bei Gemona, Croatien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, Oberitalien. 7—8. 4

4. *C. centauroides* Coult. Bl. et Fgh. Comp. I. 1. p. 218. *Scabiosa* — L. Lamk. *Sc. laevigata* W. et Kit.

Succisa corniculata Rchb. exc. Var. β . *corniculata*: *Scabiosa corniculata* W. et Kit. Rchb. pl. crit. *Cephalaria* — R. et Schult. — γ . *uralensis*: *Scabiosa* — Murray. Host. *Succisa* — Rchb. exc. Gebirge, sonnige Hügel in Ungarn u. Siebenbürgen. 7—9. 4

366. *Knautia* Coult. (IV. 1.) *Knautie*. K. syn.

376. K. Taschb. 249. Comp. I. 1. p. 219.

1. K. *hybrida* Coult. K. syn. *Scabiosa* — Allioni Rchb. exc. p. 191. *Trichera* — R. et Schult. T. *mutabilis* Schrader. *Scabiosa lyrata* Lamk. Sc. *bidens* Sibth. Rchb. exc. Var. β . *integrifolia*. *Scabiosa integrifolia* L. Rchb. exc. Hügel, Weingärten, an Zäunen, im südl. Vittoral, Istrien bei Gause, Insel Dsero, Dalmatien, Ungarn. 6—7. ☉

2 K. *longifolia* Koch. K. syn. *Scabiosa* — Host. W. et Kit. Rchb. exc. p. 199. *Scab. sylvatica* β . *longifolia* M. et K. DC. prodr. Triften d. Alpen u. Boralpen; Destr. Böhmen, Steyermark, Kärnthen auf d. Pasterze, Tyrol Seiseralp, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Schweiz. 6—7. 4

3. K. *sylvatica* Duby. K. syn. *Scabiosa* — L. Rchb. exc. Var. β . *Scab. dipsacifolia* Host. Rchb. exc. Gebirgswälder, stchw. dch. d. südl. u. mittlere Geb., Rheing. dch. Elsaß, Baden im Breisgau bei Freiburg, Rastatt, Heidelberg, Pfalz, Speier, Gernsheim, Siegburg bei Bonn, Mühlheim bei Köln u., Naheg. bei Oberstein, Saar- u. Moselg., Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Malmédy, Aachen u. Var. β . in d. Alpen von Destr. Steyermark, Tyrol, Krain. 7—8. 4

4. K. *arvensis* Coult. K. syn. *Scabiosa* — L. Rchb. exc. Sc. *variabilis* F. W. Schultz, er vereint damit Sc. *arvensis*, Sc. *sylvatica* et Sc. *longifolia* W. et Kit. Var. β . *campestris*: Sc. *campestris* Besser. Rchb. exc. — γ . *collina*: Sc. *collina* Duby Rchb. exc. — δ . *pubescens*: Sc. *pubescens* W. et Kit. — ϵ . *glandulifera* Freyer. Sc. *trivialis* Rchb. Wälder, Wiesen, Wege, Felder, dch. d. g.

Geb. Var. γ . u. δ . Dalmatien, Ungarn, ϵ . in Krain.
7—8. 4

5. K. Fleischmannii Maly enum. p. 106. Scabiosa
— Rchb. Fl. germ. exsicc. K. arvensis γ . rigidula K.
syn. Ralfsgebirge in Krain bei Germada u. Octovsz. 7. 4

6. K. ciliata Coult. Scabiosa — Spr. Rchb. exc.
Trichera — R. et Schult. Waldwiesen in Mähren auf
d. kleinen Schneeberg u. in Ungarn bei Fünffkirchen. 7—8. 4

7. K. montana DC. Scab. tatarica L. Rchb. exc.
Sc. montana M. v. Bieb. Trichera — R. et Schult.
Knautia arvensis var. Coult. An Gräben in Ungarn bei
Tyrnau u. Lautschitz. 6—7. 4

367. Pterocephalus Vaill. (IV. 1.) Feder=
Scabiose. Rchb. exc. p. 192. Comp. I. 1. p. 222.

1. P. plumosus Coult. Rchb. exc. Knautia — L.
Scabiosa — Sibth. Sc. papposa Host. Sc. Wilichii Link,
Cephalaria — R. et Schult. Gebirgsstellen in Dalmatien.
6—7. ☉

368. Succisa M. et Koch. (IV. 1.) Teufelsabbiss.

K. syn. 377. K. Taschb. 250. Rchb. exc. p. 196.

1. S. pratensis Moench. K. syn. Scabiosa Succisa
L. Asterocephalus — Wallr. Var. β . glabrata. Feuchte
Wiesen, Triften, Heiden, Wälder, dch. d. g. Geb. 7—9. 4

2. S. australis Rchb. Rchb. exc. K. syn. Scabiosa
— Wulf. M. et K. Sc. repens Brign. Host. Fl. austr.
Sumpfige, schlammige Orte, im südl. Geb., Destr. Steyer-
mark, Kärnthen, Südtirol, Littoral, Istrien bei Monfalcone,
Aquila, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig, Ober-
italien, Ungarn. 8—9. 4

369. Scabiosa L. R. et Schult. syst. (IV. 1.)

Scabiose. K. syn. 377. K. Taschb. 250. Asteroce-
phalus. Rchb. exc. p. 192. Comp. I. 1. p. 223.

1. Sc. gramuntia L. K. syn. Sc. Columbaria. ϵ .

gramuntia DC. Sc. ceratophylla Tenore, Asterocephal.
gramuntius Rchb. exc. Var. α . agrestis: Sc. agrestis W.
et Kit. Asterocephal. — Rchb. exc. Sc. lejocephala Hoppe
M. et K. Sc. Styriaca Vest. — β . mollis: Sc. mollis
Willd. Sc. capillata R. et Schult. — γ . tomentosa: Sc.
mollissima DC. Sc. pyrenaica All. pedm. Grasige Gebirgs-
stellen im südl. Geb., Steyermark, Tyrol, Krain, Littoral
Fstrien, Croatien, Dalmatien, Kombardei, Venedig, Oberita-
lien. 6—7. 4

2. Sc. bannatica W. et Kit. Asterocephalus ban-
naticus Rchb. exc. Sc. diversifolia Baumg. Grasige Felsen
in Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

3. Sc. ochroleuca L. K. syn. Sc. Columbaria δ .
M. et K. Asterocephal. ochroleucus Wallr. Rchb. exc.
Sc. tenuifolia α . Roth. Steinige Gebirgsstellen, sandige Ab-
hänge stellw. besonders im südl. Geb., seltener im mittleren
u. nördl. Rheing. auf d. Rauhenalp bei Trochelfingen, Baiern,
Sachsen, Schlesien; Destr. in allen Provinzen. 7—8. 4

4. Sc. Columbaria L. K. syn. Sc. aniseta Savi.
Sc. laxiflora Willd. Asterocephal. Columbaria Rchb. exc.
Trockene Hügel, Waldstellen, Heiden, Triften, Feldbränder u.
dch. d. g. Geb. 6—10. ☉

5. Sc. holosericea Bertolon. Host. Fl. austr.
Asterocephal. Columnae Var. Rchb. exc. Scab. — Te-
nore. Schattige Gebirgsstellen im südl. Geb., Dalmatien an
d. M. Biokovo, Oberitalien. 7—10. 4

6. Sc. Scopoli Jacq. Asterocephal. — Rchb. exc.
Sc. reversa Ledeb. Im südl. Littoral, Dalmatien, Ungarn.
7—9. 4

7. Sc. lucida Vill. delph. K. syn. Sc. stricta W. et
Kit. Sc. norica Vest. Asterocephal. lucidus Rchb. exc.
Triften d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpen-
fette bis Destr., Rheing., in d. Vogesen auf d. Hohenack, in
d. Gebirgen v. Schlesien, Böhmen, Mähren, Siebenbürgen,
Kombardei u. 7—8. ☉

8. Sc. Hladnikiana Host. K. syn. Asterocephal.

lucidus β . Rchb. exc. Gebirgsstellen, Steyermark, Krain bei Villachgräß, Vitoral, Istrien. 8—9. 2

9. *Sc. suaveolens* Desf. K. syn. *Sc. canescens* W. et Kit. *Asterocephal. suaveolens* Rchb. exc. Gebirgsabhänge, Hügel, Heiden, Rainen, Begeränder, stellw. bh. d. Geb., Rheing., besonders auf Kalk u. Sand, Baden bei Waghäusel, Wiesloch, Schwellingen, Heidelberg, Mannheim, Bergstraße bis Darmstadt, Offenbach, Pfalz bei Speyer, Mardorf, Dürkheim, Wachenheim, Worms bis Mainz, Niederlingheim u. auf d. Ockelheimer Hörnchen bei Bingen, stellw. in Baiern, Thüringen Sachsen, Schlesien nach Destr., Böhmen, Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—9. 2

10. *Sc. silenifolia* W. et Kit. K. syn. *Asterocephalus suaveolens* β . *silenifolius* Rchb. exc. Felsen im südl. Geb., Destr., Krain bei Gotschee, Dalmatien, Croatien. 7. 2

11. *Sc. vestina* Fachini. K. Taschb. 251. Wälder im südl. Geb., Südtirol im Vestino-Thale u. in d. Gebirgen d. Eudicarie, Bondon u. Brixen. 7—8. 2

12. *Sc. ambigua* Tenore. *Asterocephal. — ambiguus* Rchb. exc. *Scab. maritima* Bertolon. *Sc. acutiflora* Rchb. test. Bertolon. *Sc. Saviana* Rchb. Weingärten in Dalmatien. ☉

13. *Sc. ucranica* L. K. syn. *Asterocephal. —* Rchb. exc. *Sc. alba* Scopol. Var. β . *Sc. argentea* Lin. — γ . *Sc. maritima* Wulf. *Sc. bivaricata* Jacq. *Sc. sicula* Lin. *Sc. eburnea* Sibth. Sandige Orte am südl. Vitoral, Istrien bei Monfalcone u. Sagrado, Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

14. *Sc. stellata* Lin. *Asterocephal. stellatus* Rchb. exc. p. 194. *Sc. simplex* DC. Trockene, steinige Orte in Piemont, um Nizza. 6—7. ☉

15. *Sc. graminifolia* L. K. syn. *Asterocephal. —* ius Spr. Rchb. exc. Steinige Orte d. Boralpen u. Gebirge im südl. Geb., Schweiz im Cant. Tessin bei Lugano auf d. M. Salvator; Südtirol, Krain M. Baldo; Vitoral, Istrien,

am Isonzo bei Triest, um Görz, Dalmatien, Croatien, Kombarbei, Venedig. 7—8. 4

16. *Sc. multiseta* Visiani K. syn. *Sc. brachiata* Sibth. *Asterocephalus* — *tus* Rehb. exc. *Knautia palaestina* L. *Pterocephalus palaestinus*. γ . *dalmaticus* DC. prodr. Pt. *palaestinus* Coult Comp. I. 1. p. 222. Grasige Orte im südl. Littoral, Istrien zw. Dignano u. Fasana; Dalmatien bei Sebenico. 5—7. ☉

Vierundsechzigste Ordnung.

Compositeen.

Adans. K. syn. 381. K. Taschb. 252. Rehb. exc. p. 211.
Class. XIX. Syngenesia Lin.

Erste Unterordnung.

Corymbiferen Vaillant. Juss. K. Taschb. 252.

Erste Unterabtheilung.

Eupatoriaceen Lessing. Koch. Taschb. 252.

370. *Eupatorium* L. Wasserdoft. K. syn. Rehb. exc. p. 278. Comp. II. p. 280.

1. *E. cannabinum* L. K. syn. Schattige, nasse Orte an Bächen, Teichen, Gräben dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *E. maculatum* L. DC. prodr. V. p. 152. *E. purpureum* Lin. β . *maculatum* Darlington in Torrey et Gray Fl. of North America. C. Schultz bip. Flora 1848. Nro. 11. Rheing., Schweiz an d. Wiese bei Basel. 4

371. *Adenostyles* H. Cassini. Drüsengriffel. K. syn. 382. Rehb. exc. p. 278. Comp. II. p. 281.

1. *A. albifrons* Rehb. exc. K. syn. *A. albida* Cassin. *A. Petasites* Bl. et Fgh. *Cacalia* — Lamk. C. *albifrons* L. C. *hirsuta* Vill. C. *tomentosa* Jacq. Gebü-

sche, Triften d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Destr. ic.; Rheing. v. Schwarzwalde bis gegen Baden, u. auf d. Vogesen u. in d. Sudeten. 7—8. 4

2. *A. alpina* Bl. et Fgh. K. syn. *A. viridis* Cassin. *Cacalia alpina* L. *C. glabra* Vill. *C. alliariaefolia* Lamk. *Tussilago* *Cacalia* Jacq. Etwas feuchte Triften d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Destr. Tyrol ic. u. mit d. Jura bis Basel. 7—8. 4

3. *A. hybrida* DC. K. syn. *Cacalia tomentosa* β. *hybrida* Vill. Gaud. Alpen d. Schweiz Cant. Wallis u. Cant. Graubündten. 8. 4

4. *A. leucophylla* Rehb. exc. K. syn. *A. candidissima* Cassin. *Cacalia leucophylla* Willd. *C. tomentosa* Vill. delph. All. Alpen d. Schweiz Cant. Wallis im Saaser- u. Nicolaithale u. in d. Lombardei. 8. 4

372. *Homogyne* H. Cassini. *Homogyne*. K. syn. 382. Rehb. exc. p. 279. Comp. II. p. 282.

1. *H. sylvestris* Cass. K. syn. *Tussilago* — Scopol. Jacq. Sturm. Wälder d. Boralpen, Kärnthen, Steyermark, Krain; Dalmatien, Croatien. 5—6. 4

2. *H. discolor* Cass. K. syn. *Tussilago* — Jacq. *T. alpina* β. Lin. Triften d. Hochalpen; Salzburg, Tyrol, Kärnthen, Steyermark, Destr. Littoral, Istrien, Siebenbürgen. 5—7. 4

3. *H. alpina* Cass. K. syn. *Tussilago* — L. *Petasites* — Scopol. Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Tyrol, Destr., Rheing., Oberbaden auf d. Feldberg im Breisg.; Schlesien, Sachsen im Erzgebirge, Oberlausitz; Böhmen, Mähren. 5—7. 4

373. *Tussilago* L. Huflattig. K. syn. 383. Rehb. exc. p. 240. Comp. II. p. 285.

1. *T. Farfara* L. K. syn. Etwas feuchte Aecker, Felser auf Thon u. Kalkboden dch. d. g. Geb. 3—4. 4

374. *Petasites* Gaertn. Pfestwurz. K. syn. 383.
Rchb. exc. p. 279. Comp. II. p. 286.

1. *P. officinalis* Moench. K. syn. *P. vulgaris* Desf. Rchb. exc. *Tussilago Petasites* Hoppe. α. *Herm. thyrsus ovatus*: *T. Petasites* L. — β. *Fem. thyrsus oblongus* *T. hybridus* L. Früchte Orte, Wiesen, Bachufer, Gräben, Weidengebüsch, stchw. dch. d. g. Geb. 3—4. 4

2. *P. albus* Gaertn. K. syn. *Tussilago alba* Hoppe. a. *Herm. T. alba* L. — b. *T. ramosa* Hoppe. Var. β. *laevigatus*: *P. laevigatus* Rchb. exc. *Tussilago bohemica* Hoppe *T. laevigata* Schult. Fl. austr. Feuchte Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette; Rheing., Vogesen bei Basel, Feldberg im Breisg., a. d. Rnibis, Würtemberger Jura bei Stetten, Bogelsberg in Hessen u. bei Gießen, Schwaben, Baiern, Thüringen, Preußen bei Elbing, Sachsen, Lausitz, Schlesien nach Böhmen, Mähren u. 4—5. 4

3. *P. niveus* Baumg. K. syn. *Tussilago nivea et hybrida* Vill. *Fem. T. paradoxa* Retz. Bachufer d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Oest. u. an d. Nach bei Bregenz. 4—5. 4

4. *P. spurius* Rchb. exc. K. syn. *P. tomentosus* DC. *Tussilago*. — a. *Ehrh. T. spuria* Retz. Flußufer, stchw. dch. d. Geb., mehr im nördl., Elbufer, Holstein, Mecklenburg, a. d. Ober in Pommern, a. d. Weichsel bei Danzig, a. d. Pregel bei Königsberg; Krain, Siebenbürgen. 4. 4

375. *Nardosmia* H. Cassini. Duftlattig. Rchb. exc. p. 280.

1. *N. fragrans* Rchb. exc. *Tussilago* - Vill. In Dalmatien. 6. 4

Zweite Unterabtheilung.

Asteroideen Lessing. K. Taschb. 254.

376. *Linosyris* DC. Goldhaar. K. syn. 384.

Rchb. exc. p. 235. Comp. II. p. 296.

1. *L. vulgaris* Cass. K. syn. *Chrysocoma Linosyris* L. Rchb. exc. *Crinitaria* — Lessing. Sonnige Hügel, Felsen, lichte Waldstellen, Raine, Triften, Grassstellen, besonders auf Kalk u. Sand; bch. d. südl. u. mittlere Geb., nördl. bis Thüringen; Rheing. an vielen Orten bch. Elsaß, Baden im Breisg., längs d. Harbtgebirge bis Alzey, Annweiler, Donnerberg bis Mainz, Bingen, Coblenz, Elz, Ahrthal bei Altenahr, Nahe- u. Moselgebirge von Perl, Luxemburg, Ferncastel bis Coblenz u., Nassau, Schwaben, Baiern, Franken, Thüringen, Sachsen, Schlesien nach Destr. u. 8—9. 4

2. *L. villosa* DC. *Chrysocoma* — L. Rchb. exc. In Ungarn M. Tokay, Siebenbürgen. 8. 4

3. *L. punctata* Cassin. *Chrysocoma Dracunculoides* Lamk. Rchb. exc. *C. biflora* Willd. In Galizien. 8—9. 4

377. *Aster* L. Sternblume. K. syn. 385. Rchb. exc. p. 246. Comp. II. p. 286.

1. *A. alpinus* L. K. syn. Var. β . *A. hirsutus* Host. Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. bch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Thüringen, Tyrol, Destr. u. u. höheren Gebirgen, Rheing., Oberbaden auf d. Feldberg im Breisg., im Unterharz, in d. Sudeten in Schlesien; Böhmen, Mähren. 7—9. 4

2. *A. Amellus* L. K. syn. *A. amelloides* Hoffm. Var. β . *latifolius*: *A. amelloides* Rchb. exc. *A. Pseudo-Amellus* DC. — γ . *hispidus* Wallr. DC. Gebirgstriften, lichte Waldbahänge, sonnige, steinige Hügel, stchw. besonders im g. südl. u. im mittleren Geb., Rheing., Baden bei Constanz, Durlach bis Wiesloch, Bergstraße, Pfalz Maxdorf u. angst d. Gebirge, Dürkheim, Oppenheim, Nierstein bis Win-

gen, Nassau, Nahethal bis Kreuznach, Obermosel, Trier u. stellw. bis Coblenz 1c.; Var. β . Rheing. bei Berghausen, Durlach, Bergstraße, Coblenz, im nördl. bis Thorn, Rastenburg; — γ . in Thüringen. 8—10. 4

3. *A. Tripolium* L. K. syn. *Tripolium vulgare* Nees. Var. β . *A. pannonicus* Jacq. Rchb. exc. Am südl. u. nördl. Seestrande, dann an salzhaltigen, feuchten Orten, an Salinen, stellw. im Geb., Rheing., Sumpfwiesen bei Emmerweiler, Roßbrück, Saarlautern, Saarbrunn unweit Saarbrücken Flora v. Trier, Salinen in d. Wetterau bei Nauheim u. Nibba, an d. Ostsee bei Königsberg u. Memel 1c.; Var. β . in Mähren, Ungarn. 8—9. ☉

4. *A. brumalis* Nees. K. syn. *A. Novi Belgii* Willd. N. America. Stellw. im Geb. an Flußufern verwildert; Rheing. in Weidengebüsch am Rheine zw. Neuwied u. Irrlich, Mainufer in Franken. 10—11. 4

5. *A. pesthinensis* DC. Comp. II. p. 287. *A. riparius* Nees. *A. salignus hungaricus* Günth. herb. In Ungarn bei Pesth. 9—10. 4

6. *A. Novi-Belgii* L. K. syn. *A. scrotinus* Willd. N. America. Stellw. an Flußufern verwildert. 9—10. 4

7. *A. salignus* Willd. K. syn. *A. salicifolius* Scholler. Flußufer, stellw. dch. d. Geb., Rheing., am Rheine bei Speier, Frankenthal, Nassau bei Destrach, Horchheim bei Coblenz, Saargemünd, an d. Nahe bei Martinstein u. einzeln bei Trier an d. Mosel, an d. Elbe u. Nebenflüssen v. Hamburg nach Barby bis Sachsen, Hessen an d. Werra bei Allendorf; Baiern an d. Donau v. Regensburg bis Passau; Destr. Mähren, Ungarn bei Rakos, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 7—8. 4

8. *A. leucanthemus* Desfont. K. syn. *A. dracunculoides* Willd. N. America. Flußufer verwildert, Berlin an d. Spree, Rheing., Main bei Höchst Coblenz, im Lahnthale bei Steten, oberhalb Limburg, zw. Wilmar u. Weilburg. 8—20. 4

9. *A. parviflorus* Nees K. syn. *A. miser* Ait. *A. lanceolatus* Lej. Rchb. exc. N. America. An Flußufern

verwilt, stellw. an d. Elbe, Main, Rhein, Mosel u. Maas, Rheing., Pfalz bei Speier, Frankenthal, Rheing. bei Destr., Boppard, Obermosel im Luxemburgschen, Trier, Diekirch an d. Sauer, Martinsstein an d. Nahe u. in d. Flora v. Spa bei Pepinster zc. 8—9. 4

378. *Galatella* H. Cassini. *Galatella*. K. syn. 387. Comp. II. 290.

1. *G. acris* Nees. *Aster acris* L. Rchb. exc. *Galat. rigida* Cass. *C. punctata* α. *angustifolia* DC. Im südlichsten Vittoral, Piemont, Genua u. Nizza. 9. 4

2. *G. punctata* Nees. *Aster punctatus* W. et Kit. Rchb. exc. *G. intermedia* Cass. *G. punctata* β. *intermedia* DC. *G. insculpta* Nees. Salzhaltige Wiesen, Gräben, im südl. Geb., Croatien, Ungarn im Comitat Semplin u. Esen-grader, Siebenbürgen. 8. 4

3. *G. cana* Nees. K. syn. *Aster canus* W. et Kit. Rchb. exc. *Galat. canescens* Cassin. Waldstellen, Mähren in einem sumpfigen Wäldchen am Mälnißersee, Ungarn im Banat bei Bersek, Siebenbürgen. 8—9. 4

379. *Bellidiastrum* H. Cassini. *Sternlieb*. K. syn. 387. Rchb. exc. p. 233. Comp. II. p. 285.

1. *B. Michellii* Cass. K. syn. *B. montanum* Bl. et Fgh. *Doronicum Bellidiastrum* L. *Arnica* — Vill. *Aster* — Scopol. *Margarita* — Gaud. Riesige, feuchte Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Destr., Rheing., Oberbaden bei Nach, Engen zc. auf d. Feldberg im Breisg., auf d. Würtemberger Alp, Baiern bis Landshut hinab; Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Ungarn. 6—7. 4

380. *Bellis* L. Gänseblümchen. K. syn. 387. Rchb. exc. 233. Comp. II. p. 294.

1. *B. perennis* L. K. syn. Gräßige Orte, Wiesen, Begeränder im g. Geb. 3—4. 4

2. *B. annua* L. K. syn. Wiesen, im südl. Eittoral, Istrien, Lombard bei Verona, Oberitalien. 4—6. 4

3. *B. sylvestris* Cyrill. Rchb. exc. *B. hirta* Host. Fl. austr. Gräßige Orte im südl. Eittoral, Istrien bei Pola, Dalmatien, Oberitalien. 6—7. 4

381. *Stenactis* H. Cassin. *Stenactis*. K. syn.

387. Comp. II. p. 293.

1. *St. bellidiflora* A. Braun. Koch. in litt. K. syn. Löhr. Fl. v. Trier 1843. *St. bellidifolia* A. Braun. K. Taschb. 256. *St. heterophylla* C. Schultz. *St. annua* Nees. *St. dubia* Cassin. *St. bellidioides* Döll. *Pulicaria annua* Gaertn. *P. bellidiflora* Wallr. *Diplopappus annuus* Bl. et Fgh. *D. bellidiflorus* Löhr Fl. v. Coblenz 1838. *Aster annuus* L. *Erigeron annuus* Pers. *E. heterophyllus* Willd. *E. bellidioides* Spen. Frib. Waldfstellen, Gebüsch, Säune, Acker-
ränder, Flußufer, stellenw. dch. d. Geb., Schweiz Cant. Bern, Basel, Rheing., Elsaß, Baden, Hessen, Nassau, Pfalz bis Coblenz, Köln, Trier u.; Destr. Steyermark, Tyrol, Eittoral, Istrien, Lombard u. 7—10. 4

382. *Erigeron* L. *Veruffraut*. K. syn. 388. Rchb.

exc. p. 239. Comp. II. p. 291.

1. *E. canadensis* L. K. syn. Ufer, Raine, Wege, Acker, Felber, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *E. acris* L. K. syn. Var. β . *E. serotinus* Weihe. Rchb. exc. — γ . *E. corymbosus* Wallr. Sonnige Anhöhen, Heiden, Wege, Mauern, Schutt; dch. d. g. Geb. 7—8. ☉ et 4

3. *E. podolicus* Besser. Rchb. exc. *E. asteroides* Andr. Westphalen im Teutoburger Walde? 8—9. ☉

4. *E. droebachensis* Mill. K. syn. *E. acris* β . *droebachensis* Schleich. *E. acris* β . *angulatus* Hartm. *E. angulosus* Gaud. *E. elongatus* Ledeb. Auf d. Riese d. Bäche in d. Alpen u. Voralpen, am Rheine, Rheineck bis Müllheim, Darland bei Karlsruhe, Baiern bei Augsburg,

Schweiz zerstreut dch. d. Alpenkette nach Baiern, Destr. Salzburg, Tyrol, Kärnthen. 7—8. ☉

5. *E. Villarsii* Bellard. K. syn. *E. atticum* Vill. *E. rupestris* Hoppe. Var. β . *E. intermedius* Trachsel! Schleich. Rchb. exc.? Alpen u. Alpenthäler; Schweiz im Cant. Bern a. d. Stockhornkette, Cant. Wallis; Südtirol; Kärnthen auf d. Pasterze, u. Padon-Alp in Fassa; Ungarn, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

6. *E. alpinus* L. K. syn. Var. β . *grandiflorus* Hoppe. Rießige, grasige Orte d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Destr. u. 7—8. 4

7. *E. glabratus* Hoppe et Hornsch. K. syn. *E. uniflorus* β . Cesati. *E. alpinus* β . DC. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Salzburg, Destr. u. 7—8. 4

8. *E. uniflorus* L. K. syn. *E. polymorphon* Scopol. Grasige Orte d. Hochalpen; Schweiz M. Grimsel, Gemmi, Gotthardt u., Destr. Salzburg, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Galizien, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

383. *Solidago* L. Goldruth. K. syn. 389. Rchb. exc. p. 245. Comp. II. p. 295.

1. *S. Virga-aurea* L. K. syn. *Doria Virgaurea* Scopol. Var. β . *angustifolia* Gaud. *S. Virga-aurea* β . DC. prodr. *S. minuta* Thore — γ . *alpestris*: *S. alpestris* W. et Kit. Willd. Rchb. exc. — δ . *cambrica*: *S. cambrica* Ait. Willd. Huds. *S. carpathica* Schrad. Rchb. exc. p. 852. *S. Virga-aurea* γ . *pumila* Gaud. helv. — ϵ . *arenaria*: *S. arenaria* W. et Kit. Hornem. Rchb. exc. Eichte Wäldstellen, schattige Abhänge, Hügel, Heiden, Triften, dch. d. g. Geb. Var. γ . Hochgebirge u. Alpen, δ . Alpen d. Schweiz, Südtirol, Ungarn. ϵ . in Ungarn. 7—8. 4

2. *S. minuta* L. Rchb. exc. Alpen im südl. Geb., Lombardei, Piemont. 8—9. 4

3. *S. littoralis* Savi. Rchb. exc. Im südlichsten Littoral, Toscana bei di Luni. 8—9. 4

384. *Conyza* L. *Dürrmurz*. DC. prodr. V. p. 381.

1. *C. ambigua* DC. *Erigeron linifolius* Willd. Rchb. exc. *E. laciniatus* Martens. Am südl. Eittoral, Combarbei bei Vicenza, Piemont, Nizza. 7—8. ☉

385. *Phagnalon* H. Cassin. *Dürrblume*. Rchb.

exc. p. 224. Comp. II. p. 297.

1. *P. sordidum* Rchb. exc. *P. tricephalum* Cass. *Conyza sordida* L. *Gnaphalium* — L. Felsen, Mauern im süblichstn Eittoral; Piemont bei Nizza, Oneglia, Massa u. 7—8. 4

2. *P. saxatile* Cassin. Rchb. exc. *Conyza* — Lin. Felsen, Mauern im süblichstn Eittoral, Piemont Val d'Ossola, Savona, Nizza u. in d. Novara. 7—8. 5

3. *P. rupestre* DC. Comp. II. *Conyza* — tris L. *C. saxatilis* Host. Fl. austr. *C. geminiflora* Tenore *C. Tenorii* Spreng. Fesen im sübl. Eittoral, Dalmatien bei Spalato, Venedig. 5—6. 5

386. *Micropus* L. Benth. *Filzblume*. K. syn.

390. Rchb. exc. p. 219. Comp. II. p. 298.

1. *M. supinus* L. Rchb. exc. *Filago* — Lamk. Am sübl. Eittoral Dalmatien; Nizza. 6—7. ☉

2. *M. erectus* L. K. syn. Unfruchtbare Fesder, Fan Wegen im sübl. Geb., Belgien; Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Ungarn bei Ofen; Piemont. 6—7. ☉

387. *Evax* Gaertn. *Filzfraut*. K. syn. 390. Rchb.

exc. p. 219. Comp. II. p. 298.

1. *E. pygmaea* Pers. K. syn. *E. umbellata* Gaertn. *Filago acaulis* Allion. *F. pygmaea* L. Rchb. exc. *Micropus pygmaeus* Desf. Trockene, sonnige Orte am sübl. Eittoral, Istrien Insel Cherso, Dalmatien; Piemont, Nizza. 6—7. ☉

388. *Telekia* Baumg. *Telekie*. K. syn. 391. Rchb.

exc. p. 236. Comp. II. p. 309.

1. *T. speciosa* Baumg. K. syn. *T. cordifolia* DC. *Bupthalmum* — *lium* W. et Kit. *Rchb. exc. B. speciosum* Schreb. *Inula caucasica* Pers. Etwas feuchte Gebirgswälder stellw. im Geb. Böhmen im Raichenbachgrund bei Oberleitensdorf, Eittoral Istrien bei Marstavadiza bei Fiume, Croatien, Galizien, Ungarn an d. Herkulesbädern, Siebenbürgen. 8. 4

389. *Bupthalmum* L. Rindsauge. K. syn. 391. *Rchb. exc. p. 236. Comp. II. p. 307.*

1. *B. speciosissimum* Arduin. K. syn. *Telekia* — *a* Lessing. Bewachsene Gebirge im südl. Geb. Südtirol Val di Vestino, Kalkfelsen am Steiger zw. d. Grenze v. Bondon u. Guidicarien, Lombardei Val Susana bei Como auf d. Corni di Conzo. 7—8. 4

2. *B. salicifolium* L. K. syn. Var. β . *angustifolium*: *B. grandiflorum* L. *Rchb. exc.* Wiesen, Triften d. Kalkgebirge u. Voralpen; Schweiz bei Bregenz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Destr. bis in d. südl. Eittoral; Rheing., Rheineck, Embs rc., Oberelsaß, Oberbaden bei Billingen, Mundelfing, auf d. Schwarzwalde, Kalkgebirge in Franken. 7—8. 4

390. *Asteriscus* Tournef. Sternauge. K. syn. 391. *Comp. II. p. 308.*

1. *A. maritimus* Moench. DC. *Bupthalm.* — *um.* L. *Rchb. exc. p. 236. Nauplius* — Cassin. Am südl. Eittoral, Dalmatien u. Inseln, Piemont bei Nizza. 5. 4

2. *A. aquaticus* Moench. K. syn. *Nauplius* — Cassin. *Bupthalm.* — *um.* L. *Rchb. exc.* Brachäcker im südl. Eittoral, Istrien bei Aquileja, Dalmatien um Spalato; Piemont, Nizza, Ligurien. 6—9. ☉

391. *Pallënis* H. Cassin. Dornalant. K. syn. 392. *Comp. II. p. 309.*

1. *P. spinosa* Cass. K. syn. *Bupthalm.* — *sum.* L. *Rchb. exc. p. 236. Brachfelder, Weingärten, an Zäunen,*

Begen im südl. Eittoral, Istrien bei Pirano, Fiume, Insel Gherzo; Dalmatien, Lombardei, Venedig; Piemont, Ligurien, Oberitalien. 6—8. 4

392. *Inula* L. Mant. K. syn. 392. Rchb. exc. p. 237.

Comp. II. p. 299.

1. *I. Helenium* L. K. syn. *Aster* — *Scopol.* Feuchte Wiesen, Gräben, Ufer, Baumgärten um Dörfern, stellw. dch. d. Geb., Rheing. Coblenz, Luxemburg bei Herbeumont; dch. Westphalen nach Niedersachsen, Mecklenburg, Pommern, Preußen, Schlesien; Mähren; auch angepflanzt u. verwildert. 7—8. 4

2. *I. germanica* L. K. syn. Steinige Hügel, Raine, Wege u. Ackerländer stellw. dch. d. Geb., Rheing., Pfalz bei Dürtheim, Deidesheim, Grünstadt, Oppenheim, Niederulm, Alzei, Mainz bis Bingen hinter d. Rogusberg, Nahe aufwärts, bei Laubenheim, Langlonsheim bis Kreuznach; Baiern Franken bei Würzburg, Schweinfurt, Thüringen bei Halle, Jena, Barby, Sachsen bei Rögliß, Unterharz; Destr. bei Wien, Böhmen, Mähren; Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

3. *I. media* M. v. Bieb. K. syn. Grasige Kalkhügel am Mittelrheine, Nahe aufwärts zw. Bingen u. Kreuznach bei Laubenheim, Planig u. selten in Thüringen bei Halle. 7—8. 4

4. *I. hybrida* Baumg. K. syn. Steinige Gebirgsstellen in Destr. am Kahlenberg bei Wien, Mähren, Siebenbürgen. 7—8. 4

5. *I. ensifolia* L. K. syn. *Aster* — *Scopol.* Steinige Hügel mehr im südl. Geb., Baiern; Destr. bis Mähren, Südtyrol Val di Sacra am Gardasee, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig; Ungarn, Galizien. 7—8. 4

6. *I. salicina* L. K. syn. *Aster* — *Scopol.* Etwas feuchte Waldwiesen, an Gräben, schattige Hügel u. Gebirge, besonders auf Kalk- u. Thonboden, auch in Torfgründen stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten. 7—8. 4

7. *I. squarrosa* L. K. syn. *I. Bubonium* Jacq. *Aster* — *Scopol.* Var. β . *I. germanica* Vill. delph. — γ . *I. spi-*

raeaeifolia L. DC. I. *Bubonium* Murr. Rchb. exc. Gebirgswälder, Gebüſche, Hecken im ſüdl. Geb., Schweiz Cant. Teſſin; Südtirol, Deſtr. Krain, Vittoral, Iſtrien, bei Fiume, Saule, Dalmatien, Croatien, Ungarn bei Neutra, Siebenbürgen, Lombardei; Piemont, Oberitalien. 7—8. 4

8. *I. hirta* L. K. syn. *I. montana* Pollich. *Aster hirtus* Scopol. Sonnige Hügel, Waldränder, ſtellw. dch. d. g. Geb., Rheing. im g. Jurazug, Elſaß, Baden, im Breiſg. am Kaiſerſtuhl, Bergſtraße bei Heppenheim, Naſſau bei Rüdesheim, Glörsheim, Pfalz bei Speyer, Neuſtadt an d. Hardt, Dürkheim, Deidesheim biß Bingen, Nahe aufwärts bei Laubenheim, Hardt, Kreuznach, Württemberg bei Tübingen, M. Haſenbühl, Thüringen bei Jena, Halle, Baiern, Pommern, Preußen bei Marienwerder, Schleſien; Deſtr. dch. Mähren, Böhmen, Südtirol, Krain biß in d. ſüdl. Vittoral. 5—6. 4

9. *I. Vaillantii* Vill. delph. K. syn. *I. cinerea* Lamk. *I. ramosissima* Clairv. Sumpfige, graſige Orte, Flußufer, mehr im Süden; Schweiz Cant. Bern, auf d. Gynatte u. Hunzikerau bei Bern, Genf; Savoyen, Piemont, Genua. 8—9. 4

10. *I. semiamplexicaulis* Reuter. DC. Bl. et Fgh. Comp. II. p. 302. Schweiz in einem Wäldchen Bättie bei Genf; Piemont. 7—8. 4

11. *I. Conyza* DC. K. syn. *Conyza squarrosa* L. Rchb. exc. Steinige bewachſene Bergſtellen, Felsen, Raine, Ufer, Waldwege, Brachfelder, beſonders auf Kalk u. Thon dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

12. *I. suaveolens* Jacq. K. syn. Feuchte Orte, ehemals im ſüdl. Vittoral, Iſtrien bei Monfalcone. 7—8. 4

13. *I. candida* Cassin. Rchb. exc. Var. α . *Conyza verbascifolia* Willd. Host. C. *candida* Lin. Tratt. — β . C. *limonifolia* Sibth. C. *candida* Willd. Gebirgsthäler an ſonnigen Felsen, in Dalmatien bei Spalato. 7. 4

14. *I. thapsoides* Spreng. Maly enum. pl. austr. p. 113. *Conyza* — Schult. oestr. Fl. Im ſüdl. Geb. Krain, bei Neuſtadt; Ungarn. 7. 4

15. *I. bifrons* L. Rchb. exc. *I. alata* Baumg. *I. glabra* Besser. *Aster bifrons* Allion. Schattige Thäler in Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont, Ligurien. 7—8. ☉

16. *I. Oculus-Christi* L. K. syn. Var. β . *I. campestris* Bess. Rchb. exc. Sonnige, steinige Orte, besonders auf Kalk u. Sand im südl. Geb., Destr. bei Wien, Mähren, Dalmatien, Croatien, Ungarn bei Ofen, Siebenbürgen. 6—7. 4

17. *I. Britanica* L. K. syn. *I. hirta* Pollich. *I. Otetliana* Rchb. exc. Var. β . *I. discoidea* Tausch. Nasse Wiesen, an Gräben, Teichen, Ufern, stellw. dch d. g. Geb. 7—8. 4

18. *I. montana* L. K. syn. Sonnige Gebirgsstellen, Felsen im südl. Gebirgszuge, West- u. Südschweiz, Cant. Glarus auf d. Rander matt; auf d. Creux du Bau im Jura u. in d. Walliser Alpen; Destr. Vittoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont, Genua. 7—8. 4

19. *I. crithmoides* L. K. syn. *I. crithmifolia* Willd. *Aster* — *Scopol.* Feuchte Stellen im südl. Vittoral, Istrien bei Triest, Saule, Aquileja, Dalmatien, Lombardei, Venedig; u. in Belgien. 7—8. 4

20. *I. graveolens* Desf. K. syn. *Erigeron* — L. Rchb. exc. *Solidago* — Lamk. Etwas feuchte, steinige Aecker, Weingärten im südl. Vittoral, Istrien, Insel Neglia, Dalmatien, Piemont, Nizza, Dneglia. 7—9. ☉

393. *Pulicaria* Gaertn. Flohkraut. K. syn. 395. Rchb. exc. p. 238. Comp. II. p. 306.

1. *P. vulgaris* Gaertn. K. syn. *Inula Pulicaria* L. *Aster* — *Scopol.* *Diplopapus* — Bl. et Fgh. Sumpfige, feuchte Orte, Tristen, Wiesen, Gräben, Ufer, Wegeränder dch d. g. Geb. 7—8. 4

2. *P. dyssenterica* Gaertn. K. syn. *Inula* — L. *Aster* — *Scopol.* *Diplopapus* — us Bl. et Fgh. Sumpfige, nasse Wiesen, Gräben, Ufer, Wegeränder, Gelbränder stellw. dch d. g. Geb. 7—8. 4

3. *P. odora* Rchb. Rchb. exc. *Inula* — L. *Aster odorus* Allion. pedm. Steinige Orte, Felsen im südl. Vit-

toral, Istrien an d. M. Maggiore, Dalmatien, Piemont. 7—8. 4

4. *P. viscosa* Cassin. K. syn. *Erigeron viscosum* L. *Inula* — Ait. *Solidago* — Lamk. Steinige Orte im südl. Littoral, Istrien, Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Venedig, Genua, Piemont. 7—8. 4

394. *Jasonia* DC. prodr. V. p. 475. Sasonie.

1. *J. sicula* DC. Maly enum. pl. austr. p. 114. *Conyza sicula* Willd. *Erigeron siculum* L. In d. Lombardei. ☉

395. *Galinsoga* Ruiz. et Pav. Galinsogie. K. syn. 396. Rchb. exc. p. 247. Comp. II. p. 311.

1. *G. parviflora* Cavan. K. syn. Willd. DC. *Wiborgia Acmella* Roth. *W. parviflora* Kunth. Rchb. exc. *Galins. quinqueradiata* R. et Pav. Aus Peru, jetzt hin u. wieder verwildert, Felser, Saune, in Baiern bei Erlangen, Sachsen bei Dresden, Hamburg, Berlin u. Königsberg bis Memel u. 7—8. ☉

396. *Bidens* L. Zweizahn. K. syn. 396. Rchb. exc. p. 248. Comp. II. p. 310.

1. *B. tripartita* L. K. syn. Var. β . *radiata*. Rasse Orte, Gräben, Teiche, Ufer dch. d. g. Geb. 7—10. ☉

2. *B. cernua* L. K. syn. Var. β . *radiata*: *Coreopsis Bidens* L. — γ . *minima*: *Bidens minima* L. Sumppfige Orte, Gräben, Teichränder, besonders Torfboden, dch. d. g. Geb. 8—10. ☉

3. *B. bullata* L. Rchb. exc. An Gräben, im südlichsten Geb., Lombardei Porta Liviana bei Padua, Piemont. 8—9. ☉

4. *B. bipinnata* L. K. syn. Ackerränder, Felser im südl. Geb., Südtirol bis Brixen, Bogen in großer Menge; Lombardei Padua, Venedig. 7—10. ☉

397. *Helianthus* L. Sonnenblume. K. syn. 396. Rchb. exc. p. 211. Comp. II. p. 352.

1. *H. annuus* L. K. syn. Aus Peru, Mexico. Häufig cultivirt u. stchw. verwildert. 7. ☉

2. *H. tuberosus* L. K. syn. Aus Brasilien. Cultivirt u. verwildert. 10—11. 4

398. *Carpesium* L. Kragenblume. K. syn. 397.
Rchb. exc. p. 235. Comp. II. p. 352.

1. *C. cernuum* L. K. syn. Feuchte Orte, in Gebüsch, an Wegen, mehr im südl. Geb., Rheing., Elsaß bei Ostheim; Schweiz Michelfelden, Unterseen, M. Arvel bei Billeneuve; Oestr. Steyermark, Südtirol, Krain, Vittoral, Istrien, Montfalcone, Friaul um St. Daniele, Croatien, Kombarbei, Venedig, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont. 7—8. ☉

2. *C. abrotanoides* L. K. syn. Wälder im südl. Geb. Krain, Istrien bei Aquileja u. Montfalcone, Croatien, Dalmatien u. 7—8. ☉

399. *Filago* L. Fries. Fadenfraut. K. syn. 397.
Rchb. exc. p. 222. Comp. II. p. 348.

1. *F. germanica* L. K. syn. *Gnaphalium germanicum* Huds. Rchb. exc. Impia — ca. Bl. et Fgh. *Gifola vulgaris* Cassin. Comp. II. p. 352. Var. β . *pyramidata* DC. *Filago pyramidata* Gaud. Aecker, Felder, Brachäcker, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *F. spathulata* Presl. *Gnaphalium spathulatum* Fr. Schultz. Archiv p. 126. Flora 1850 p. 202. *Gn. pyramidatum* Willd. Rchb. exc. *Filago* — ta L. K. syn. in adnot. ap. *F. germanica* β . p. 398. *F. germanica* γ . *Jussiaci* Fr. Schtz. Fl. d. Pfalz. *F. Jussiaci* Coss. et Germ. Aecker, Felder, stellw. mit Voriger wohl dch. d. g. Geb., Rheing. Pfalz, Trier, Coblenz, Eöln u. 7—8. ☉

3. *F. arvensis* L. DC. K. syn. *Gnaphalum* — se Lamk. *Achariterium* — Bl. et Fgh. *Oglifa* — sis Cassin. *Filago montana* Wahlenb. Linn. Fl. suec. Heiden, Brachfelder, Aecker, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

4. *F. minima* Fries. K. syn. *F. arvensis* Wahlenb. *F. montana* DC. *Gnaphal. montanum* Huds. Willd. Rchb.

exc. *G. minimum* Smith. Willd. Sandige Felder, Heiden, Hügel, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

5. *F. gallica* L. K. syn. *Gnaphalium* — cum Huds. Host. Rechb. exc. *Xerotium* — Bl. et Fgh. Acker, Weingärten, auf Thon- u. Sandboden, besonders im südl. Geb., im mittleren sehr zerstreut u. selten; Rheing., Basel, Elßaß, Baden im Breißg., Rastatt, Karlsruhe, Rheinhessen bei Mackenheim, Pfalz in d. Lautergegend zw. Mohrlautern u. Otterbach, Zweibrücken, Bitsch, am Glan bei Meisenheim, Saarbrücken, Hornbach, Wollmünster; Westphalen, Thüringen bei Halle, Jena, nördl. bis Hamburg; Böhmen, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Siebenbürgen. 7—8. ☉

400. *Gnaphalium* L. Ruhrkraut. K. syn. 398. Rechb. exc. p. 222. Comp. II. p. 346—352.

Erste Rotte. *Gnaphalium* Koch. syn.

1. *G. sylvaticum* L. K. syn. *G. rectum* Smith. *G. sylvaticum* α. Wahlenb. Lichte Waldstellen, Waldwegen, Heiden, Triften, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *G. norvegicum* Gunner. K. syn. *G. sylvaticum* Smith. *G. sylvaticum* β. *fuscum* Wahlenb. *G. fuscum* Pers. *G. fuscum* Lamk. Rechb. exc. non Scopol. Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr.; in d. Gebirge d. Vogesen, Sudeten in Schlesien; Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Krain, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien. 7—8. 4

3. *G. Hoppeanum* Koch. K. syn. *G. supinum* Hoppe. Alpen u. Boralpen; Destr. Steyermark, Salzburg, Kärnthen; Hochgebirge im Erzgebirge, d. Sudeten, in Schlesien; Böhmen, Mähren u. Galizien. 7—8. 4

4. *G. supinum* L. K. syn. *G. pusillum* Haenke. *Omalotheca supina* Cassin. *G. supinum* Willd. *G. supinum* α. Wahlenb. *Filago acaulis* Krock. Fl. Sil. Var. β.

fuscum: *G. fuscum* Scopol. Willd. *G. pusillum* γ . *fuscum* Pers. — γ . *pusillum*: *G. pusillum* Willd. *G. supinum* β . *pusillum* Pers. Steinige, grasige, etwas feuchte Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Schwaben; Tyrol, Destr. 2c.; Rheing. im Breisg. auf d. Feldberg, u. am Osterrain, Schwarzwald u. in d. höheren Vogesen, auf d. Sudeten in Böhmen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

5. *G. uliginosum* L. K. syn. Var. β . *G. pilulare* Wahlenb. — γ . *glabrum*: *G. nudum* Hoffm. Rchb. exc. *G. pilulare* β . *nudum* DC. prodr. Feuchte Wiesen, Triften, Gräben, Teichränder, Acker, dch. d. g. Geb., Var. β . Westphalen, Hannover, Oldenburg, Pommern bei Stettin. 7—8. ☉

6. *G. luteo-album* L. K. syn. *Helichrysum* — Rchb. exc. p. 244. Feuchter Sandboden, Teiche, Gräben, Heiden, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., in d. Vogesensandstein nicht selten, Kaiserslautern, Pirmasens, Homburg, Saarbrücken, Rirkel, Saarwellingen, Luxemburg, an d. Mosel bei Berterich, an d. Nahe bei Kreuznach, am Niederrheine bei Neuwied, Bonn 2c., südl. bis Destr. u. in d. Lombardei u. nördl. nach Preußen bis Tilsit, Thorn, Danzig. 7—8. ☉

Zweite Rotte. *Leontopodium* Koch. syn.

7. *G. Leontopodium* Scopoli. K. syn. *Filago* — Linn. *Leontopodium alpinum* Cassin. Sonnige Triften d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Salzburg, Destr. bis in d. südl. Eittoral. 7—8. 4

Dritte Rotte. *Antennaria* Gaertn. K. syn.

8. *G. dioicum* L. K. syn. *Antennaria dioica* Gaertn. Gebirgswiesen, Triften, Heiden, Nadelholzwälder, besonders dch. d. g. gebirgischen Theil d. Geb. 5. 4

9. *G. carpaticum* Wahlenb. K. syn. *G. alpinum* Willd. Host. *Antennaria carpatica* Bl. et Fgh. Etwas feuchte Felsen, Abhänge d. Hochalpen u. Karpathen, Schweiz

u. stellw. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. u. im südl. Eittoral. 7—8. 2

10. *G. alpinum* L. Rchb. icon. Cent. VIII. f. 996. Maly enum. pl. austr. p. 116. *Antennaria alpina* DC. prodr. Auf d. höchsten Fochen d. Monte Baldo. 7—8. 2

11. *G. margaritaceum* L. Rchb. exc. *Antennaria* — R. Brow. *Helichrysum* — Bl. et Fgh. Etwas feuchte Gebirgswiesen im südl. Geb., Siebenbürgen auf d. Istenzeckalp; Savoyen auf d. M. Genis, sonst wohl nur im Geb. verwildert, auch in Gärten angepflanzt. 7—8. 2

401. *Helichrysum* Gaertn. Sonnengold. K. syn. 401. Rchb. exc. p. 224. Comp. II. p. 345.

1. *H. arenarium* DC. K. syn. *Gnaphal.* — Lin. Var. *β. aurantiacum* Pers. Sandige Orte, Heiden, Triften, stellw. dch. d. g. Geb. d. Var. *β.* seltener. 7—8. 2

2. *H. angustifolium* DC. K. syn. *Gnaphal.* — Lamk. *G. italicum* Roth. Trockene, sonnige Hügel im g. südl. Geb., Eittoral, Istrien, Fiume; Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig, Piemont, Genua, Oberitalien. 7—8. 3

3. *H. Stoechas* DC. Rchb. exc. *Gnaphal.* — L. Sonnige, steinige Orte im südl. Eittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Piemont, Nizza. 6—7. 3

402. *Artemisia* L. Beyfuß. K. syn. 401. Rchb. exc. p. 219. Comp. II. p. 336.

1. *A. arborescens* Ait. Host. Fl. austr. Rchb. exc. Felsen, Abhänge im südlichsten Geb., Dalmatien; Piemont. 8. 3

2. *A. Absinthium* L. K. syn. *Absinthium vulgare* Gaertn. Gebirgseisen, stellw. besonders dch. d. g. südl. Geb., nördl. nach Preußen bis Tilsit u., Rheing. Baden, Nassau, auf d. Porphyre d. Nahe, Kreuznach u., auf d. Thonschiefer d. Mosel v. Berncastel, stellw. bis Coblenz, auf Sand in Luxemburg u., Schweiz Cant. Wallis, Graubünd-

ten, Südtirol, dann an vielen Orten im Geb. angepflanzt u. verwildert. 7—8. 4

3. *A. camphorata* Villars. K. syn. *A. Lobelii* All. pedm. *A. corymbosa* Lamk. *A. subcanescens* Willd. *A. rupestris* Scopol. Var. α . *saxatilis*: *A. saxatilis* Willd. *A. campestris* Scopol. *A. humilis* Wulf. — β . *A. intermedia* Host. — γ . *canescens*: *A. subcanescens* Balb. et Nocc. — δ . *tomentosa*: *A. Biasoletiana* Visian. Fl. Dalm. Steinige Kalkhügel, Felsen, besonders im g. südl. Geb., Rheing., im Oberelsaß bei Colmar, Westhalten u. Gebweiler; Südtirol bei Bozen, an d. Ufer d. Isongo Krain, im südl. Eittoral, Istrien, Fiume, Görz; Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Ungarn. 9—10. 4

4. *A. rupestris* L. K. syn. *A. grandiflora* Hoffm. Var. β . *A. viridiflora* Ledeb. Rchb. pl. crit. Dürren, salzhaltiger Kalkboden, Triften in Thüringen bei Staßfurt, Bernburg, Borkleben. 9. 4

5. *A. chamaemelifolia* Vill. delph. Rchb. exc. Alpen, Felsen im Süden; Lombardei, Piemont. 8—9. 4

6. *A. lanata* Willd. K. syn. *A. pedemontana* Balbis. Alpen in d. südl. Kette; Südtirol auf d. Schlehenzug u. im Fassa-Thale; Piemont im Matra-Thal u. d. Val d'Asti-Alp. 7—8. 4

7. *A. glacialis* L. K. syn. Gletschergegenden d. Hochalpen selten; Schweiz Cant. Wallis, Nicolaithal, Matterhorn im Jannthale innerhalb d. Schweiz, Val Deni, Siebenbürgen. 7—8. 4

8. *A. Mutellina* Vill. delph. K. syn. *A. rupestris* Allion. *A. rupestris* β . Lin. *A. umbelliformis* Lamk. *A. glacialis* Wulf. Granitfelsen d. Hochalpen, Südschweiz M. Gemmi, Rapp, Saasthal am M. Moro im Cant. Wallis, Südtirol, Steyermark, Kärnten, Salzburg, Krain, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

9. *A. Baumgartenii* Besser. *A. Mutellina* β . K. syn. *A. spicata* Rochel. ban. *A. spicata* β . *eriantha* DC.

prodr. Absinthium petrosum Baumg. Alpen in Ungarn u. Siebenbürgen. 7—8. 4

10. *A. spicata* Wulf. K. syn. *A. Boccone* All. pedm. *A. Gneipi* Stechm. *A. rupestris* Villars. Felsen d. Hochalpen; Südschweiz Cant. Wallis, Nicolaithal, M. Foully; Südtirol, Salzburg, Steyermark, Kärnten, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

11. *A. laciniata* Willd. K. syn. *A. Mertensiana* Wallr. Salzhaltiger Kalkboden, Wiesen, Triften in Thüringen bei Bernburg, Staßfurt, Borkleben u. Aschersleben. 7—8. 4

12. *A. tanacetifolia* Allion. pedm. K. syn. *A. tanacetifolia* et *A. atrata* Lamk. *A. atrata* Bess. Auf d. höchsten Fochen d. Monte Marosch bei Glitsch in Krain, Vittoral, Istrien, Lombardei, Piemont. 7—8. 4

13. *A. procera* Willd. Host. Fl. austr. Maly enum. pl. austr. p. 117. Felsen in Dalmatien. 7. 4

14. *A. Abrotanum* L. K. syn. Sonnige Hügel im südlichsten Geb. Vittoral, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza; im übrigen Geb. angepflanzt u. verwildert. 9. 3

15. *A. naronitana* Visian. Flora. 1830. Rechb. exc. sub. *A. Abrotanum*. In Dalmatien. 8. 3

16. *A. pontica* L. K. syn. *A. balsamita* Willd. Var. β . *elatio* Rochel ban. Gebirgsabhänge, Felsen, Wege u. Aefferränder, stellw. bh. d. Geb. besonders im mittleren u. südl., Schweiz selten, Rheing., Hohenstoffeln, Hügel d. Tertiärfalk d. Pfalz bei Haseloch im Wormser Gau, Alwig. Niederulm, Alzen u. stellw. bis Mainz, Neuwied, Nahe, Kreuznach im Gau; Württemberg bei Stuttgart, Schwaben, Baiern, Wertheim, Westphalen bei Dülmen, Thüringen, Sachsen, Schlesien; Destr. Mähren, Böhmen, Steyermark, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien. 7—8. 4

17. *A. austriaca* Jacq. K. syn. *A. repens* Pallas in Willd. *A. orientalis* Willd. *A. nivea* Redowsk. Sonnige, trockene Bergwiesen im südl. Geb.; Destr. am Kahlenberg

bei Wien, Krain, Ungarn a. d. Bloßs- u. Adlersberg bei Ofen, Galizien, Siebenbürgen. 8—9. 4

18. *A. inodora* M. v. Bieb. DC. prodr. VI. p. 96. Maly enum. pl. austr. p. 117. In Galizien. 5

19. *A. campestris* L. K. syn. *Oligosporus* — Cassini. Var. β . *sericea* Fries. — γ . *robustior*. — δ . *alpina* DC. — ϵ . *A. lednizensis* Rochel ban. Abhänge, Krain, Wegeränder, Felder, stchw. dch d. g. Geb., südlich nach Destr. bis in d. Kombarbei u. nördl. an d. Ostsee bei Memel, Rheing. auf d. g. Rheinfläche häufig; Var. γ . in d. Vor-alpen, δ . in den Alpen u. ϵ . Ungarn im Banat. 7—8. 4

20. *A. nana* Gaud. helv. K. syn. *A. helvetica* Schleich. Rchb. exc. Südschweiz Cant. Wallis im Saasthale am Mont-Mar-See, Monte Moro, Südtirol nach Sauter. 7—8. 4

21. *A. scoparia* W. et Kit. K. syn. Sandige Hügel, Mauern, Ufer, Felddraine, stchw. im südl. Geb., Destr. bei Wien, Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Galizien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen. 8—9. 4

22. *A. Dracunculus* L. K. syn. *Oligosporus condimentarius* Cassin. Cultivirt. 8—9. 4

23. *A. vulgaris* L. K. syn. Uncultivirte Orte, Wege, Ufer, Schutt im g. Geb. 8—9. 4

24. *A. maritima* L. K. syn. *A. Seriphium* Wallr. Var. α . *A. maritima* Willd. — β . *A. gallica* Willd. Rchb. exc. — γ . *A. salina* Willd. Rchb. exc. — δ . *A. valesiaca* Allion. pedm. Rchb. exc. Sandige, grasige Orte am See-strande, an Salinen u. Salzseen; Var. α . u. γ . an d. Küsten v. Belgien, Holstein, Mecklenburg; Pommern, an d. Salinen in Thüringen, besonders um Artern; in Ungarn u. Siebenbürgen; Var. β . im südl. Littoral, Dalmatien u. bei Rizza; Var. δ . Felsen in d. Südschweiz Cant. Wallis bis Leuf an Wegen u. Abhängen, Val d'Aost; Piemont. 9—10. 4

25. *A. fragrans* Willd. Rchb. exc. Im südlichsten Littoral, Piemont, Ligurien, Genua. 8—9. 4

26. *A. monogyna* W. et Kit. Rchb. exc. Salzseen, salzhaltige Triften, in Ungarn u. Siebenbürgen. 8—9. 4

27. *A. caerulescens* L. K. syn. *Absinthium angustifolium* Dod. pemp. Sumpfige Orte am südl. Littoral, Istrien bei Triest, Monfalcone, Dalmatien, Venedig. 8—9. 4

403. *Tanacetum* L. Rheinfarn. K. syn. 407. Rchb. exc. p. 225. Comp. II. p. 344.

1. *T. vulgare* L. K. syn. Var. β . *crispa* Rchb. Gräben, Ufer, Feldraine, Begeränder im g. Geb. 7—8. 4

2. *T. Balsamita* L. K. syn. *Balsamita major* Desf. Rchb. exc. *B. vulgaris* Willd. Uncultivirte Orte im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin bei Lugano, Littoral, Dalmatien, Lombardei, Venedig; auch in Gärten cultivirt. 8—9. 4

404. *Balsamita* Desf. Balsamkraut. Rchb. exc. p. 225. Comp. II. p. 345.

1. *B. annua* DC. Fl. fr. Rchb. exc. *Tanacetum annuum* L. Sandige Orte im südlichsten Geb., Piemont am Barfuß bei Nizza. 7—8. ☉

2. *B. virgata* Desf. Rchb. exc. *Cotula grandis* L. *Chrysanthemum discoideum* Allion. pedm. Sonnige, trockene Orte um Nizza, Piemont. 7—8. ☉

405. *Cotula* L. Laugenblume. K. syn. 407. Rchb. exc. p. 225. Comp. II. p. 336.

1. *C. coronopifolia* L. K. syn. Wege, an Gräben, am nördl. Seestrande u. d. Inseln längst der Küste von Emden in Ostfriesland nach Holstein, Hamburg, Bremen, Sever u. 7—8. ☉

406. *Santolina* L. Heiligenblume. K. syn. 407. Rchb. exc. p. 224. Comp. II. p. 335.

1. *S. Chamae-Cyparissus* L. K. syn. Sonnige Bergstellen, Weingärten im südl. Geb., Destr. Steyermark in d. Roschniza u. bei Brescia, Littoral, Istrien, Dalmatien,

Arain, Schweiz Cant. Wallis M. Foully, Piemont in d. Valle Macra bei Dertona. 7—8. ‡

2. *S. pinnata* Visian. Rchb. exc. *S. leucantha* Bertolon. Im südlichsten Geb. in d. apuanischen Alpen, in d. Lunenfishen Steinbrüchen über Torrano, zw. Ajola u. Vinca in Oberitalien. 7—8. ‡

3. *S. rosmarinifolia* L. Comp. II. p. 336. Host. Fl. Austr. Felsen d. südl. Vittoralis in Dalmatien. 8—9. ‡

407. *Otanthus* Link. Ohrblume. Rchb. exc. p. 219. Comp. II. p. 335.

1. *O. maritimus* Lk. Rchb. exc. *Santolina* — ma L. *Diotis candidissima* Desf. *Athanasia* et *Filago maritima* L. *Gnaphalium legitimum* Clus. Im südlichsten Vittoral, Piemont bei Nizza. 7—8. 4

408. *Hiorthia* Necker. *Hiorthie*. Comp. II. p. 334.

1. *H. valentina* Lessing. Comp. II. *Anacyclus valentinus* L. Rchb. exc. p. 225. Im südlichsten Geb., Piemont, um Nizza. 7—8. ○

409. *Achillea* L. Schafgarbe. K. syn. 407. Rchb. exc. p. 227. Comp. II. p. 318.

Erste Rotte. *Ptarmica* Tournef. K. syn.

1. *A. lingulata* W. et Kit. Rchb. exc. In d. östl. Alpenzuge, Galizien, Ungarn M. Rosaly, Siebenbürgen Monte Guttin. 7. 4

2. *A. Herbarota* Allion. pedm. Rchb. exc. *A. cuneifolia* Lamk. Alpen in der südlichsten Kette, Lombardie, Piemont u. 7—8. 4

3. *A. Ageratum* L. Rchb. exc. *A. viscosa* Lamk. Feuchte, sonnige Orte im südl. Geb., Dalmatien, Piemont um Nizza. 7. 4.

4. *A. Ptarmica* L. K. syn. *Ptarmica vulgaris* DC. prodr. Var. β . *alpina* Schleich. Feuchte, schattige Orte, Ufer, Gräben, bch. d. g. Geb. 7—8. 4

5. *A. alpina* L. K. syn. *Ptarmica* — DC. prodr. Alpen in d. südl. Kette, Schweiz am Gotthard gegen Airolo; Lombardei, Savoyen u. in d. Novara. 7—8. 4

6. *A. cartilaginea* Ledeb. Rchb. exc. in add. p. 849. Wiesen in Ungarn im Comitat Krasso bei Lugos. 6. 4

7. *A. pectinata* Willd. Rchb. exc. *A. ochroleuca* Ehrh. W. et Kit. Sandhügel im Flugsande, in Ungarn, an d. Donau bei Pesth bis an d. Theiß u. in Siebenbürgen. 6—8. 4

8. *A. Clavennae* L. K. syn. *Ptarmica* — DC. prodr. *A. capitata* Willd. Var. β . *A. glabra* Hoppe. — γ . *A. argentea* Visian. Alpen d. Südschweiz Cant. Tessin a. d. M. Generosa; Tyrol u. d. südl. Alpenkette bis zum Eittoral, Istrien, Lombardei, Venedig u. in Siebenbürgen; Var. γ . in Dalmatien. 7—8. 4

9. *A. valesiaca* Suter helv. K. syn. *A. incisa* Clairv. *A. helvetica* Murith. *Ptarmica valesiaca* DC. Var. β . Schleicheri: *A. helvetica* Schleich. Südschweiz Cant. Wallis an d. Rhonequellen selten. 7—8. 4

10. *A. Thomasiana* Hall. fil. K. syn. *A. montana* Schleich. *Ptarmica Thomasiana* DC. prodr. Alpen d. Südschweiz Cant. Wallis im oberen Rhonethal M. Bavonnaz. 7—8. 4

11. *A. macrophylla* L. K. syn. Rchb. pl. crit. *Ptarmica* — DC. prodr. Wälder, Gebüsche d. Boralpen, Schweiz, dch. d. g. Alpenkette nach Tyrol im Fassaz u. Fiemme-Thal, auf d. Mödleralp im Algau, Krain, dann in d. Lombardei, Venedig. 7—8. 4

12. *A. moschata* Wulfen. K. syn. *A. livia* Scopol. *A. impunctata* Vest. *Ptarmica moschata* DC. prodr. Feuchte Orte d. Hochalpen im Urgebirge; Schweiz dch. d. Alpenkette, M. Grimsel, Furka, Gemmi zc., nach Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

13. *A. hybrida* Gaud. K. syn. *A. moschata* β . *hybrida* Gaud. helv. Var. β . *A. intermedia* Schleicher.

Höchste Granitalpen d. Schweiz, im Cant. Wallis Nicolai- u. Saasthal, am M. Moro. 7—8. 4

14. *A. nana* L. K. syn. *Ptarmica* — DC. prodr. Granitfelsen, Gerölle d. Hochalpen, Südschweiz M. Furka, Roßbodenstock, M. Dödi, Cant. Wallis im Nicolai- u. Saasthale am Monte-Mar-See, Gletscher am M. Rosa 2c., Tyro am Saleneferner, Madrischferner gegen d. M. Orteler zu, Lombardei, Savoyen, Piemont 2c. 7—8. 4

15. *A. atrata* L. K. syn. *Ptarmica* — DC. prodr. *Anthemis corymbosa* Haenke. Etwas feuchte Orte d. Kalt- u. Granitalpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Destr. bis in d. südl. Geb. 7—8. 4

16. *A. Clusiana* Tausch. K. syn. *A. atrata* Jacq. *A. atrata* β . L. *Ptarmica atrata* γ . DC. Feuchte Orte d. Alpen in Destr. Steyermark, Krain, M. Schneeberg, M. Detscher, Eittoral. 7—8. 4

17. *A. abrotanoides* Maly enum. pl. austr. p. 119. *Ptarmica* — Visian. Fl. Dalm. In Dalmatien. 7—8. 4

Zweite Rotte. *Millefolium* Tournef K. syn.

18. *A. tomentosa* L. K. syn. Steinige Orte, Ufer, sandige Orte dch. d. g. südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis im Vispthale von Stalden nach Visp, M. Foully, Branson, St. Pierre, Südtirol bei Bogen, Meran, Brixen, im Vintschgau, Lombardei, Venedig, Piemont, Oberitalien 2c. 5—7. 4

19. *A. leptophylla* M. v. Bieb. DC. prodr. VI. p. 29. Maly enum. pl. austr. p. 199. In Galizien. 4

20. *A. compacta* Willd. Rchb. exc. *A. glomerata* M. v. Bieb. *A. coarctata* Poir. Steinige Orte in Gebirgen, Ungarn im Banat, M. Bersäska 2c. 6—7. 4

21. *A. Millefolium* L. K. syn. *A. sylvatica* Becker *A. collina* Beck. Var. β . *crustata*: *A. crustata* Rchb. exc. in add. p. 850. *A. crassifolia* Dietr. *A. scabra* Host. — γ . *lanata*: *A. lanata* Auct. *A. Sedlii* Presl. Rchb. exc. — δ . *sordida*: *A. polyphylla* Schleicher. — ϵ . *alpestris* Wim. et Grab. *A. magna* Haenke. *A. Haenkeana* Tausch. *A.*

gegen Bonn; Baiern, Main bis Würzburg, Rhethal von Bingen nach Kreuznach bis Oberstein, Meisenheim, Grumbach, Lauterack, Moselthal bei Winingen; Thüringen bis z. Harze; Destr. Böhmen, Mähren; Süd- u. Westschweiz. 7—8. 4

28. *A. ligustica* Allion. Rchb. exc. Hügel, im südl. Geb., Kombardei a. d. Euganeen im Bosana-Thale, am M. Baldo; Piemont, Novara, Ligurien um Voltri. 7—8. 4

29. *A. odorata* L. DC. K. syn. Kalkgebirge im südl. Vittoral, Istrien, Triest, Monfalcone, Krain, Dalmatien, Kombardei. 7—8. 4

410. *Anthemis* L. Anthemisch. K. syn. 412. Rchb. exc. p. 226. Comp. II. p. 312.

1. *A. tinctoria* L. K. syn. Sonnige, steinige Orte, Hügel, Raine, Brachfelder, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉ et 4

2. *A. Triumphetti* Allion. misc. K. syn. *A. rigescens* Willd. *A. caucasica* Hornem. *A. austriaca* β. *Triumphetti* DC. prodr. *A. tinctoria* β. *Triumphetti* L. *Chamaemelum Triumphetti* All. pedm. Gebirge im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin; Vittoral, Istrien, Kombardei, Piemont. 7—8. 4

3. *A. macrantha* Heuffel. Bot. Zeit. 1833. Comp. II. p. 313. Wiesen d. Boralpen, Ungarn, M. Rif, u. Val-lachico im Banat. 7—8. 4

4. *A. austriaca* Jacq. K. syn. Felder, Acker, besonders im südl. Geb., Baiern bei Regensburg, nach Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. ☉

5. *A. altissima* L. K. syn. *A. Cota* Willd. Sandfelder, an Wegen im südl. Vittoral, Istrien. 7—8. ☉

6. *A. Cota Viviani*. K. syn. *A. brachycentros* Gay. *A. austriaca* β. *virans* Rchb. Fl. germ. exsicc. Acker, Weingärten im südl. Vittoral, Istrien, Fiume, Dalmatien, Kombardei, Venedig, Ungarn, Oberitalien. 6—7. ☉

7. *A. ruthenica* M. v. Bieb. K. syn. Sonnige,

steinige Hügel in Böhmen u. im südl. Eittoral, Istrien. 7—8. ☉

8. *A. incrassata* Loisl. *A. peregrina* Willd. Rchb. exc. *A. altissima* Bellard. *A. nicaeensis* Willd. Im südlichsten Eittoral, Dalmatien, Piemont um Nizza. 7—8. ☉

9. *A. sphacelata* Presl. DC. prodr. VI. p. 6. Maly enum. pl. austr. p. 121. Brachäcker im südl. Eittoral, Istrien. 7. 4

10. *A. arvensis* L. K. syn. *A. arvensis* et *A. agrestis* Wallr. Rchb. exc. Aecker u. cultivirte Orte, seltener an Abhängen, Rainen, besonders auf Lehm- u. Sandboden dch. d. g. Geb. gemein. 6—9. ☉

11. *A. Chia* L. Visian. Fl. Dalmatic. Maly enum. pl. austr. in add. p. 404. Steinige Orte, an Wegen, Dalmatien um Ragusa. 7. ☉

12. *A. Cotula* L. K. syn. *Maruta* — DC. M. vulgaris Bl. et Fgh. Aecker, Wege, Schutt, dch. d. g. Geb. 6—10. ☉

13. *A. nobilis* L. K. syn. Trockene, grasige Hügel, im südl. Geb., Dalmatien, Lombardei, Pavia, Venedig, Piemont, Nizza, Novara; im übrigen Geb. wohl nur verwilbert, z. B. Westphalen, Schweiz, Oestr. Böhmen; auch cultivirt. 7—8. 4

14. *A. maritima* L. Rchb. exc. *Chamaemelum maritimum* Allion. *A. punctata* Desf. Im südl. Eittoral, Dalmatien bei Ragusa, Piemont um Nizza. 7—8. 4

15. *A. montana* L. K. syn. *A. grandiflora* Host. *A. Kitaibelii* Spr. Rchb. exc. *A. saxatilis* Kit. *A. mucronulata* Rchb. exc. non Bertolon. *A. styriaca* Vest. *A. montana* J. Gay. *A. carpatica* Willd. Alpen, Steyermark, auf d. hohen Zinken, von Seckau über d. Wolfspass am Gräbel unter d. Mitterplan; Galizien, Ungarn, Siebenbürgen; Piemont. 8—9. 4

16. *A. alpina* L. K. syn. Hochalpen; Tyrol M. Schlehern, Kirchbaumer-Alp, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei, M. Baldo u. 7—8. 4

411. Ormenis H. Cassini. Spornfamilie. Comp.
II. p. 317.

1. *O. bicolor* Cass. *Anthemis mixta* L. Rchb. exc. p. 225. Hügel im südlichsten Littoral, Piemont bei Nizza. 6—7. ☉

412. Anacyclus L. Ringblume. K. syn. 415.
Rchb. exc. p. 225. Comp. II. p. 317.

1. *A. radiatus* Loisl. Rchb. exc. *Anthemis valentina* L. Aecker, Brachfelder im südlichsten Littoral, Dalmatien a. d. Insel Vissa; Piemont, Ufer d. Flusses Paillon bei Nizza. 7—8. ☉

2. *A. pubescens* Rchb. Rchb. exc. *A. tomentosus* DC. *Anthemis pubescens* Willd. *Anth. biaristata* DC. Aecker, sandige Orte im südl. Littoral, Dalmatien, Piemont, Nizza. 7—8. ☉

3. *A. Pyrethrum* Link. Rchb. exc. *A. officinalis* Hayne. K. syn. *A. pulcher* Bess. DC. prodr. *Anthemis Pyrethrum* L. Auf d. Apenninen; angepflanzt in Thüringen, am Harz u. 7—8. ☉

413. Matricaria L. Kamille. K. syn. 416. Rchb.
exc. p. 230. Comp. II. p. 330.

1. *M. Chamomilla* L. K. syn. *Chrysanthemum Matricaria* Neir. Vind. Aecker, Felder, im g. Geb. 5—7. ☉

2. *M. Kochiana* C. H. Schultz. d. *Tanacetum* p. 26. *M. Chamomilla* β . *bipontina* F. W. Schultz. Fl. d. Pfalz p. 236. Saatacker, Schutt, am Schlossgarten bei Zweibrücken 1825, später nicht wieder aufgefunden. 6—7. ☉

414. Chrysanthemum L. Bucherblume. K.
syn. 416. Rchb. exc. p. 232. Comp. II. p. 327.

1. *C. rotundifolium* W. et Kit. Rchb. exc. Alpen u. Boralpen; Ungarn im Beregher u. Marmorosa-Comitat, Galizien u. Siebenbürgen. 7—9. ☉

2. *C. Leucanthemum* L. K. syn. *Leucanthemum*

vulgare Tournef. DC. prodr. Var. β . discoideum K. syn. — γ . atratum: C. atratum Gaud. Thom. non Lin. Wälder, Triften, Wiesen, Brachfelder, Raine, Wegeränder, im g. Geb. bis in d. Alpen. 6—7. 4

3. C. montanum L. K. syn. Phalacrodiscus montanus Lessing. Comp. II. p. 328. Var. α . adustum: C. Leucanthemum II. alpinum Gaud. Leucanthem. atratum DC. prodr.? — β . heterophyllum: C. atratum α . Lin. C. lanceolatum Pers. C. heterophyllum Willd. Allion. pedm. Phalacrodiscus lanceolatus Lessing. — γ . saxicolum: C. montanum L. Leucanthemum — DC. prodr. VI. p. 48. Steinige Orte, Triften d. Alpen u. südl. auch in d. Niederungen bis in d. südl. Eittoral; Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Kärnthen, Krain, Istrien, Monte Spacato bei Triest, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombard. 6—7. 4

4. C. graminifolium L. Rchb. exc. in add. p. 850. Phalacrodiscus — ius Lessing. Comp. II. p. 329. Ph. montanus B. graminifolius C. H. Schultz. bip. In Dalmatien bei Ragusa. 5. 4

5. C. coronopifolium Villars. delph. K. syn. C. atratum Lin. Host. C. Halleri Suter helv. Pyrethrum Halleri Willd. Tanacetum atratum C. H. Schultz. Felsen d. Hochalpen u. mit d. Flüssen in d. Thäler bis z. südl. Eittoral; Baiern im Isarbett bei München; Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Steyermark, Krain, Siebenbürgen, Lombard. 7—8. 4

6. C. Bauhini Tausch. Rchb. exc. in add. p. 850. C. atratum β . Lin. Gebirge in d. südlichsten Kette, Lombard. auf d. Euganes'schen Hügeln westl. v. Padua. 6—7. 4

7. C. ceratophylloides Allion. pedm. K. syn. Pyrethrum — Willd. DC. prodr. Steinige Orte d. Alpen, Baiern auf d. Finkersköpfe; Tyrol u. in Dalmatien. 7—8. 4

8. C. alpinum L. K. syn. Pyrethrum — Willd. Tanacetum — C. H. Schultz. Var. β . minimum Gaud. helv. C. minimum Vill. delph. Pyrethrum alpestre β . pu-

bescens Dub. Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Destr. Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Ungarn, Lombardien, Venedig; Var. β . Schweiz Cant. Wallis im Nicolaithal bei Zermatt; Siebenbürgen. 7—8. 4

9. *C. Parthenium* Pers. K. syn. *Matricaria* — L. *Pyrethrum* — Willd. *Tanacetum* — C. H. Schultz. Schattige, steinige Felsenabhänge, Wege, Schutt, dch. d. g. südl. Geb. u. stellenw. im übrigen Geb., ob nur verwildert? Rheing. nicht selten. 6—10. 4

10. *C. cinerariaefolium* Treviran. *C. Turraeanum* Visian. *Pyrethrum cinerariaefolium* Rchb. exc. Host. Fl. austr. Felsen d. Gebirge im südl. Littoral, Dalmatien bei Spalato u. Umfissa. 5—6. 4

11. *C. corymbosum* L. K. syn. *Pyrethrum* — Willd. *Tanacetum* — C. H. Schultz. *Pyrethrum Clusii* Fisch. Rchb. exc. Gebirgige, walbige Orte, Abhänge, Dämme, Wiesen, stellenw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, Rheing. v. Jura dch. Elsaß, Baden bis Frankfurt nach Nassau, v. Speier dch. d. Hardtgebirge bis Mainz, Bingen, Coblenz, Neuwied bis gegen Bonn, Nahe- u. Rheingeb. v. Kreuznach bis Oberstein, Meisenheim, Trier u. 6—7. 4

12. *C. Zawadzki* Herbach add. Fl. Galiziae. Comp. II. p. 327. Kalkfelsen in Galizien bei Groscienko am Flusse Dunajec an d. Ueberfahrt. 7—8. 4

13. *C. uliginosum* W. et Kit. *Pyrethrum* — Host. Rchb. exc. Sumpfige Orte in Ungarn am Theiß. 8—9. 4

14. *C. macrophyllum* W. et Kit. K. syn. *Pyrethr.* — Willd. *Tanacetum* — C. H. Schultz. *Gymnocline* — a Bl. et Fgh. *G. leucocephala* Cassin. *Achillea sambucifolia* Desf. *A. macrophylla* Piller. et Mittersp. *A. sambucius* Thonin. Gebirgswälder, schattige Alpengegenden, Tyrol bei Innsbruck a. d. Frau-Hüttberg, Krain im Görjanz-Wald, Littoral, Istrien, Ungarn, Banat bei Steyerdorf, Siebenbürgen, Croatien. 6—7. 4

15. *C. elegans* Pollini. *Pyrethrum* — Rchb. exc.

p. 231. Gebirge im südl. Geb., Tyrol im Eosanno-Thale, M. Baldo, Dalmatien, Lombard. 5—8. 2

16. *C. Myconis* L. Rehb. exc. *Pyrethrum* — Spreng. *Coleostephus* — Cassini. *Myconia chrysanthemoides* C. H. Schultz. Im südlichsten Eittoral, Piemont um Nizza. 7. ☉

17. *C. segetum* L. K. syn. *Pyrethrum* — Fl. Wett. *Matricaria segeta* Schrank. *Xanthophthalmum segetum* C. H. Schultz. Thonige Aecker, stchw. dch. d. g. Geb., aber mehr im mittleren u. südl., seltner im nördl. Geb., Rheing., stchw. dch. Baden bis Darmstadt, von Colmar bis Mainz, Coblenz, Bonn, Köln u., häufig in d. Nahe- u. Glangegend bis Kaiserslautern, Saarbrücken, lästiges Unkraut in d. Flora v. Trier, Eurenburg u. 7—8. ☉

415. *Tripleurospermum* C. H. Schultz. K. syn. in addent. p. 1026.

1. *T. uniglandulosum* * *Chrysanthemum* — Visian herb. Maly enum. pl. austr. in add. p. 405. *Chamaemelum* — Visian. Fl. Dalm. II. t. 51. f. 1. Aecker in Dalmatien an d. Monte Bellebit. ☉

2. *T. inodorum* C. H. Schultz. K. syn. 1026. *Chrysanthemum* — L. K. syn. 419. *Pyrethrum* — Smith. Rehb. exc. p. 231. *Matricaria inodora* Lin. suec. Aecker, Felber, Begeränder dch. d. g. Geb. 7—10. ☉

3. *T. maritimum* Koch. K. syn. in add. *Chrysanthemum inodorum* β . *maritimum* Koch. syn. 419. *C. inodorum* β . *salinum* Wallr. *Tripleurosp. inodorum* β . C. H. Schultz. Meerufer, an den Küsten d. Ost- u. Nordsee, salzhaltige Orte, Salinen; Hamburg, Elbufer bei Blankenese u. 7—9. ☉

4. *T. pusillum* * *Chrysanthemum* — Maly enum. pl. austr. p. 122. *Dibothrospermum* — Knaf. Felsen d. Gebirgen in Böhmen bei Komotau. 7—8. ☉

416. *Pinardia* H. Cassini. *Pinardie*. K. syn. 419. K. Taschb. 278. Comp. II. p. 334.

1. *P. coronaria* Lessing. K. syn. *Chrysanthemum* — *ium* L. Rehb. exc. p. 232. *C. speciosum* Brouss. Südliche Alpenkette, Schweiz sehr selten, Cant. Wallis a. d. M. La Comba, Veltlin a. d. M. Fraela, in Dalmatien a. d. Insel Lissa. 7—8. ☉

417. *Doronicum* L. Gemswurz. K. syn. 419. Rehb. exc. p. 234. Comp. II. p. 353.

1. *D. Pardalianches* L. K. syn. *D. latifolium* Cluss. *D. Matthioli* Tausch Rehb. exc. Gebirgswälder, stellw. dch. d. südl. u. mittlere Geb., Rheing., Elsaß, Oberbaden, Pfalz am Drachensfels bei Dürkheim, Kaiserslautern, Bergstraße am Melibokus, auf d. Taunus, Nassau, Limburg, Mosel bei Winingen, Trier, Baiern, Schwaben, Franken, Main bei Würzburg, Schwabenberg bei Castell, Hamburg; Schweiz; Destr. Böhmen, Tyrol, Krain, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 5—6. 4

2. *D. scorpioides* Willd. K. syn. *D. plantagineum* Roth. *D. Pardalianches* — *Plinii* Moench. Alpen u. Voralpen, mehr in d. südl. Kette; Schweiz an d. Salève bei Genf; Tyrol im Rosanna-Thal, am M. Baldo, Lombardei, Venedig, Siebenbürgen, Galizien. 5—6. 4

3. *D. cordifolium* Sternb. K. syn. *D. orientale* Adams. Rehb. exc. *D. caucasicum* M. v. Bieb. Rochel. *D. Columnae* Tenore, *Arnica cordata* Wulf, *A. Wulfeniana* Pollini. Felsen d. Alpen, Tyrol M. Schlehren, Kirchbaumer Alp, Salzburg auf d. Tennengebirge, Destr. Steyermark M. Hohenschwab, Ungarn, Siebenbürgen. 6—8. 4

4. *D. austriacum* Jacq. K. syn. *D. scorpioides* Wim. et Grab. *D. Pardalianches* α. Lin. *Arnica austriaca* Hoppe. Schattige Voralpen u. Gebirgsthäler, Schlessien auf d. Schneeberg bei Glas; Böhmen, Mähren, Destr. Tyrol, Salzburg M. Lofer, Riggühl, Steyermark, Krain, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Littoral. Istrien. 6—8. 4

5. *D. plantagineum* L. Rehb. exc. *D. angusti-*

folium Clus. Bewachsene sandige Hügel, Gebirgswiesen, in Ungarn bei Maria Einsiedel u. in Siebenbürgen. 6—7. 4

418. *Aronicum* Necker. Schwindelkraut. K. syn.

421. Rchb. exc. p. 233. Comp. II. p. 356.

1. *A. Clusii* Koch. K. syn. *A. Doronicum* DC. prodr. Rchb. exc. *Doronicum Clusii* Tausch. Arnica — Allion. pedm. Arn. *Doronicum* Jacq. *A. styriaca* Vill. delph. *Grammarthron biligulatum* Cassini. Var. β . *longifolium*: *Doronicum longifolium* Rchb. exc. p. 234. — γ . *hirsutum*: *Aronia Bauhini* Rchb. exc. *Doronicum* — Sauter. Feuchte, grasige Orte d. Hochalpen; Schweiz u. d. d. g. südl. Alpenkette nach Destr. Ungarn, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien. 7—8. 4

2. *A. glaciale* Rchb. Rchb. exc. K. syn. *A. Clusii* δ . *glaciale* K. syn. edit. I. *A. scorpioides* γ . *glaciale* DC. prodr. Arnica *glacialis* Wulf. Jacq. Feuchte Orte, an d. Gletschern d. Hochalpen, Schweiz u. d. d. g. Alpenkette nach Destr. Steyermark, Kärnten, Krain, Vittoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardien, Piemont. 7—8. 4

3. *A. scorpioides* Koch. K. syn. Arnica — L. *Grammarthron* — Bl. et Fgh. *Doronicum* IV. *styriacum* Clus. Var. β . *auriculatum*: *Doronicum Jacquini* Tausch. *A. latifolium* Rchb. exc. *A. scorpioides* α . *latifolium* DC. prodr. — γ . *non auriculatum*: *Doronicum Halleri* Tausch. *A. scorpioides* Rchb. exc. *A. scorpioides* β . *medium* DC. prodr. Kieselige, steinige Orte d. Alpen, Schweiz u. d. d. g. Alpenkette bis in d. südl. Vittoral u. Lombardien. 7—8. 4

419. *Arnica* L. Wohlverleih. K. syn. 422. Rchb. exc. p. 233. Comp. II. p. 357.

1. *A. montana* L. K. syn. Gebirgswiesen, Waldwiesen an etwas feuchten Orten, Heiden, d. d. g. Geb. bis in d. Boralpen u. Alpen. 6—7. 4

420. *Cineraria* L. Aschenkraut. K. syn. 422. Rchb. exc. p. 241. Comp. II. p. 367.

1. *C. maritima* L. *Senecio maritimus* Rchb. exc. p. 244. Comp. II. p. 363. Am südlichen Littoral, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza, Ligurien. 7—9. 4

2. *C. crispa* Jacq. K. syn. *Senecio crispatus* DC. prodr. Var. β . *rivularis*: *C. rivularis* W. et Kit. Koch. bot. Zeit. Rchb. exc. *Senecio* — DC. prodr. — γ . *C. sudetica* Koch. Rchb. exc. *C. integrifolia* Schkr. *Senecio sudetica* DC. prodr. *C. Schkuhrii* Rchb. exc. *Senecio* — DC. prodr. — ϵ . *crocea*: *C. crocea* Tratt. Rchb. exc. Sumpfige Orte d. Boralpen u. Gebirge; Erzgebirge, Schlessen in d. Sudeten nach Mähren; Destr. Steyermark, Kärnthen, Krain, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. 4

3. *C. pratensis* Hoppe K. syn. *Senecio* — DC. prodr. Var. β . *capitata* Hoppe et Hornsch. Sumpfige Orte am Fuß d. Alpen, Salzburg, Krain, Ungarn. 5—6. 4

4. *C. longifolia* Jacq. Rchb. K. syn. *C. integrifolia* β . *longifolia* Bl. et Fgh. Comp. II. p. 369. *Senecio brachychaetus* DC. prodr. Var. β . *discoidea* Hoppe. Eriften d. Alpen; Destr. Böhmen, Steyermark, Kärnthen, Tyrol, Krain, Siebenbürgen, Galizien, Lombardei; Var. β . bei Heiligenbluth. 5—6. 4

5. *C. alpestris* Hoppe K. syn. *C. integrifolia alpina* Jacq. *C. integrifolia* Willd. *Senecio alpestris* DC. prodr. Var. α . *legitima*: *C. alpestris* Koch. Rchb. — β . *Clusiana*: *C. Clusiana* Host. — γ . *ovirensis*. *C. ovirensis* Koch. bot. Zeit. *C. crassifolia* Kit. *Senecio ovirensis* DC. prodr. Alpen u. Boralpen; Destr. Tyrol, Steyermark, Kärnthen M. Loibl, Krain, Littoral, Istrien, Croatien, Ungarn. 5—6. 4

6. *C. spathulaefolia* Gmel. bad. K. syn. Rchb. *C. longifolia* Sturm. *C. integrifolia* Wallr. *C. campestris* DC. Fl. fr. *Senecio spathulaefolia* DC. prodr. *S. nemorensis* Pollich, *C. tenuifolia* Gaud. Var. β . *discoidea*. — γ . *lejocarpa*. Steinige Gebirgswälder dch. d. südl. u. mittlere Geb., Rheing., Schweiz bis zur Schwäbischen Alp, Elsaß bei Colmar, Baden, Breisg. auf d. Kaiserstuhl, Heidelberg,

Bergstraße bei Weinheim, Mosbach, Nassau, Pfalz, Vogesen- sand- stein zw. Eppenbrunn, Stürzelbrunn u. Ludwigswinkel, Por- phyr- u. Mandelstein-Trappgebirge v. Kreuznach bis Oberstein, Meisenheim, Baumholder, an d. Geisberge bei Kusel; Main- thal bis Würzburg, Moselgegend Trier, Berncastel, Trar- bach an d. Starckenburg, bis Biningen, Coblenz. auf d. vul- kanischen Gebirge d. Mayenfeldes bis ins Uhrthal gegen Bonn u. nach d. Eifel bis gegen Schöneck, Prüm u., Thü- ringen, Sachsen, Schwaben, Baiern, Baireuther Geb. nach Destr. Mähren, Tyrol, Kärnthn, Croatien. 5—6. 4

7. *C. campestris* Retz. K. syn. *C. integrifolia* Smith. *C. integrifolia* β . *pratensis* Jacq. *C. lanceolata* Gmel. bad. *C. alpina* γ . *integrifolia* Lin. *C. alpina* Huds. *Senecio campestris* DC. prodr. Var. β . *C. papposa* Rehb. exc. *Senecio papposus* Lessing. DC. prodr. Sonnige, gra- ffige Kalkhügel, Wiesen, besonders im südl. u. mittleren Geb. Schweiz Cant. Wallis; Luxemburg bei Wilz, Thüringen; Destr. Böhmen, Steyermark, Kärnthn M. Voibl, Krain, Littoral, Istrien bei Triest, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 6—7. 4

8. *C. aurantiaca* Hoppe K. syn. *Senecio* — DC. prodr. Var. β . *lanata*: *C. capitata* K. syn. edit I. *Senecio aurantiacus* β . *tomentosus* DC. prodr. — γ . *discoidea*. *C. capitata* Wahlenb. Triften am Fuße d. Alpen u. Vor- alpen; Schweiz Cant. Fern Stockhornkette, Cant. Wallis M. Rosa; Destr. Böhmen, Steyermark, Tyrol, Kärnthn M. Voibl, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Pie- mont M. Genis. 5—7. 4

9. *C. palustris* L. K. syn. *Senecio* — DC. prodr. Sumpfige, schlammige Orte mehr im nördlichen, selten im mittleren Geb., Rheing., Aachen im Schönforst, v. da nach d. Niederrheine dch. Westphalen, Hannover dch. d. g. nördl. Deutschland, Insel Rügen, Berlin, Preußen um Königsberg u. jenseits d. Thüringerwalde, Schlesien; Destr. Böhmen, Galizien, Siebenbürgen. 6—7. ☉ u. ☉

421. *Senecillis* Gaertn. *Senecilliſ.* DC. prodr. VI. p. 313. Maly enum. pl. austr. p. 125.

1. *S. glauca* Gaertn. Maly enum. pl. austr. *Cineraria* — Willd. Gebirge Galiziens, Siebenbürgen Alpe Ronces. 4

422. *Ligularia* H. Cassin. *Ligularie.* K. syn. 425. Comp. II. p. 367.

1. *L. sibirica* Cass. K. syn. *Cineraria* — *L. Hoppea* — Rehb. exc. p. 240. Sumpfige Gebirgswiesen; Bächen bei Münchengrätz an d. Forsthaufe Reckow, bei Habstein nach Sefera; Galizien, Ungarn Siebenbürgen. 7—8. 4

423. *Senecio* L. *Kreuzwurz.* K. syn. 425. Rehb. exc. p. 242. Comp. II. p. 357.

1. *S. vulgaris* L. K. syn. Var. β . *lanatus* Lohr Fl. v. Trier. — γ . *radiatus*: *S. denticulatus* Müller. Rehb. exc. Auf cultivirtem Lande, an Rainen, Begerändern im g. Geb. Var. β . Hannover, Holstein. 3—11. ☉

2. *S. viscosus* L. K. syn. *Jacobaea viscosa* Fl. Wett. Sandige Orte, Felder, Wälder, Dämme, Schutt im g. Geb. 6—10. ☉

3. *S. sylvaticus* L. K. syn. Var. β . *auriculatus*: *S. sylvaticus* β . *lividus* Hooker. *S. lividus* Nolt. nov. Smith. Rehb. exc. non Linn. Sandige Wälder dch. d. g. Geb. Var. β . in Lauenburg. 7—8. ☉

4. *S. leucanthemifolia* Burr. DC. prodr. VI. p. 344. Maly enum. pl. austr. p. 125. *S. vernus* Rivin. Im südl. Littoral auf d. Insel Lesina in Dalmatien. 6—7. ☉

5. *S. vernalis* W. et Kit. K. syn. Wälder, Hecken, Weinberge u. auf Feldern in Schlesien bei Rosenberg, Stremplowitz, Troppau, Breslau u. Oppeln, Preußen bei Königsberg, Tilsit, Graudenz; Elbing, Danzig; Galizien bei Lemberg, Ungarn, Siebenbürgen. 4. ☉

6. *S. nebrodensis* L. K. syn. *S. rupestris* W. et

Kit. Rchb. exc. *S. rupestris* et *S. montana* Willd. *S. laciniatus* Balb. Var. β . *S. paradosus* Hoppe. Kalkfelsen in d. südl. Kette bis in d. Alpen, Schweiz im Weltlin; Südtirol M. Baldo, Salzburg, Steyermark, Krain, Vittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Ligurien. 5—7. ☉

7. *S. squalidus* L. K. syn. *S. chrysanthemifolius* Poir. *S. gallicus* Vill. delph. Hecker, Weingärten, an Mauern, im südl. Vittoral, Krain, Istrien, Dalmatien. 6—7. ☉

8. *S. abrotanifolius* L. K. syn. Steinige Orte d. Kalkalpen in d. südl. Kette; Schweiz im Innthale nach Salzburg, Tyrol bei Brixen, Destr. Steyermark, Kärnten, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig; Ungarn, Siebenbürgen; Oberitalien. 7—8. 4

9. *S. carpaticus* Herbig. Comp. II. p. 360. *Herbigia abrotanifolia* Zaw. Senec. — folius Wahlenb. carp. Alpen in Galizien u. Siebenbürgen. 7—8. 4

10. *S. erucifolius* L. K. syn. Huds. Pollich. Rchb. Var. β . *S. tenuifolius* Jacq. Rchb. exc. Uncultivirte Orte besonders auf Lehm- u. Kalkboden, Brachfeldern, Rainen, Wege- u. Wiesenrändern dch. d. g. südl. u. mittlere Geb. 7—8. 4

11. *S. dalmaticus* Visian. Fl. Dalm. t. 7. Maly enum. pl. austr. p. 126. In Dalmatien. 4

12. *S. Jacobaea* L. K. syn. Huds. *S. tomentiger* Rchb. Var. β . *discoidea*. Uncultivirte Orte, Wege, Raine, Dämme, Wiesen u. Waldränder im g. Geb. 7—8. ☉

13. *S. aquaticus* Huds. K. syn. *S. Jacobaea* γ . Pollich. Var. β . *S. barbareaefolius* Rchb. exc. Sumpfige Wiesen, feuchter Torfboden stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. stchw. dch. d. g. Rheinthal u. in d. Nebenthälern, Main-, Nahe-, Glan-, Saar- u. Moselthal bis Luxemburg, Hochwald u. Eifel u. 7—8. ☉

14. *S. erraticus* Bertolon. K. syn. Rchb. exc. *S. barbareaefolius* Krok. *S. aquaticus* Loisl. Feuchte Wiesen,

Ufer, nasse Waldwege, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Urgebirge in einem Walde v. Meckenheim nach d. Wischel bei Altenahr, Aachen bei Schönforst, Eder, Rurmer Eisenbahntunnel; Schlesien Oderufer bis Frankfurt, Preußen Königsberg, Danzig; Destr. Südtirol, Krain. 7—9. ☉

15. *S. anthoraefolius* Presl. Rchb. exc. *S. arenarius* M. v. Bieb. *S. delphinifolius* Rchb. exc. *S. praealtus* Bertol. *S. chrysanthemifolius* Moretti. Schattige Orte im südl. Geb., Destr. an d. Donau, Ungarn im Stadtwaldchen bei Pesth, Lombardei bei Verona. 8—9. 4

16. *S. lyratifolius* Rchb. exc. K. syn. *S. alpinus* L. fil. *Cineraria alpina* β . *alata* L. *C. alpina* Willd. Gaud. *C. Zahlbruckneri* Host. Thäler d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Steyermark, Destr. Böhmen, Galizien, Ungarn, Vittoral, Istrien, Lombardei bis Oberitalien. 7—8. 4

17. *S. cordatus* Koch K. syn. *S. alpinus* Rchb. exc. DC. prodr. non Scop. et L. *Cineraria cordifolia* Gouan. Jacq. Triften d. Alpen u. Boralpen, Bodensee Gegend bei Winterfulgen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Destr. u. in d. Lombardei. 7—8. 4

18. *S. subalpinus* Koch K. syn. *S. alpinus* β . *auriculatus* Rchb. exc. DC. prodr. *Cineraria alpina* Host. *C. cordifolia auriculata* Jacq. Feuchte Triften d. Alpen u. Boralpen; Schlesien auf d. Baranja, Dominowka, Babia Gora; Destr. Steyermark, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

19. *S. carniolicus* Willd. K. syn. *S. incanus* Scop. carn. Etwas feuchte, kieselige Orte d. höchsten Granit-Alpen; Schweiz Cant. Graubünden auf d. Fluela; Destr. Steyermark, Tyrol, Salzburg, Kärnten, Krain; Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

20. *S. incanus* L. K. syn. *Jacobaea pumila* Pluck. *J. alpina pumila* Bocconi. Felsen u. im Gerölle d. höchsten Granit-Alpen; Schweiz auf d. Gotthard, Cant. Wallis, Saas- u. Nicolaithal, M. Foully, über Bagnes, M. Moro, Grau-

bündten 2c.; Südtirol, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont 2c. 7—8. 4

21. *S. uniflorus* Allion. pedm. K. syn. Granitfelsen u. Gerölle d. Hochalpen, Schweiz, im Cant. Wallis Nicolaital, M. Foulx, Stockberg, Matterhorn, M. Moro am Matt-Mar-See im Saaserthale; Lombardei, Piemont. 7—8. 4

22. *S. Cacaliaster* Lamk. K. syn. *Cacalia saracenica* L. Senec. *croaticus* W. et Kit. Boralpen in d. südl. Kette; Südtirol, Kärnten, Steyermark, Croatien, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

23. *S. nemorensis* Lin. K. syn. Var. α . *genuinus* *S. nemorensis* Willd. *S. frondosus* Tausch. *S. germanicus* Wallr. — β . *odoratus*: *S. nemorensis* Jacq. *S. Jacquinianus* Rehb. exc. DC. *S. fontanus* Wallr. — γ . *octoglossus*: *S. nemorensis* Ledeb. Rehb. icon. *S. octoglossus* DC. prodr. — δ . *Fuchsii*: *S. Fuchsii* Gmel. bad. Rehb. exc. *S. ovatus* Willd. *S. saracenicus* Pollich. Wallr. *S. salicifolius* Wallr. *Jacobaea ovata* Fl. Wett. *Solidago saracenicus* Fuchs. Schattige Wälder, Gebüsche d. Gebirge u. Niederungen dch d. g. Geb. bis in d. Boralpen. 7—8. 4

24. *S. saracenicus* L. K. syn. *S. fluviatilis* Wallr. Var. β . *flosculosus* DC. prodr. Flußufer, feuchte Weidengebüsche, Hecken stchw. dch d. Geb., Rheing., Mainz, Rüdesheim, Coblenz, Boppard, Nahe bei Kreuznach, Mosel bei Trier 2c., Main v. Rüggingen bis Mainz, an d. Elbe bis Holstein, an d. Leine u. Weser, Hamburg, Jena, Sachsen; Schlesien an d. Oder bis Frankfurt; Preußen, Tilsit, Thorn, Marienburg, Baiern an d. Donau v. Regensburg nach Destr. bei Wien 2c., Moldau. 7—8. 4

25. *S. umbrosus* W. et Kit. Rehb. exc. in add. p. 852. Nadelholzwälder, in Destr. um Ebenfurt, Galizien bei Lemberg, Ungarn bei d. Luischer Bädern, Croatien, Siebenbürgen. 8—9. 4

26. *S. macrophyllus* M. v. Bieb. DC. prodr. Maly enum. pl. austr. p. 127. Wiesen in Galizien. 4

27. *S. Doria* L. K. syn. Gräßige Hügel, Triften,

im südl. Geb., Baiern; Destr. Kärnthen, Croatien, Lombardei, Galizien, Siebenbürgen. 7—8. 4

28. *S. Visinianus* Papasaba. Vis. Fl. Dalm. Maly enum. pl. austr. p. 127. In Dalmatien. 7. 4

29. *S. paludosus* L. K. syn. *S. riparius* Wallr. *Jacobaea paludosa* Fl. Wett. Var. β . *glabratus* *S. bohemicus* Tausch. — γ . *tomentosus*: *S. tomentosus* Host. *S. Sadleri* Lang. Rasse, sumpfige Wiesen, Triften, an Gräben, buschigen Flußufern, stellenw. dch. d. Geb., Rheing., dch. Elsaß, Baden, Pfalz bei Landau, Speier, Dürkheim, Frankenthal, Worms bis Mainz u. Bingen, Niederrhein, Grefeld bei Niep; Eurenburg bei Frenlange u., nach Westphalen, Hamburg, Schwaben, Baiern, Sachsen, Schlesien, Preußen bis Danzig; Destr. bis in d. Lombardei. 7—8. 4

30. *S. Doronicum* L. K. syn. Var. β . *glaberrimus* Rochel. Ban. Steinige Orte d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. südl. Alpenkette nach Salzburg, Tyrol, Kärnthen, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Ungarn, Siebenbürgen; Piemont. 7—8. 4

31. *S. lanatus* Scopoli. K. syn. *S. arachnoideus* Sieber. *Cineraria* — dea Rehb. exc. p. 242. *Senec. Scopoli.* Hoppe et Hornsch. *S. Doronicum* β . K. syn. edit. I. *Arnica lanigera* Tenore. Gräßige Gebirgsstellen am südl. Littoral, Krain dch. d. g. Karstgebirge bis Triest, M. Spaceto u. 5—6. 4

Zweite Unterordnung.

Cynerocephaleen. Vaill. K. syn. *Cynareen* Lessing. K. Taschb. 286.

Erste Unterabtheilung.

Calendulaceen Cassini DC. prodr. K. Taschb. 286.

424. *Calendula* L. Ringelblume. K. syn. 451.

Rehb. exc. p. 211. Comp. II. p. 370.

1. *C. arvensis* L. K. syn. *Caltha officinalis* Scopol. Acker, Weingärten, dch. d. g. südl. u. im mittl. Geb., Rheing.

v. Basel bch. Elsaß, Pfalz an d. Hardt bei Burweiler, Weiher, Fischlingen, Landau, Speyer, Dürkheim, Worms, Mainz bis Bingen, Rheing., im Main- u. Neckarthale, an d. Nahe bei Kreuznach, Fl. v. Trier bei St. Wendel u. im Obermoselthale, Schwaben, Baiern, Franken, Halle, Thüringen, Sachsen; Böhmen, Südtirol, Eittoral, Istrien, Triest, Croatien, Dalmatien, Kombarbei. 7—9. ☉

2. *C. officinalis* L. Rchb. exc. Aecker, Schutt im südlichsten Geb., Dalmatien, Oberitalien bei Novara u. allgemein in Gärten rc. cultivirt. 7—9. ☉

Zweite Unterabtheilung.

Echinopsideen Cassini in Lessing. K. Taschb. 286.

425. *Echinops* L. Kugeldistel. K. syn. 452. Rchb. exc. p. 292. Comp. II. p. 373.

1. *E. spaerocephalus* L. K. syn. Rchb. exc. *E. multiflorus* Lamk. Var. β . *E. paniculatus* Jacq. Rchb. exc. Weinberge, an Wegen, steinige Orte, stellw. besonders im südl. Geb., Wiesbaden, Thüringen bei Jena, Württemberg, Burg Fahrenberg, Eisberg bei Gßlingen, Baiern, Schloß Welchenberg bei Straubingen, Elbufer bei Hamburg, Mecklenburg auf d. Insel Güstrow; Destr. Böhmen um Melnik, Mähren, Steyermark bei Gdrz u. Marburg, Tyrol, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Kombarbei. 7—8. 4

2. *E. Neumayeri* Visiani. Fl. Dalm. Maly enum. pl. austr. in add. p. 405. In Dalmatien. 4?

3. *E. exaltatus* Schrad. K. syn. *E. strictus* Fischer. *E. Ritro* Schkr. Waldbstellen im südl. Geb., Krain, Eittoral, Istrien im Guschiza-Thale, Dorf Necke bei Triest, Ungarn bei Ofen. 7—8. 4

4. *E. banaticus* Rochel. Host. Fl. austr. p. 524. *E. ruthenicus* M. v. Bieb. Rchb. exc. Rochel. *E. humilis* M. v. Bieb. Rchb. exc. *E. davuricus* Fisch. Trevir. Flußthäler d. Biela, Beda u. Gzerna in Ungarn u. am Römer-Wall im Banat. 7—8. 4

5. *E. Ritro* Lin. K. syn. *E. pauciflorus* Lamk. Var. β . *E. tenuifolius* Fisch. *E. Ritro* Ledeb. *E. Ritro-elegans* Bertolon. *E. virgatus* Lamk. Gräßige, trockene Hügel, Abhänge, an Wegen im südl. Geb., Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Croatien, Dalmatien bei Spalato, Nizza. 7—8. 4

426. *Cirsium* Tournef. Kragdistel. K. syn. 452 et in add. 989. K. Taschb. 287. Rechb. exc. p. 282. Comp. II. p. 375.

1. *C. lanceolatum* Scopol. K. syn. *Carduus* — *tus* L. *Cnicus* — Willd. Var. β . *semidecurrens* Jaeger. F. Schultz Fl. d. Pfalz p. 246. — γ . *Jaegeri* Schultz. Fl. d. Pfalz. *C. grandiflorum* Kittel. *C. Jaegeri* F. W. Schultz früher. — δ . *paradoxum* K. syn. add. 990. Triften, magere Wiesen, Wege u. Feldränder, Schutt, im g. Geb. Var. β , γ . u. δ . in d. Pfalz. 6—9. ☉

2. *C. nemorale* Rechb. exc. K. Taschb. K. syn. edit. I. *C. lanigerum* Naegeli. *Cirsien* d. Schweiz. *C. lanceolatum* β . *nemorale* K. syn. 452. et in add. 990. *C. laniflorum* M. v. Bieb. Waldstellen, stellenw. im Geb., Sachsen im Lindenthal bei Leipzig, Holstein, Schleswig; Schweiz besonders in d. Bergregion, am Uto bei Zürich. Sihlthal, Bergthaler in Wallis; Destr. bei Wien. 7—8. ☉

3. *C. eriophorum* Scopol. K. syn. *Carduus* — *us* Jacq. *Cnicus* — Roth. Willd. *Eriolepis eriophora* H. Cassini; Var. β . *C. spathulatum* Gaud. helv. Moretti Rechb. exc. Gebirgische, schattige Orte, an Wegen bis in d. Boralpen u. Alpenthäler, besonders im südl. u. mittl. Geb., Rheing. v. Basel dch. Elsaß u. Baden bis Mannheim, Pfalz bei Speier, Frankthal, Worms bis Frankfurt, Mainz bis Bingen an d. Laurentius-Kapelle bei Ockelheim, Alzei, Nassau an d. Lahn, an d. Saar bei Saarbrücken, Dillingen u. stellenw. bis Eurenburg; Franken bei Würzburg, Thüringen, Schlesien, Baiern; Destr. dch. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Galizien, Siebenbürgen, Lombardien, Schweiz. 7—8. ☉ 4

4. *C. ciliatum* M. v. Bieb. DC. prodr. VI Maly

enum. pl. austr. p. 128 et 380. *Carduus ferox*. Baumg. non DC. Siebenbürgen bei Rynlas. 4

5. *C. italicum* DC. Rechb. exc. *Cnicus italicus* Sebast. et Maur. *C. samniacus* Tenore. Im südlichsten Geb., Lombardei u. bei Bologna in Oberitalien. 6—7. ☉

6. *C. ferox* DC. Rechb. exc. *Cnicus* — Allion. pedm. Uncultivirte Orte im südlichsten Geb., Lombardei, Piemont, Nizza. 7—8. ☉

7. *C. palustre* Scopol. K. syn. *Carduus* — tris L. *Cnicus* — Willd. Var. β . *C. Chailleti* Gaud. non K. syn. edit. I. Sumpfige, nasse Wiesen, Gräben, Waldstellen 2c., im g. Geb. 7—8. ☉

8. *C. pannonicum* Gaud. helv. K. syn. *Carduus* — Lin. fil. *C. serratuloides* Jacq. *Cnicus* — Willd. *Cirsium* — Scopol. Gebirgswiesen, im südl. Geb., Schweiz Cant. Tesfin an d. Corno di Ganzo; Destr. bei Wien, Böhmen, Kärnthen, Südtirol, Krain, Littoral, Istrien, M. Maggiore, Galizien, Ungarn bei Pesth, Lombardei; Piemont. 6—7. 4

9. *C. monspessulanum* Allion. pedm. Rechb. exc. *C. compactum* α . Lamk. *Carduus monspessulanus* L. Gebirgsthäler im südlichsten Geb., Lombardei bei Verona, Piemont, Nizza. 7—8. 4

10. *C. pyrenaicum* DC. Rechb. exc. *C. compactum* β . Lamk. An Gebirgsbächen im südlichsten Geb., in Piemont an d. Quellen v. Vinadio. 7—8. 4

11. *C. canum* M. v. Bieb. K. syn. 454 et in add. 991. *Carduus canus* L. *C. tuberosus* Jacq. enum. *C. canus* Jacq. austr. *Cnicus* — Willd. Var. β . *Cirs. pratense* Lamk. *Carduus chius* Jacq. h. vind. Feuchte Gebirgswiesen, theilw. im Geb., Sachsen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

12. *C. carniolicum* Scopol. K. syn. 454 et in add. 994. *C. rufescens* Ramon apud. DC. *Cnicus carniolicus* Willd. Felsen d. Alpen u. Boralpen in d. südl. Kette; Destr. im Müllner-Thale u. im Alpenwalde, Steyermark, Kärnthen,

Krain auf d. M. Baba, M. Privale, M. Voibl in d. Wochein. 7—8. 4

13. *C. pauciflorum* Rehb. Rehb. exc. K. syn. edit. I. Spreng. K. Taschb. 288. *Cnicus pauciflorus* W. et Kit. *Cirsium rivulare* — *heterophyllum* K. syn. in add. 1004.? Triften d. Granit-Alpen; Steyermark am Bürgersee u. Rottenmanner-Tauern, Krain im Karstgebirge, Vittoral, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

14. *C. Erisithales* Scopol. K. syn. 455 et in add. 994. *C. glutinosum* Lamk. *C. ochroleucum* α. DC. prodr. Lamk. *Carduus Erisithales* Jacq. Lamk. *Cnicus* — L. Gebirgshaine, schattige Felsen d. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Salzburg, Destr. 2c., Rheing., Oberbaden im Bärenthale, im Breisg. u. bei Möskirchen im Donauthale. 7—8. 4

15. *C. ochroleucum* Allion. pedm. K. syn. edit. I. 396. K. Taschb. 289. Rehb. exc. *C. ochroleucum* β. DC. *C. Erisithales* II. Gaud. helv. Schattige Felsen d. Alpen, Schweiz α. d. M. Doie im Surazug; Piemont bei Tenda. 7—8. 4

16. *C. spinosissimum* Scopol. K. syn. *Cnicus* — us Lin. *Carduus* — Villar. delph. *C. involucrat* Lamk. Feuchte Triften u. auf Bachfließ d. Alpen; Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Destr. Steyermark, Tyrol, Salzburg, Kärnthén, Krain, Vittoral; Piemont. 7—8. 4

17. *C. stellatum* Allion. pedm. Rehb. exc. *Cnicus stellatus* Host. *Carduus* — L. *Chamaepeuce stellata* DC. Visian. Fl. Dalm. *Lamyra stipulacea* H. Cassini. Necker, an Wegen, im südl. Vittoral, Dalmatien auf d. Insel Lefina; Piemont, Nizza. 6—7. ☉

18. *C. oleraceum* Scopol. K. syn. *Cnicus* — L. *Carduus* — Pers. *C. acanthifolius* Lamk. *Onothrophe oleracea* Cassini. Feuchte, sumpfige Wiesen, Walbstellen, Gräben, Ufer; stchw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

19. *C. montanum* Spreng. Rehb. exc. *Cnicus* — Walst. et Kit. *C. alsophilus* Pollini veron. Gebirge im südl. Geb.,

Croatien, Siebenbürgen, M. Baldo, Lombardei, Venedig.
7—8. 4

20. *C. rivulare* Link. K. syn. *C. tricephalotes* Lamk. DC. *C. carniolicum* Allion. pedm. *Carduus rivularis* Jacq. *Cnicus* — Willd. *Carduus Erisithales* Vill. delph. Var. β . *ramosum*: *Cnicus salisburgensis* Willd. Feuchte Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Destr., dann in d. Niederungen längs d. Alpen u. Gebirge; Rheing., Schwaben in allen Guraetheilen, Oberbaden bei Müllheim, Breisg. a. d. Feldberg, Billingen zc., Preußen bei Königsberg, Schlesien, Oberbaiern, Böhmen, Mähren, Galizien, Lombardei. 6—7. 4

21. *C. heterophyllum* Allion. pedm. K. syn. *Carduus* — *lus* L. *Cnicus* — Willd. Var. β . *integrifolium*: *C. helenioides* Allion. *Carduus* — Willd. Suter helv. non Lin. Feuchte Triften, an Quellen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. stellw. dch. d. Alpenkette nach Baiern; Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Galizien, Siebenbürgen bis in d. Lombardei, in den Gebirgen v. Oberbaden, Oberbaiern, am Thüringer Walde, Sachsen bei Tharand, Schlesien; Mähren u. Böhmen. 6—7. 4

22. *C. anglicum* DC. Fl. fr. K. syn. 456. *C. bulbosum*, *C. anglicum* Naegeli K. syn. 992. *Carduus anglicus* Lamk. *Card. pratensis* Huds. Host. *C. dissectus* Huds. Vill. delph. *Cnicus pratensis* Willd. Sumpfige Wiesen d. Gebirge u. Boralpen, Rheing., Oberbaden zw. Stockach u. Bizenhausen, am Bodensee, stellw. dch. d. Alpenkette d. nördl. Schweiz u. in Obersteyermarf. 6. 4

23. *C. bulbosum* DC. Fl. fr. K. syn. *C. tuberosum* Allion. pedm. *Carduus tuberosus* Pollich. *Card. tuberosus* β . Lin. *Cnicus tuberosus* Willd. *Cn. spurius* Hoffm. Var. β . *major*: *Cirs. ramosum* Naegeli. Feuchte, etwas schattige Gebirgswiesen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. Elsaß bis Speier, Pfalz Deidesheim, Dürkheim, Maxdorf bis Mainz, Bingen, Wiesbaden zc., Kreuznach u. dch. d. Hochwald nach d. Eifel bei Prüm Flora v. Trier, dch. Baden bei Graben,

Wiesloch, St. Ilgen u.; Schwaben, Baiern, Maingeb. bis Würzburg, Thüringen, Sachsen, Harz, Schlesien, Schweiz v. Zürich bis Basel; Oest. Böhmen, Mähren, Steyermark, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

24. *C. acaule* Allion. pedm. K. syn. *Carduus acaulis* L. *Cnicus* — Willd. Var. β . *caulescens*: *Cnicus dubius* Willd. *Carduus Roseni* Villar. delph. Wiesen, Triften, steinige Waldwege u. Feldränder, besonders in den Gebirgen dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 7—8. 4

25. *C. arvensis* Scopul. K. syn. *Serratula arvensis* Lin. Var. β . *integrifolium*: *C. setosum* M. v. Bieb. — γ . *vestitum*: *C. argenteum* Vest. Cultivirte u. uncultivirte Orte, Felder, Aecker, Triften, stellenw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

26. *C. strigosum* M. v. Bieb. Rehb. exc. in add. p. 856. *Carduus* — et *Cnicus* M. v. Bieb. Im südlichsten Geb., Lombardei bei Pavia u. in d. Novarese. 8—9. ☉

27. *C. macrostylus* Rehb. Rehb. exc. in add. p. 856. *Cnicus macrostylus* Moretti. Im südlichsten Geb., Lombardei; in d. Novarese im Valle Bogna. 7—9. ☉

Wirkliche oder muthmaßliche Bastarde von *Cirsium*.

Man ist nach meinem Dafürhalten in Beziehung der Bastardbildung dieser Gattung in neuerer Zeit wohl etwas zu weit gegangen — denn es läßt sich keineswegs in Abrede stellen, daß noch fernere Beobachtungen anzustellen sind, um die wirkliche Hybridität mancher der folgenden Arten bestimmt festzustellen; wie der scharfsinnige Beobachter F. W. Schulz in seiner Flora d. Pfalz richtig bemerkt. Der selige Koch scheint selbst nicht ganz mit der Bearbeitung dieser Gattung durch Nageli in Zürich »Dispositio specierum generis *Cirsii* tum genuinarum quam hybridarum etc. Koch synops in add. p. 990 bis p. 1012.« einverstanden zu sein, wie mir sein letztes Schreiben beweist. — Statt der hybriden Benennungen habe ich bei

den betreffenden Arten andere Namen und zwar bekannten Botaniker vorgezogen.

28. *C. Gerhardtii* C. H. Schultz bip. Flora Nro. 35. 1849. *C. eriophoro-lanceolatum* C. H. Schultz. Feuchte Wiesen unter d. Eltern, stchw. Rheing., Oberbaden bei Pfohren, Pfalz zw. Speier u. Ludwigshafen, auf d. Neuhofer Gänse- oder Sauweide in d. Nähe d. Ludwigsdamm's, bei d. Krieglage gegen d. Altrhein 8. ☉

29. *C. Naegelianum* * *C. lanceolata-palustre* Naegeli Cirsien d. Schweiz. K. syn. in add. 996. Schweiz unter d. Eltern am Uto bei Zürich. 7—8. ☉

30. *C. sabaudum* * *C. lanceolato-acaulis* K. syn. in add. 997. Savoyen bei Gambern. 7. 4?

31. *C. Kochianum* Löhr. Flora 1842. K. Taschb. 293. Löhr Fl. v. Trier, F. W. Schultz Fl. d. Pfalz; *C. bulboso-palustre*. Kirchschl. statistique p. 14. *Carduus Kochianus* F. Schultz. Etwas feuchte Wiesen unter den Verwandten, Rheing. Im Elsaß, dann in d. Eifel zw. Prüm u. Giesdorf Flora v. Trier; Schweiz am Uto bei Zürich. K. syn. in add. 998. 7—8. 4

32. *C. semidecurrens* Richter. Rehb. exc. *C. lanceolatum* Döll. Rh. Fl. *Cnicus palustri-tuberosum* Schiede pl. hyb. *Cirsium palustri-bulbosum* DC. prodr. Naegeli. *C. palatinum* C. H. Schultz. Feuchte Wiesen, stchw. im Geb., unter d. Eltern; Rheing., Pfalz bei Deidesheim, Elberstadt, Forst, Annweiler, in d. Trifelsbach; Oberbaden bei Müllheim; Baiern bei München, Sachsen bei Leipzig; Schweiz am Uto bei Zürich. 7—10. 4

33. *C. subalpinum* Gaud. helv. K. Taschb. 291. *C. palustri-rivulare* Naegeli K. syn. in add. 998. *Cnicus palustri-rivularis* Schiede pl. hyb. Feuchte Triften d. Vor-alpen, unter d. Eltern; Oberbaiern; Tyrol, Steyermark, Krain, Lombardien, Schweiz im Valle de Lour u. im Sihlthale. 7—8. 4

34. *C. Wirtgenii* * *C. rivulari-palustre* Koch. syn.

in add. 998. Feuchte Wiesen unter d. Eltern, Schweiz im Sihlthale. 8. ☉?

35. *C. Bruneri* Alex. Braun. Flora Nr. 1. 1846. *C. tuberoso-rivulare* Al. Br. Etwas feuchte Wiesen im Jura-Gebiet, in Oberbaden, bei Mundelfingen unweit Donaueschingen. 7—8. 4

36. *C. Kirschlegeri* C. H. Schultz. K. syn. in add. 999. *C. palustri-acaule* Hampe prodr. Fl. hercyn p. 48. Nahe Triften unter d. Eltern; Rheing., Elsaß bei Straßburg; im Harz bei Blankenburg. 7—8. 4

37. *C. hybridum* Koch. ap. DC. Fl. fr. K. syn. edit I. p. 394. K. Taschb. 292. *C. parviflorum* Bl. et Fgh. DC. prodr. VI. *Carduus parviflorus* L. *C. hybridus* Steud. nomcl. *Cnicus* — Heller. Wierzb. Schleich. exsicc. *C. Erisithales* Hagen non Lin. *Cirs. subalatum* Thom. *C. palustri-oleraceum*. K. syn. in add. 999. Naegeli d. *Cirs. d. Schweiz* p. 148. *Cnicus palustri-oleraceus* Schiede. Nahe, sumpfige Wiesen, Gebüsche, stellw. im Geb., unter d. Eltern, Rheing., Oberbaden bei Mühlheim Rnielingen, Grahen, Brühl, Neckargemünd, Rheinhessen zw. Bergen u. Bornheim bis Frankfurt; bch. Elsaß bei Straßburg, Pfalz, Kaiserslautern, Zweibrücken, Bitsch, Annweiler u., Baiern, Donaugegend bei Ulm, Franken bei Marktbreit, Sachsen, Schlesien, Berlin, Königsberg; Schweiz im Sihlthale bei Studen, Hüttchen im Cant. Zürich, Freiburg bei Bou, Cant. Wallis, Luzern u. in d. Lombardei. 7—8. ☉

38. *C. lacteum* Koch. K. syn. edit. I. K. Taschb. 292. *Cnicus* — tus Schleich. *Cirs. subalpinum* β. *lacteum* Gaud. helv. Feuchte Alpentriften d. Schweiz. 7—8. 4

39. *C. Chailleti* Koch. K. syn. edit. I. 393. *C. pannonicopalustre*. Koch. Taschb. 291. *C. arvensi-palustre* K. syn. edit. II. in add. 1000. Sumpfige Wiesen, in Destr. zw. Bruck u. Batrandorf bei Wien u. in Mähren. 7—8. ☉?

40. *C. Freyerianum* Koch. K. Taschb. 288. *C.*

pannonico-acaule K. syn. in add. 1001. Uncultivirte Orte, bei Gottschee in Unterfrain. 7—8. 4

41. *C. Linkianum* * *C. Erisithali* - pannonicum Heer. *C. pannonico-Erisithales* K. syn. in add. 1001. *Carduus tenuifolius*? Thomas exsicc. Im südlichsten Geb., Lombardei, Corni di Conzo, ital. Schweiz. 7—8. 4

42. *C. tataricum* Wim. et Grab. Fl. Sil. non All. K. Taschb. 292. *Carduus tataricus* L. *Cnicus* — Besser. Fl. Galicae. *C. cano-oleraceum* Rehb. exc. p. 287. K. syn. in add. 1002. Feuchte Wiesen unter d. Eltern; Thüringen, Erfurt, Franken, Sachsen bei Dresden, Schlesien; Oestr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn. 6—8. 4

43. *C. Reichenbachianum* * *C. oleraceo-arvense* Naegeli. Cirsien d. Schweiz p. 146. t. IV. K. syn. in add. 1002. Feuchte Waldstellen unter d. Eltern, Sachsen an d. Weisseritz, Schweiz am Uto bei Zürich. 7—8. 4

44. *C. Zizianum* Koch. K. syn. edit. I. 398. K. Taschb. 294. *C. medium* All. pedm. Rehb. exc. *Cnicus medius* Willd. *Carduus pedemontanus* Pers. *Cnicus acaule-tuberosus* Schiede pl. hyb. Cirs. tuberoso-acaule Kirschleyer. *C. bulboso-acaule* Naegeli K. syn. in add. 1003. *C. acauli-bulbosum* K. Taschb. Hügel, Wiesen, Triften, besonders auf Kalk in d. Rheing., stellw. dch. d. Geb. unter d. Verwandten, Rheing., Pfalz Marbof, Ibsenheim, Arzheim, Mainz, Bingen, an d. Ockelheimer Spitze, Naheg. bei Sponheim, Schweiz bei Zürich, Sachsen bei Bienitz. 7—8. 4

45. *C. Heerianum* Naegeli Cirs. d. Schweiz p. 75. *C. rivulare-acaule* K. syn. in add. 1003. Feuchte Gebirgswiesen unter d. Eltern, Schweiz in d. Vallée de Joux. 7—8. 4

46. *C. alpestre* Naegeli Cirs. d. Schw. p. 84. *C. heterophyllo-acaule* K. syn. in add. 1004. Feuchte Wiesen d. Ber Alpen unter d. Stammarten; Schweiz im Cant. Wallis bei Zermatt. 8. 4

47. *C. ambiguum* Koch syn. edit. I. 396. Allion. pedm.? *Carduus ambiguus* Schleich. Cirs. *Erisithali-*

heterophyllum K. syn. in add. 1005. Feuchte Wiesen d. südl. Alpen unter d. Eltern, Tyrol im mittlern Binschgau, Schweiz Cant. Wallis, Lombardien, Piemont. 7—8. 4

48. *C. Schultzeanum* * *C. spinosissimo-rivulare* Naegeli d. Cirs. d. Schw. p. 140. *C. rivulare-spinosissimum*? K. syn. in add. 1006. Alpenwiesen in d. südlichsten Kette, Piemont an d. M. Genis. 7—8. 4

49. *C. Cervini* Thomas K. syn. edit. I. 399. K. Taschb. 293. *C. purpureum* All. pedm. Rchb. exc. p. 286. *C. Hallerianum* Gaud. *C. controversum* DC. prodr. VI. *C. erucagineum* DC. prodr. VI. *C. ambiguum* β . *albidum* DC. prodr. VI. *Carduus autareticus* Vill. delph. *Cnicus* — Loisl. Fl. gall. *Cirs. autareticum* Mutel Fl. Dauph. *C. rigens* β . *laevigatum* Gaud. helv. *C. spinosissimo-heterophyllum* Naegel. Cirs. d. Schw. p. 142. *C. heterophyllo-spinosissimum* K. syn. in add. 1006. *C. spinosissimo-alpestre* Naegel. Cirs. d. Schw. p. 141. Feuchte Triften d. Alpen an Bachufern in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Graubünden, Wallis bei Zermatt, am Matterhorn, Piemont an d. M. Genis u. in Südtirol. 7—8. 4

50. *C. Gutnickianum* * *C. spinosissimo-acaule* Naegli Cirs. d. Schw. p. 139. *C. acaule-spinosissimum* K. syn. in add. 1007. Triften d. Alpen unter d. Stammarten, Schweiz bei Ber auf d. Bovanna, St. Moriz im Engadin. 7—8. 4

51. *C. Braunii* F. W. Schultz. Fl. d. Pfalz p. 250. *C. Lachenalii* All. Braun. K. syn. edit. I. 397, non K. Taschb. *C. rigens* Rchb. exc. *C. inerme* Rchb. exc. *C. pallens* DC. prodr. *C. bulbosum* β . *pallens* Wallr. *Cnicus Lachenalii* Gmel. bad. Cn. *rigens* Aiton. *Carduus Braunii* F. W. Schultz. Jahrb. *Cnicus bulboso-oleraceum* Schiede pl. hybr. *Cirs. oleraceo-bulbosum* Naegeli. *C. bulboso-oleraceum* K. syn. in add. 1007. *C. oleraceo-ramosum* Naegeli Cirs. d. Schw. Feuchte Wiesen unter d. Eltern, stettw. im Geb., Rheing. von Basel nach Elßaß bei Straßburg, bch. Baden bei Karlsruhe, Graben, Pfalz Deidesheim

u. längst d. Gebirge bei Annweiler, Wolmesheim u. bis gegen Mainz, Baiern, Thüringen, Sachsen, Schweiz bei Freiburg, Zürich bis Basel. 7—9. 4

52. *C. bipontinum* F. W. Schultz Fl. d. Pfalz p. 350. *C. Lachenalii* Koch Taschb. 294. *Carduus bipontinus* F. W. Schlitz. *Cirs. oleraceo-lanceolatum* F. W. Schlitz. *C. lanceolato-oleraceum* Koch. Taschb. 294. Wiesen u. Wiesenränder, Rheing. Elsaß, Pfalz bei Zweibrücken. 8. 4

53. *C. praemorsum* Michel. *C. semipectinatum* Rchb. exc. K. syn. edit. I. *Cnicus pectinatus* Schleicher. *Cirs. erucagineum* DC. Fl. fr. *Cnicus oleraceo-rivularis* Schiede pl. hybr. *Cnic. saanensis* Schleich. *Cirs. oleraceo-rivulare* DC. prodr. VI. *Cirs. rivulare-oleraceum* K. syn. in add. 1009. Feuchte Wiesen in Gebirgs- und Alpen: thälern, Rheing. am Bodensee bei Markdorf und bei Müllheim in Oberbaden, Oberbaiern; Destr. Tyrol, Schweiz im Jura, Appenzell, im Sihlthale u. im Saanenlande. 7—8. 4

54. *C. affine* Tausch. *C. oleraceo-heterophyllum* Naegel. *Cirs. d. Schwz.* K. syn. in add. 1009. Feuchte Gebirgswiesen u. Triften d. Boralpen unter d. Verwandten; Sachsen bei Hammer, Schweiz (im Beltlin), im Rheinwalde, Böhmen um Rußwarta. 8. 4

55. *C. decoloratum* Koch. K. syn. edit. I. 398. K. Taschb. 294. *C. rigens* Wallr. *C. tataricum* DC. Fl. fr. *Cnicus acaule-oleraceus* Schiede pl. hybr. *Cirs. oleraceo-acaule* Hampe, Naegeli, K. syn. in add. 1010. Feuchte Wiesen unter d. Eltern, stellw. dch. d. Geb., Rheing. dch. Elsaß, Baden bei Billingen, Donaueschingen, Rehl, Frankfurt a. M., Thüringen, Halle, Harz, Göttingen; Böhmen, Schweiz im Jura, bei Zürich u. in d. Alpen von Ber. 7—8. 4

56. *C. flavescens* Koch. K. Tschb. 292. *C. spinosissimo* — *Erisithales* Fachini. K. syn. in add. 1011. Alpen: triften in d. südl. Kette; Südtirol a. d. Monte di Pozza in Fassa, im Wintschgau. 7—8. 4

57. *C. Candolleanum* Naegeli *Cirs. d. Schweiz*

p. 98. *C. Erisithali-oleraceum* K. syn. in add. 1012. Gebirgshaine unter d. Eltern; Italien, Schweiz am Comersee im Vall Affino u. M. Segnone. 7. 4

58. *C. Thomasii* Naegeli Cirs. d. Schweiz p. 93. *C. spinosissimo-oleraceum* Koch syn. in add. 1012. Feuchte Alpenwiesen d. Schweiz, auf d. Bovanna bei Ber. 7—8. 4

427. *Picnomon* H. Cassini. Speerdistel. K. syn.

458. Rchb. exc. 287. Comp. II. p. 389.

1. *P. Acarna* Cass. K. syn. *Cnicus* — L. *Cirsium* — Moench DC. prodr. K. Taschb. 291. *Chamaeleon salmanticensis* Clus. Sonnige, steinige Orte im südl. Eittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien bei Spalato, Nizza. 7—8. 4

428. *Cynara* L. Artischocke. K. syn. 458. Rchb. exc. p. 288.

1. *C. Scolymus* L. K. syn. Im südl. Eittoral, Dalmatien a. d. Insel Lissa; sonst nur cultivirt im Geb. 8. 4

2. *C. Cardunculus* L. K. syn. Besonders im südl. Geb. angepflanzt. 8. 4

429. *Silybum* Gaertn. Mariendistel. K. syn. 458.

Rchb. exc. p. 288. Comp. II. p. 398.

1. *S. marianum* Gaertn. K. syn. *Carduus* — us L. Gebirgstriften, steinige Orte im südl. Geb., Eittoral, Istrien bei Duino, Ternovo, Dalmatien, Venedig bis nach Oberitalien, im übrigen Geb. nur dch. Ausläen verwildert, Rheing. stellw. auf Aecker. 7—8. ☉

430. *Galactites* Moench. Milchdistel. Rchb. exc.

p. 212. Comp. II. p. 398.

1. *G. tomentosa* Moench. Rchb. exc. *Centaurea Galactites* L. Sonnige Hügel im südlichsten Eittoral, Dalmatien, Piemont, Nizza, Oneglia. 7—8. ☉

431. *Tyrimnus* H. Cassini. *Tyrimne*. K. syn. 458.
K. Taschb. 295. *Carduus* Rchb. et Comp. II.

1. *T. leucographus* Cass. K. syn. *Carduus* — L.
Rchb. exc. p. 282. Comp. II. p. 393. Neßer, Wege im südl.
Geb., Istrien auf Dsero, Dalmatien. 5—6. ☉

432. *Carduus* L. Distel. K. syn. 458. Rchb. exc.
p. 280. Comp. II. p. 390.

1. *C. carlinoides* Gouan. Comp. II. p. 390. *Car-*
lina pyrenaica L. Rchb. exc. p. 292. *Cirsium paniculatum*
Lamk. Im südlichsten Geb., Piemont bei Tenda. 7. 4

2. *C. pycnocephalus* Jacq. K. syn. *C. tenuiflorus*
DC. prodr. Var. γ . et δ . Rosk. Schmidt. Var. β . *C. tenui-*
florus DC. Fl. fr. — γ . *C. pycnocephalus* β . *elongatus*
Dub. An Wegen, Säunen, besonders im südl. Geb., Littoral,
Istrien bei Triest u. d. Inseln, Dalmatien, Lombardei, Be-
nedig, Piemont nach Oberitalien, in d. nördl. Geb. an d.
Ewine bei Ewinemünde. 7—8. ☉ u. ☉

3. *C. tenuiflorus* Smith. Curt. K. syn. *C. tenui-*
florus α . DC. prodr. *C. microcephalus* Gaud. helv. Var. β .
C. syncephalus Rchb. exc. p. 281. *C. tenuiflorus* Schleich.
Wege, Säune, besonders im südl. Geb., Rheing. im Elsaß u.
am Niederrheine bei Wesel, Schweiz in d. Alpenthälern d.
Oberwallis, Dalmatien, Lombardei, Venedig bei al Eido,
Piemont, Oberitalien bei Novigno. 7—8. ☉ u. ☉

4. *C. litigiosus* Balb. et Nocc. Fl. Ticin. Rchb.
exc. *C. arenarius* DC. *C. Candolii* Moretti. Hügel im süd-
lichsten Geb., Lombardei bei Pavia jenseits des Po. 6—7. ☉

5. *C. intricatus* Rchb. exc. Im südlichsten Geb.,
Piemont bei Riviere de Gènes. 6—7. ☉

6. *C. acanthoides* L. K. syn. *C. polyanthos* Schreb.
Curt. *C. crispus* Huds. Var. β . *C. acuminatus* Gaud. helv.
C. alpestris Schleich. Uncultivirte Orte, an Wegen, Rainen,
stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., dch. Elsaß, Baden bei Phi-
lippsburg, Heidelberg, Mannheim, von Worms bis Mainz,
Kreuznach, Trier, Luxemburg u. dch. d. g. Rheinthäl u. 7—8. ☉

7. *C. multiflorus* Gaud. helv. K. syn. *C. polyanthemos* Schleich. Tenore Lin. Koch syn. edit. I. *C. acanthoides* Schkr. *C. crispus* β . DC. Aderränder, an Wegen, Schweiz besonders in d. Thälern d. Jura, Rheing. Nassau bei Löhnberg, bei Trier selten, und in Mähren. 7—8. ☉

8. *C. crispus* L. K. syn. Var. β . *C. aretioides* Schleich. Uncultivirte Orte im g. Geb. 7—8. ☉

9. *C. Personata* Jacq. K. syn. *Aretium* — L. Haller helv. Card. *aretioides* Vill. *C. crispus* γ . *Personata* Fl. Sil. Alpen, Boralpen, an Bächen d. Alpenthäler, schattige, etwas feuchte Haine; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Destr. bis in d. südl. Geb., Rheing. bei Unadingen, auf d. Hoheneck d. Vogesen, Bregenz, Schwarzwald, auf d. Jura in Württemberg; Schlesien, Böhmen, Mähren u. 7—8. 4

10. *C. candicans* W. et Kit. Rehb. exc. *C. collinus* β . K. syn. Sonnige, steinige Gebirgsstellen, im südl. Geb., Littoral bei Triest, Dalmatien, Siebenbürgen, Galizien, Ungarn auf d. Bersekerberg, Ruinen des Schlosses auf d. Bergen d. Neugrader Comitats. 7—8. ☉

11. *C. collinus* W. et Kit. K. syn. *C. candicans* K. syn. edit. I. Steinige Orte, uncultivirte Hügel im südl. Geb., Krain, Littoral, Istrien, Triest, Fiume, Croatien, Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn. 7—8. ☉

12. *C. hamulosus* Ehrh. W. et Kit. K. syn. Bewachsene Bergstellen, Hügel, Wege; im südl. Geb., Destr. Krain, Siebenbürgen, Ungarn, Galizien. 7—8. ☉

13. *C. aretioides* Willd. K. syn. *Cirsium* — Scopol. *Arctium Carduelis* L. Card. *centauroides* Hoppe. Alpen u. Boralpen, Schweiz nach Südtirol, Kärnthen im Bozenthäl, Krain in d. Wocheiner-Alpen, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn, Galizien. 7—8. 4

14. *C. alpestris* W. et Kit. Rehb. exc. *C. aretioides* β . K. syn. Triften d. Alpen u. Boralpen in Krain u. in Croatien. 6—7. 4

15. *C. Argemone* Lamk. Rchb. exc. Alpen in Piemont. 6—7. 4

16. *C. defloratus* L. K. syn. *Cirsium defloratum* Scopol. Var. β . *C. crassifolius* Willd. *C. summanus* Pollini Rchb. exc. *C. Argemone* Schleich. — γ . *C. transalpinus* Suter helv. *C. crassifolius* K. syn. edit. I. *C. glaucus* Baumg. — δ . *C. cirsioides* Vill. delph. — ϵ . *C. defloratus* δ . *rhaeticus* DC. prodr. *C. carlinaefolius* K. syn. edit. I. Gaud. — ζ . *C. leptophyllus* Gaud. helv. — η . *C. defloratus* β . *alpestris* DC. prodr. Felsige Orte d. Alpen, Boralpen u. höheren Gebirgen, besonders auf Kalk; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Salzburg, Oestr. südl. bis in d. Combarbei u. nach Piemont; Rheing. vom Jura nach Württemberg, bei Bregenz, Oberbad, im Breisg. im Barstler Loch auf d. Feldberg, Sachsen bei Jena, Thüringen, Mähren, Littoral, Istrien, Ungarn u. 7—8. 4

17. *C. carlinaefolius* Lamk. Rchb. exc. *C. nutans* β . Bertoloni *C. montosus* Pollini. Gebirge d. südl. Kette, über d. Alpen, Schweiz Cant. Tessin, Combarbei, M. Baldo, Piemont, M. Generoso. 7—8. 4

18. *C. nigrescens* Vill. delph. Rchb. exc. In d. Alpen v. Siebenbürgen. 7—8. 4

19. *C. nutans* L. K. syn. Steinige, uncultivirte Orte, an Wegen u. im g. Geb. 7—8. ☉

20. *C. platylepis* Sauter. Rchb. exc. K. syn. Triften, Ackerländer d. Alpenthäler zu 4000'; Steyermark, Tyrol bei Rieghühl u. Isfer, Salzburg bei Heiligenblut. 7—8. 4

21. *C. chrysacanthus* Tenore. Visian. Fl. Dalm. II. p. 46. Maly enum. pl. austr. in add. p. 405. *C. nutans* var. *radians* Biasol. Sonnige, steinige Orte in Dalmatien. 4

22. *C. acicularis* Bertoloni Visian. Fl. Dalm. II. p. 48. Maly enum. pl. austr. in add. p. 406. Sonnige Felsen in Dalmatien um Stretto di Morter. ☉

23. *C. bicolor* Visian. Fl. Dalm. II. p. 48. Maly enum. pl. austr. in add. p. 406. In Dalmatien. ☉

24. *C. Braunii** Card. *acanthoidi* — *nutans* K. syn. 462. Uncultivirte Orte, Nassau bei Dörfel, Guck, Baiern bei München. Mer. Braun, bei Hamburg Sonder. 7—8. ☉

25. *C. orthocephalus* Wallr. Card. *nutanti-acanthoides* K. syn. 462. Unter d. Stammarten. 7—8. ☉

26. *C. Stangii* Buek. Koch in litt. Card. *crispo-nutans* K. syn. 462. *C. polyanthemos* Döll. Rh. Fl. p. 505. Schleicher exsicc. Hegestsch. et Heer. Uncultivirte Orte, an Wegen, stellw. unter d. Verwandten im Geb. Schweiz, Rheing., Baden bei Philippsburg, Mannheim, Hessen bei Offenbach, Hanau, Frankfurt a. M., Schlesien, Hamburg bei Steinwerden. 7—8. ☉

433. *Onopordon* L. Felsdistel. K. syn. 462. Reh. exc. p. 288. Comp. II. p. 397.

1. *O. Acanthium* L. K. syn. Var. β . *O. Schultesii* Brittinger. Uncultivirte, steinige Orte im g. Geb. 7—8. ☉

2. *O. illyricum* L. K. syn. *O. elongatum* Lamk. Fl. fr. Steinige Orte im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien. 7—8. ☉

434. *Lappa Tournes.* Lamk. Klette. K. syn. 463. Reh. exc. p. 288. Comp. II. p. 374.

1. *L. major* Gaertn. K. syn. *L. officinalis* Allion. pedm. *Arctium majus* Schkr. A. *Lappa* Willd. Arct. — α . Lin. Uncultivirte Orte, Wege, Ufer, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *L. minor* DC. Fl. fr. K. syn. *Arctium minus* Schkr. Uncultivirte Orte, Wege, Schutt, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

3. *L. tomentosa* Lamk. K. syn. *Arctium* — um Schkr. A. *Bardana* Willd. Wald- u. Wiesenränder, Felssaine, steinige, uncultivirte Orte, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

435. *Arctium* Lamk. Bärendistel. Reh. exc. p. 288. Comp. II. p. 399.

1. *A. lanuginosum* Lamk. Comp. II. *A. Daleschampii* Rehb. exc. *Berardia subacaulis* Vill. delph. *Onopordon rotundifolium* Allion. pedm. Im Gerölle d. südlichsten Alpenkette, Lombardei, Piemont u. in d. Novara.
7. 4

436. *Carlina* L. Eberwurz. K. syn. 463. Rehb. exc. p. 291. Comp. II. p. 401.

1. *C. acaulis* L. K. syn. *C. Chamaeleon* Vill. delph. *C. caulescens* Lamk. *C. subacaulis* DC. Fl. fr. *C. alpina* Jacq. Steinige, kalkhaltige Orte, Triften in Gebirgsgegenden bis in d. Alpen, stellw. im mittl. u. südl. Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Salzburg, Tyrol, Nestr. bis in d. Lombardei; Rheing., Oberbaden bei Constanz bei Müllheim, Breisg. auf d. Roßkopfe, Schönberg, in d. Vogesen auf d. Günsti-Berg beim Sülzer-Ballon, Schwarzwald bei Pforzheim, Württemberg bei Tübingen, Rosethal, Thüringen, Sachsen, Preußen, Schlesien u. 7—8. ☉

2. *C. simplex* W. et Kit. K. syn. *C. aggregata* Willd. *C. acaulis* β . *caulescens* Neilr. vin. Alpen u. Vor-alpen in d. südl. Kette; Oberkrain um Velbes, Vittoral, Istrien, Croatien, Ungarn, Galizien. 7—8. ☉

3. *C. acanthifolia* All. pedm. K. syn. *C. Utska* Hacq. *C. chardousse* Vill. delph. *C. acanthifolia* α . DC. prodr. Steinige Orte im südl. Geb., Krain bei Murenfeld; Vittoral, Istrien auf St. Antonio, M. Maggiore auf d. Höhen d. Utska, Monte Kolnik, Baba u. Platnik, Dalmatien, Piemont, Ligurien. 7—8. ☉

4. *C. lanata* L. K. syn. *C. Pola* Hacq. Trockene, sandige Orte am südl. Vittoral, Istrien, Triest, Pola, Fiume, Dalmatien, Croatien, Piemont, Nizza. 7—8. ☉

5. *C. corymbosa* L. K. syn. Steinige Orte im südl. Vittoral, Istrien, Triest bei Contavillo, Fiume bei d. Kirche St. Veit, Dalmatien, Croatien, Piemont um Borgamasino, Nizza, Dneglia. 7—8. ☉

6. *C. vulgaris* L. K. syn. Bergtriften, Heiden, Brachfelder, Wald- u. Felsbränder, dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

7. *C. longifolia* Rchb. exc. K. syn. edit. I. p. 406. *C. nebrodensis* Guss. K. syn. 464. *C. Biebersteinii* Bernh. *C. vulgaris* β . *leptophylla* Grieseb. Alpen u. Boralpen, Rheing., auf d. Vogesen, d. Hoheneck; Tyrol bei Rißbichl am Sinterbacherwasserfall, auf d. Giesstein u. in Siebenbürgen. 7—8. ☉

437. *Staphelina* L. *Stapheline*. K. syn. 465. Rchb. exc. p. 290. Comp. II. p. 406.

1. *St. dubia* L. K. syn. *St. rosmarinifolia* Cassini Rchb. exc. Steinige Orte im südl. Eittoral, Istrien auf d. Insel Cherso u. Dsero, Dalmatien, Lombardei bei Pavia, Venedig, Oberitalien. 6—7. ‡

2. *St. fruticosa* L. Rchb. exc. *Hirtellina lanceolata* Cass. Im südlichsten Geb., Lombardei, M. Baldo, Valle Buffiana. 6—7. ‡

438. *Acarna* Willd. *Gitterdistel*. Rchb. exc. p. 280. Comp. II. p. 403.

1. *A. cancellata* Willd. Comp. Fl. germ. II. *Atractylis* — Rchb. exc. *Cirsellium* — tum Gaertn. Steinige Orte, Felsen, im südlichsten Eittoral, Piemont bei Nizza. 6—7. ☉

439. *Saussurea* DC. *Sauffürle*. K. syn. 465. Rchb. exc. 289. Comp. II. p. 399.

1. *S. alpina* DC. K. syn. *Serratula* — L. Var. β . *S. macrophylla* Sauter. Grasige Granitfelsen d. Hochalpen, im südl. Geb., Schweiz in den Penninischen u. Rhätischen Alpen; Tyrol in d. Norischen Alpen, Steyermark, Kärnthen nach Krain, Siebenbürgen, Ungarn, Galizien; Lombardei, Piemont. 7—8. ‡

2. *S. discolor* DC. K. syn. *Serratula* — Willd. *S. alpina* γ . Lin. Haller helv. Granitfelsen d. Hochalpen,

Schweiz St. Bernhard, Gotthardthal bei d. Teufelsbrücke, auf d. Splügen, Simplon auf d. Bergstock im Zehnden Gombes Cant. Wallis; Südtirol, Steyermark, Krain, Destr. Littoral, Istrien, Lombardien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

3. *S. pygmaea* Spreng. K. syn. *Serratula* — Jacq. *Cnicus pygmaeus* L. *Cirsium pygmaeum* Scopol. *Carduus* — Jacq. *Lagarostemon* — um Cassini. Felsen der Kalkalpen, Destr. Steyermark bei Admont, Rabling u. Willacher Alpen, Salzburg auf d. Untersberg, Krain, Littoral, Istrien, Ungarn, Galizien. 7—8. 4

440. *Serratula* L. Scharfe. K. syn. 466. Rechb. exc. p. 290. Comp. II. p. 403.

Erste Abtheilung. *Serratula* K. syn.

1. *S. tinctoria* L. K. syn. *Carduus tinctorius* Scopol. carn. Wälder, Waldwiesen, Heiden, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten. 7—8. 4

2. *S. radiata* M. v. Bieb. K. syn. *S. centauroides* Host. *Carduus radiatus* W. et Kit. Sonnige Kalkgebirge im südl. Geb., Destr. bei Wien, Burkersdorf, Littoral, Istrien auf d. Krinikberg, d. Koinizza u. d. näheren Gebirgen, Dalmatien, Ungarn bei Ofen, Palota und Fünfkirchen, Siebenbürgen. 6—7. 4

3. *S. heterophylla* Desfon. K. syn. *Carduus lycophilus* Vill. delph. *C. nitidus* W. et Kit. Gebirgswiesen, steinige Orte im südl. Geb., Destr. um Laxenburg und Munkendorf bei Wien, Littoral, Istrien auf d. Solavnik, d. Koinizza u. benachbarten Bergen, Ungarn um Palota u. Jnosta u. in Siebenbürgen. 6—7. 4

4. *S. nudicaulis* DC. K. syn. *Centaurea* — L. *Carduus cerinthaeifolius* Vill. *C. cerinthoides* Willd. *C. glaucus* Cavan. Alpen im südl. Geb., Südschweiz auf dem Salève bei Genf, Piemont im Valle di Nisi. 6—7. 4

3weite Rotte. Rhaponticum K. syn.

5. *S. Rhaponticum* DC. Fl. fr. K. syn. *Rhaponticum scariosum* Lamk. Rchb. exc. p. 289. *Centaurea Rhaponticum* L. Var. β . *lyrata*: *Centaurea lyrata* Bellard. Alpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis M. Alesse, M. Foully, M. Galarba, Graubünden am Absteige nach d. Splügen, Südtessin, Steiner Alpen, Südtirol, M. Baldo, Lombardei, Piemont, Savoyen 2c. 7—8. 4

441. *Leuzea* DC. Fl. fr. Zapfendistel. Rchb. exc. p. 289. Comp. II. p. 407.

1. *L. conifera* DC. Rchb. exc. *Rhaponticum coniferum* Lessing, *Centaurea* — a L. Sonnige Gebirgsstellen im südlichsten Geb., Piemont im Valle di Susa, um Nizza und in Savoyen. 6—7. 4

442. *Jurinea* H. Cassini. Surinie. K. syn. 467. Rchb. exc. p. 290. Comp. II. p. 405.

1. *J. mollis* Rchb. K. syn. *Carduus* — L. *Serratula cyanoides* Gaertn. *Serr. blanda* M. v. Bieb. *Serr. simplex* DC. diss. *Serr. mollis* K. syn. edit. I. *Cirsium molle* Scopol. Walbige Hügel auf Kalk- und Sandfelsen, mehr im südl. Geb., Niederöstr. nach Mähren, Steyermark, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien, Oberitalien. 5—6. 4

2. *J. Pollichii* Koch. Taschb. 300. *J. cyanoides* Rchb. exc. K. syn. *Serratula* — β . DC. *S. Pollichii* DC. h. monsp. *Carduus cyanoides* M. v. B. *Card. cyanoides* α . *monoclonus* L. *Card. mollis* Pollich. *Acarna cyanoides* Wibel Wert. Trockene Hügel, sandige, uncultivirte Orte, Sandfelder, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Baden bei Mannheim, Schwellingen, Labenburg, Pfalz Maxdorf bis Mainz, an d. Hardtmühle, Bingen, Frankfurt a. M., Baiern, stellw. bis Wertheim, Würzburg, Schwaben, Franken bei Schweinfurt, nach Thüringen, Harz, Halle, Mecklenburg u. Böhmen. 7—8. 4

443. *Carduncellus* Allion. pedm. *Carduncelle*.

Rchb. exc. p. 280. Comp. II. p. 406.

1. *C. Monspeliensium* Allion. pedm. Rchb. exc. *Carthamus Carduncellus* L. Sonnige Gebirgstellen in Piemont zw. Lucerne u. Lautscha. 6—7. ☉

444. *Carthamus* L. *Saffor*. K. syn. 467. Rchb.

exc. p. 280. Comp. II. p. 423.

1. *C. tinctorius* L. K. syn. Rchb. exc. Sonnige Orte im südlichsten Geb., Piemont bei Nizza; stammt aus Egypten u. wird besonders im südl. Geb. angepflanzt. 7—8. ☉

445. *Cnicus* Gaertn. *Cardobenedict*. Rchb. exc. p.

218. Comp. II. p. 423.

1. *C. benedictus* L. Rchb. exc. *Centaurea benedicta* icon. pl. medic. Im südl. Geb., in Dalmatien bei Sebenico; stammt aus d. Orient u. wird allgemein als Arzneipflanze gezogen. 6—7. ☉

446. *Kentrophyllum* Neck. DC. *Spornblatt*.

K. syn. 468. Rchb. exc. p. 218. Comp. II. p. 424.

1. *K. lanatum* DC. K. syn. *Carthamus lanatus* L. *Centaurea — ta* DC. Fl. fr. *Atractylis — Scopol.* *Atr. Fusus — agrestis* Gaertn. *Centrophyllum lanatum* Rchb. exc. *Onobroma lanata* Bl. et Fgh. *Heracantha — Link.* Steinnige Hügel, Weinberge, an Wegen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Sitten, Südtirol, Südfrein, Littoral, Istrien, Fiume, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Oberitalien 7—8. 4

447. *Centaurea* L. *Stoßblume*. K. syn. 468.

Rchb. exc. p. 212. Comp. II. p. 408.

Erste Rotte. *Centaurea* Juss. Comp. II. p. 408.

1. *C. alpina* L. Rchb. exc. *C. cornuti* Rchb. hort. b.

Im südlichsten Geb., Lombardei M. Balbo, im Valle Sambuca bei Bassano, Gegend v. Venedig, Savoyen bei St. Maurice. 7—8. 4

2. *C. moschata* L. Host. Fl. austr. II. p. 514. Maly enum pl. austr. p. 135. In Dalmatien bei Ragusa. 7—8. ☉

3. *C. Centaurium* L. Rchb. exc. Host. Fl. austr. Alpen in d. südlichsten Kette, Siebenbürgen, Lombardei M. Balbo; Piemont um Susa u. Genestrella, Valle d'Ossola u. in d. Novarese. 7. 4

4. *C. ruthenica* Lamk. Baumg. Transylv. III. p. 70. Maly enum. pl. austr. p. 135. Bewachsene, trockene Gebirgsstellen in Galizien u. Siebenbürgen. 7. 4

5. *C. crithmifolia* Visian Fl. Dalm. tom. 2. ined. Maly enum. pl. austr. p. 135. In Dalmatien bei Sagliopomo. 7. 4

Dritte Rotte. *Jacea* Juss. K. syn.

6. *C. splendens* L. K. syn. Rchb. exc. *C. Stoebe palmadifida* III. Clus. Gebirgsstellen im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin, Lugano, Vittoral, Istrien, Fiume, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Oberitalien. 7—8. 4

7. *C. muricata* L. Rchb. exc. Hügel im südl. Vittoral, Istrien um Pirano. 7. ☉

8. *C. alba* L. DC. Fl. fr. Rchb. exc. Var. β . *C. deusta* Tenore. Im südlichsten Geb., Lombardei, Oberitalien. 7—8. 4

9. *C. amara* L. K. syn. Var. β . *C. bracteata* Bertoloni Rchb. exc. Trockene Hügel, Abhänge im südl. Geb., Südschweiz, Südtirol, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Oberitalien. 8. 4

10. *C. Jacea* L. K. syn. Var. β . *lacera*: *C. decipiens* Rchb. exc. Thuill. *C. nigra* β . DC. prodr. VI. — γ . *commutata*: *C. nigrescens* DC. prodr. VI. et auct. nostr. cisalpin. — δ . *pratensis*: *C. pratensis* Thuill. Rchb. exc. DC. prodr. VI. — ϵ . *capitata*. Wälder, Gebüsche, Heiden, Triften, Wiesen, an Wegen dch. d. g. Geb. 6—10. 4

11. *C. Weldeniana* Rehb. exc. In Dalmatien. 4

12. *C. trinervia* Stephan. Rehb. exc. in add. p. 848.

Cyanus roseus Baumg. transylv. *Jacea graminifolia* Lamk. Sonnige, grasige Orte in Siebenbürgen, bei Kološvar, bei Morgonda auf d. Flechte u. Heuwiese. 7—8. 4

13. *C. nigrescens* Willd. K. syn. *C. dubia* Suter helv. Var. β . *transalpina*: *C. transalpina* Schleich. — β . *vochinensis*: *C. vochinensis* Bernh. Rehb. exc. *C. salicifolia* DC. prodr. VI. — γ . *Candollii*: *C. nigrescens* γ . Koch Tasehb. 302. — δ . *tomentosa*: *C. tomentosa* Rehb. Fl. exsicc. — ϵ . *C. flosculosa* Rehb. pl. crit. Gebirgswiesen u. Alpen in d. südl. Kette; Südschweiz über d. Alpen bei Airolo; Südtirol in d. Bochein, Steyermark, Krain, M. Poibl, Eittoral, Istrien bei Duino, Monfalcone u. 7—8. 4

14. *C. austriaca* Willd. K. syn. *C. phrygia* α . *austriaca* Comp. II. p. 412. Var. β . *fusca*: *C. austriaca* γ . *ambigua* DC. prodr. VI. — γ . *pallida*: *C. cirrata* Rehb. exc. *C. pectinata* Allion. — δ . *capitata* K. syn. Uncultivirte, steinige Orte, Wiesen, Bergwälder, mehr im südl. Geb., Rheing., Oberbaden bei Eschbach, Schwarzwald bei Mittelwald u. Hornberg, Baiern, Sachsen, Thüringen bei Jena, Preußen bei Königsberg, Danzig u., Schlesien; Destr. Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Südschweiz Cant. Graubünden; Var. γ . Ungarn im Banat u. in Piemont. 7—8. 4

15. *C. phrygia* L. Willd. K. syn. *C. austriaca* Rehb. exc. Var. β . *pallida*. — γ . *capitata*: *C. flosculosa* Balb. *Cyanus flosculosus* Baumg. Gebirgswiesen, Wälder u. Vor-alpen, stellw. dch. d. südl. u. mittlere Geb., Rheing., Oberbaden Mundelfingen, Billingen, Württemberg am Seeweiher bei Leutkirch, Nassau im Taunus, Luxemburg bei Engelsberg, Schwaben, Baiern, Thüringen, Harz, bei Hamburg, Schlesien; Destr. nach Böhmen, Mähren, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Ungarn, Galizien; Schweiz im Oberinntale und in Unter-Engadin. 7—8. 4

16. *C. nervosa* Willd. K. syn. *C. phrygia* Rehb. exc.

DC. prodr. VI. *C. phrygia* β . *helvetica* Gaud. *C. Berini* Sieb. *C. austriaca* Rochel. ban. *C. phrygia* γ . *alpestris* Comp. II. p. 412. *C. ambigua* Thomas pl. exsicc. Triften d. Alpen u. Boralpen in d. südl. Kette, Südschweiz auf d. St. Bernhard u. Gotthard, Südtirol M. Schlehren, Seiseralp, Krain, Ungarn im Banat, Lombardien, Piemont, Oberitalien. 7—8. 4

17. *C. uniflora* L. Rehb. exc. Alpenwiesen in d. südlichsten Kette, Lombardien, Venedig, Piemont a. d. M. Genis, Novara um di Vedro; Ungarn. 7—8. 4

18. *C. nigra* L. K. syn. Var. β . *pallens* K. syn. Schattige Gebirgswiesen, Heiden, Abhänge, Waldwege, stellenw. dch. d. südl. u. mittl., seltener im nördl. Geb., Schweiz u. dch. die g. Boralpenkette nach Schwaben, Baiern etc., Rheing. v. Basel dch. Baden, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg bis Frankfurt nach Nassau, dch. Elsaß nach d. Pfalz v. Speier bis Coblenz, Bonn, Nahe, Kreuznach etc. dch. d. Hochwald nach Trier, Saarbrücken, auch in d. Eifel, Luxemburg u. im Moseltale; Württemberg; dch. d. Niederlande nach Westphalen, Hannover, Schlesien, Preußen bei Danzig; Oestr. Böhmen, Mähren, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

Dritte Rotte. *Cyanus* L. K. syn.

19. *C. montana* L. K. syn. *C. mollis* W. et Kit. Gebirgswälder u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Württemberg, Baiern; Salzburg, Tyrol etc., Rheing. dch. Elsaß, Baden stellenw. bis zum Niederrheine, Nahe, stellenw. v. Kreuznach bis Saarbrücken, Trier, an d. Mosel bis Coblenz, Luxemburg, Eifel bis Aachen, Bonn; Harz, Jena, Schlesien; Oestr. Böhmen, Mähren bis in d. südl. Geb. 5—7. 4

20. *C. axillaris* Willd. K. syn. Var. α . *stricta*: *C. stricta* W. et Kit. Rehb. exc. — β . *carniolica*: *C. carniolica* Host. *C. Triumphetti* Allion. pedm. — γ . *seusana*: *C. seusana* Vill. delph. *C. variegata* Lamk. Rehb. exc. — δ . *tomentosa*: *C. Fischeri* Willd. Gebirgswiesen, besonders

auf Kalk, mehr im südl. Geb., Baiern bei München; Süd-
schweiz Cant. Tessin, Destr. Mähren, Steyermark, Krain,
Eittoral, Istrien, Lombardien, Venedig; Piemont M. Genis;
Siebenbürgen, Ungarn. 7—8. 4

21. *C. napulifera* Rochel act. Ungar. 1834. *Maly*
enum. pl. austr. p. 136. *C. tuberosa* Visiani *Fl. Dalmatic.*
In Dalmatien, Ungarn. 7—8. 4

22. *C. Cyanus* L. K. syn. Saatkäfer, Felber, Brach-
felder 2c. dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

23. *C. atropurpurea* W. et Kit. *Rchb. exc. p.*
216. Var. β . *flava*: *C. calocephala* Willd. Kalkfelsen, Ga-
lizien, Ungarn im Banat an Veteranis-Höhle, Siebenbürgen.
6—7. 4

24. *C. Scabiosa* L. K. syn. Var. β . *C. coriacea*
W. et Kit. *Rchb. exc.* — γ . *C. badensis* Tratt. — δ . *C.*
spinulosa Roch. ban. *Rchb. exc.* *C. Stoebe* Willd. herb.
Rchb. exc. Hügel, Wälder, Wiesen, Triften, Feld- u. We-
geränder im g. Geb.; Var. β . im südl. Geb. v. Ungarn bis
Piemont; Var. γ . Destr.; Var. δ . Destr. bei Wien u. im
Banat. 7—8. 4

25. *C. incompta* Visian. *Fl. Dalm. II. p. 38. t. 49.*
Maly enum. pl. austr. in add. p. 406. Wiesen in Dalma-
tien um Narenta. 4

26. *C. Kotschyana* Heuffel. K. syn. Gebirgsab-
hänge in Destr., M. Ortscher; Ungarn. Siebenbürgen.
7—8. 4

27. *C. stereophylla* Besser. *Rchb. exc. K. syn. in*
adn. 473. Aecker in Destr. um Wien. 7—8. 4

28. *C. sordida* Willd. K. syn. *C. variabilis* γ . *sor-*
dida Bartl. Var. α . *purpurascens*: *C. sordida* Willd. herb.
C. Grafiana DC. prodr. — β . *lutescens*: *C. pubescens*
Willd. spec. Sonnige Wiesen im südl. Eittoral, Krain am
Adlersberg u. M. Ranaß, Istrien bei Triest, Fiume, im
Ejepina u. Sponzo-Thale. 6—7. 4

29. *C. rupestris* L. K. syn. *C. variabilis* α . et β .
Bartl. Var. α . *subinermis*: *C. rupestris* L. *C. adonifolia*

Rchb. exc. — β . armata: C. rupestris Rchb. exc. C. collina Scopoli. Sonnige Felsen, im südl. Eittoral, Krain auf d. Karstgebirge, Adlersberg, Istrien bei Triest, Fiume, Croatien, Dalmatien u. in Oberitalien. 6—7. 4

30. C. orientalis L. Host. Fl. austr. Rchb. exc. in add. p. 848. C. theiantha Spreng. Gebirgswiesen, Felsränder in Siebenbürgen. 6—7. 4

31. C. salmantica L. Host. Fl. austr. II. p. 520. Maly enum. pl. austr. p. 137. Steinige Orte, Bäume, Weinberge in Dalmatien, Spalato. 6—7. 4

32. C. virgata Willd. Host. Fl. austr. Maly enum. pl. austr. p. 137. In Dalmatien um Ragusa. 6—7. 4

33. C. maculosa Lamk. K. syn. DC. prodr. C. paniculata Jacq. K. syn. edit. I. et omn. Auct. Fl. germ. Uncultivirte Orte, Fels- u. Wegeränder, an Rainen, Dämmen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. d. Schweiz dch. Elsaß, Baden bei Rastatt, Mannheim, Pfalz Speier, Worms bis Mainz, Bingen, Bergstraße bei Weinheim, Darmstadt, Hanau, Nassau bei Mosbach u., Nahegegend bei Kreuznach, Mosel bei Trier, Perl u. Mosel abwärts bei Wehr, am Niederrheine bei Eöln u., Destr. in allen Provinzen. 7—8. ☉

34. C. paniculata Lamk. K. syn. DC. prodr. C. maculosa Rchb. exc. C. corymbosa Pourr. Uncultivirte Orte, Wege, Raine im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Lombardei, Piemont, Siebenbürgen. 7—8. ☉

35. C. divergens Visian. Fl. Dalm. II. p. 31. t. 41. Maly enum. pl. austr. in add. p. 406. Gebirgsstellen, Hügel in Dalmatien um Sesina. 7—8. ☉

36. C. cristata Bartl. K. syn. C. spinosa-ciliata Bernh. C. acutiloba DC. prodr. C. Scopoli Vest. Rha-ponticum paniculatum Scopol. carn. Felsen im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Croatien, Dalmatien bei Spalato. 7—8. ☉

37. C. Karschtiana Scopol. K. syn. Wulf. Rchb. exc. . Sonnige Gebirgswiesen, Felsen, im südl. Eittoral,

Istrien Insel Cherso u. Duino, Krain auf d. Karttschgebirge; Croatien. 7—8. ☉

38. *C. punctata* Visian. Fl. Dalm. Flora. 1829. Rechb. exc. in add. p. 448. Dürre Gebirgsäcker in Dalmatien um Duare. 7. ☉

39. *C. cuspitata* Visiani Flora. 1829. Rechb. exc. Comp. II. p. 419. Felsenspalten in Dalmatien am Bischofsberg bei Makarska. 5—6. 4

40. *C. ragusina* L. Rechb. exc. Felsen in Dalmatien bei Ragusa u. am Schlosse Diocletian in Spalato. 6—7. 4

41. *C. cineraria* L. Visian. Fl. Dalm. II. p. 35. Maly enum. pl. austr. in add. p. 407. *C. candidissima* Lamk. In Dalmatien. 4

42. *C. cinerea* Lamk. Rechb. exc. *C. cineraria* Allioni. Im südlichsten Geb., Piemont bei Lucerame. 7—8. 4

43. *C. Friderici* Visian. ined. Maly enum. pl. austr. p. 137 et 407. Steinige Orte in Dalmatien auf d. Insel Pelagosa u. Pomo. 7. 4

Vierte Rotte. *Seridia* Juss. Comp. II. p. 420.

44. *C. sicula* L. Rechb. exc. in add. p. 848. *C. raphanifolia* Salzmann. In Dalmatien auf d. Insel Vegina. 6—7. ☉

45. *C. Seridis* L. Rechb. exc. Sonnige Orte im südlichsten Littoral, Piemont um Nizza. 6—7. ☉ et ☉

46. *C. sonchifolia* L. Rechb. exc. Steinige Orte, Piemont um Nizza. 6—7. ☉

47. *C. aspera* L. Rechb. exc. Steinige Orte im südlichsten Littoral, Piemont, Nizza, Genua. 6—7. ☉

48. *C. Isnardi* L. Rechb. exc. Weingärten, sandige Orte, Piemont um Nizza. 7. 4

Fünfte Rotte. *Calcitrapa* Juss. K. syn.

49. *C. Calcitrapa* L. K. syn. *Rhaponticum* — Scopol. *Calcitrapa Hippophaestum* Gaertn. Uncultivirte Orte, Wegeränder, Tristen, Ufer, Grassstellen, stellenw. dch.

d. g. Geb., Rheing. dch. Elsaß, Baden bei Heidelberg, Pfalz Speier, Worms, Mainz, Bingen, Coblenz, Bonn, Köln, Trier, Luxemburg, Aachen 2c. 7—8. ☉

50. *C. Calcitrapoides* L. Rchb. exc. An Gräben in d. Lombardei, Mailand bei Alexandria della Paglia. 7—8. ☉

51. *C. adulterina* Moretti DC. prodr. VI. Maly enum. pl austr. p. 138 et 381. In Dalmatien. 7. 4

52. *C. hybrida* Allion pedm. Rchb. exc. Im südl. Geb., Lombardei bei Verona, Piemont, Turin. 7. ☉

53. *C. solstitialis* L. K. syn. *C. Sicula*. Leys. *Calci-trapa solstitial*. Löhr. Fl. v. Trier. 1844. Sonnige Hügel, Ufer, an Wegen, Feldern, stchw. dch. d. g. südl., mittl. Geb. u. im nördl. Geb. vereinzelt; Rheing., Baden bei Engen, Goldbach, Neureuth, Heidelberg, Mannheim, Elsaß im Hegau, Straßburg, Hagenau, Mühlburg, Pfalz bei Speier, Frankenthal, Worms bis Mainz, Bingen, Biebrich, Coblenz bei Winningen, Neuwied, Linz u. einzeln bis Köln, Nahe- u. Rheithal bei Kreuznach, an d. Saar bei Saarlouis, Bergstraße bei Weinheim, Darmstadt, Hanau, Frankfurt a. M. bei Wertheim, in Württemberg bei Tübingen, Heilbronn, Schwaben, Baiern, Thüringen, Halle, Harz, Schlesien, Preußen, Danzig u. Marienwerder; Destr. Böhmen, Mähren 2c. 7—8. ☉

54. *C. Adami* Willd. Rchb. exc. Sonnige Orte, an Wegen im südl. Geb., Dalmatien, Ungarn. 7—10. ☉

55. *C. nicaeensis* Allion. pedm. Rchb. exc. Var. β . *apula* DC. Fl. fr. Im südlichsten Geb., Piemont bei Nizza. 6—7. ☉

56. *C. collina* L. Rchb. exc. *C. salonitana* Visian. Fl. Dalm. *C. latisquama* β . DC. prodr. VI. Hügel, Ufer- u. Ränder im südl. Geb., Dalmatien bei Salona u. Spalato, M. Vellebis; Piemont um Turin, bei Finale u. Nizza. 6—7. 4

448. *Crupina* Pers. *Crupine*. K. syn. 476. Comp. II. p. 408.

1. *C. vulgaris* Pers. K. syn. *Centaurea Crupina* L. Rchb. exc. p. 212. Hügel, Felder im südl. Eittoral, Istrien bei Rovigno u. Dignano, Dalmatien, Venedig u. in Ungarn. 7—8. ☉

449. *Xeranthemum* L. Spreublume. K. syn. 476. Rchb. exc. p. 291. Comp. II. p. 371.

1. *X. annuum* L. K. syn. *X. radiatum* Lamk. Sonnige, steinige Orte, besonders im südl. Geb., Destr. um Simmering bei Wien, Böhmen bei Prag, Mähren, Eittoral, Istrien bei Triest, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn bei Ofen, Kombarbei. 6—7. ☉

2. *X. inapertum* Willd. K. syn. *X. annuum* β. *inapertum* L. *X. erectum* Presl. DC. prodr. VI. Sonnige, uncultivirte Orte, an Wegen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Leuk, Sitten, Val d'Aoste, Ungarn, Kombarbei, Piemont, Novara u. Oberitalien. 5—6. ☉

3. *X. cylindraceum* Smith. K. syn. *X. cylindricum* Spreng. *X. inapertum* DC. Fl. fr. *Chardinia cylindrica* Desv. *Xeroloma foetidum* H. Cassini. Sonnige, trockene Orte im südl. Geb., Eittoral, Istrien bei Pola, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn in d. Matra bei Pomaz; Venedig. 6—7. 4

450. *Amphoricarpus* Visian. Giorn. bot. 1844. Maly enum. pl. austr. p. 381.

1. *A. Neumayeri* Visian. Maly enum. pl. austr. p. 138. *Jurinea Neumayeriana* Visian. Fl. Dalm. Bewachsene Felsen am Orienberg in Dalmatien. 4

Dritte Unterabtheilung.

Cichoraceen.

Juss. K. Taschb. 306. Semiflosculosae Lin.

451. *Scolymus* L. Golddistel. K. syn. 476. Rchb. p. 280. Comp. II. p. 425.

1. *S. hispanicus* L. K. syn. *S. maculatus* Scopoli
Rchb. exc. non Lin. Felsige Orte, an Wegen, Felsbränden
im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien,
Lombardien, Venedig. 7—8. ☉

452. *Lapsana* L. Rainföhl. K. syn. 477. Rchb.
exc. p. 248. Comp. II. p. 425.

1. *L. communis* L. K. syn. Cultivirte Orte, Wälder,
Wege, Schutt, im g. Geb. 7—8. ☉

453. *Aposeris* Necker. Drahtstengel. K. syn. 477.
K. Taschb. 307.

1. *A. foetida* Lessing K. syn. *Hyoseris* — L. Rchb.
exc. p. 250. *Lapsana* — Scopoli. Schattige Orte, Tristen,
d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. stchw. dch. d. g. Alpen-
fette Baiern, Salzburg, Oestr. u. bis ins südl. Geb. u. mit d.
Flüssen in d. Niederungen nach München u. Salzburg. 7—8. 4

454. *Arnoseris* Gaertn. Fämmersalat. K. syn. 477.
Rchb. exc. p. 250. Comp. II. p. 426.

1. *A. pusilla* Gaertn. K. syn. *A. minima* K. syn.
edit. I. *Hyoseris* — Lin. *Lapsana* — Allion. *Laps. pusilla*
Willd. Sandboden, Gelber, Aecker, Heiden, Nadelwälder, dch.
d. g. Geb. 7—8. ☉

455. *Rhagadiolus* Tournef. Sichelsalat. K. syn.
478. Rchb. exc. p. 249. Comp. II. p. 426.

1. *R. stellatus* Gaertn. K. syn. *Lapsana stellata*
Lin. Var. β . *intermedius* DC. *R. intermedius* Tenore.
R. lapsanoides Desf. Gräßige Orte, an Wegen im südl.
Geb., Eittoral, Istrien bei Fiume u., Dalmatien, Lombardien,
Venedig. 4—5. ☉

2. *R. edulis* Gaertn. Rchb. exc. *R. stellatus* β .
edulis K. Taschb. *Lapsana Rhagadiolus* Lin. Cultivirte
Orte im südl. Eittoral mit *R. stellatus*. 5. ☉

456. *Cichorium* L. *Cichorie*. K. syn. 478. Rchb. exc. p. 250. Comp. II. p. 429.

1. *C. Intybus* L. K. syn. Uncultivirte Orte, an Wegen u. Gelbrändern, Triesten dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *C. pumilum* Jacq. Rchb. exc. in add. p. 853. *C. minimum* Portenschl. Hügel, Gelber in Dalmatien auf d. Insel Lesina. 6—7. ☉

3. *C. Endivia* L. K. syn. Aus Indien u. im g. Geb. cultivirt. 7—8. ☉

457. *Catananche* L. *Raffelblume*. Rchb. exc. p. 250. Comp. II. p. 429.

1. *C. lutea* L. Rchb. exc. Im südlichsten Geb., Piemont bei Breglio. 7—8. ☉

2. *C. caerulea* L. Rchb. exc. Steinige, bürre Orte im südlichsten Geb., Piemont, Turin, Nizza, Ligurien. 7—8. ☉

458. *Hyoseris* L. *Schweinsalat*. K. syn. 478. Rchb. exc. p. 250. Comp. II. p. 427.

1. *H. scabra* L. K. syn. *H. adspersa* Moench. *H. microcephala* Cassini. *Rhagadiolus scaber* Allion. pedm. *Hedypnois coronopifolia* Tenore. Cultivirte Orte, an Wegen im südl. Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Piemont u. um Nizza. 5—6 ☉

2. *H. radiata* L. Rchb. exc. *Taraxacum saxatile* Bocc. Hügel, Weinberge, Mauern im südl. Vittoral, Dalmatien auf d. Insel Lesina, Piemont, bei Genua, Nizza. 5. 4

3. *H. lucida* L. Host. Fl. austr. II. p. 428. Jacq. hort. Maly enum. pl. austr. p. 139. In Dalmatien auf d. Marianenberg. 5—6. 4

459. *Hedypnois* Tournef. *Röhrchenkraut*. K. syn. 479. Rchb. exc. p. 249. Comp. II. p. 427.

1. *H. monspeliensis* Willd. Rchb. exc. *Hyoseris Hedypnois* Lin. Sandige Gelber, an Wegen, Piemont, Nizza, Ligurien. 5. ☉

2. *H. cretica* Willd. K. syn. *Hyoseris* — L. *Hedyp. tubaeformis* Tenore Rechb. exc. Uncultivirte Orte, Weingärten, an Bäumen im südl. Eittoral, Istrien bei Bolosca, Dalmatien, Piemont, Nizza. 5—6. ☉

3. *H. pendula* Willd. Rechb. exc. *Hyoseris* — Balbis. Im südlichsten Eittoral, Piemont, bei Nizza u. Dneglia. 5. ☉

4. *H. rhagadioloides* Willd. Rechb. exc. *Hyoseris* — L. *Hyos. cretica* Cavan. et Tenore. Auf dem Sande im südlichsten Eittoral, Piemont, bei Nizza. 5. ☉

5. *H. furfuracea* Rechb. exc. Im südlichsten Eittoral, Piemont, um Nizza. 5. ☉

6. *H. crepidiformis* Rechb. exc. Im südlichsten Eittoral, Piemont, um Nizza. 5. ☉

460. *Tolpis* Gaertn. Tolpis. Rechb. exc. p. 255. Comp. II. p. 430.

1. *T. barbata* Gaertn. Rechb. exc. *Crepis* — L. *Drepania* — Desf. Sandige Orte, Aefferränder, in Piemont bei Nizza. 6—7. ☉

2. *T. umbellata* Pers. Rechb. exc. *T. quadriaristata* Bivona Schmidtia — Lessing. Hügel, Gelbränder im südlichsten Geb., Piemont um Garzana, bei Castagnetolo am M. Bruciana. 7. ☉

3. *T. altissima* Pers. *T. virgata* Bertol. Balb. Rechb. exc. *T. sexaristata* Bivon. *Crepis ambigua* Balb. *T. grandiflora* Tenore. Hügel im südl. Geb., Piemont bei Garzana, Olivengärten bei Savona, Genua. 7. ☉

461. *Thrincia* Roth. Thrinie. K. syn. 479. Rechb. exc. p. 251. Comp. II. p. 421.

1. *Th. hirta* Roth. K. syn. Rechb. exc. *Th. Leysseri* Wallr. Rechb. exc. *Th. hispida* Rechb. exc. non Roth. *Th. hirta*, *Th. Leysseri* et *Th. hispida* DC. prodr. *Apargia hirta* Smith, *A. Brumati* Schiede, *A. hyoserioides* Vest. *Hyoseris taraxacoides* Wulf. *Leontodon hirtum* L. spec. 1123. *Leont. hispidum* Pollich. *Leont. saxatile* Lamk. Grafige,

sandige Orte, Wiesen, Triften, Raine, Abhänge, Ufer, Brachäcker, bch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *Th. hispida* Roth. cat. K. syn. edit. I. 417. *Th. maroceana* Pers. *Hyoseris hispida* Schousb. Rasse Orte im südlichsten Geb., Dalmatien, Lombardien; soll auch in d. Schweiz im Waadtlande wachsen. 6—7. ☉

3. *Th. tuberosa* DC. K. syn. *Apargia* — Willd. *Leontodon tuberosum* L. Gräßige Orte im südl. Eittoral, Istrien u. d. nahen Inseln, Dalmatien, in Piemont u. um Nizza. 5—6. 4

462. *Leontodon* L. Löwenzahn. K. syn. 480. Rchb. exc. p. 251. Comp. II. p. 433.

Erste Rotte. *Oporina* Don. K. syn.

1. *L. autumnalis* L. K. syn. *Apargia* — Willd. *Hedypnois* — Huds. *Oporina* — Don. Var. β . *pratensis*: *Apargia pratensis* Lk. A. *Taraxaci* Smith. *Hieracium* — Lin. *Oporina pratensis* Lessing. Gräßige Orte, Wiesen, bch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 7—10. 4

Zweite Rotte. *Dens Leonis* K. syn.

2. *L. Taraxaci* Loisl. K. syn. *Apargia* — Willd. *Hedypnois* — Vill. delph. *Picris* — Allion. pedm. *Leontodon montanum* Lamk. Triften der Hochalpen, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Destr. Steyermark, Kärnthen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig. 7—8. 4

3. *L. pyrenaicus* Gouan. K. syn. *L. squamosum* Lamk. *L. alpinus* Jacq. Rchb. exc. *Apargia alpina* Willd. Host. Gaud. *Picris saxatilis* Allion. *Hedypnois pyrenaica* Vill. delph. *Oporina* — C. H. Schltz. Var. β . *aurantiacus*: *L. aurantiacus* Rchb. exc. *Apargia* — ca Kitaib. Ap. *crocea* Host. *L. croceum* Haenke Rchb. exc. — γ . *pinnatifidus*: Ap. *crocea* Willd. spec. A. *media* Host. Gräßige Orte, Triften der Alpen, Boralpen u. Hochgebirge, Schweiz u. bch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Salzburg,

Throl nach Destr. 2c., Rheing. von d. Höhen d. Schwarzwaldes, Herrnwiese 2c. bis gegen Gernsbach an d. Murg bei Rastatt u. auf d. g. Rogesenzuge. 7—8. 4

4. *L. hastilis* L. K. syn. *L. protheiforme* Vill. delph. *Apargia communis* Spenn. *Hedypnois hispida* Smith. Var. α . *vulgaris*: *L. hispidum* L. *Apargia* — Willd. Host. *Hieracium incanum* Pollich. — β . *glabratus*: *L. hostile* Linn. Jacq. *L. danubiale* Jacq. *Hieracium* — Pollich. *Picris* — *lis* Allion. *Apargia hastilis* Host. *A. guestfalica* Boeningh. — γ . *dubius*: *Apargia dubia* Hoppe. *L. dubius* Rchb. exc. *Apargia hastilis* β . *lucida* Sauter. — δ . *hyoserioides*: *Apargia hyoserioides* Welw. Rchb. exc. in add. p. 853. *A. hyoseridiflora* Sauter. *A. hastilis* γ . *pinnatifidus* Saut. — ϵ . *opimus*: *L. caucasicus* Rchb. exc. in add. p. 853. Gräßige Orte, Wiesen, Triften, lichte Gebüsch, Raine, Wegeränder, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen; Var. γ . auf d. Alpen, Südschweiz, Throl; δ . Schweiz, Steyermark, Throl ϵ . Schweiz, Throl auf d. Kirchbaumer-Alp, Kärnthen auf d. M. Loibl. 6—10. 4

5. *L. tenuiflorus* Rchb. Rchb. exc. in add. p. 853. K. syn. DC. prodr. *Apargia tenuiflora* Gaud. helv. Gebirgswiesen im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin, Monte Salvege, M. Salvadore bei Lugano, Lombardei, Contobello. 6. 4

6. *L. Villarsii* Loisl. Fl. gall. Rchb. exc. *L. hirtum* Vill. delph. *Apargia Villarsii* Willd. *Leontodon hispidum* β . DC. Felsen d. Alpen und Gebirge im südlichsten Geb., Südschweiz Valle d'Aosta in Savoyen, Piemont im Lanza-Thal; Lombardei, Venedig. 7—8. 4

Dritte Rotte. *Apargia* C. H. Schultz. K. syn.

7. *L. incanus* Schrank. K. syn. *Apargia incana* Host. Scopoli. *Hieracium* — um Lin. Steinige Orte, Felsen bis in d. Alpen u. mit d. Flüssen in d. Niederungen, Schweiz selten, sonst dch. d. g. Alpenkette bis ins südlichste Geb., auf d. Jura-Kalk in Württemberg bei Tuttlingen u.

in Franken bei Muggendorf, Baiern bei Regensburg; Oestr. bei Baden u. 7—8. 4

8. *L. Berinii* Roth. K. syn. *Apargia* — Bartl. *A. canescens* Sieber. *A. arenaria* Moretti. Felsen im südl. Eittoral, Istrien bei Fogliano auf d. Riese d. Ssonzo, vom Glitschthale bis z. Ausflusse d. Ssonzo, u. in d. Lombardei, bei Venedig. 7—8. 4

Vierte Rotte. *Asterothryx* Cassin. K. syn.

9. *L. crispus* Vill. delph. K. syn. *Apargia crispata* Willd. Felsen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Nicosai-Thal, über Zermatten u. am Flüelen, Cant. Tessin auf d. Monte Bre. 7—8. 4

10. *L. saxatilis* Rchb. exc. K. syn. *L. crispus* K. syn. edit. I. *L. hispidum* Scopol. *Apargia saxatilis* Tenore, *A. tergestina* Hoppe. Sonnige Felsen am südl. Eittoral, Krain, Istrien bei Triest, Monte Spaccato; Dalmatien, Venedig. 6—7. 4

11. *L. asper* Rchb. exc. *Apargia aspera* W. et Kit. *A. hispanica* Willd. Sonnige, steinige Orte im südl. Geb., Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn. 7—8. 4

463. *Picris* L. Bitterkraut. K. syn. 484. Rchb. exc. p. 253. Comp. II. p. 438.

1. *P. hieracioides* L. K. syn. Rchb. exc. *P. ruderalis* Willd. Rchb. exc. *P. paleacea* Vest. *P. umbellata* Nees. Rchb. exc. *Leontodon umbellatum* Schkr. Var. β . *P. crepoides* Sauter. *P. sonchoides* Vest. Rchb. exc. Uncultivirte Orte, Wald = u. Wiesenränder, an Rainen, Wegen u. im g. Geb.; die Var. β . Gebirgswiesen auf d. Hohenack d. Bogesen, Steyermark bei Admont u. in Tyrol. 7—8. ☉

2. *P. hispidissima* Bartl. K. syn. *P. laciniata* Visian. *Crepis lappacea* Host. Felsen im südl. Eittoral, Istrien bei Castel Muschio, Insel Veglia an d. sandigen Küste, Dalmatien. 6—7. ☉

3. *P. pauciflora* Willd. *Medicusia lappacea* Rchb. exc. p. 254. *M. Sprengeriana* Rchb. exc. *Picris* — Poir. *Crepis* — Allion. pedm. Ackerländer im südl. Eittoral, Dalmatien; Piemont, am Schloßberge bei Nizza. 5—6. ☉

464. *Helminthia* Juss. Wurmsalat. K. syn. 484. Rchb. exc. p. 254. Comp. II. p. 439.

1. *H. echioides* Gaertn. K. syn. *Picris* — Lin. Acker, Weinberge, an Wegen, Schutt u., mehr im südl. Geb., Frankfurt a. M., Luxemburg an d. Obermosel, Thüringen um Barby, Haarhausen bei Arnstadt, Mecklenburg bei Warnemünde a. d. Ostsee, Harz bei Blankenburg, Oestr. Steyermark bei Gilly, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig; Belgien bei Ostende. 7—8. ☉

465. *Urospermum* Juss. Schweifsaamen. K. syn. 485. Rchb. exc. p. 277. Comp. II. p. 440.

1. *U. Dalechampii* Desf. K. syn. *Tragopogon* — L. *Arnopogon* — Willd. Connige, steinige Orte, Acker, im südl. Eittoral, Istrien, auf d. Inseln Dsero u. Cherso, Dalmatien, Piemont, Nizza, Genua. 5—6. 4

2. *U. picroides* Desf. K. syn. *Tragop.* — L. *Arnopogon.* — Willd. Weinberge, uncultivirte Orte, mit voriger im südl. Eittoral, Istrien u. 5—6. ☉

466. *Geropogon* L. Greisenbart. Rchb. exc. p. 269. Comp. II. p. 441.

1. *G. glaber* L. Rchb. exc. Im südlichsten Eittoral, Dalmatien a. d. Insel Lesina, u. in Piemont bei Nizza. 6—7. ☉

467. *Tragopogon* L. Bocksbart. K. syn. 485. Rchb. exc. p. 277. Comp. II. p. 441.

1. *T. porrifolius* L. K. syn. Wiesen, Wege im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Piemont,

Rizza, und sonst im Geb. dch. Cultur, verwilbert.
6—7. ☉

2. *T. major* Jacq. K. syn. *T. porrifolius* var. Fries.
Felsen, Hügel, trockene Wiesen, an Wegen, besonders auf
Kalk, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. Mannheim, Speier.
Pfalz bis z. Donnersberg, Worms bis Mainz, Bingen, dch.
Rassau, Coblenz, Neuwied, Ahrthal, Bonn, an d. Nahe v.
Kreuznach bis Meisenheim, Mosel bei Winningen z., dch. d.
g. südl. u. mittl. Geb., Baiern, Schwaben, Sachsen, Berlin,
Preußen bis z. Weichsel u. in ganz Destr. 6—7. ☉

3. *T. Tommasinii* C. H. Schultz. bipon. Maly
enum. pl. austr. p. 142. Im südl. Eittoral, Istrien, M.
Spaccato. 6—7. ☉

4. *T. minor* Fries K. syn. *T. pratensis* β . *micran-*
thes Wimmer. Auf Wiesen stellw. im Geb. Rheing., Fran-
kenthal, Worms, Mainz, Trier; Westerwalde oberhalb Mon-
tabaur bei Ellar u. um Frickhofen bei Hadamar im Nassau-
schen; Hamburg, Preußen an d. Weichsel u. in Schlesien. 5—7. ☉

5. *T. pratensis* L. K. syn. Wiesen, Triften, dch.
d. g. Geb. 5—7. ☉

6. *T. orientalis* L. K. syn. *T. undulatus* Rehb.
exc. *T. undulatus* β . *orientalis* DC. prodr. *T. revolutus*
Schweigg. Wiesen, besonders im g. südl. u. mittl. Geb.,
Rheing., Mannheim, Frankenthal, Worms, Coblenz, Bonn,
Eöln, Mosel, stellw. bis Trier, Eurenburg, St. Wendel z.,
nördl. bis Preußen bei Frauenburg, Tilsit. 5—7. ☉

7. *T. undulatus* Jacq. Maly enum. pl. austr. p.
142. *T. pratensis* β . *tortilis* K. syn. Baumgärten, Triften
in Siebenbürgen. 5—7. ☉

8. *T. floccosus* W. et Kit. K. syn. *T. canus*
Willd. *T. heterospermus* Schweigg. Sanbige Grasstellen
am nördl. u. südl. Eittoral, Pommern bei Swinemünde,
Ostpreußen im Kurlischen Haff, Memel; Istrien bei Triest,
Krain, Ungarn bei Pesth. 6—7. ☉

9. *T. crocifolius* L. K. syn. *T. sinuatus* Ave
Lullm. *T. eriospermus* Tenore. Wiesen, Triften d. südl.

Alpenkette, Schweiz auf d. St. Bernhard; Dalmatien u. in Weingärten in Ligurien. 7—8. ☉

468. *Scorzonera* L. Haferwurz. K. syn. 487.

Rchb. exc. p. 275. Comp. II. p. 444.

1. *S. austriaca* Willd. K. syn. *S. humilis* Jacq. DC. prodr. Var. α . *latifolia*: *S. humilis* Rchb. exc. — β . *angustifolia*: *S. angustifolia* Rchb. exc. *S. pannonica* III. Clus. Steinige Orte, Gebirge, Hügel, besonders auf Kalk im g. südl. Geb., Schweiz im Cant. Wallis u. Waadt; Destr. Mähren, Steyermark, Südtirol, Littoral, Istrien bei Obschino, Lombardei, Siebenbürgen, Ungarn. 4—5. 4

2. *S. humilis* L. K. syn. *S. lanata* Schrank. *S. nervosa* α . Lamk. *S. plantaginea* Schleich. Rchb. exc. *S. angustifolia* Wigg. *S. macrorrhiza* Schleich. Gaud. Feuchte Wiesen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Bregenz im Bodenseeried, im Molassegebiet in Württemberg bei Mundelfingen, Baden bei Billingen, Breisg. auf d. Felsberg, am Titisee, Elsaß bei Straßburg, Pfalz bei Maxdorf, Frankenthal, Worms, Alzei, Nahethal bei Kreuznach, Saarthal, Luxemburg 2c., Baiern, Thüringen, Sachsen, Hannover bis Preußen an d. Weichsel u. bei Königsberg 2c. 5—6. 4

3. *S. latifolia* Visian. Fl. Dalm. t. 5. f. 2. Maly enum. pl. austr. p. 142. In Dalmatien. 6. 4

4. *S. parviflora* Jacq. K. syn. *S. graminifolia* Tausch. Feuchte Wiesen in Destr., Mähren am Mönziger See; Ungarn bei Pesth, Siebenbürgen. 5—7. 4

5. *S. aristata* Ramon. K. syn. *S. grandiflora* Lapeyr. Rchb. exc. *S. alpina* Hoppe. *S. Hoppeana* Sieber. Kriften d. Hochalpen, im südl. Zuge; Tyrol M. Schehren, Geiseralp u. im Brachenthale, Kärnthen Alpe Karthal, Grosniß, Pasterze, Heiligenblut, Krain bei Bassowiza; Lombardei bei Venedig. 7. 4

6. *S. lanuginosa* Baumg. Transyl. III. p. 9. Maly enum. pl. austr. p. 142. Gebirge in Siebenbürgen bei Bonyha. 6. 4

7. *S. hispanica* L. K. syn. Var. α . *latifolia*: *S. hispanica* α . *sinuata* Wallr. *S. denticulata* Lamk. *S. edulis* Moench. — β . *glastifolia* Wallr. *S. glastifolia* Willd. Rehb. exc. *S. graminifolia* Roth. tent. — γ . *asphodeloides* Wallr. *S. montana* Mutel. Fl. Dauphine. Grasige Orte, Wiesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. an d. Nahe, v. Bingen bis Kreuznach, Thüringen, Franken bei Windsheim, Holstein, Hannover, Baiern bei München; Schweiz selten im Cant. Wallis; Destr. Böhmen, Mähren, Littoral, Istrien, Ungarn; auch häufig angepflanzt u. verwildert. 6—7. ☉

8. *S. hirsuta* L. Rehb. exc. *S. eriosperma* Gouan. *Hieracium capillaceum* Allion. pedm. Scorzon. Julia Vest. Im südl. Littoral, Dalmatien, Venedig bei St. Daniele; Piemont um Nizza. 5. 4

9. *S. purpurea* L. K. syn. Bewachsene Kalkhügel, sandige Nadelholzwälder, stellw. dch. d. Geb., Rheing. Pfalz bei Dürkheim, Reistadt, Oppenheim bis Mainz, Niederingelheim, Heidesheim, Gonsenheim bis Bingen; Nassau bei Flörsheim, Thüringen bis zum Harz, Berlin, Frankfurt a. d. Oder, Schlesien, Stettin, Bromberg, Preußen, Graubenz, Thorn, Oberbaiern; Destr. Mähren, Böhmen, Krain, Dalmatien, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen. 5—6. 4

10. *S. rosea* W. et Kit. K. syn. Bergwiesen im südl. Geb., Krain in d. Wochein, Croatien, Ungarn, Combardei. 7. 4

11. *S. dalmatica* Host. Fl. austr. p. 391. Maly enum. pl. austr. p. In Dalmatien a. d. Insel Lissa. 4

469. *Podospermum* DC. Stielsaamen. K. syn.

489. Rehb. exc. p. 277. Comp. II. p. 447.

1. *P. Jacquinianum* Koch. K. syn. *P. octangulare* DC. prodr. non Willd. *Scorzonera laciniata* Jacq. Wege, Schutt, uncultivirte Orte im südl. Geb., Destr. Mähren, Littoral, Istrien, Siebenbürgen, Ungarn. 6—8. 4

2. *P. laciniatum* DC. K. syn. *Scorzonera* — L.

Rchb. exc. Pollich. Sc. octangularis Willd. Var. β . muricatum: Scorzon. muricata Balb. Willd. Rchb. exc. Treviran. Podosp. muricatum DC. prodr. Sonnige Hügel, Acker, an Wegen, besonders auf Kalk- u. Lehmboden, stellw. bh. d. g. Geb., Rheing. Pfalz bei Deidesheim, Forst, Ellerstadt, Mannsheim, Darmstadt nach Nassau, Frankenthal, Worms bis Bingen, am Main v. Mainz bis Würzburg. Nahe bei Kreuznach bis Meisenheim, Moselgegend bei Trier, Luxemburg; Württemberg, Baiern bis Regensburg, Thüringen Jena bis z. Unterharz. Barby bei Magdeburg, Holstein; Destr. Böhmen, Mähren, Vitoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Venedig; Schweiz Cant. Wallis bei Sitten. 5—7. ☉

3. *P. calcitrapifolium* DC. K. syn. *P. resedifolium* DC. *Scorzonera calcitrapifolia* Vahl. Sc. *resedifolia* Retz. Kalkhügel, besonders im südl. Geb., Rheing., Oberelsaß bei Colmar, Rosheim, Scharrachbergheim; Obermosel bei Wintrauge in Luxemburg, Fl. v. Trier im Sauerthale von Alf nach Rahlingen; Combarbei, Piemont Valle d'Aost, Susa. 5—7. ☉

470. *Galasia* H Cassini. Milchwurz. K. syn. 490.

K. Taschb. 314. Comp. II. p. 449.

1. *G. villosa* Cassin. K. syn. *Scorzonera* — Scopol. Rchb. exc. Sc. *angustifolia* L. Host. austr. W. et Kit. Steinige Orte im südl. Vitoral, Südrain, Istrien bei Triest, Fiume, Saule zc., Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Combarbei bis nach Oberitalien zc. 5—6. 4

471. *Hypochaeris* L. Ferkelfraut. K. syn. 490.

Rchb. exc. p. 268. Comp. II. p. 449.

Erste Rotte. *Hypochaeris* K. syn.

1. *H. glabra* L. K. syn. *H. Balbisii* K. syn. edit. I. Triften, Felber, Acker, besonders auf Sand- u. Lehmboden bh. d. g. Geb. 7—10. ☉

2. *H. Balbisii* Loisl. Rchb. exc. (excl. syn. Richter

et Jacq.) *H. minima* Balb. (non Cyrill.) Im südlichsten Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei. 7—8. ☉

3. *H. radicata* L. K. syn. *H. intermedia* Richter, *Achyrophorus radiatus* Scopol. *Scorzonera taraxacifolia* Jacq. Wiesen, Triften, Waldränder, Kraine, Brachfelder, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

Dritte Rote. *Achyrophorus* K. syn.

4. *H. maculata* L. K. syn. *Achyrophorus* — *tus* Scopol. Gebirgswiesen, Waldtriften, Heiden, Nadelholzwälder, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Basel, Elsaß in d. Vogesen auf d. Sulzer-Ballon, Baden im Breisg. bei Neustadt, auf d. Kaiserstuhl, Kaiserthaler-Wald bei Mannheim, Württemberg im Schwarzwalde, Tübingen, Hohenstaufen, Pfalz, Hardegebirge v. Deidesheim, Dürkheim bis Kaiserslautern, Bingen, Nassau, Kreuznach u. einzeln bis Trier; Luxemburg, Eifel bei Prüm, Malmédy. Eupen bei Aachen u.: Baiern, Franken, Sachsen, nördl. bis Preußen, südl. bis in d. Lombardei. 7—8. 4

5. *H. uniflora* Vill. delph. K. syn. *H. helvetica* Wulf. *Achyrophorus helveticus* Scopol. Triften d. Alpen, Boralpen u. höheren Gebirgen; Rheing., Baden im Breisg. auf d. Feldberg; Schlesien in d. Sudeten nach Mähren, Böhmen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Destr. Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig u. 7—8. 4

472. *Willemetia* Necker. *Willemetie*. K. syn.

491. Rchb. exc. p. 269. Comp. II. p. 452.

1. *W. apargioides* Cassin. K. syn. *W. hieracioides* Monn. *Hieracium stipitatum* Jacq. *Wiebelia apargioides* Röhl. *Crepis* — Willd. *Peltidium* — Zollikh. *Zollikhoferia* — Nees, *Barkhausia* — Spreng. *Chondrylla stipitata* C. H. Schultz bipon. Wiesen, Gebüsche d. Alpen u. Boralpen, auch in d. Niederungen, Bodensee bei Bregenz, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern,

Deftr. Böhmen, Tyrol, Steyermark, Krain, Lombard. 7—8. 2

473. *Seriola* L. Brennsalat. Rchb. exc. p. 269.
Comp. II. p. 452.

1. *S. aethnensis* L. Rchb. exc. Steinige Orte im südl. Eittoral, Dalmatien, Piemont, Nizza. 6—7. ☉

474. *Taraxacum* Juss. Rußblume. K. syn. 491.
Rchb. exc. p. 270. Comp. II. p. 453.

1. *T. officinale* Wiggers. K. syn. *T. vulgare* Schrank. *T. Dens-Leonis* Desf. *Leontodon Taraxacum* L. *Leont. officinale* Wither. Var. β . *glaucescens*: *T. glaucescens* Rchb. exc. *T. offinale* β . *corniculatum* Koch et Ziz. *Leontodon Taraxacum* III. *obliquus* Fries L. *glaucescens* M. v. Bieb. *L. corniculatus* Kitaib. — γ . *alpinum*: *Leont. alpinus* Hoppe. *L. caucasicus* Stev. — δ . *nigricans*: *T. nigricans* Rchb. exc. *Leontod. nigricans* Kitaib. — ϵ . *taraxacoides*: *Taroxac. laevigatum* DC. Rchb. exc. *Leontod. — tus* Willd. *L. taraxacoides* Hoppe. — ζ . *palustre*: *Taraxac. palustre* DC. Rchb. exc. *T. lanceolatum* Poir. *Leontodon Taraxacum* β . *palustre* Wim. et Grab. *Taraxac. officinale* E. *lividum* K. syn. *Leontodon palustre* Smith. *L. lividum* W. et Kit. *L. erectum* Schrank. *L. Raii* Gouan. *L. Taraxacum* I. *palustre* Fries. *Hedypnois paludosa* Scopol. *Leont. salinus* Pollich. *L. erectus* Hoppe. *Apargia alpina* Fl. Wett. — η . *acaulis*: *Taraxac. Scorzonera* Rchb. exc. *Scorzonera acaulis* Roth. Willd. Cultivirte u. uncultivirte Orte, auf nassen u. trockenen Wiesen, Triften, an Wegen u., bch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 5—10. 2

2. *T. leptcephalum* Rchb. Rchb. exc. *T. officinale* η . *leptcephalum* K. syn. Sumpfige, grasige Orte; Deftr. Mähren am Mdniger See. 4—5. 2

3. *T. alpestre* Tausch. Flora. 1821. *Leontodon* — DC. prodr. VII. In d. Subeten in Schlesien an d. Schneegrube. 2

4. *T. Pacheri* C. H. Schultz. bapon. Flora. 1848. Nr. 11. Hochalpen, Kärnthen am Salmögletscher am Großglockner. 4

5. *T. tenuifolium* Hoppe. K. syn. Leontod. — Sturm. Feuchte Orte an d. Salinen im südl. Littoral, Istrien v. Saute nach Triest u. 4—5. 4

6. *T. serotinum* Poir. K. syn. Leontod. — W. et Kit. Trockene Hügel, Wiesen, Wege, mehr im südl. Geb., Oestr. bei Wien, Mähren an d. Polauer-Bergen, bei Geitzsch, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—9. 4

475. *Chondrilla* L. Knorpelsalat. K. syn. 493.

Rchb. exc. p. 271. Comp. II. p. 456.

1. *C. juncea* L. K. syn. Var. β . *spinulosa*: *C. acanthophylla* Borkh. Rchb. exc. — γ . *latifolia*: *C. latifolia* M. v. Bieb. *C. rigens* Rchb. exc. Trockene Hügel, kiesige Orte, Ufer, Begeränder, Felser, Aecker, stchw. dch. d. g. Geb.; Var. γ . Rheing., Pfalz, Dürkheim, Mannheim, Mainz, Trier u. 7—8. ☉

2. *C. prenanthoides* Villars. K. syn. *Prenanthes chondrilloides* Lin. Host. *Lactuca prenanthoides* Scopol. carn. Riesige Flußufer, besonders im südl. Geb., Baiern bei München an d. Isar, bei Kreuth am Tegernsee, Schweiz bei Bregenz an d. Ache, Graubünden bei Chur an d. Bächen Plessur u. Landquart; Südtirol in Valsugana am Bache Valcabiera, Südtirol an d. Save u. d. Isongo, Littoral, Istrien, Lombardien, Venedig. 7—8. 4

476. *Prenanthes* L. Hasensalat. K. syn. 494.

Rchb. exc. p. 272. Comp. II. p. 457.

1. *P. purpurea* L. K. syn. *Chondrilla* — Lamk. Var. β . *angustifolia*: *Pren. tenuifolia* Gmel. bad. Schattige Gebirgswälder an Bachufern, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten. 7—8. 4

2. *P. tenuifolia* L. Allion. Rchb. exc. Wälder d.

Alpen in d. südlichsten Kette, Schweiz, Piemont, M. Balbo, M. Generoso, Lombardei, Novara. 7—8. 4

477. *Lactuca L. Lattich*. K. syn. 494. Rchb. exc. p. 272. Comp. II. p. 458.

1. *L. sativa* L. K. syn. Im g. Geb. allgemein angepflanzt u. hin u. wieder verwildert. 7—8. ☉

2. *L. virosa* L. K. syn. *Wiestia* — C. H. Schultz. Steinige, bewachsene Gebirgsabhänge, Felsen, Weinberge 2c., stchw. dh. d. Geb., besonders im südlichen, im nördlichen selten, Rheing., Baden im Breisg., Elsaß bei Türkheim, Münster, Rappoltsweiler, Straßburg; Pfalz am Harbtgebirge bei Neustadt bis Türkheim, Kallstadt, Donnersberg, an d. Nahe u. Glan, Bingen, Kreuznach, Oberstein, Meisenheim u. häufig an d. Mosel bei Berncastel, Zell, Binningen, Coblenz, Einz, St. Goar, Boppard, in Nassau, Ahrthal u. Siebengebirge b. Bonn, Aachen 2c., Tyrol, Krain, Littoral, Lombardei 2c. 6—8. ☉

3. *L. angustana* Allion. pedm. Rchb. exc. Im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Piemont, Valle d'Aost; Lombardei, Siebenbürgen. 6—7. ☉

4. *L. Scariola* L. K. syn. *L. sylvestris* Lamk. *L. virosa* Schkr. Var. β . *L. Wallrothii* Spreng. Uncultivirte Orte, Dämme, Raine, Abhänge, Begeränder, Mauern 2c., stchw. dh. d. g. Geb. 7—8. ☉

5. *L. saligna* L. K. syn. Uncultivirte Orte, Dämme, Abhänge, Mauern, Wege u. Ackerränder, stchw. dh. d. Geb., besonders im südlichen von d. Schweiz dh. Württemberg, Baden, Elsaß bis Mainz, Frankfurt bis Würzburg, Pfalz Mannheim, Frankenthal, Worms, Nassau bei Hochheim u. Sothen, an d. Nahe v. Kreuznach bis Norheim, Meisenheim a. d. Glan, Saarthal, Moselthal, Luxemburg, Trier bis Binningen, Coblenz, Baiern; Thüringen, Jena, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien bis Venedig. 7—8. ☉

6. *L. viminea* C. H. Schultz. K. syn. *Phoenixopus decurrens* Cassini. Ph. *vimineus* Rchb. exc. p. 272. *Prenanthes viminea* L. Sonnige Gebirgsstellen, Hügel, stchw.

im Geb., Schweiz im Cant. Wallis, Sachsen von Dresden bis nach Destr. Böhmen, Mähren, Croatien, Dalmatien, Ungarn. 7—8. ☉

7. *L. ramosissima* * *Phoenixopus ramosissimus* Rchb. exc. p. 272. *Prenanthes* — a. Allion. pedm. *Phoenixopus vimineus* β . *ramosissimus* Bl. et Fgh. Comp. II. p. 457. Gebirgsstellen im südlichsten Geb., Piemont, Nizza. 7. ☉

8. *L. muralis* Fresenius Taschb. K. syn. *Prenanthes* — *L. Chondrilla* — Lamk. *Mycelis angulosa* Cassini. *M. muralis* Rchb. exc. p. 272. *Cicerbita* — Wallr. *Phoenixopus* — K. syn. edit. I. Wälder, Felsen, Bäume, Schutt, bch. d. g. Geb. 7—8. ☉

9. *L. stricta* W. et Kit. K. syn. *L. quercina* L. K. syn. edit. I. *Cicerbita corymbosa* Wallr. In Wäldern, Gebüschen, stellw. im Geb., besonders im südlichen; Thüringen, Jena, Unterharz, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien, Croatien, Venedig, Piemont. 7—8. ☉

10. *L. sagittata* W. et Kit. K. syn. Wäldungen, besonders im südl. Geb., Mähren bei Brünn, Südbain im Walde von Lipizza unter dem Dorfe Kanjian, Vittoral am Recafluß, im Thale Salsizza gegen d. Schloß Schwarzenegg, Ungarn, Siebenbürgen, Venedig. 7—8. ☉

11. *L. perennis* L. K. syn. *L. caerulea* Sauter. Steinige, felsige Orte, Weinberge, Mauern, stellw. im Geb., besonders im g. südlichen, Schweiz, Oberbaden im Hührgau, Hohentwiel, Engen u., bch. Elsaß, Pfalz am g. Hardtgeb. bis Mainz, Bingen bis Coblenz, Linz, Mosel aufwärts bis Trier, Luxemburg häufig, Frankfurt nach Nassau, Baiern bis Würzburg, Baireuth, Regensburg, Thüringen, Jena, Sachsen; Destr. Böhmen, Südtirol, Krain; Dalmatien, Ungarn, Kombarbei, Venedig u. im Norden bei Danzig. 5—6. 4

478. *Sonchus* L. Gänsefistel. K. syn. 497. Rchb. exc. p. 273. Comp. II. p. 462.

1. *S. tenerrimus* L. K. syn. Steinige Orte im

südl. Littoral, Istrien, am Cazaretto sporco in Triest, Dalmatien, Lombardei, Piemont, Nizza. 6—7. ☉

2. *S. oleraceus* L. K. syn. *S. laevis* Vill. *S. ciliatus* Lamk. *Hieracium oleraceum* Scopol. Var. α . *integrifolius* Wallr. — β . *runcinatus*: *S. oleraceus* β . *triangularis* Wallr. — γ . *lacerus* Wallr. *S. lacerus* Willd. Cultivirte Orte, Gärten, Felder, Wege, Schutt, im g. Geb. 6—10. ☉

3. *S. asper* Vill. delph. K. syn. *S. fallax* Wallr. *S. oleraceus* γ . et δ . Lin. *S. spinosus* Lamk. *S. rigidus* Fl. Dan. Cultivirte Orte, Gärten, Felder, an Zäunen, Waldschlägen u., stchw. bch. d. g. Geb. 6—9. ☉

4. *S. maritimus* L. K. syn. *S. nitidus* Villars. Var. β . *S. littoralis* Rchb. exc. Feuchte Orte am südl. Littoral, Istrien bei Triest, Monfalcone, Gradisca, Aquileja, Croatien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza. 7—8. 4

5. *S. arvensis* L. K. syn. *Hieracium arvense* Scopol. Var. β . *laevipes*: *S. intermedius* Bruckn. Acker, Felder auf Kalk u. Thonboden, bch. d. g. Geb. 7—8. 4

6. *S. uliginosus* M. v. Bieb. DC. prodr. VII. p. 186. Maly enum. pl. austr. p. 146. Sumpfige Orte in Dalmatien. 7. 4

7. *S. palustris* L. K. syn. Sumpfige Wiesen, Gräben, Ufer, stchw. bch. d. Geb., Rheing., Frankfurt zw. d. Mainkur u. Seckbach, im Ried zw. Huttelborn u. d. Dornheimer Hecken, Rheinhessen im Darmstädtischen, Rheinufer oberhalb Bingen, Baiern, Würzburg, Thüringen bei Halle, Sachsen, von Westphalen nach Hannover u. bch. d. g. nördl. Geb. nach Preußen; Destr. Mähren, Steyermark, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

479. *Mulgedium* H. Cassini. Milchlattich. K. syn

498. K. Taschb. 317. Rchb. exc. p. 273.

1. *M. alpinum* Lessing syn. K. syn. *Sonchus alpinus* L. Rchb. exc. Comp. II. p. 462. *S. montanus* Lamk. *S. caeruleus* Smith. *S. canadensis* With. *Aracium alpinum*

Monn. *Cicerbita alpina* Wallr. *Hieracium caeruleum* Scopol. Schattige Orte d. Alpen, Boralpen u. Alpenthler, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Oestr. u. , auf d. Vogesen bis zum Hochfelde, im Schwarzwalde vom Suden bis zu d. Hornisgrunden, Erzgebirge, Thringen, Voigtland, Ilmenau, Schmon bei Halle, Harz u. in d. Gebirgen v. Schlesien, Bohmen, Mhren. 7—8. 4

2. *M. Plumeri* DC. prodr. K. syn. *Sonchus* — L. K. syn. edit. I. Rchb. exc. Bewachsene Felsen d. Boralpen u. Gebirge, Rheing, auf d. Vogesen, d. Hoheneck, auf d. Sulzer Ballon u. Giromagny, Westschweiz, Cant. Wallis, Saenthal bei Zweifsimmen, im Jura Dent de Jeman u., Croatien, Savoyen. 7—8. 4

480. *Picridium* Desf. Bitterlattich. K. syn. 499.

Rchb. exc. p. 274. Comp. II. p. 465.

1. *P. vulgare* Desf. K. syn. *Scorzonera picroides* L. *Sonchus* — Allion. pedm. Aecker, Wege im subl. Vittoral, Istrien bei Pola, Fiume u. d. Inseln Cherso, Osero u. 4—5 ☉

481. *Zacyntha* Tournef. Warzenkohl. K. syn. 499.

Rchb. exc. p. 254. Comp. II. p. 465.

1. *Z. verrucosa* Gaertn. K. syn. *Lapsana Zacyntha* L. *Rhagadiolus* — Allion. pedm. Brachfelder im subl. Vittoral, Istrien bei Fiume, Triest, Dalmatien, Lombardien, Piemont, Oberitalien. 5—6. ☉

482. *Pterotheca* H. Cassini. Rochersalat. K. syn.

499. K. Taschb. 319. Rchb. exc. p. 269.

1. *P. nemausensis* Cass. K. syn. *Lagoseris* — M. v. Bieb. Host. K. syn. edit. I. *Crepis* — Allion. pedm. *Andryala* — Vill. delph. *Hieracium sanctum* L. *Andryala nudicaulis* Lamk. Var. β . *Lagoseris bifida* K. syn. edit. I. *Trichocrepis* — Visian. Fl. Dalm. Uncultivirte Orte am subl. Vittoral, Istrien bei Fiume, Triest, Dignano, Dalma-

ten bei Spalato, Ungarn, Piemont u. häufig um Nizza.
5—6. ☉

483. *Nemauchenes* H. Cassini. *Nemauchenes*.
Comp. II. p. 466.

1. *N. aspera* * *N. aculeata* et *N. inermis* Cassin.
Comp. II. *Crepis aspera* L. *Barkhausia* — Rchb. exc. p.
255. Endoptera — DC. prodr. VII. Nester im südlichsten
Eittoral, Lombardien, Venedig um St. Daniele. 7. ☉

484. *Gatyna* H. Cassini. *Gatyna*. Rchb. exc. p.
254. Comp. II. p. 466.

1. *G. Dioscoridis* Rchb. Rchb. exc. *Crepis* — Lin.
Schkr. non Pollich. *C. croatica* Host. Endoptera — DC.
prodr. *G. globulifera* Cass. *Crepis globifera* Hall. fil. *C.*
heterosperma Schrad. Im südl. Geb., Dalmatien, Croatien,
Ungarn, Siebenbürgen, Piemont bei Canavese. 6—8. ☉

485. *Crepis* L. Pippau. K. syn. 500. K. Taschb. 319.

1) *Barkhausia* Moench. DC. Rchb. exc. p. 255. Comp.
II. p. 468.

1. *C. foetida* L. K. syn. *Barkh.* — DC. Rchb. exc.
K. syn. edit. I. Var. β . *pinguis*: *Barkh. pinguis* Rchb. exc.
Crepis glandulosa Bast. — γ . *corymbosa*: *Barkh. graveolens*
Rchb. exc. *Wibelia* — Fl. Wett. Uncultivirte, trockene Orte,
Hügel, Raine, Wege, steinw. dch. d. Geb., besonders im g.
südl. u. mittleren, seltener im nördl. Geb., Rheing., dch. d.
g. Rheinthal u. in d. Nebenthälern u. 6—8. ☉

2. *C. rhocadifolia* M. v. Bieb. K. syn. *Barkh.* —
DC. prodr. Rchb. exc. K. syn. edit. I. Sonnige, unculti-
virte Hügel, Raine, steinw. im Geb., Böhmen bei Prag u.
Münchengrätz, Mähren bei Brünn und in Krain. 6—7. ☉

3. *C. alpina* L. *Barkh.* — DC. Rchb. exc. *B. scariosa*
Moench. Gebirgswiesen im südl. Geb., Siebenbürgen, Pie-
mont, Novara del Margozza. 6—7. ☉

4. *C. rubra* L. K. syn. Barkh. — Moench. DC. Rchb. exc. K. syn. edit. I. *Hostia rubra* Cassini. Var. β . *C. incarnata* Visian. Barkh. — Host. austr. Bewachsene Orte, Aderränder, Wege, im südl. Littoral, Istrien u. d. Inseln Cherso u. Dsero u. längst d. g. Küste bis Dalmatien, Piemont, Nizza. 6—7. ☉

5. *C. taraxacifolia* Thuill. K. syn. Barkh. — DC. prodr. Rchb. exc. K. syn. edit. I. *C. taurinensis* Wallr. *C. tectorum* Vill. delph. *C. cinerea* Desf. *C. vesicaria* Balbis. *C. Lachenalii* Gmel. bad. non Gochn. *C. scabra* Willd. *Wibelia taraxacifolia* Röhl. D. Fl. Var. β . *C. praecox* Balbis. Barkh. — Rchb. exc. — γ . Barkh. *intybacea* DC. h. monsp. et Fl. fr. Trockene Wiesen, Raine, Weinberge, Ufer, besonders auf Kalk, stchw. im südl. u. mittleren Geb., Schweiz, Rheing. v. Bodensee (bei Bregenz) u. längs d. Zuralkalk nach Württemberg, nach Oberbaden, Stocach zc., dann Rhein abwärts bis Mannheim, Elsaß, Pfalz Landau, v. Rauschbach über Arzheim, Frankenweiler bis Gleisweiler, Oberbaiern nach Tyrol, Littoral, Dalmatien, Lombardei. 5—6. ☉

6. *C. bursaefolia* L. Barkh. *bursifolia* Presl. Rchb. exc. Lagoseris — Link. Necker, Raine, Wege im südl. Geb., Dalmatien, Piemont, um Nizza. 5—6. ☉

7. *C. vesicaria* L. K. syn. Barkh. — Spr. K. syn. edit. I. Var. *C. vesicaria* Willd. *C. scariosa* Willd. Barkh. — Rchb. exc. Triften, Wege, im südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Inseln Dsero u. Beglia, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Ligurien bei Roletta. 5. ☉

8. *C. setosa* Hall. fil. K. syn. Barkh. — DC. prodr. Rchb. exc. *C. hispida* W. et Kit. Barkh. — Link. Rchb. exc. Necker, Felder, Weinberge stchw. im Geb., Rheing. Elsaß bei Mülthausen, Pfalz bei Niederbrunn, Ludwigshafen, Rheininsel, Rheinschanze bei Mannheim u. auf d. Roller bei Schwegingen; Schlesien bei Oppeln; Schweiz bei Lausanne zc. Destr. Steyermark, Tyrol, Littoral, Istrien, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

9. *C. Leontodon* * *Barkhausia Leontodon* DC. Fl.

fr. Barkh. leontodontoides Rchb. exc. Cr. — Allion Lagoseris — Link. Waldränder im südl. Geb., Piemont, Ligurien. 7—8. ☉

2) *Crepis* DC. Rchb. exc. p. 257. Comp. II. p. 472.

Geracium Rchb. exc. p. 259.

10. *C. praemorsa* Tausch. K. syn. *Hieracium praemorsum* L. *Geracium* — Rchb. exc. p. 259. *Intybus* — us Fries, *Intybellia* — sa Monnier. Walbige, schattige Gebirge u. Wiesen d. Kalkformation, stellw. besonders im südl. u. mittl. Geb., Rheing., Meersburg am Bodensee nach Elßaß bis Straßburg, Baden bei Durlach, Bruchsal, Fergstraße, Pfalz bei Landau bis Deidesheim, Zweibrücken, Blieskastel, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Eifel bei Prüm, Münster-eifel u., Coblenz; Schwaben, Baiern, Franken nördl. bis Thüringen, Sachsen, Schlesien, Preußen bei Königsberg, Tilsit; Böhmen, Mähren, Galizien, dann in Destr. bis in d. Lombardei. 5—4. 4

11. *C. incarnata* Tausch. K. syn. *Hieracium* — Wulf. H. *montanum* Scopol. *Geracium incarnatum* Rchb. exc. p. 259. *Intybellia incarnata* Monnier. Triften d. Vor-alpen, Gebirgswiesen in d. südl. Kette; Südtirol im Pustertal, M. Carist im Feltrichen, Kärnthen, Krain, Vittoral, Lombardei, Venedig. 5—6. 4

12. *C. Froelichiana* DC. prodr. VII. *C. incarnata* β. *lutea* K. syn. *Hieracium parviflorum* Schleich. H. *praemorsum* II. *corymbosum* Gaud. helv. *Geracium parviflorum* Rchb. exc. Alpenthäler, Schweiz im Eufannathale am Eari-See; Südtirol im Dorec-Thale hinter d. Schlehren, Destr. bei Steyer. 5—6. 4

13. *C. bulbosa* Tausch. K. syn. *Leontodon* — sum L. *Prenanthes* — sa DC. Fl. fr. *Aetheorrhiza* — Cass. DC. prodr. VII. *Taraxacum bulbosum* Rchb. exc. p. 270. *Hieracium* — Willd. Sandige Orte, Triften, im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien. 4—5. 4

14. *C. aurea* Tausch. K. syn. *Leontodon* — eum

L. Hieracium — Scopol. Vill. Geracium — Rchb. exc. Feuchte Triften d. Alpen u. Boralpen, Rheing., Oberbadern, im Kriegerthale bei Engen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Destr. bis in d. Süden. 7—8. 4

15. C. alpestris Tausch. K. syn. Rchb. exc. Hieracium — tre Jacq. Waldige Gebirgstriften, Alpen u. Boralpen, Schweiz von Schaffhausen mit d. Jurakalk dch. Württemberg bei Tuttingen, Ehingen, Mundelfingen nach Oberbadern bei Stockach, Engen, Billingen, Höffingen, Baiern längs d. Donau bis Regensburg u. Eichstädt; dch. d. Cant. Graubündten nach Tyrol, Destr. Steyermark, Kärnthen, Krain, Galizien, Siebenbürgen, Lombardien. 7—8. 4

16. C. chrysantha Froel. K. syn. DC. prodr. VII. C. Jubata K. Taschb. 321. C. frigida C. H. Schultz Hieracium frigidum Stev. H. chrysanthum Ledeb. Schweiz in d. Walliser-Alpen im Bagnes-Thal. 7—8. 4

17. C. chondrilloides Jacq. K. syn. C. foeniculacea Froel. C. Adonis Spr. Andryala chondrilloides Scopol. Berinia andryaloides Brign. Wibelia chondrilloides Hoppe et Hornsch. Sonnige Kalkfelsen im südl. Eittoral, Krain auf d. Karstgebirge, M. Bhaun, Adelberg, Istrien bei Triest, Fiume; Dalmatien. 6—7. 4

18. C. lacera Tenore. Fl. Neap. Rchb. exc. C. latina Sebast. C. erucaefolia Tausch. Kalkfelsen im südl. Eittoral, Istrien Insel Veglia; Oberitalien. 6—7. ☉

19. C. biennis L. K. syn. Var. α. runcinata: C. lodoviciensis Bess. Rchb. exc. — β. lacera: C. biennis β. banatica Rochel. — γ. dentata Fl. Siles. Wiesen, Triften, lichte Waldstellen, dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

20. C. nicaeensis Balbis K. syn. C. scabra DC. prodr. VII. non Willd. Trockene Wiesen, stchw. im Geb., Rheing., in Baden, Knielingen bei Karlsruhe, bei Mannheim; Destr. bei Wien; Ungarn; Piemont, Nizza. 6—7. ☉

21. C. tectorum L. K. syn. C. Dioscorides Pollich. DC. Fl. fr. C. stricta Schultz Starg. Var. β. C. setigalis Roth. C. Lachenalii Gochn. C. cinerea Pers. —

γ. pinnatifida. Aeder, Weinberge, Brachfelder, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten. 5—6. ☉

22. *C. virens* Vill. delph. K. syn. Willd. DC. h. monsp. Gaud. *C. tectorum* Pollich. *C. polymorpha* Wallr. DC. prodr. VII. *C. pinnatifida* Willd. Var. *β*. *C. agrestis* W. et Kit. Lichte Waldstellen, Wiesen, Triften, Aeder, Felber, Wege, dch. d. g. Geb. 6—10. ☉

23. *C. neglecta* L. K. syn. Smith. Bertoloni amoen. *C. cernua* Tenore Fl. Neap. K. Taschb. 322. *C. stricta* Scopol. Bertol. ital. *C. polymorpha* DC prodr. VII. *Barkhausia cernua* Rchb. exc. p. 255. K. syn. edit. I. Triften, Wiesen, Wege, im südl. Eittoral, Krain, Istrien bei Triest häufig, Fiume, Croatien, Dalmatien. 4—5. ☉

24. *C. pulchra* L. K. syn. *Prenanthes* — DC. Fl. fr. Pr. *hieracifolia* Willd. Pr. *viscosa* Baumg. *Intybellia pulchra* Monnier, *Chondrilla* — Lamk. *Lapsana* — Vill. delph. *Sclerophyllum pulchrum* Gaud. helv. *Phaeacasium lampsanoides* Cassini. Bewachsene Hügel, Weinberge, Aeder, Wege, auf Lehm- u. Kalkboden, stellw. im Geb., besonders im g. südl., Rheing., Oberbaden bei Berghausen nach Würtemberg, Tübingen, Stuttgart, Elsaß u. dch. d. Gebirge am linken Rheinufer nach Speier bis zur Nahe u. d. Glane, bei Ginsweiler, Obernheim, Meisenheim, Obermoschel; nicht in d. Schweiz; dann in Baiern bei Schweinfurt, Schlesien nach Destr. Tyrol, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Piemont Valle d'Aost. 6—7. 4

25. *C. Jacquini* Tausch. K. syn. *Hieracium chondrilloides* L. Jacq. *Geracium* — Rchb. exc. p. 260. Steinige, grasige Orte d. Alpen u. Boralpen; dch. d. östliche Schweiz nach Schwaben, Vorarlberg, Baiern; Destr. Mähren, Tyrol, Steyermark, Ungarn, Krain, Eittoral bis in d. Lombardei. 7—8. 4

26. *C. paludosa* Moench. K. syn. *Hieracium paludosum* L. *Geracium* — Rchb. exc. *Aracium* — Monnier. Sumpfige, etwas moorige Wiesen, lichte Waldstellen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. Elsaß, Baden, Hessen bis z.

Niederrheine zc., an d. Nahe, Saar u. Mosel, in Luxemburg u. bei Aachen zc. 6—7. 4

27. *C. albida* Vill. delph. *Picridium albidum* DC. Fl. fr. Rchb. exc. p. 273. Steinige Orte im südlichsten Geb., Savoyen; Piemont besonders um Nizza. 6—7. ☉

28. *C. succisaefolia* Tausch. K. syn. *Hieracium* — Allion. pedm. *Omalocline* — lia Monnier, *C. hieracioides* Chlor. hannov. Var. α . *mollis*: *Hieracium molle* Jacq. *H. croaticum* W. et Kit. *H. Sternbergii* Hornem. *Geracium croaticum* Rchb. exc. p. 260. — β . *integrifolia*: *Hieracium integrifolium* Hoppe. *Geracium succisaefolium* Rchb. exc. *Crep. hieracioides* W. et Kit. Feuchte Wiesen u. d. Alpen, Boralpen u. Gebirge, Rheing., Oberbaden a. d. Blauen, Belchen, Feldberg, Württemberg bei Donaueschingen u. Püffingen nach Oberbaiern; Thüringen am Singen u. über Arnstadt, im Steiger bei Erfurt, Sachsen, Harz, Preußen, Königsberg bei Aweiden, Schlesien; mährische Karpathen, Böhmerwald; vom Schweizer-Jura dch. alle Boralpen bis Destr. Steyermark, Croatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen zc. 7—8. 4

29. *C. pygmaea* L. K. syn. *Hieracium pumilum* L. *H. prunellaefolium* Gouan. Rchb. exc. p. 266. *H. prunellaefolium* DC. *Leontodon dentatum* L. mant. *Omalocline prunellaefolia* Cassini. Bewachsene Orte, an Gletscherrändern u. im Gerölle d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis, M. Foully, Diableret, Ravylpaß von Sieders nach d. Simmenthal, Graubündtener u. Nelener-Alpen; Tyrol auf d. Alpen am Stilfserjoch; Lombardien, Piemont. 7—8. 4

30. *C. heterogyna* Froelich. DC. prodr. VII. p. 169. *Hieracium stuposum* Rchb. exc. p. 265. Felsen im südlichsten Geb., Dalmatien bei Ragusa u. Tadera. 6—7. 4

31. *C. blattarioides* Vill. delph. K. syn. *C. austriaca* Jacq. *C. sibirica* Gouan. *Hieracium blattarioides* L. spec. Gaud. *H. pyrenaicum* L. syst. Host. Triften d. Alpen, Boralpen u. Gebirge, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, Schwaben, Baiern; Salzburg, Destr. zc., vom Jura

nach Elsaß, M. Ballon., auf d. Vogesen; dann in Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont. 7—8. 4

32. *C. grandiflora* Tausch. Willd. K. syn. *Hieracium grandiflorum* All. pedm. *H. pappoleucum* Vill. delph. *H. conyzaefolium* Gouan. Triften d. Hochalpen, besonders im Urgebirge; Oberbaiern; Schweiz nach Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

33. *C. rigida* W. et Kit. Rchb. exc. *Hieracium pannonicum* Jacq. Sonnige, waldbige Hügel in Destr. Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—9. 4

34. *C. sibirica* L. K. syn. *Hieracium sibiricum* Gmel. sib. Gebüsche d. Boralpen, Schlesien im Kessel u. auf d. Janowitzer Heide im Gesenke; dann in Mähren, Galizien, Ungarn. 7—8. 4

35. *C. adenantha* Visian. Flora. 1830. Comp. II. p. 481. Gebirgsstellen in Dalmatien. 6. ☉

486. *Soyeria* Monnier essai monogr. Soyerie.

K. syn. 508. K. Taschb. 324. Comp. II. p. 482.

1. *S. montana* Monnier. K. syn. *Crepis* — Tausch. Rchb. exc. p. 258. *Hieracium montanum* Jacq. Gaud. *Hypochaeris pontana* L. *Andryala* — Vill. delph. Triften d. Alpen u. Boralpen, mehr in d. südl. Kette; Schweiz im Cant. Wallis; Destr. Steyermark, Tyrol, Salzburg; Siebenbürgen, Lombardei; Piemont, Savoyen. 6—7. 4

2. *S. hyoseridifolia* Koch. K. syn. *Crepis* — Tausch. Rchb. exc. *Apargia* — Lessing syn. *Hieracium hyoseridifolium* Vill. Gaud. *Leontodon terglowensis* Hacq. Triften d. Hochalpen; Schweiz Cant. Bern, Freiburg, Glarus, Appenzell; Alpen in Baiern; Boralberg; Destr. Steyermark, Monte Kalbling bei Admont, Hohenschwab, Berchtesgaden, Tyrol, Kärnthen, Krain. 7—8. 4

487. *Andryala* L. Filzlattich. Rchb. exc. p. 269.

Comp. II. p. 512.

1. *A. ragusina* L. Rchb. exc. in add. p. 855. Im südl. Eittoral, Dalmatien bei Ragusa u. 6—7. 4

2. *A. integrifolia* L. Rchb. exc. *A. lanata* Vill. delph. *Rothia runcinata* Willd. in Roth. catal. Steinige Aefferränder im südlichsten Eittoral, Piemont um Nizza. 6—7. ☉

3. *A. sinuata* L. Rchb. exc. *Rothia cheiranthifolia* Willd. Roth. catal. Im südlichsten Geb., Piemont am Barflusse bei Nizza. 6—7. ☉

488. *Hieracium* L. Habichtsfraut. K. syn. 508. Rchb. exc. 260. Comp II. p. 485.

Erste Rotte. *Piloselloidea* K. syn.

1. *H. Pilosella* L. K. syn. Var. α . *vulgare* Monnier *essai monogr.* — β . *robustius* Koch. — γ . *farina-ceum* Hornung. *H. Pilosella* β . *incanum* DC. Fl. fr. *H. velutinum* Hegest. et Heer. — δ . *grandiflorum* DC. Fl. fr. *H. Pilosella* B. *alpestre* Monnier. Trockene Orte, Heiden, lichte Waldstellen, Abhänge, Raine, Wegeränder u., dch. d. g. Geb.; Var. γ . u. δ . auf Alpen u. Voralpen. 5—10. 4

2. *H. Peleterianum* Merat. Rchb. exc. *H. Pilosella* δ . *pilosissimum* K. syn. Wallr. *H. Pilosella* C. *Peleterianum* Monn. Eichte, walbige Felsen, Gebirgsabhänge, Weinberge, stchw. dch. d. mittl. Geb., besonders in d. Rheing., Vogesen auf d. Hohenack; Baden im Seckenheimer Walde, Relaishaus bei Mannheim, Pfalz v. Landau bis zum Donnersberge, Harbt von Neustadt über Königsbach, Forst, Dürkheim bis Kallstadt, Nierstein stchw. bis Coblenz bis ins Ahrthal, an d. Nahe bei Kreuznach bis Oberstein, Mosel v. Trier bis Winningen, Coblenz u. 6—9. 4

3. *H. Hoppeanum* Schultes. *H. Pilosellaeforme* Hoppe Rchb. exc. *H. Pilosella*. E. *Hoppeanum* K. syn. Triften d. Alpen, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen. 7—8. 4

4. *H. Schultesii* Fr. W. Schultz. Archiv. 1842. Fl. d. Pfalz p. 276. *H. Pilosello* — *Auricula* Fr. Schultz. Torfheiden u. Nadelholzwälder, in d. Vogesen auf d. Hohenack, auf d. Vogesensandstein bei Bitsch. 6. 4

5. *H. stoloniflorum* W. et Kit. K. syn. *H. bifurcum* β . major Neilr. Vind. *H. flagellare* Rehb. exc. *H. Piloselle-pratense* Fr. Schultz. Fl. d. Pfalz. Gebirgsstriften, grasige Orte, stchw. im Geb., Rheing., Nierstein bei Mainz, Darmstadt bei Langen; bei Hamburg, Preußen bei Saalfeld, Kapfeim; Destr. Böhmen, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. 4

6. *H. bifurcum* M. v. Bieb. K. syn. z. Theil. *H. collinum* Besser, *H. flagellare* Host. Froel. DC. *H. pedunculare* Wallr. *H. brachiatum* Bertolon. *H. hybridum* Gaud. helv. *H. dubium* Tausch. *H. auriculaefolium* Tausch. Sonnige, uncultivirte Orte, Abhänge, Raine, Wege, auf Kalk- u. Lehmboden, stchw. dch. d. Geb., Rheing. von Basel dch. Baden, Breisg. bis Frankfurt dch. Elsaß stchw. bis Mainz, Coblenz, Linz, Schwaben, Baiern, Thüringen, Sachsen, Preußen bei Marienwerder, Schlessien, Destr. Böhmen, Steyermark, Tyrol, Krain, Vitoral, Istrien, Lombard. 6—7. 4

7. *H. bitense* Fr. Schultz Fl. d. Pfalz p. 276. *H. Pilosello-praealtum* Fr. Sch. *H. bifurcum* Koch z. Theil. Grasige Hügelabhänge im Vogesensandstein bei Bitsch. 5—6. 4

8. *H. fallacinum* Fr. Schultz Fl. d. Pfalz p. 277. *H. Pilosello-fallax* Fr. Sch. *H. bifurcum* Koch z. Theil. *H. fallax* C. H. Schultz. *H. praealto-pilosella-praealtum* C. H. Schultz, *H. cinereum* Döll. non Tausch. *H. praealtum* γ . *fallax* K. syn. *H. cymosum* Pollich, *H. fallax* DC. Fl. fr. Gaud. helv. Var. β . *pilosellinum*: *H. pilosellinum* F. Schultz Fl. d. Pfalz p. 278. *H. fallacino* — *Pilosella* Fr. Schlitz. *H. fratris* C. H. Schultz. Nadelholzwälder, Waldränder, Hügelabhänge, Aecker, besonders Kleeäcker, Brachäcker auf d. Tertiärfalke u. Lias in d. Rheing., Pfalz bei Niederbrunn, Deidesheim, Forst bis Oppenheim, Nierstein, Mainz, an d. Bergstraße bei Weinheim u. 5—6. 4

9. *H. furcatum* Hoppe. K. syn. *H. sphaerocephalum* Froelich. *H. uniflorum* et *H. pumilum* Hoppe *H. angustifolium* Hoppe ap. Sturm, Rchb. exc. Var. β . *alpicola* Schleicher, Gaud. Tausch. Triften d. Hochalpen an d. Schneegrenze; Baiern, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Lombardien, M. Genis, Savoyen. 7—8. 4

10. *H. breviscapum* DC. Fl. fr. K. syn. *H. pumilum* Lapeyr. *H. Candolii* Monnier essai monogr. Triften d. Hochalpen, Schweiz im Cant. Valais, M. Foully, Lombardien, Ungarn. 7—8. 4

11. *H. angustifolium* Hoppe Taschb. 1799. K. syn. Vill. voy. Willd. *H. auriculatum* γ . *angustifolium* Duby, *H. glaciale* Lachen. act. helv. Triften d. d. Hochalpen, Schweiz; Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Eittoral, Istrien, Lombardien. 6—8. 4

12. *H. Auricula* L. K. syn. *H. dubium* Smith. *H. Lactucella* Wallr. Var. β . *H. sulphureum* Döll. rh. Fl. Etwas feuchte Orte, Wiesen, Triften, lichte Waldstellen, Rhone, Brachfelder, d. d. g. Geb. 6—10. 4

13. *H. floribundum* Wim. et Grab. Comp. II. p. 488. *H. radiocaulis* Tausch. Baumgärten in Schlesien. 6. 4

14. *H. piloselloides* Vill. delph. K. syn. DC. Fl. fr. *H. florentinum* Sturm. *H. florentinum* II. *piloselloides* Gaud. helv. *H. ambiguum* β . *piloselloides* Spen. frib. Var. β . *glareosum*: *H. Michelii* Tausch. Trockene Hügel, Felsen, Flußfließ, stchw. mehr im südl. Geb., am Fuße d. Alpen, Rheing., Oberbaden, Breisg. auf d. Kaiserstuhl, Schweiz nach Baiern, Tyrol u. in allen Provinzen Oestreichs, Var. β . in Böhmen, Krain an d. Save u. d. Sponzo. 6—7. 4

15. *H. praealtum* Vill. delph. K. syn. Var. α . *florentinum*: *H. praealtum* Vill. DC. Gochn. Rchb. exc. *H. florentinum* Willd. *H. florentinum* I. *praealtum* Gaud. helv. *H. praealtum* et *H. stellatum* Tausch. *H. obscurum* Rchb. exc. — β . *Bauhini*: *H. Bauhini* Schultes Rchb. exc. *H. Auricula* Willd. *H. filiferum* Tausch. Rchb. exc.

H. viscidulum Tausch. — γ . *decipiens*: *H. fallax* Koch. Gaud. helv. *H. collinum*, *H. vulgare* et *H. catodon* Tausch. — δ . *hirsutum*: *H. fallax* Willd. *H. cymigerum* Rchb. exc. *H. Zizianum* Tausch. *H. cymosum* β . *laxum* Chlor. hann. — ϵ . *setosum*: *H. piloselloides* Wallr. Sched. crit. Trockene Wiesen, grasige Hügel, Raine, Begeränder, stellenw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

16. *H. glaucescens* Besser. galiz. p. 150. Rchb. exc. Auf Thon- u. Kalkboden in Galizien bei Lemberg. 5—6. 4

17. *H. Besserianum* Spreng. Host. austr. II. p. 406. *H. Auricula* Bess. Fl. Galiz. Steinige Waldstellen in Galizien. 6—7. 4

18. *H. echioides* W. et Kit. pl. rar. hungar. p. 87. K. syn. *H. cymosum* c. *setosum* Meyer Chlor. hann. Var. α . *setigerum*: *H. setigerum* Tausch. Rchb. exc. *H. simplex* Tausch. *H. Rothianum* Wallr. — β . *verum*: *H. echioides* Lumn. poson. Rchb. exc. W. et Kit. p. 88. — γ . *grandiflorum*: *H. cinereum* Tausch. Rchb. exc. Son- nige Gebirgsstellen, Felsen, Hügel im süddöstl. u. nördl. Geb., Sachsen, Thüringen, Berlin bei Rüdersdorf, Frankfurt a. d. Oder, Preußen bei Conitz, Thorn, Culm an d. Weichsel u., Posen; Galizien, Mähren, Böhmen, Destr. Ungarn, Siebenbürgen. 6—8. 4

19. *H. Nestleri* Vill. voy. K. syn. *H. cymosum* L. spec. 1126. *H. cymosum* Froelich. Rchb. exc. *H. cymosum* β . *Columnae* Rchb. pl. crit. Var. β . *brevisetum* K. syn. — γ . *Vaillantii*: *H. Vaillantii* Tausch. Rchb. exc. *H. cymosum* β . *longifolium* Rchb. pl. crit. f. 116. Uncultivirte, steinige Hügel, Felsen, stellenw. dch. d. Geb., Rheing., Oberbaden, Bodenseegegend bei Engen u. Hohentwiel, bei Coblenz an der Karthaus, Franken v. Hasselberg bis nach Schwaben, Baiern, Sachsen, Jena, Schlesien, bei Frankfurt a. d. Oder; Destr. Böhmen; Tyrol, Dalmatien. 6—7. 4

20. *H. pratense* Tausch. K. syn. *H. cymosum* Willd. Sturm, *H. dubium* L. *H. collinum* Gochn. *H. am-*

biguum Ehrh. H. cymosum α . conglomeratum Meyer Chlor. han. Gräßige Hügel, Dämme, Raine, torfige Wiesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Oberbaden am Bodensee, Elsaß bei Rippoldsweiler, Anblau, Barr; Baden bei Mühlheim, Wiesloch, Bergstraße; Pfalz zw. Dürkheim u. Frankenthal, Worms, Oggersheim, Oppenau, Laubenheim, Nierstein, Oppenheim, Kreuznach bis Coblenz, Schwaben, Baiern, Sachsen, Jena, Hannover, Schlesien, Preußen bei Königsberg; Destr. Kärnthen, Ungarn u. häufiger im nördl. Geb. 6—8. 4

21. H. aurantiacum L. K. syn. Var. β . flavum: H. aurantiacum δ . flavum Gaud. helv. — γ . bicolor K. syn. — δ . fuscum: H. fuscum Vill. voy. Rchb. exc. H. aurantiacum. ζ . fuscum Froelich. Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr.; Rheing., auf d. höchsten Punkten d. Vogesen, Oberbaden im Breisg. auf d. Feldberge; in den Gebirgen von Schlesien; Böhmen, Mähren bis Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont, Oberitalien. 6—7. 4

22. H. sabinum Sebast. et Maur. K. syn. H. cymosum Vill. delph. H. cymosum var. Rchb. exc. Var. β . rubellum K. syn. H. multiflorum Schleich. Triften d. Alpen, besonders in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis über Zermatten, Ettoral, Istrien im Walde v. Vipizza bei Triest, Dalmatien, Lombardei; die Var. β . im Cant. Waadt, M. Naye u. Verraux bei Vevey. 6—8. 4

3. Zweite Rotte. Aurella K. syn.

23. H. staticaefolium Vill. K. syn. All. pedm. Alpen, Boralpen bis in d. Niederungen längs d. Alpenkette, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, Bodensee auf d. Gries d. Ache bei Bregenz, Oberschwaben, Baiern, Destr. bis in d. Lombardei. 6—7. 4

24. H. porrifolium L. K. syn. Var. α . armerifolium Froelich. — β . denticulatum K. syn. H. porrifolium. δ . denticulatum Froelich. Triften d. Alpen u. Boralpen

in d. südl. Kette; Baiern, Schweiz Cant. Tessin am Comersee; Destr. Südtirol, Steyermark, Krain am M. Voibl, Eittoral, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

25. *H. Froelichii* * *H. porrifolium* γ . *Froelichii* K. syn. *H. saxatile* Jacq. obsc. 2. t. 50. *Froelich*. ap. DC. prodr. VII. *H. saxatile* β . *latifolium* Neilr. Gebirgsstellen in Destr. bei Baden, in Krain u. Südtirol. 7—8. 4

26. *H. armeriaefolium* Rehb. exc. Alpen d. südl. Schweiz Cant. Wallis im Saasthale. 6—7. 4

27. *H. glaucum* Allion. pedm. K. syn. *H. saxatile* Jacq. icon. rar. t. 163. K. syn. edit. I. *H. scorzonrifolium* Vill. delph. *H. Allionii* Monnier Rehb. exc. *H. Widenowii* Monn. Felsige Orte d. Alpen u. Boralpen Schweiz u. bch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. Mähren, Ungarn, Dalmatien, Lombardei, Piemont. 6—8. 4

28. *H. graveolens* *Froelich* DC. prodr. VII. p. 219. *Maly* enum. pl. austr. p. 151. Wiesen im südl. Krain, M. Ranaß. 6. 4

29. *H. bupleuroides* Gmel. bad. K. syn. *H. polyphyllum* Willd. Tausch. *H. glaucum* Wahlenb. *H. graminifolium* β . *linarifolium* *Froelich*, *H. denudatum* Rochel. *H. crassifolium* Schultes, *H. calcareum* Bernh.? Steinige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz Jura bei Dornach, M. Wasserfall u. Ramstein, auch auf d. Schwäbischen Alp bei Bronnen u. Friedingen, u. stellw. bch. d. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Salzburg, Destr. Ungarn. 6—8. 4

30. *H. speciosum* Hornem. K. syn. *H. speciosissimum* Willd. enum. Boralpen Schweiz u. Tyrol im Allgau; Ungarn. 7—8. 4

31. *H. dentatum* Hoppe K. syn. *H. Schraderi* H. *dentatum* Gaud. helv. Steinige, grasige Orte d. Alpen, Schweiz u. stellw. bch. d. Alpenkette nach Tyrol, Kärnthen, Destr. 7—8. 4

32. *H. glabratum* Hoppe. K. syn. *H. Esereianum* Baumg. *H. flexuosum* *Froel.* DC. Gaud. Var. γ . non W. et Kit. *H. trichocephalum* Willd. Link. Alpen u. Boral-

pen; Schweiz u. stchw. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Salzburg, Steyermark, Destr. 6—7. 4

33. *H. villosus* Jacq. K. syn. *H. eriophyllum* Schleich. Link. Var. β . *H. flexuosus* W. et Kit. Host. — γ . *H. villosus involucratus* Rochel. — δ . *H. pilocephalum* Link. enum. — ϵ . *H. waldepilosus* Vill. Steinige, grasige Orte d. Alpen u. Boralpen dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Salzburg, Tyrol u. 6—7. 4

34. *H. Schraderi* Schleich. K. syn. *H. alpinum* Hoppe, Willd. Triften d. Hochalpen, Schweiz M. Grimsel, Gemmi, Cant. Wallis u. stchw. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Kärnthen, Tyrol, Salzburg; Lombardien. 6—8. 4

35. *H. glanduliferus* Hoppe K. syn. *H. glabratum* Schleich. DC. Fl. fr. non Hoppe et Willd. *H. Schraderi* III. *glabratum* Gaud. helv. *H. alpinum* II. *glanduliferus* Monnier. Triften d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis im Saas- u. Nicolaithale über Zermatt; Südtirol, Kärnthen, Lombardien. 7—8. 4

Dritte Rote. *Cerinthoides* K. syn.

36. *H. saxatile* Vill. delph. K. syn. Var. β . [*H. Lawsonia* Vill. Rehb. exc. Steinige Orte in d. Schweiz, Cant. Wallis bei Martigny. 5—6. 4

37. *H. longifolium* Schleich. cat. K. syn. *H. helveticum* Suter. *H. flexuosus* Gaud. helv. excl. Var. γ . *H. cerinthoides* Smith. *H. Lawsonia* Smith. Felsen d. Alpen, Schweiz in d. südwestlichsten Rette, Cant. Wallis Saasthal am M. Moro, M. Fouly, Gemmi; Krain u. in Ungarn. 7—8. 4

38. *H. decipiens* Froelich. DC. prodr. VII. K. syn. *H. cerinthoides*. ζ . *decipiens* Monnier, *H. longifolium* β . *Mougeoti* K. syn. edit. I. *H. Mougeoti* Froel. *H. cerinthoides vogesianum* Kirchscl. stat. *H. cerinthoides* Kirchscl. prodr. d'Als. Steinige Triften auf d. hoh-

sten Punkten d. Bogesen, Monte Rotobac u. Hoheneck.
7—8. 24

Vierte Rotte. Pulmonarioidea K. syn.

39. *H. vulgatum* Koch. K. syn. Fries. nov. Fl. suec. edit. 2. *H. Lachenalii* Rchb. exc. *H. murorum* β . *sylvaticum* Fl. Dan. *H. murorum* γ . Lin. Pollich. *H. murorum* II. *sylvaticum* Gaud. helv. *H. sylvaticum* Lamk. Villars, Smith. Var. β . *maculatum*: *H. maculatum* Smith. — γ . *latifolium*: *H. Lachenalii* Gmel. bad. — δ . *angustifolium*. *H. angustifolium* Gmel. bad. — ϵ . *H. Mertini* Gmel. bad. Wälder, Waldwiesen, Gebüſche, bewachſene Hügel u. Felsen, ſtellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 24

40. *H. ramosum* W. et Kit. K. syn. Gebirgswälder, ſtellw. im Geb., Südschweiz, M. Jorat; Ungarn M. Zipp bei Schmölnitz, Galizien, Siebenbürgen. 6—8. 24

41. *H. pallescens* W. et Kit. K. syn. Kalkfelsen d. Boralpen Schweiz u. in Croatien. 7. 24

42. *H. Schmidtii* Tausch. K. syn. *H. murorum* γ . *Schmidtii* Fr. Schultz, Fl. d. Pfalz. Var. β . *hirsutum* *H. candicans* Tausch. Gebirge, Felsen, ſtellw. im Geb. Rheing., Pfalz, Wildſteiner Schloß beim Donnersberg, Naſſau bei Falkenstein, Niederrhein im Arthale bei Bonn, Bogesen auf d. Hoheneck, Thüringen Gebirge an d. Saale, Walpurgisberg bei Erlangen; Deſtr. Böhmen, Schweiz, Cant. Wallis im Nicolaithal bei Zermatten. 6—8. 24

43. *H. lasiophyllum* Koch. K. syn. *H. murorum* *rotundatum* K. syn. edit. I. Felsen in Krain, im Karstgebirge an d. Grube Draga bei Orlich. 6—7. 24

44. *H. murorum* L. Vill. Fries. K. syn. *H. murorum* I. *vulgatum* Gaud. *H. murorum* α . Pollich *H. pellucidum* α . Wahlenb. suec. Var. β . *H. murorum* β . *sylvaticum* Lin. Pollich — γ . *villosum*: *H. murorum* *pelosissimum* Lin. *H. murorum* γ . *villosum* Froel. — δ . *rotundatum*: *H. rotundatum*: Kitaib. Wälder, Abhänge, Felsen, Mauern, Triften, Wiesen, Heiden dch. d. g. Geb. Var.

γ. im südlichsten Geb. u. *δ.* in Destr. u. Croatien. 6—8. 24

45. *H. incisum* Hoppe K. syn. *H. murorum* *β.* *incanum* Neilr. *H. murorum* *β.* *incisum* Fr. Schultz. Alpen u. Gebirge auf d. höchsten Ruppen d. Vogesen; Thüringer Gebirge, Harz, auf d. Willinger Berge bei Stadt-Zlm, Baiern; Schweiz, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain. 7—8. 24

46. *H. bifidum* Kitaib. K. syn. Felsen d. Boralpen, mehr in d. südl. Kette; Vogesen auf d. Hoheneck; Destr. Steyermark, Kärnthen, Ungarn, Lombardei. 6—8. 24

47. *H. rupestre* Allion auct. K. syn. Felsen d. Alpen u. Gebirge, Vogesen auf d. Hoheneck, Würtemberg bei Glemsa u. auf d. Walpurgisberge bei Erlangen; Destr., Schweiz im Cant. Wallis u. Waadt bei Vevey; Lombardei, Piemont. 6—7. 24

48. *H. Jacquinii* Vill. K. syn. *H. humile* Host. *H. pumilum* Jacq. non Lin. Steinige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. stchw. dch. d. g. Alpenkette, Oberbaden auf d. Hohentwiel, auf d. Schwäbischen Alp bei Stetten am kalten Markt, v. Bregenz nach Tyrol, Destr. Steyermark, Siebenbürgen. 6—7. 24

Fünfte Rotte. *Andryaloidea* Monn. K. syn.

49. *H. andryaloides* Vill. K. syn. Var. *β.* *H. undulatum* Willd. — *γ.* *H. pictum* Pers. — *δ.* *lanatum*: *H. Liottardi* Vill. Felsen im südl. Geb., Schweiz auf d. Saïève bei Genf u. im Cant. Wallis, Savoyen, Piemont, Lombardei. 6—7. 24

50. *H. lanatum* Vill. K. syn. *Andryala lanata* L. *H. tomentosum* All. pedm. *H. verbascifolium* Pers. syn. *H. Tommasinii* Host. *H. Waltsteinii* Tausch. Sonnige Felsen, Boralpen d. südl. Kette; Schweiz Cant. Wallis bei Saillon zw. Rida u. Martinach; Nicolaithal bei Zermatten; Savoyen, Piemont; Croatien, Dalmatien M. Sello bei Cattaro, Siebenbürgen. 5—6. 24

Sechste Rotte. *Pseudocerinthoides* K. syn.

51. *H. Pseudo-Cerinthe* Gaud. helv. K. syn. *H. cerinthoides* Schleich. Thom. Schweiz an Felsen d. Monte Salève bei Genf. 7—8. 4

52. *H. amplexicaule* L. K. syn. Gräßige, felsige Orte d. Alpen, Schweiz stellw. dch. d. g. Kette u. auf d. höchsten Vogesen; Bregenz, Hoheneck über Rheineck nach Baiern, Tyrol, Destr. Steyermark, Kärnthen u. Siebenbürgen 6—7. 4

53. *H. pulmonarioides* Vill. delph. K. syn. *H. petraeum* Hoppe, *H. intybaceum* Hoppe ap. Sturm. *H. amplexicaule* β . et γ . Froel. DC. prodr. Comp. II. p. 508. Wiesen d. Alpen u. Boralpen, stellw. im Geb. 6—7. 4

54. *H. alpinum* L. K. syn. Var. β . *H. pumilum* Hoppe. — γ . *H. melanocephalum* Tausch. — δ . *H. tubulosum* Tausch. — ϵ . *H. Halleri* Vill. Hoppe ap. Sturm. *H. atricapillum* Hoppe bot. Zeit. Flora. Hybridum Villars. — ζ . *H. sudeticum* Froel. DC. prodr. *H. alpinum* IV. *sudeticum* Wim. et Grab. — η . *H. nigrescens* Willd. Link. *H. alpinum* V. *nigrescens* Wim. et Grab. *H. decipiens* Tausch. Triften d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben Baiern; Salzburg; Destr., dann in d. Vogesen auf d. Hoheneck, in Oberelsaß, Oberbaden, Breisg. auf d. Feldberge, Schwarzwald, Erzgebirge, auf d. Brocken, Schlesien auf d. Sudeten u. d. Mährischen Carpathen; Ungarn, Siebenbürgen, Krain u. in d. Lombardei. 6—7. 4

55. *H. cydoniaefolium* Vill. K. syn. Tausch. *Geracium* — Rehb. exc. p. 260. pr. part. *H. sudeticum* Sternb. *H. pulmonarioides* Presl. In d. Sudeten, Schlesien, auf d. Kesselberg, in Böhmen u. an d. Quellen d. Elbe in Mähren. 6—7. 4

Siebente Rotte. *Intybacea* K syn.

56. *H. albidum* Vill. K. syn. *H. intybaceum* Wulf. in Jacq. col. Rehb. exc. Granitfelsen u. Gerölle d. Hochalpen u. auf d. Hoheneck d. Vogesen; Schweiz M. Gott-

hardt, M. Grimsel, Gemmi, Cant. Wallis u.; Steyermark Winterthalalp in d. Glachnis, Tyrol, Kärnthen, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont. 7—8. 4

Achte Rotte. *Prenanthoidea* Koch. syn.

57. *H. lycopifolium* Froelich. K. syn. Waldstellen bis jetzt nur in Baden am Schloßberg bei Freiburg u. in Waldbanlagen im Schloßgarten zu Karlsruhe. 7—8.

58. *H. prenanthoides* Vill. K. syn. *Geracium* — Rchb. exc. *G. cydoniaefolium* Rchb. exc. pr. part. Var. β . *H. spicatum* Allion. pedm. — γ . *H. prenanthoides* Froel. — δ . *H. perfoliatum* Froel. *H. denticulatum* Smith. — ϵ . *H. strictissimum* Froel. — η . *H. cotoneifolium* Froel. Wälder d. Alpen, Voralpen u. höhere Gebirge, Schweiz u. bsh. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Salzburg, Tyrol, Rheing., Oberbaden im Breisgau M. Feldberg, Schwarzwald, auf d. Hohenack d. Vogesen, in d. Gebirgen von Schlesien, Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Vittoral. 7—8. 4

59. *H. foliosum* W. et Kit. Rchb. exc. Hügel, Weinberge, Ungarn bei Juss, Galizien um Zaleszczyk, Siebenbürgen. 7—8. 4

60. *H. ochroleucum* Schleicher K. syn. *H. lanceolatum* Schleich. *H. picroides* Vill. voy. Froel. Triften d. Hochalpen, Schweiz selten, in Graubünden am Baltzerjoch über Obersax, M. Gotthard im Ufernthal bei Realp u. auf d. Grimsel. 7—8. 4

Neunte Rotte. *Accipitrina* K. syn.

61. *H. racemosum* W. et Kit. K. syn. Waldränder, Destr. Steyermark, Croatien, Ungarn. 7—8. 4

62. *H. sabaudum* L. spec. K. syn. Bewachsene Hügel, Waldränder, Gebüsche, mehr im südl. Geb. u. stchw. im mittleren; Rheing., auf Vogesen sandstein bei Bitsch, Sachsen, Schweiz; Destr. Mähren, Böhmen, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien, Lombardei. 8—9. 4

63. *H. boreale* Fries. K. syn. *H. sylvestre* Tausch. Rchb. exc. *H. sabaudum* L. Fl. succ. Smith, Pollich. *H. sabaudum* β . *lanceolatum* Neilr. *H. sabaudum nigrescens* Sering. *H. sylvaticum* Wahlenb. *H. nemorosum* Dierb. *H. sabaudum* β . *boreale* Fr. Schultz Fl. d. Pfalz. *H. sabaudum* α . *Friesii* Fr. Schultz Fl. d. Pfalz. p. 285. — β . *H. ovale* Döll. Rh. Fl. — γ . *H. inuloides* Tausch. Wälder, Waldränder, schattige Felsen, Gebüſche, dch. d. g. Geb., Rheing. nicht ſelten, d. Var. γ . in d. Sudeten. 8—9. 4

64. *H. rigidum* Hartm. scand. Fries. K. syn. *H. vulgatum tridentatum* Fries. *H. affine* Tausch. Froel. *H. laevigatum* Koch. syn. edit. I. *H. croaticum* Schmidt Fl. sed. Var. β . *coronopifolium*. — γ . *glandulosum*: *H. lanceolatum* Vill. Tausch. Wälder, Waldränder, Waldwiesen, ſchattige Felsen, ſtellw. dch. d. g. Geb., Rheing., in d. Vogesen bis Niederbrunn, Dahn, Pirmasens, Bitſch, Saarbrücken, Trier bis in d. Eifel, Baden bei Karlsruhe, Raſſau bei Deſtrich u. im Lahnthale Pfalz an d. Hardt u. mit d. Gebirgszüge bis Coblenz, Neuwied, auf d. Hohen Aſt u. im Urthale; Hamburg, dann in Schwaben, Baiern, Sachſen, Thüringen; Deſtr. Tyrol, Lombardei. 6—7. 4

65. *H. virescens* Sonder. K. syn. in add. p. 1027. Gebüſche in d. Gegend von Hamburg bei Flottbeck u. Niensſtadt. 8—9. 4

66. *H. umbellatum* L. K. syn. Var. β . *coronopifolium*: *H. coronopifolium* Bernh. — γ . *angustifolium* K. syn. Wälder, Waldränder, Waldwiesen, Heiden, bewachſene Hügel, Felsen, Wegeränder u., dch. d. g. Geb. 7—8. 4

Fünfundſechzigſte Ordnung.

Ambrosiaceen.

Link. Handb. K. syn. 531. K. Taschb. 338. Rchb. exc. p. 293.

489. *Ambrosia* L. (XXI. 3.) Ambroſie. Rchb. exc. p. 294. Comp. II. p. 665.

1. *A. maritima* L. Rchb. exc. Im südl. Eittoral, Dalmatien, Kombardei, Venedig, Piemont, Nizza. 7—8. ☉

490. *Xanthium* L. (XXI. 3.) Spitzklette. K. syn.

531. Rchb. exc. p. 293. Comp. II. p. 665.

1. *X. strumarium* L. K. syn. Uncultivirte Orte, Wege, Ufer, Schutt, Aecker stellw. dch. d. g. Geb. 7—10. ☉

2. *X. macrocarpum* DC. K. syn. *X. italicum* Moretti Rchb. exc. *X. orientale* Lin. *X. echinatum* Murr. Balb. Aecker, Wegeränder, Schutt, im südl. Geb., Destr. bei Wien, Eittoral, Istrien bei Opso, Kombardei, Venedig, Pavia, Oberitalien bei Porto di Fermo, am Po bei Turin. 7—10. ☉

3. *X. spinosum* L. K. syn. An Wegen, Schutt, im südl. Geb., Destr. bei Wien, Krain, Eittoral, Istrien, Fiume, Dalmatien, Kombardei, Venedig, Siebenbürgen, Ungarn, Galizien. 7—8. ☉

Sechshundsechzigste Ordnung.

Lobeliaceen.

Juss. K. syn. 532. K. Taschb. 338. Rchb. exc. p. 296.

491. *Lobelia* L. (V. 1.) Lobelie. K. syn. 532. Rchb. exc. p. 296. Comp. I. 1. p. 294.

1. *L. Dortmanna* L. K. syn. Unter d. Wasser in Seen, Teichen, zur Blüthenzeit mit d. Aehre außer d. Wasser, im nördl. Geb., in d. Ost- u. Nordsee, Holstein im Einfeldsee bei Bred, Trittau, Hannover, Lauenburg bei Jeber, Celle, Lippe-Deilmold, am Rheine bei Wesel am sogenannten Schwarzwasser häufig, Renlo, Essen, Westphalen, Preußen im Ragersee bei Danzig. 7—8. 4

Siebenundsechzigste Ordnung.

Campanulaceen.

Juss. K. syn. 532. K. Taschb. 338. Rchb. exc. p. 295.

492. *Jasione* L. (V. 1.) *Jasione*. K. syn. Rchb. exc. p. 296. Comp. I. 1. p. 294.

1. *J. montana* L. K. syn. *J. undulata* Lamk. Var. β . major. — γ . littoralis: *J. montana* β . littoralis Fries. nov. Trockene, sandige Orte, Heiden, Hügel, Abhänge, Felsen etc., dch. d. g. Geb.; Var. β . bei Kroneburg a. d. Nahe, Hohenstein bei Weilmünster in Nassau; Var. γ . Seeküste auf Sand. 6—7. ☉

2. *J. perennis* Lamk. K. syn. *J. montana* β . perennis L. Var. β . humilis Pers. Sandboden, Heiden, Nadelholzwälder, grasige, schattige Felsen, mit Moos bewachsene Hügel, stchw. im Geb., besonders in d. Rheing. dch. Elßaß bei Rheinzabern, Niederbrunn, Weißenburg, Hagenauer Forst, Lauterburg bis Bitsch etc., Pfalz Dürkheim, Trippstadt, Annweiler, Kaiserslautern, auf Porphyr am Donnersberg, Eurenburg bei Martelange, Rambrouch, Flora v. Spa, Thüringen Rosleben bei Halle. 6—8. 4

493. *Phyteuma* L. (V. 1.) *Rapunzel*. K. syn. 533. Rchb. exc. p. 296. Comp. I. 1. p. 296.

1. *P. pauciflorum* L. K. syn. Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. südl. Alpenkette nach Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Littoral, Istrien bis in d. Lombardei, in Galizien u. Siebenbürgen. 7—8. 4

2. *P. globulariaefolium* Sternb. et Hoppe. M. et K. D. Fl. Rchb. exc. *P. pauciflorum* β . *globulariaefolium* K. syn. Granitfelsen d. höchsten Alpen, Schweiz, Südtirol, Kärnthen, Steyermark, Krain, Littoral. 7—8. 4

3. *P. hemisphaericum* L. K. syn. Var. β . *P. graminifolium* Sieb herb. Grasige Orte d. Hochalpen, Schweiz

u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

4. *P. humile* Schleicher K. syn. Var. β . *coloratum* K. syn. Grasige Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis, M. Räfel über Zermatten, M. Moro über Macugnaga oberhalb d. Gasthales, Graubündten, Südtirol am Venezia=Gletscher in d. nordwestl. Giudicarie, Lombardei, M. Nien bei Como, M. Cervin in Piemont, Novara im Cesiathal; Var. β . in Graubündten Berninakette Val de Tain. 7—8. 4

5. *P. Sieberi* Spreng. K. syn. *P. Charmelii* Sieb. non Vill. Hochalpen, Tyrol, Eiseralp, Kirchbaumeralp, Steyermark, Kärnthen auf d. Villacher Alpen, M. Loibl, Krain, Eittoral. 7—8. 4

6. *P. orbiculare* L. K. syn. *Rapunculus — laris* Scopol. Var. β . *P. lanceolatum* Vill. delph. Rchb. exc. *P. ellipticum* Poir. — γ . *P. fistulosum* Rchb. exc. — δ . *P. cordatum* Vill. Rchb. exc. Waldwiesen, Triften, Gebüsche, stellw. dch. d. g. Berggeb. bis in d. Boralpen u. Alpen, Rheing. dch. Baden nach Nassau, Elsaß, bis Mainz, Bingen, Ockelheim, Kreuznach, Oberstein bis Trier, Luxemburg, dch. d. Eifel bis Aachen u. Oest. in allen Provinzen. 6—8. 4

7. *P. inaequatum* Kitaib. Rchb. exc. p. 298. Alpen in Ungarn im Arver Comit. 7. 4

8. *P. Scheuchzeri* Allion. pedm. K. syn. *P. Charmelii* Vill. delph. *P. corniculatum* Clair. Gaud. helv. *P. ovata* Lamk. Enc. IV. p. 72. Var. β . *serrata*: *P. Charmelii* Vill. var. Felsen d. Alpen u. Boralpen in d. südl. Kette bis in d. Niederungen, Schweiz Berneralpen, Glarneralpen, Walliser Alpen im Gasthale, über d. Gotthard bei Bellinzona, Lugano, Südtirol, Steyermark, Kärnthen, Krain im Isongothale, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont; Var. β . bei Mailand. 7—8. 4

9. *P. Michelii* Bertolon. K. syn. Var. α . *P. bètonicaefolium* Vill. Rchb. exc. *P. persicifolium* Hoppe. — β . *angustissimum*: *P. Michelii* γ . *angustissimum* K. syn. *P.*

Michelii Allion. pedm. Triften d. Alpen u. Boralpen in d. südl. Kette bis in d. Niederungen, Schweiz Berneralpen, Walliser Alpen, Saßthal, Gotthard zc., Tyrol, Salzburg, Pasterze, Ruhwegeralp, Steyermark, Kärnthen Saualpe, Krain, Eittoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig, Piemont M. Genis u. Savoyen. 7—8. 4

10. *P. scorzonerifolium* Vill. delph. Rehb. exc. *P. Michelii* β . *scorzonerifolium* K. syn. Schweizer Alpen im Cant. Wallis um d. Sennerhütte Aufkomm im Nicolaithale. 7—8. 4

11. *P. nigrum* Schmidt. K. syn. *P. ovale* Hoppe. *P. spicatum* β . *Rapunculus* Pers. *P. spicatum* β . *caeruleum* δ . Floristen. Waldwiesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. häufig, Pfalz, Trier, Coblenz, Köln, Aachen zc. 5—6. 4

12. *P. spicatum* L. K. syn. *Rapunculus spicatus* Scopol. Berg- u. Waldwiesen, Gebüsch, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. seltener als vorige, Baden bei Rastatt, Waghäusel, Heidelberg, Bergstraße nach Nassau, nicht in d. Pfalz, im Naßethal bei Kreuznach bis Trier, Luxemburg, Eifel bis Aachen, Coblenz zc. nach Norden u. Süden. 5—6. 4

13. *P. Halleri* Allion. pedm. K. syn. *P. ovatum* Schmidt boh. *P. atropurpureum* Hoppe. *P. urticaefolium* Clairv. Thalwiesen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Eittoral, Lombardien, Siebenbürgen, Ungarn, Galizien, Böhmen zc. in d. Sudeten. 6—7. 4

14. *P. comosum* L. K. syn. Felsen d. Gebirge u. Alpen in d. südl. Kette, Tyrol von d. obersten Baumgrenze bis zum Delbaum, M. Baldo, Schlehen, Krain in d. Wozhein, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardien Piemont im Val Cassina u. in d. Novara. 6—7. 4

15. *P. canescens* W. et Kit. K. syn. *P. campanuloides* Bot. Mag. *Campanula canescens* Roth. enum. Schattige Hügel unter d. Gesträuche, Steyermark zw. Gills u. Lichtenwald, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7. 4

16. *P. collinum* Gusson. Rchb. exc. in add. p. 857. In Dalmatien, häufig um Ragusa. 5—6. 4

494. *Campanula* L. (V. 1.) Glockenblume. K. syn. 536. Rchb. exc. p. 298. Comp. I. 1. p. 300.

1. *C. Zoysii* Wulfen. K. syn. Felsen d. Alpen, Kärnthen auf d. Ovir u. Rechberge am Eingang in d. Wilschthal Steyermark an d. Distrija im Gailkreise im Sulzbachthale, am Felsen d. Nadel, Krain in d. Wochsein in d. Nähe d. M. Voibl; Illirien Alpe Kren bei Görz. 7—8. 4

2. *C. pulla* L. K. syn. Triften d. Alpen u. Boralpen, Destr. Steyermark, Kärnthen, Tyrol, Salzburg, Krain, Eittoral, Istrien, Siebenbürgen u. Galizien. 7—8. 4

3. *C. excisa* Schleicher. K. syn. Felsen u. Gerölle d. höchsten Schweizer-Alpen an Gletscherrändern, nur im Oberwallis oberhalb d. Saßthale am Matt-Mat-Gletscher, M. Moro, M. Simplon am Kaltwassergletscher, an d. Furca di Bosco u. Formazza-Thale, Münsterthal im Großen Boden, Zehnden Gombs. 7—8. 4

4. *C. caespitosa* Scopol. K. syn. Var. β . *C. uniflora* Roth. Kalkfelsen d. Alpen u. Boralpen; Destr. Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Krain, Eittoral. Istrien, Kombarbei, Venedig u. Ungarn. 7—8. 4

5. *C. pusilla* Haenke K. syn. *C. caespitosa* Vill. delph. *C. rotundifolia* β . L. *C. rotundifolia*. ϵ . *pusilla* Fl. Sil. Var. β . *pubescens*: *C. pubescens* Schmidt boh. Willd. Rchb. exc. Felsige, kiesige Orte d. Alpen, Boralpen bis in d. Subeten u. mit d. Flüssen in d. Niederungen, Schweiz u. d. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Salzburg, Tyrol, Destr. zc. mit d. Rheine nach Neuenburg, bei Mülheim in Oberbaden u. bei Straßburg, u. mit d. Isar bei München. 6—8. 4

6. *C. macrorrhiza* Gay Rchb. exc. Im südlichsten Geb., Piemont an d. Col de Brause bei Nizza. 6—7. 4

7. *C. rotundifolia* L. K. syn. Var. β . *velutina* DC. Fl. fr. — γ . *lancifolia* K. syn. *C. rotundifolia* β . *reniformis* Pers. *C. Baumgartenii* Becker Rchb. exc. Wie-

sen, Triften, Wegen, Mauern, bewachsene Hügel, Felsen dch. d. g. Geb. Var. γ . am Feldberg bei Ribba unweit Frankfurt u. in Siebenbürgen. 6—10. 4

8. *C. Scheuchzeri* Vill. delph. K. syn. Rchb. exc. *C. linifolia* Haenke. Rchb. exc. *C. rotundifolia* γ . Lin. Var. α . glabra: *C. linifolia* DC. *C. Scheuchzeri* Vill. *C. Schleicheri* Suter. — β . hirta: *C. valdensis* Allion. pedm. Gaud. *C. uniflora* Vill. Wiesen, Triften d. Alpen u. Voralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, auf d. Wasserfall bei Basel, in d. höheren Bogesen u. in d. Subeten. 7—8. 4

9. *C. carnica* Schiede. K. syn. *C. linifolia* Scopol. Felsenspalten d. Alpen in d. südl. Kette; Krain zw. Resiutte u. Ponteba an d. Hauptstraße zw. Welbes u. d. Wocheins-Alpe Kren. 6—7. 4

10. *C. Waldsteiniana* R. et Sch. Rchb. exc. *C. flexuosa* W. et Kit. *C. rupestris* Host. Gebirgsfelsen, im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien. 7—8. 4

11. *C. Hostii* Baumg. Trans. III. p. 392. Rchb. exc. Schattige Gebirgswiesen im südl. Geb., Destr. Croatien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

12. *C. serpyllifolia* Visian. Fl. Dalm. Rchb. exc. *Edrajanthus* — *ius* DC. prodr. VII. Im südl. Geb., Dalmatien auf d. Spitze d. M. Biokowo bei St. Georgio. 6—8. 4

13. *C. Morettiana* Rchb. icon. K. syn. *C. filiformis* Moretti. *C. pulla* Pollini. Kalffelsen d. Alpen u. Voralpen im südl. Geb., Südtirol auf d. Ubai im Fassa-Thale, M. Castellazzo di Ponereggio in Fiemme bis gegen Agordo u. Feltre u. in Dalmatien. 7—8. 4

14. *C. floribunda* Visiani Rchb. exc. *C. isophylla* Moretti. Steinige Orte im südlichsten Geb., Oberitalien am Vorgebirge di Roli bei Varigotti. 7. 4

15. *C. muralis* Portenschl. Rchb. exc. Felsen, Mauern in Dalmatien. 5—6. 4

16. *C. garganica* Tenore. K. syn. *C. Elatines* Tenore. Felsen im südl. Littoral, Istrien bei Lianova, M.

Triskavaz auf d. Insel Beglia, Insel Dsero u. Cherso u. in Dalmatien. 5—6. 4

17. *C. Erinus* L. K. syn. *Wahlenbergia* — Link. Roncela — DuMort. Rchb. exc. p. 298. Steinige Orte, Felsen, Mauern, Feldränder, besonders im südl. Eittoral, Rheing., Oberelsaß bei Mompelgard; Istrien im Amphitheater bei Pola, Fiume, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 6. 4

18. *C. diffusa* Vahl. Rchb. exc. *C. fragilis* Cyril. *C. cochlearifolia* Hornem. *C. crassifolia* Ness. ab Esenb. Felsige Orte im südlichsten Eittoral, Dalmatien bei Spalatro, in d. Lombardei u. um Rizza. 5. 4

19. *C. elatinoides* Moretti Rchb. exc. *C. Elatines* Pollini veron. Felsen, Mauern im südlichsten Geb., Lombardei; Piemont in d. Waldfenfer-Alpen; Novara im Begezzo-Thale. 5—6. 4

20. *C. Elatines* L. K. syn. Felsen im südl. Eittoral, Istrien Insel Dsero; Dalmatien bei Ragusa, Lombardei, Venedig. 5—6. 4

21. *C. Wanneri* Rochel. pl. rar. Ban. [Rchb. exc. in add. p. 857. *C. heterophylla* Baumg. Transylv. Felsen an Alpenschlünden im Banat, an d. Wasserfällen d. Bistraf-Rose, Alpen Gurko im Gropa-Bistritz-Thale. 6. ☉

22. *C. carpatica* L. Rchb. exc. Auf d. Carpathen in Ungarn, Galizien u. Siebenbürgen. 7. 4

23. *C. dasycarpa* Kitaib. in Schultes Fl. austr. Rchb. exc. In Bälbern d. Zypß in Ungarn. 7. 4

24. *C. cenisia* L. K. syn. Hochalpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis im Nicolaithale, Saßthale am M. Moro beim Gletscher, M. Foully, M. Gries, Simplon, Pennina u. im Val Bagnes; Lombardei, Piemont, M. Genis, Savoyen. 7—8. 4

25. *C. Raineri* Perpent K. syn. *C. Perpentiae* Moretti. Felsige Orte im südlichsten Geb., Schweiz Cant. Tessin, M. Generoso, Südthrol, Lombardei, M. Corno di Conzo, Gringa Monte del Lago di Como; Oberitalien. 7—8. 4

26. *C. Alpini* L. Rchb. exc. *B. lanceolata* Lapeyr.

C. rotundifolia Allion pedm. Alpenwiesen in Piemont bei Bassano. 6—8. 4

27. *C. rhomboidalis* L. K. syn. *C. rhomboidea* Willd. Gebirgswiesen u. Voralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette besonders im g. Jura; nach Schwaben, Baiern, Ungarn, Lombardei, Venedig, Piemont, Novara. 6—8. 4

28. *C. persicifolia* L. K. syn. Var. β . *grandiflora* DC. Fl. fr. — γ . *hispida* Lej. Gebirgswälder, grasige Hügel, in Gebüschen, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

29. *C. Rapunculus* L. K. syn. Trockene Wiesen, Waldränder, Gebüsche, Acker, Brachfelder u. im g. Geb. 5—8. 4

30. *C. patula* L. K. syn. *C. decurrens* Thore. *C. brachiata* Seidl. Var. β . *punctata* Wallr. — γ . *flaccida* Wallr. *C. neglecta* R. et Sch. Grasige Orte, Wiesen, Waldränder, stellw. dch. d. g. Geb., fehlt aber auf großen Strecken, z. B. v. d. Pfalz längs d. g. linken Rheinseite bis zu d. Niederlanden sind die Standorte sehr unsicher. Rheing., v. Basel nach Baden bei Lorsch, Ladenburg, nach Schwegingen, Heidelberg, Bergstraße bis Darmstadt, Frankfurt nach Nassau; Deuß bei Köln, nach d. Niederrheine, Westphalen nach d. nördl. Geb. bis Preußen; Kreuznach im Salinenwalde, Perl, Luxemburg, Baiern, Sachsen, Thüringen u.; Destr. Böhmen, Mähren, Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Galizien, Ungarn, Lombardei u. 5—7. 4

31. *C. Steveni* M. v. Bieb. Rchb. exc. *C. simplex* Stev. *C. patula* β . *pauciflora* Rochel ban. *C. Altaica* Ledeb. Gebirgswälder, Waldtriften, Ungarn im Banat M. Semniß u. M. Kapazin; Siebenbürgen. 6—7. 4

32. *C. ramosissima* Sibth. Rchb. exc. *C. Lorei* Pollini *C. baldensis* Balb. Im südl. Geb., Dalmatien bei Spalato, Lombardei, Venedig, Valsoglio bei Verona. 5—6. ☉

33. *C. vesula* Allion pedm. Rchb. exc. p. 301. In Piemont Monte Beso. 4

34. *C. Cervicaria* L. K. syn. *C. ligulata* Rchb. pl. crit. VI. Laubwälder, Gebüsche, besonders an Gebirgsabhängen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. Elsaß, Ba-

den im Breisg., Billingen, Engen; Pfalz bei Schifferstadt, Gimmelbdingen, Langenscheid, Berstadt, Donnersberg bis Kaiserslautern, Zweibrücken, Bergstraße v. Weinheim bis z. Melibocus, Starfenburg, Auerbacherschloß, Taunus, Naheg., Kreuznach, Ottweiler, St. Wendel bis Luxemburg, Eifel auf d. Hohen-Acht, Coblenz; Baiern, Thüringen, Jena, Sachsen, Hannover, Mecklenburg, Preußen bei Königsberg zc.; Schweiz im Cant. Wallis, Oestr. zc. 7—8. 4

35. *C. multiflora* W. et Kit. Rchb. exc. *C. Cervicaria* β . *multiflora* Rchb. pl. crit. VI. Gebirge in Ungarn bei Verseg unter d. Schloßruine, Monte Labor zc. 7. ☉

36. *C. thyrsoides* L. K. syn. Wiesen, Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Salzburg, Tyrol zc. 7—8. ☉

37. *C. spicata* L. K. syn. Trockene, steinige Orte d. Boralpen u. längs d. Alpen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Schloß bei Martinach, M. St. Pierre, Fouty, Cant. Tessin; Kärnthen, Südtirol Seiseralp, Bogen, Krain, Littoral, Istrien, Croatien, Lombardei bei Mailand, am Comersee, Ungarn, Piemont zc. 6—7. 4

38. *C. glomerata* L. K. syn. *C. congesta* R. et Sch. Var. β . *farinosa*: *C. farinosa* Andr. *C. glomerata* β . *salviaefolia* Wallr. *C. petraea* Schmidt. boh. *C. aggregata* β . *farinosa* Rchb. exc. — γ . *aggregata*: *C. aggregata* Willd. Rchb. exc. et icon. — δ . *speciosa*: *C. speciosa* Hornem. Rchb. icon. — ϵ . *elliptica* Kit. Rchb. exc. Wiesen, Triften, Waldränder, grasige Hügel, Raine, dch. d. g. Geb. 5—9. 4

39. *C. petraea* L. Rchb. exc. Felsen im südlichsten Geb., Lombardei, M. Baldo an d. Kapelle Corona, Venedig bei Trident M. Chiusa u. Peti. 7—8. 4

40. *C. foliosa* Tenore Rchb. exc. *C. glomerata* Allion. pedm. Im südlichsten Littoral, Piemont um Nizza. 6—7. 4

41. *C. rapunculoides* L. K. syn. Rchb. exc. *C. crenata* Link. Rchb. exc. *C. trachelioides* Rchb. exc. p. 302. non M. v. Bieb. Wälder, Gebüsche, Wege, Feldrân-

der u. Brachsfelder, besonders auf Kalkboden dch. d. g. Geb. 7—8. 4

42. *C. bononiensis* L. K. syn. Rchb. Var. β . *C. simplex* DC. Fl. fr. Rchb. exc. — γ . *C. Thaliana* Wallr. — δ *C. ruthenica* M. v. Bieb. Gebirgswälder, sonnige Hügel, Wiesen, Waldränder, besonders im g. südl. u. stellw. im mittl. u. nördl. Geb., Thüringen, Jena, Erfurt, Sachsen, südl. Rand des Harzes nach Mecklenburg, Pommern bei Stettin, Mark Brandenburg, Preußen bei Ortelberg, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Kärnthen, Tyrol, Krain, Littoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Galizien, Lombardei, Schweiz Cant. Wallis zw. Branson u. Foully. 7—8. 4

43. *C. latifolia* L. K. syn. Schattige Wälder, Gebüsche, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Vogesen im Münsterthale, Baden im Breisg. auf d. Feldberg, Württemberg bei Tübingen, Stuttgart, Baiern auf d. Vogelsberge, Rhöngebirge, Jena, Halle, Erzgebirge, Harz bei Quedlinburg, Blankenburg, Hannover nach Preußen, Königsberg, Danzig u., Hamburg, Mecklenburg, Holstein, Pommern, Schlesien; Böhmen, Mähren, Tyrol, Ungarn, Siebenbürgen, Littoral, Lombardei. 7—8. 4

44. *C. Trachelium* L. K. syn. Var. β . *dasycarpa*: *C. urticifolia* Schmidt. boh. Wälder, Gebüsche, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

45. *C. pyramidalis* L. K. syn. Steinige Hügel, Felsen, Mauern, im südl. Geb., Krain um Idria, Littoral, Istrien, Triest, Fiume, M. Santo bei Görz; Dalmatien, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉ u. 4

46. *C. Grosseckii* Heuffel. Fl. 1833. Comp. II. 1. p. 314. Steinige Wälder, Gebüsche, Felsen in Ungarn an d. Hercules-Bädern u. im Schuppauf-Thale. 7—8. 4

47. *C. sibirica* L. K. syn. Sonnige, bewachsene Gebirge, Hügel, stellw. im Geb., Schlesien v. Frankfurt a. d. Oder bis Oppeln, Berlin, Preußen im Weichselgeb. bei Pselplin, Graudenz, Thorn u.; Destr. Böhmen, Mähren,

Ungarn, Galizien, Steyermark, Südtirol, Eittoral, Istrien, Lombardei. 5—6. ☉

48. *C. divergens* Willd. Rchb. exc. *C. spathulata* W. et Kit. *C. pannonica* Kitaib. Kalkfelsen, Dalmatien im Karbangebirge, Ungarn im Banat; Siebenbürgen. 5—6. ☉

49. *C. lingulata* W. et Kit. Rchb. icon. *Maly enum. pl. austr. p. 159. pl. crit.* Wälder im südl. Geb., Dalmatien, Croatien, Ungarn. 6. ☉

50. *C. Medium* L. Rchb. exc. *Maly enum. pl. austr. p. 159.* Im südl. Geb., Siebenbürgen, Piemont, Nizza, Novara u. Ligurien, in Destr. verwildert. 6—7. ☉

51. *C. mollis* L. Rchb. exc. Gebüsche in Dalmatien bei Makurska. 5. ☉

52. *C. barbata* L. K. syn. Wiesen, Triften d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Salzburg, Destr. Tyrol bis in d. Lombardei u. in d. Subeten nach Schlesien u. Mähren 2c. 7—8. 4

53. *C. Allionii* Vill. delph. Rchb. exc. *C. alpestris* Allion. pedm. *C. nana* Lamk. Gerölle d. Bergströme im südlichsten Geb., Lombardei, Piemont M. Genis, Novara, M. Turlo. 7—8. ☉

54. *C. alpina* Jacq. K. syn. Sonnige, steinige Orte d. Kalk-Alpen, Schweiz in Graubündten; Tyrol Monte Spinale, Salzburg a. d. Untersberg, Destr. Steyermark, Kärnten, Krain, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 6—7. 4

495. *Edrajanthus* A. DC. (V. 1.) Büschelglocke.

K. syn. 543. K. Taschb. 344.

1. *E. Kitaibelii* A. DC. K. syn. *Campanula* — *Maly enum. C. graminifolia* W. et Kit. non Lin. Steinige Orte, Triften d. Alpen im südl. Geb., Krain auf d. Schneeberg im Karstgebirge, Eittoral, Istrien bei Fiume; Siebenbürgen, Ungarn. 7. 4

2. *E. tenuifolius* A. DC. K. syn. *Campanula* —

W. et Kit. Rechb. exc. p. 301. *C. graminifolia* Host. austr. Steinige Orte im südl. Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Monte d'Issero, Dalmatien bei Spalato, Croatien, Ungarn. 7—8. 4

3. *E. graminifolius* A. DC. DC. prodr. VII. p. 448. *Campanula graminifolia* L. Maly enum. pl. austr. p. 158. Felsen, Ungarn im Banat bei den Hercules-Bäbern. 7. 4

4. *E. Pumilio* A. DC. DC. prodr. VII. *Campanula* — Portenschl. Rechb. exc. p. 301. *C. silenifolia* Host. In Dalmatien an d. M. Biokovo. 6—7. 4

5. *E. dalmaticus* A. DC. DC. prodr. VII. *Campanula dalmatica* Maly enum. pl. austr. p. 157. In Dalmatien bei Spalato. 4

496. *Adenophora* Fischer. (V. 1.) Drüsenglocke.

K. syn. 443. Rechb. exc. p. 304. Comp. I. 1. p. 316.

1. *A. suaveolens* Meyer K. syn. *A. lilifolia* DC. prodr. *A. communis* Fisch. *Campanula lilifolia* Lin. M. et K. *C. suaveolens* Willd. *C. intermedia* Schult. *C. Fischeri* Schultes. Wälder, Gebüsche, stellenw. im Geb., Preußen bei Rastenburg, Ortelsberg, Schlesien am Geiersberg u. d. Strehlner Bergen; Böhmen am Karlstein d. Belka Gora; Südtirol, Gebirge d. Rondon in d. südl. Giudicarie bei d. Schlosse Tobron, Trembellano oberhalb Roveredo; Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig; Siebenbürgen, Galizien u. in d. Novara bei Baralli. 7—8. 4

497. *Specularia* Heister. (V. 1.) Spiegelglocke.

K. syn. 544. K. Taschb. 344.

1. *S. Speculum* A. DC. K. syn. *Campanula* — L. *Pismatocarpus* — Herit. Rechb. exc. p. 305. Comp. I. 1. p. 317. Saatäcker, Brachfelder, besonders auf Kalk u. Sand, stellenw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Rheing. an vielen Orten häufig. 6—7. ☉

2. *S. hybrida* A. DC. K. syn. *Campanula* — L. *Prismatocarpus hybridus* Herit. Rchb. exc. Comp. I. 1. Saatäcker, besonders auf Kalk- u. Thonboden mit Sand; stellw. dch. d. Geb., Schweiz, Schwaben, Baiern, Rheing. dch. Elsaß; Baden bei Ladenburg, Steckenheim, Griesheim, Grünstadt, Pfalz, Oppenheim, Nierstein bis Mainz; Rheingegend bei Kreuznach, Langenlohnshausen; Saargegend bei Saargemünd, Saarlouis u. einzeln bis Trier, Aachen bei Baels, Schneeberg, Süstern u. Muffert häufig; Frankfurt a. M., Köln zw. Brühl u. Bonn, bei Flammersheim, Westphalen, Thüringen bei Arnstadt, Eisenach, im südl. Theile v. Hannover, bei Göttingen; Holstein; Destr. Südtyrol, Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. 6—7. ☉

3. *S. falcata* A. DC. K. syn. Cultivirte Orte, Aecker, Felder im südl. Littoral, Istrien bei Fiume häufig, Dalmatien, Croatien, Lombardei. 6. ☉

4. *S. cordata* * *Campanula* — Visian. Fl. Dalmat. *Prismatocarpus cordatus* Rchb. exc. in add. p. 858. Saatäcker im südl. Geb., Dalmatien bei Spalato u. längs d. Küste bei Zara, Sebenico u. 5—6. ☉

498. *Wahlenbergia* Schrader. (V. 1.) *Wahlenbergie*. K. syn. 544. Rchb. exc. p. 305. Comp. I. 1. p. 318.

1. *W. hederacea* Rchb. exc. K. syn. *Campanula* — L. *Schultesia* — Roth. enum. Sumpfige Torfwiesen unter *Sphagna* u. *Viola palustris*, stellw. im Geb., Rheing., Pfalz bei Kaiserslautern, zw. d. Vogelweh u. d. Blechhammer am Pfaffenberge, an d. Saar Saarlouis bei Frau-lautern, Kirchenbollenbach, Trier u. Malmedy; Oldenburg bei Neuendorf, Barel; u. an Mauern in Dalmatien. 6—8. 4

Achtundsechzigste Ordnung.

Vaccineen.

DC. K. syn. 545. K. Taschb. 345. Rchb. exc. p. 203.

499. *Vaccinium* L. (VIII. 1.) Heidelbeere. K.
syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 8.

1. *V. Myrtillus* L. K. syn. Wälder, Gebüsche, besonders Heiden, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 5—6. ‡

2. *V. uliginosum* L. K. syn. Moorboden, an sumpfigen Orten, Nadelholzwälder, stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen u. Alpen; Rheing., im Bodenseegebiet von Konstanz bis Wolterdingen nach Oberbaden, Breisg. auf d. Welchen, Feldberg bis zum Kniebis u. Herrenwiese, auf d. Schwarzwalde, im Odenwalde, in d. Vogesen bis Bitsch, Kaiserslautern, Landstuhl, Homburg, Saarbrücken, Luxemburg, Trier in d. Eifel bis nach Aachen im Rdtgen, dch. d. Bergische bei Dahringhausen nach Westphalen zc. 5—6. ‡

3. *V. Vitis idaea* L. K. syn. Sandige Heiden u. Nadelholzwälder, stellw. dch. d. gebirgischen Theil d. Geb., Rheing. an vielen Orten, besonders im Jura, d. Vogesen bis Trier dch. d. Eifel nach Luxemburg, Aachen, Coblenz, Köln, Düsseldorf nach Westphalen zc. 5—7. ‡

4. *V. intermedium* Ruthe. K. syn. Feuchte, sandige Orte bei Berlin in d. Jungfernheide. 5—6. ‡

5. *V. Oxycoccos* L. K. syn. *Oxycoccos palustris* Pers. Rchb. exc. p. 203. Torfboden im Moose d. Moore stellw. dch. d. g. mittl. u. nördl. Geb., im Süden nur in d. Gebirgen. 6—8. ‡

Neunundsechzigste Ordnung.

Ericineen.

Desveau K. syn. 546. K. Taschb. 346. Rchb. exc. p. 411.

I. Gruppe. Arbuten DC. prodr. VII. K.
Taschb. 346.

500. *Arbutus* L. (X. 1.) Sandbeere. K. syn. Rchb. exc. p. 416. Comp. I. 2. p. 41.

1. *A. Unedo* L. K. syn. *Unedo edulis* Link. Felsen im südl. Eittoral, Istrien, Fiume, Insel Cherso, Krain, Dalmatien, Kombarbei, Venedig auf d. M. Verba; Piemont um Nizza. Blüthenzeit im Februar u. im October. 3

501. *Arctostaphylos* Adans. (X. 1.) Bärentraube. K. syn. Rchb. exc. p. 416. Comp. I. 2. p. 42.

1. *A. alpina* Spreng. K. syn. *Arbutus* — Lin. Steinige Orte d. Alpen, besonders in d. südl. Kette; Schweiz u. stellw. dch. d. Alpen nach Destr. Tyrol, Krain bis in d. Kombarbei. 5—7. 3

2. *A. officinalis* Wim. et Grab. K. syn. *Arct. Uva ursi* Spreng. Rchb. exc. *Arct. procumbens* E. Meyer. *Arbutus Uva ursi* Lin. Steinige, felsige Orte im Nadelholze d. Boralpen u. Gebirge, stellw. dch. d. Geb., Rheing. v. Basel dch. d. Vogesen bis Kaiserslautern, bei Hochspeier bis Elmstein auf d. Erbsenkopf; dch. Oberbadon bei Mörsburg, am Heligenberg, bei Ueberlingen, Willafingen, Käferthal bei Mannheim zc., Pfalz am Hardtgebirge, Dürkheim, Kallstadt, Wachenheimer-Wald; Schwaben, Baiern, Franken, Sachsen, Hannover, Holstein, Hamburg; dann stellw. dch. d. g. nördl. Geb. bis Schlesien, Pommern, Preußen bei Königsberg, Tilsit, Graudenz; Destr. Tyrol bis in d. Eittoral. 5—6. 3

II. Gruppe. Andromede DC. prodr. VII. K. Taschb. 346.

502. *Andromeda* L. (X. 1.) Andromede. K. syn. 547. Rchb. exc. p. 414. Comp. I. 2. p. 43.

1. *A. polifolia* L. K. syn. *Rhododendron* — lium Scop. Heißen. u. Nadelholzwälder in Torfmooren, stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen, nach Schwaben, Baiern bis Preußen, Rheing. v. Konstanz bis Willingen, Donau-efchingen, auf d. Schwarzwalde bis zur Herrenwiese bei Ba-

den-Baden, in d. Vogesen bis Kaiserslautern, Landstuhl u., Eifel bei Prüm, bei Ulmen, Moosbrucher-Weiher bei Gillefeld, Hohe Venn bis Aachen, Siegburg bei Bonn u. 6—7. ‡

2. *A. calyculata* L. K. syn. *Chamaedaphne* — Moench. *Lyonia* — Rchb. exc. *Cassandra* — Don. Sumpfige Orte in Pommern u. Ostpreußen, Königsberg bei d. Spittelhof, Greifswalde am Behrenhof. 4—5. ‡

III. Gruppe. Ericen DC. prodr. VII. K. Taschb. 346.

503. *Calluna* Salisb. (VIII. 1.) Heidekraut. K. syn. 547. Rchb. exc. p. 412. Comp. I. 2. p. 12.

1. *C. vulgaris* Salisb. K. syn. *Erica* — Lin. Var. β . *pubescens*: *E. ciliaris* Huds. non Lin. Torfheiden, Wälder, Erisen besonders auf Sand, im g. Geb.; Var. β . in Sümpfen. 8—10. ‡

504. *Erica* L. (VIII. 1.) Heide. K. syn. 547. Rchb. exc. p. 412. Comp. I. 2. p. 11.

1. *E. scoparia* L. Rchb. exc. *E. viridi purpurea* L. *E. virgulata* Wendl. Im südlichsten Littoral, Dalmatien auf d. Inseln Iessina u. Brazza; Piemont M. Ahenza, Nizza. 3—4. ‡

2. *E. multiflora* L. Rchb. exc. Im südl. Littoral, Dalmatien, Piemont u. in Belgien bei Hardezwyl. 6. ‡

3. *E. vagans* L. K. syn. Rchb. exc. *E. multiflora* Huds. *E. multiflora longipedicellata* Wendl. Im südl. Littoral, Istrien auf d. Insel Cherso u. Dsero, Belgien unter Gesträuche bei Hardezwyl. 4. ‡

4. *E. carnea* L. K. syn. Rchb. exc. *E. herbacea* Willd. Sturm. *E. purpurascens* Thunb. Mit Nadelholz bewachsene Heiden d. Gebirge u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Salzburg, Destr., Rheing., Pfalz in d. Frankenecker Thale an d. Südseite d. Spangenberges, in d. Au bei Bregenz, Regensburg, Schlesien; Böhmen, Mähren bis in d. Lombardei. 4—5. ‡

5. *E. mediterranea* L. Rchb. exc. *E. lugubris* Salisb. Im südl. Geb., Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont am Fuße d. M. Baldo im Valle di Caprino. 4. 3

6. *E. Tetralix* L. K. syn. Gebirgige Torfheiden, sumpfige Torfmoore, stellw. im Geb., besonders im g. nördlichen, fehlt in allen Provinzen Destr. außer Siebenbürgen, Rheing., Bodensee am Heiligenberg, am Niederrheine a. d. Westerwalde, in d. Eifel bis Aachen, im Siebengebirge, bei Bonn, Köln u., nach Westphalen, Hannover, Holstein, Preußen, Schlesien u. in d. Wetterau u. 7—9. 3

7. *E. cinerea* L. K. syn. *E. mutabilis* Salisb. Torfige Gebirgsheiden in d. unteren Rheingegenden, bei Bonn oberhalb Dottenorf unter *E. Tetralix*, Aachen bei Wassenberg, Belgien bei Maastrich, Lüttich, Utrecht u. Spa. 6—7. 3

8. *E. arborea* L. K. syn. *E. scoparia* Wulf. *E. lusitanica* Roth. *E. castra* Lin. Andr. *E. stylosa* Rud. *E. procera* Salisb. *E. elata* Link. *E. scoparia* Thunb. Steinige Orte im südl. Geb. Vittoral, Istrien bei Pola, Insel Cherso u. Dsoro, Südtirol in d. Giudicarie, Südschweiz im Beltlin, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 5—6. 3

505. *Bruckenthalia* Rchb. (VIII. 1.) *Bruckenthalie*. Rchb. exc. p. 413. Comp. I. 2. p. 13.

1. *B. spiculifolia* Rchb. exc. *Erica Bruckenthalia* Spreng. *Menziesia* — Host. Baumg. Alpen in Ungarn, Siebenbürgen bei Hermannstadt, Sforta u. Fogorás. 7—8. 4

506. *Menziesia* Smith. (VIII. 1.) *Menziesie*. Rchb. exc. p. 417. Comp. I. 2. p. 14.

1. *M. caerulea* Sm. Rchb. exc. *Andromeda* — L. *A. taxifolia* Pall. *Erica caerulea* Willd. Schattige Orte im südl. Vittoral, in Friaul nicht fern v. Monte Forca. 7—8. 3

VI. Gruppe. Rhodoreen Don. DC. prodr. VII. K. Taschb. 347.

507. *Azalea* L. (V. 1.) *Azalie*. K. syn. 548. Rchb. exc. p. 417. Comp. I. 1. p. 318.

1. *A. procumbens* L. K. syn. *Chamaeledon* — Link. *Loiseleria* — Desveaux. Felsen d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. bis ins südlichste Geb. 7—8. ‡

508. *Rhododendron* L. (X. 1.) Alpenrose. K. syn. 549. Rchb. exc. p. 417. Comp. I. 2. p. 47.

1. *R. ferrugineum* L. K. syn. Alpen u. Boralpen, besonders auf Granit, Rheing., Oberbaden im Breisg. auf d. Feldberg, Lautersee bei Risslen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. bis Ungarn, Siebenbürgen u. in d. Lombardei. 7—8. ‡

2. *R. myrtifolium* Schott. et Kotschy botan. Zeitg. Jahrg. 9. St. 2. *R. ferrugineum* Baumg. Südl. Alpen in Siebenbürgen. ‡

3. *R. intermedium* Tausch. K. syn. Auf d. Alpen, Destr. unter den beiden Nachbarn. 7—8. ‡

4. *R. hirsutum* L. K. syn. Var. β . *R. latifolium* Hoppe. Alpen u. Boralpen, besonders auf Kalk, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. bis in d. südl. Vittoral u. Lombardei. 4—7. ‡

5. *R. Chamaecistus* L. K. syn. *Rhodothamnus* — Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 48. Alpen u. Boralpen auf Kalk, mehr in d. südl. Kette, Destr. Steyermark, Tyrol, Salzburg, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei u. Siebenbürgen. 6—7. ‡

509. *Ledum* L. (X. 1.) Porst. K. syn. 549. Rchb. exc. p. 417. Comp. I. 2. p. 48.

1. *L. palustre* L. K. syn. Torfgründe, stellw. im nördl. u. mittleren Geb., Rheing., Schwarzwald am wilden Hornsee, Baiern, Regensburg, Thüringen, Westphalen, Hannover, Sachsen, Preußen bei Königsberg, Berlin bis Holstein, Schlesien, in Böhmen, Mähren nach Destr. u. Steyermark. 7—8. ‡

Siebenzigste Ordnung.

Pyrolaceen.

Lindl. syst. K. syn. 550. K. Taschb. 348. Ericaceae p. Rchb. exc. p. 414.

510. *Pyrola* L. (X. 1.) Wintergrün. K. syn. Rchb. exc. p. 414. Comp. I. 2. p. 44.

1. *P. rotundifolia* L. K. syn. Var. β . *arenaria* K. syn. Wälder, Gebüſche, ſtellw. dch. d. g. Geb.; Var. β . auf d. Inſel Norðerney. 6—7. 4

2. *P. chlorantha* Schwarz. K. syn. *P. virens* Schw. et Kaert. *P. media* Hayne. *P. rotundifolia* Sturm. *P. asarifolia* Rad. Wälder, ſtellw. dch. d. nördl. u. mittlere Geb., Deſtr. biß in d. Lombardei, Rheing., Nadelholzwalbungen vom Bodensee dch. Baden, bei Raſtatt, Schwebingen, Mannheim im Käferthal nach Darmſtadt, Frankfurt, Raſſau bei Dillenburg, Schifferſtadt, Kaiſerſlautern, Rußdorfer Wald, Tggelbach 2c. 6—7. 4

3. *P. media* Schwartz. K. syn. *P. rotundifolia* Fl. Dan. Laub- u. Nadelholzwälder, ſtellw. beſonders im nördl. u. mittleren Geb., im ſüdl. ſeltener; Schweiz um Ruggisberg, Rheing., Oberbaden, Elſaß, zw. Soultzmatt u. Gnebu, Raſſau, Baiern bei Kreuth, Heſſen bei Allend am Meißner, Thüringen, bei Halberſtadt am Hux, Sachſen, Hannover bei Göttingen am Wießner, Mecklenburg bei Ripen, Schleſien bei Schmiedeberg, Gubowa; nach Böhmen, Mähren, Deſtr. Steyermark, Tyrol, Ungarn. 6—7. 4

4. *P. minor* L. K. syn. Wälder dch. d. g. nördl. u. mittlere Geb., Deſtr. biß in d. Lombardei. 6—7. 4

5. *P. rosea* Smith. Rchb. exc. *P. minor* Fl. Dan. *P. intermedia* Schleich. Laubwälder, ſtellw. mit *P. minor* dch. d. g. Geb. 6—7. 4

6. *P. secunda* L. K. syn. Laub- und Nadelholzwälder, ſtellw. dch. d. g. Geb., Rheing., vom Bodensee nach Baſel, dch. Baden biß Mannheim, Bergſtraße biß Frankfurt,

Hanaup nach Nassau bis zum Niederrheine, Coblenz, Köln, Trier u. 6—7. 4

7. *P. uniflora* L. K. syn. *Moneses grandiflora* Salisb. in Gray. *Moneses uniflora* Reich. *Bryophthalmum uniflorum* E. Meyer. Wälder, besonders in Gebirgen, stellw. im Geb., Rheing., Oberbaden bei St. Blasien, Breisg. M. Feldberg, Pforzheim, Heidelberg, Friedrichsfeld u. Birnheim bei Mannheim, Bensheim, Darmstadt, Frankfurt nach Nassau, Württemberg bei Wolfegg, Leutkirch u., Basel bei Disberg, Elsaß im Bologner Thale, Kaiserslautern, Baiern bei Würzburg, Sachsen bei Dresden, Harz, Hannover, Hamburg, Holstein bis Preußen bei Königsberg, Danzig u.; Destr. in allen Provinzen (excl. Dalmatien). 6—7. 4

8. *P. umbellata* L. K. syn. *Chimophila* — Nutt. Rchb. exc. p. 415. Comp. I. 2. p. 47. Wälder, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Elsaß bei la Roche, Baden, Rastatt, bei Pforzheim, Schwellingen, Mannheim im Käferthal, Darmstadt, Frankfurt, Pfalz Hagenauer Forst, Schifferstadt, Speier, Kaiserslautern, Baiern, Sachsen, Jena, Hamburg, Hannover, Harz nach Preußen bis Königsberg, Memel, Elbing u., Schlesien; Böhmen, Mähren, Galizien, Siebenbürgen, Steyermark. 6—7. 4

Einundsiebenzigste Ordnung.

Montropeen.

Nutt. K. syn. 551. K. Tschb. 349. Ericaceae prs. Rchb. exc. p. 411.

511. *Monotropa* L. (X. 1.) Ohnblatt. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 49.

1. *M. Hypopitys* L. K. syn. Var. α . *glabra*: *M. glabra* Bernh. Rchb. exc. *M. Hypophegea* Wallr. *M. Hypoxa* Spreng. *M. Hypopitys* α . Roth tent. *Hypopitys glabra* DC. prodr. — β . *hirsuta*: *M. Hypopitys* Wallr. *M. Hypopitys* β . *hirsuta* Roth. *Hypopitys multiflora*

Scopoli DC. prodr. Gebirgswaldungen unter Laub u. Nadelholz, zwischen d. Wurzelsäfern d. Bäume, stellw. dh. d. g. Geb., aber sehr zerstreut. 7—8. 4

Dritte Unterklasse.

Corolliflorae Koch. syn. K. Taschb. 349.

Kronenblüthige.

Zweiundsiebenzigste Ordnung.

Ebenaceen.

Vent. K. syn. 552. K. Taschb. 349. Sapotaceae prs.

Rchb. exc. p. 433.

512. *Diospyros* L. (VIII. 4.) Dattelpflaume.

K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 33.

1. *D. Lotus* L. K. syn. Hügel, unter Gesträuche im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin bei Lugano, Locarno, Graatien, Lombardei, Mailand, Verona, Gressona, Venedig, Piemont bei Turin. 7—8. 3.

513. *Styrax* L. (X. 1.) *Styrax*. Rchb. exc. p. 433.

Comp. I. 2. p. 50.

1. *S. officinalis* L. Rchb. exc. Ackerländer, steinige Orte im südl. Geb., Dalmatien auf d. Insel Brazza, Lombardei, Comersee, Mailand, Piemont, um Nizza, Oberitalien. 5—6. 3

Dreiundsiebenzigste Ordnung.

Aquifoliaceen.

DC. K. syn. 552. K. Tschb. 349. Sapotaceae prs. Rchb.

exc. p. 433.

514. *Ilex* L. (IV. 1.) Stechpalme. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 263.

1. *I. Aquifolium* L. K. syn. *Aquifolium Ilex* Scop. *A. spinosum* Gaertn. Trockene Gebirgswälder, Gebüsche, Heiden, stellenw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, Schweiz, Schwaben, Baiern; Rheing. v. Bodensee nach d. Schwarzwalde dch. Baden, Breisg., Ettlingen, Rastatt bis Heidelberg; Vogesen dch. Elsaß bis Kreuznach, bis Trier, Luxemburg u. dch. d. g. Moselgebirge bis Coblenz, Bonn, Köln, Aachen; v. Westphalen, Hamburg dch. Hannover, Oldenburg, Holstein, Mecklenburg, Pommern, Berlin; Destr. Tyrol, Steyermark, Krain, Dalmatien, Croatien bis in d. Lombard. 5—6. ‡

Vierundsiebenzigste Ordnung.

Oleaceen.

Lindl. K. syn. 553. K. Taschb. 350. Sapotaceae prs. Rchb. exc. p. 431.

515. *Olea* L. (II. 1.) Delbaum. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 13.

1. *O. europaea* L. K. syn. *O. sativa* Link. *O. sylvestris* Matth. Steinige Orte zw. Gebüschen im südlichsten Geb. Piemont, Genua, Nizza u. in Oberitalien; angepflanzt im südl. Geb., in d. Schweiz Cant. Tessin; Südtirol, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombard., Venedig. 5—6. ‡

516. *Phillyrea* L. (II. 1.) Steinlinde. K. syn. 553. Rchb. exc. p. 432. Comp. I. 1. p. 13.

1. *P. media* L. K. syn. *P. virgata* Willd. Wälder, Zaune, Felsen im südl. Geb., Südtirol am See von Toblin nördl. v. Gardasee, Littoral, Istrien bei Fiume, Duino, Insel Gerso, Dalmatien, Croatien, Venedig. 3—4. ‡

2. *P. angustifolia* L. Rchb. exc. Am südl. Littoral.

ral, Istrien an d. M. Maggiore u. in Piemont um Nizza. 5—6. 2

3. *P. latifolia* L. Rchb. exc. *P. ilicifolia* Link. *P. buxifolia* Link. Steinige Gebüsche im südl. Littoral, Südtirol, Istrien bei Pola, auf d. Insel Cherso, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza, Oberitalien. 3—4. 3

4. *P. stricta* Bertol. Fl. ital. Maly enum. pl. austr. p. 166 et 383. Felsen in Südtirol bei Brixen auf d. Seeseite d. Berge Benaci. 3—5. 3

517. *Ligustrum* L. (II. 1.) Hartriegel. K. syn. 554. Rchb. exc. p. 432. Comp. I. 1. p. 14.

1. *L. vulgare* L. K. syn. Gebirgswälder, Hecken, Zäune, Wege, im g. Geb. 6—7. 3

518. *Syringa* L. (II. 1.) Flieder. K. syn. 554. Rchb. p. 432. Comp. I. 1. p. 14.

1. *S. vulgaris* L. K. syn. Gebirgsfelsen in Ungarn u. Siebenbürgen; im übrigen Geb., stellw. in Hecken, an Zäunen, verwildert u. allgemein in Gärten angepflanzt. 4—5. 3

2. *S. Josikaea* Jacq. Rchb. exc. Felsen in Siebenbürgen bei Sebes im Comitat Clausenburg. 5. 3

519. *Fraxinus* L. (II. 1.) Esche. K. syn. 554. Rchb. exc. p. 432. Comp. I. 1. p. 12.

1. *F. excelsior* L. K. syn. *F. aurea* Willd. *F. atrovirens* Desf. *F. simplicifolia* Willd. *F. heterophylla* Vahl. *F. oxyphylla* M. v. Bieb. Gebirgswälder bis in d. Alpen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. Baden, Pfalz am Donnersberge an d. Nahe u. am Glan bis Trier, Luxemburg, Mosel, abwärts bis Coblenz u. häufig angepflanzt. 4—5. 3

2. *F. Ornus* L. K. syn. *F. florifera* Scopoli, *Ornus europaea* Pers. Comp. I. 1. p. 12. Var. β . *F. diversifolia*

Rochel. ban. Gebirgswälder dch. d. g. südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin, Südtirol, Kärnthen, Krain, Vittoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn, Lombardei, Venedig, Piemont u. Oberitalien; auch angepflanz. 4—5. ‡

3. *F. rotundifolia* Aiton. Ornus — Comp. Fl. germ. I. 1. p. 13. Gebirgswälder in Ungarn. 4. ‡

Fünfundsiebenzigste Ordnung.

Jasmineen.

Rob. Brow. K. syn. 554. K. Taschb. 350. Contortae prs. Rchb. exc. p. 430.

520. *Jasminum* L. (II. 1.) Jasmin. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 15.

1. *J. officinale* L. K. syn. Steinige Orte, Weinberge, Mauern im südl. Geb., Südschweiz bei Chiavenna, Lugano, im Veltlin; Südtirol bei Bozen, Brixen, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Venedig, Piemont, Ligurien, Nizza. 7—8. ‡

2. *J. fruticans* L. Rchb. exc. Im südlichsten Vittoral, Lombardei bei Venedig u. in Piemont. 5—9. ‡

Sechsendsiebenzigste Ordnung.

Asclepiadeen.

R. Brow. K. syn. 555. K. Taschb. 350. Rchb. exc. p. 418.

521. *Cyanthum* L. (V. 1.) Hundswürger. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 396.

1. *C. acutum* L. K. syn. *C. longifolium* Martens test. Bertolon. Am südl. Vittoral, Istrien bei Triest, auf d. M. Scoglio di St. Marina am Golf v. Nebolino; Dalmatien, Venedig. 7. 4

2. *C. Vincetoxicum* R. Brow. K. syn. Asclepias —

L. Var. β . *C. acuminatum* Pollini veron. Steinige Orte in Gebirgswäldern, stellw. dch. d. g. Geb. 5—7. 4

3. *C. laxum* Bartling. K. syn. *C. medium* K. syn. edit. I. *C. nigrum* Host. *C. acutum* Schkr. *Asclepias fuscata* Willd. Gebirge u. Voralpen im südl. Eittoral, Krain bei Görz, Istrien, Kombardei, Venedig, Oberitalien. 5—7. 4

4. *C. contiguum* Koch. K. syn. Wiesen im südl. Eittoral, Istrien, Triest. 5—7. 4

5. *C. medium* DC. prodr. Maly enum. pl. austr. *C. fuscatum* Link. Im südl. Geb. Dalmatien bei Spalato. 5—7. 4

6. *C. monspeliacum* L. Rehb. exc. *C. monspesulanum* Host. Weingärten, an Zäunen, Dalmatien bei Spalato. 7—8. 4

522. *Asclepias* L. (V. 1.) Seidenpflanze. Rehb. exc. p. 419. Comp. I. 1. p. 398.

1. *A. syriaca* L. Rehb. exc. Aus Nordamerika, im südl. Geb., häufig u. fast verwildert. 7—9. 4

523. *Periploca* L. (V. 1.) Schlinge. Comp. I. 1. p. 398.

1. *P. graeca* L. Comp. I. 1. In Dalmatien an d. Quellen d. Rarenta. 7—8. 3

Siebenundsiebenigste Ordnung.

Apocyneen.

R. Brow. K. syn. 556. K. Taschb. 351. Contortae prs. Rehb. exc. p. 429.

524. *Apocynum* L. (V. 1.) Hundstod. K. syn. Rehb. exc. Comp. I. 1. p. 395.

1. *A. venetum* L. K. syn. *A. compressum* Moench. Rasse, sandige Orte im südl. Eittoral, Istrien, Triest, Fiume, zw. Monfalcone u. Aquileja, Kombardei, Venedig zc. 7—8. 4

525. *Nerium* L. (V. 1.) Oleander. K. syn. 557.

Rchb. exc. p. 430. Comp. I. 1. p. 395.

1. *N. Oleander* L. K. syn. Felsen, Ufer, im südl. Geb., Südtirol am Gardasee; Vittoral, Istrien, Dalmatien bei Ragusa, Lombardien, Piemont, Nizza, Genua u. Oberitalien. 7—8. 5

526. *Vinca* L. (V. 1.) Sinngrün. K. syn. 556.

Rchb. exc. p. 430. Comp. I. 1. p. 394.

1. *V. major* L. K. syn. *Pervinca* — *Scopoli*. An Zäunen, Mauern, Schutt, im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis, Südtirol, Krain bei Görz, Vittoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig u. in Belgien. 4—5. 4

2. *V. minor* L. K. syn. *Pervinca* — *Scopoli*. Var. *β. V. intermedia* Tausch. Schattige Wälder, Gebüsche, Hecken, dch. d. g. Geb. 4—5. 4

3. *V. herbacea* W. et Kit. K. syn. Sonnige Hügel, Gebirge, stellenw. im südl. Geb., Destr. am Bissamberg bei Wien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. Croatien. 4—5. 4

Achtundsiebenzigste Ordnung.

Gentianeen.

Juss. K. syn. 557. K. Taschb. 351. *Contortae* prs.

Rchb. exc. p. 420.

527. *Menyanthes* L. (V. 1.) Stöckchenblume. K.

syn. 558. Rchb. exc. p. 420. Comp. I. 1. p. 329.

1. *M. trifoliata* L. K. syn. Sumpfige Wiesen, besonders Torfwiesen dch. d. g. Geb. 4—5. 4

528. *Limnanthemum* Gmel. (V. 1.) Pfützen-

blume. K. syn. 558. K. Taschb. 351.

1. *L. Nymphoides* Link. K. syn. *L. peltatum*

Gmel. act. petrop. Menyanthes Nymphoides L. Villarsia — Vent. Rechb. exc. p. 420. K. syn. edit. I. Waldschmidia — Comp. I. 1. p. 389. Schweyckeria — Gmel. bad. In stehendem u. stillfließendem Wasser schwimmend, in Seen, Teichen, Gräben, stellenw. dch. d. g. Geb., Rheing. in d. Altwasser d. Rheines von Oberbaden, Rastatt bis Mannheim, Pfalz, Speyer, Kaiserslautern, Worms bis Coblenz, Eöln, Düsseldorf, Trier, Luxemburg u., Baiern, Hessen, Westphalen, Hannover, Hamburg. Bremen bis zur Weichsel nach Preußen bei Danzig u.; Destr. 7—8. 4

529. *Chlora* L. (VIII. 1.) Bitterling. K. syn. 558. Rechb. exc. p. 421. Comp. I. 2. p. 14.

1. *C. perfoliata* L. K. syn. *Gentiana* — L. spec. Feuchte u. torfige Wiesen, stellenw. dch. d. südl. u. mittl. Geb., Rheing., Schweiz v. Bodensee nach Basel dch. Baden bei Mühlheim, Breisg. am Kaiserstuhl, Pforzheim u. Mannheim, Elsaß, Pfalz, Speyer, Dürkheim, Maxdorf bis Worms, Mainz, Darmstadt; Destr. Böhmen, Tyrol, Littoral, Istrien, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 7—8. ☉

2. *C. serotina* Koch. K. syn. Var. β . *C. acuminata* K. et Ziz. Rechb. exc. Feuchte u. torfige Wiesen, stellenw. im südl. u. mittl. Geb., Rheing., Schweiz vom Bodensee dch. Elsaß, Baden bis Mannheim, Pfalz bei Speier, Dürkheim, Worms bis Mainz bei Gienheim u.; Tyrol, Dalmatien, Venedig, Oberitalien. 8—10. ☉

530. *Swertia* L. (V. 2.) Swertie. K. syn. 558. Rechb. exc. p. 429. Comp. I. 1. p. 424.

1. *S. perennis* L. K. syn. Torfige Wiesen, Tristen d. Alpen, Boralpen u. Gebirge u. in Sümpfen d. nördl. Geb., Schweiz, Jura u. dch. d. Alpenkette bis in d. Lombardei, Rheing. auf d. Vogesen, Oberbaden im Breisg. auf d. Feldberg, bei Steinbach in Württemberg, Oberbaiern, im

Erzgebirge u. in d. Sudeten, auf d. Mooren v. Holstein, Mecklenburg, Preußen bei Königsberg, Pommern zc. 7—8. 4

2. *S. punctata* Baumgarten. Rchb. exc. Alpen, Ungarn d. Fagarasch u. Rodner-Alpen, Siebenbürgen. 7—8. 4

531. *Lomatogonium* Alex. Braun. (V. 2.) *Fränzenkante*. K. syn. 559. Rchb. exc. p. 421.

1. *L. carinthiacum* Al. Br. Rchb. exc. K. syn. *Swertia carinthiaca* Wulf. *Gentia* a — Froel. Comp. I. 1. p. 437. *Pleurogyne* — Grieseb. Sonnige Orte, Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis im Saasthale, am M. Moro, Salzburg auf d. Rastfelde, d. Pasterze u. Fleiß bei Heiligenblut, über Sagriz u. Döllach, Tyrol auf d. Hochebene d. Schlehern, Kärnthen auf d. höchsten Mühlehäler Alpen, Großglockner, Siebenbürgen. 8—10. ☉

532. *Gentiana* L. (V. 2.) *Enzian*. K. syn. 559. Rchb. exc. p. 428. Comp. I. 1. p. 425.

Erste Rotte. *Coelanth* Froel. K. syn.

1. *G. lutea* L. K. syn. *Swertia* — Vest. Triften d. Alpen, Boralpen u. Hochgebirge, besonders auf Kalk, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Schwaben, Salzburg, Tyrol zc. bis in d. südl. Eittoral nach d. Lombardei zc., Rheing., v. Jura nach d. Vogesen u. Oberbaden, Schwarzwald am Wildbad, Herrenwiese, Hornisgründe, Schwäbische Alp, Thüringen auf d. Gleichen bei Arnstadt. 7—8. 4

2. *G. Thomasii* Hall. fil. Gillabog. K. syn. *G. hybrida* Schleich. *G. rubra* Clairv. *G. campanulata* Reyn. *G. purpureo-lutea* Grieseb. Triften d. Hochalpen, in d. Schweiz selten, über Ber auf d. Bovannaz u. am Rhonegletscher. 7—8. 4

3. *G. Charpentieri* Thomas K. syn. *G. punctatolutea* Griesch. Alpenthäler d. südl. Schweiz, Engadin im Beversthale. 7—8. 4

4. *G. Gaudiniana* Thomas. K. syn. *G. pannonica*

Gaud. helv. *G. punctato-purpurea* Grieseb. Alpen d. Schweiz über Ber. 7—8. 4

5. *G. purpurea* L. K. syn. Alpen, Schweiz auf d. Berner, Aelener u. Walliser Alpen, auf d. Gotthard, Pilatus, Rigi u. Splügen, M. Rosa, Lombardei, Piemont, Ungarn u. Siebenbürgen. 7—8. 4

6. *G. pannonica* Scopoli K. syn. *G. purpurea* Schrank. Wiesen, Triften d. Granitalpen u. Boralpen, Tyrol u. böh. d. g. Alpenkette nach Destr. Krain, Böhmen, im Böhmerwalde, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 8—9. 4

7. *G. punctata* L. Jacq. K. syn. Var. β . *concolor*: *G. campanulata* Jacq. Gräßige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. böh. d. g. Alpenkette nach Tyrol, Destr. bis Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, im Gesenke d. Subeten u. im Böhmerwalde. 7—9. 4

8. *G. cruciata* L. K. syn. Sonnige Hügel, Wiesen, Waldränder, besonders auf Kalk, stchw. böh. d. g. Geb., Rheing., böh. Elsaß, Baden, Pfalz bis Kreuznach, Trier, Luxemburg, Coblenz, Bonn u. 7—9. 4

9. *G. phlogifolia* Schott et Kotsch. Bot. Z. 1851. p. 151. Siebenbürgen, Alpe Piatra, Krajuluj. 8. 4

10. *G. asclepiadea* L. K. syn. *G. plicata* Schmidt, *Dasystephana asclepiadea* Borkh. Schattige Thäler d. Alpen, Boralpen und damit zusammenhängenden Gebirge, Schweiz u. böh. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Destr. Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Rheing. v. Jura bis Basel, auf d. Vogesen u. im Oberelsaß, in d. Lausitz, Schlesien u. in d. Subeten. 8—9. 4

11. *G. Pneumonanthe* L. K. syn. *G. linarifolia* Lamk. *Ciminalis Pneumonanthe* Borkh. *Pneumonanthe vulgaris* Schmidt. Feuchte Torfwiesen, lichte Orte in Nadelholzwäldern, stchw. böh. d. g. Geb., Rheing., v. Bodensee bis Mainz, Nassau, Pfalz, Trier, Luxemburg, Aachen, dann am Niederrhein bei Bonn, Düsseldorf, Elve, Elberfeld u. 7—10. 4

12. *G. Froelichii* Hladnikiana. K. syn. *G. Hladni-*

kiana Host. *G. angustifolia* Rehb. exc. Sturm. *G. Froelichii* Jan. Rehb. exc. in add. p. 865. *G. carnica* Welw. Höchste Focher d. Alpen, Kärnthen, Krainer Alpen, an d. Steiner Alpen Wetta planava. 8—9. 4

13. *G. frigida* Haenke. K. syn. *Pneumonanthe* — Schmidt. Auf d. höchsten Focher d. Granitalpen, Steyermark a. d. Seckenueralp, Grieskogel, Hohezingen, Seckent u. anderen Alpen, dann in Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen. 7—8. 4

14. *G. acaulis* L. K. syn. *G. grandiflora* Lamk. *Ciminalis acaulis* Borkh. *G. acaulis* β . Lin. *G. angustifolia* Vill. delph. Wiesen, Triften d. Alpen u. Ber Alpen u. stellenw. in d. Niederungen herabsteigend bis gegen d. Donau, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette bis in d. südl. Vittoral, Rheing., v. Jura nach d. Vogesen, Oberelsaß, Oberschwaben u. Luxemburg bei Echternach, dann bei Halle und in Oberbayern bis Regensburg. 6—8. 4

15. *G. excisa* Presl. K. syn. *G. acaulis* α . Lin. *G. acaulis* Villars. Var. β . minor: *G. alpina* Vill. Rehb. exc. Wiesen, Triften d. Hochalpen, auf Granit u. Kalk, Südschweiz Cant. Wallis im Saasthale u. dch. d. südl. Alpenkette nach Südtirol, Destr. Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Ungarn, Lombardei, Piemont; in Südtirol bis zum Delbaum herabsteigend. 7—8. 4

Zweite Rotte. *Calathia* Froel. K. syn.

16. *G. bavarica* L. K. syn. *Hippion* — Schmidt. *G. serpyllifolia* Lamk. *G. prostrata* Wahlenb. Var. β . *rotundifolia*: *G. rotundifolia* Hoppe. *G. imbricata* Schleich. Etwas feuchte Orte d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Destr., Lombardei, Venedig. 7—8. 4

17. *G. brachyphylla* Villars. K. syn. *G. verna* *brachyphylla* Rehb. exc. *G. tergloviensis* Haecq. Granitfelsen d. Hochalpen, Südschweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Destr. Steyermark, Kärnthen. 7—8. 4

18. *G. verna* L. K. syn. *Hippion vernum* Schmidt. Var. β . *G. elongata* Haenke. Wiesen, Triften d. Alpen,

Boralpen bis in d. Niederungen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Rheing., v. Constanz dch. Oberbaden bis Pforzheim, Württemberg, Baiern, Franken, bei Berlin, Schlesien in d. Sudeten u. böhmischen Gebirgen. 5—9. 4

19. *G. aestiva* R. et Sch. K. syn. *G. angulosa* M. v. B. Rchb. exc. *G. verna* β . *angulosa* Wahlenb. *G. utriculosa* Wahlenb. *G. discolor* Hoffmeigg. *G. uniflora* Georg. it. *Hippion aestivum* Schmidt. Alpen- u. Gebirgswiesen im südl. Geb. bis in d. Niederungen, Südschweiz, Kärnthen Krain auf d. Karstgebirgen, Südtirol, Steyermark auf d. Sulzbacher Gebirgen, Vittoral, Istrien bei Triest, Ungarn, Lombardien, Venedig, Oberitalien. 5—6. 4

20. *G. imbricata* Froel. K. syn. *G. verna* γ . *imbricata* M. et K. Hochalpen, besonders auf Kalk, Tyrol auf d. Kirschbaumer Alp, nach Süden an dem Kren u. Maubart, Kärnthen, Steyermark, Krainer Alpen u. im Vittoral. 7—8. 4

21. *G. pumila* Jacq. K. syn. *G. verna* var. M. et K. *Hippion pumilum* Schmidt. Triften d. Hochalpen, Destr. auf d. Schneeberge, Goldberg in Kauris, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Krain, Vittoral, Siebenbürgen, Lombardien, Piemont u. Oberitalien. 7—8. 4

22. *G. prostrata* Haenke. K. syn. Töcher d. Hochalpen an Gletscherrändern, Tyrol M. Schlehren, in d. Karthale u. Frosniger Alpen in Salzburg, Heiligenbluter Tauern u. Pasterze in Kärnthen, Steyermark auf d. Todtengebirge bei Auffee. 7—8. ☉

23. *G. utriculosa* L. K. syn. Feuchte Wiesen, Triften d. Alpen, Boralpen u. Gebirge, im südl. Geb. bis in d. Niederungen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Tyrol, Destr. zc. bis in d. Lombardien, Rheing., v. Constanz bis Basel, Hünningen, Bensfeld, Breisg., Oberelsaß u. dch. d. Rheinfläche nach d. Pfalz bei Lambsheim, Marzorf, Speier, Dürkheim, Forst, Oggersheim, Frankenthal bis Mainz bei Nombach, Oberbaiern bei Augsburg. 6—8. ☉

24. *G. nivalis* L. K. syn. *Hippion nivale* Schmidt.

Hochalpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette bis in d. südlichste Geb., in Südtirol bis in d. Gegenden d. Ackerbaues herabsteigend. 7—8. ☉

25. *G. pyrenaica* Gouan. Rchb. exc. Beregher Alpen in Ungarn am Berzowa. 7. 4

26. *G. aquatica* L. Rchb. exc. *G. humilis* Stev. *G. humilis simplicicaulis* Rochel. ban. *G. carpatica* Kitaib. Selten u. einzeln im Banat an d. Wasserrändern im Gropathale, wo v. d. Sarbo das Wasser zur Bistra herabfließt; Blüthe Anfangs Frühling. ☉

Dritte Rotte. *Endotricha* Froel. K. syn.

27. *G. campestris* L. K. syn. *Hippion auriculatum* Schmidt. Var. β . *G. chloraefolia* N. v. E. Rchb. exc. Sonnige Wiesen d. Alpen u. Boralpen dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern u. stchw. dch. d. Gebirge u. Niederungen; Rheing., Basel bei Ramstein, Muttenser Berge, Breisg. auf d. Feldberg, Hessen bei Gießen, Nassau bei Westerburg zc., Coblenz oberh. Arzheim u. auf d. Hochsinner bei Mayen, Trier in d. Eifel bei Hillesheim, Hamburg, Preußen bei Danzig, Schlesien, Mähren, Böhmen zc.; Var. β . Oberbadon im Sundgau u. bei Mühlhausen im Elsaß. 6—8. ☉

28. *G. germanica* Willd. K. syn. *G. Amarella* Pollich. *G. gracilis* N. v. E. *G. lancifolia* Bess. Var. β . *uniflora*: *G. uniflora* Willd. N. v. E. *Hippion gentianellum* Schmidt. — γ . *G. flavescens* Visian. — δ . *G. pratensis* Froelich. Etwas feuchte Wiesen, Triften, Heiden, stchw. dch. d. g. Geb. bis in d. Süden, besonders in Berggegenden. 8—9. ☉

29. *G. amarella* L. K. syn. Willd. *G. sylvestris* de Bray. *G. pratensis* Bess. *G. axillaris* Rchb. icon. *Hippion axillare* Schmidt. *G. lancifolia* Sturm. Var. β . *G. uliginosa* Willd. *G. obtusifolia* Rchb. icon. — γ . *G. flava* Meyer. Feuchte, torfige Wiesen, Triften, stchw. im Geb., gemein im nördl. Deutschland, dann am Niederrhein, in Sachsen, Preußen, Königsberg, Memel, Tilsit, Schlesien,

Böhmen, Mähren, Destr. Tyrol, Kärnthen, Galizien, Ungarn, bis in d. Lombardei. 8—9. ☉

30. *G. obtusifolia* Willd. K. syn. *Hippion obtusifolium* Schmidt. Var. β . *G. spathulata* Bartl. *G. amarella* β . *depauperata* Rochel. — γ . *G. montana* N. v. E. — δ . *G. calycina* Fachini. — ϵ . *G. pyramidalis* N. v. E. Triften d. Alpen u. Boralpen u. höheren Gebirgen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Tyrol, Destr. Galizien, Ungarn u. Littoral; Rheing. im Bodenseeried bei Rheineck, Sachsen im Erzgebirge; dann in Böhmen, Mähren u. d. Var. β . in Tyrol. 7—8. ☉

31. *G. crispata* Visiani. Rechb. exc. in add. p. 865. In Dalmatien an d. M. Biokowo. 9. ☉

32. *G. tenella* Rottb. K. syn. *G. glacialis* Vill. A. Thomas. K. syn. edit. I. Rechb. exc. *G. tetragona* Roth. *G. Koenigii* Gunn. norw. *Hippion longipedunculatum* Schmidt. Granit- u. Kalkfelsen d. Hochalpen in d. Nähe d. Gletscher; Schweiz u. dch. d. g. südl. Alpenkette nach Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Ungarn, Lombardei u. Oberitalien. 8—9. ☉

33. *G. nana* Wulfen. K. syn. *Eurythalia* — Borkh. *Hippion nanum* Schmidt. Hochalpen, an Gletscherrändern; Destr. Kärnthen, Salzburg, Tyrol, Krain auf d. Nassfelder Tauern, Gambgrube, Pasterze, bei Heiligenblut, Südbahngang am Glockner u. auf d. Müllthaler-Alpen. 8—9. ☉

Vierte Rotte. *Grossopetalum* Froel. K. syn.

34. *G. ciliata* L. K. syn. *Grossopetalum gentianoides* Roth. *Grossop. divis.* Froelich. Gräßige, etwas feuchte Abhänge d. Gebirge, lichte Waldstellen, Triften, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. dch. Elsaß, Baden im Breisg., Heidelberg, Pfalz, Zweibrücken bis Mainz, nach Nassau, Coblenz, Ahrthal, Bonn, Kreuznach, Saarbrücken, Trier, besonders in d. Eifel, Luxemburg u.; Schwaben, Baiern, Hessen, Thüringen, Hannover, Schlesien nach Destr. 8—9. ☉

533. *Cicendia* Adans. (IV. 1.) Bitterblatt. K. syn. 566. Rchb. exc. p. 420. Comp. I. 1. p. 236.

1. *C. filiformis* Rchb. K. syn. *Gentiana* — *L. Exacum filiforme* Willd. Sandige, nasse Triften, stellw. im Geb., Rheing., Wetterau bei Hanau, Flora v. Trier, bei Birkenfeld, Luxemburg bei Sept-Fontaines, Aachen u. Raeren, Nassau bei Kropbach, Montabaur, Vinz bei Asbach, Siebengebirge, Siegburg, Bonn am Venusberg, bei Dottendorf, Emmerich, Elberfeld, dch. Westphalen, Hamburg, Braunschweig, Oldenburg, nach Bremen, Sachsen; Holstein, Mecklenburg; Siebenbürgen u. am südl. Vorgebirge in Istrien. 7—8. ☉

534. *Erythraea* R. Richard. (V. 1.) Tausendgüldenfraut. K. syn. 566. Rchb. exc. p. 421. Comp. I. 1. p. 390.

1. *E. Centaurium* Pers. Rich. K. syn. *Gentiana* — *L. Chironia* — Willd. *Centaurium vulgare* Schum. Var. β . *E. capitata* R. et Sch. — γ . *E. grandiflora* R. et Sch. Etwas feuchte Waldtriften, lichte Waldstellen dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *E. linariaefolia* Koch. K. syn. *E. linarifolia* Pers. Rchb. exc. *Gentiana* — Lamk. *E. littoralis* Fries. nov. *E. compressa* Hayne. *E. angustifolia* Wallr. *E. uliginosa* Willd. *Chironia* — W. et Kit. *Hippocentaurium* — Schult. *E. pumila* Dietr. Var. β . *E. littoralis* Smith. Sandige, salzhaltige Triften an d. Küsten d. Nord- u. Ostsee; salzhaltige Wiesen um Landseen in d. Mark Brandenburg, Preußen bei Memel, Thüringen; Böhmen, Mähren, Oest. Ungarn. 7—8. ☉

3. *E. pulchella* Fries nov. K. syn. Var. β . *ramosissima*: *E. ramosissima* Pers. syn. excl. Var. β . *E. inaperta* v. Schlechtenth. *Chironia pulchella* Smith. *Gentiana Centaurium* β . L. — γ . *simplicissima*: *Chironia Vaillantii* Schmidt. *E. inaperta* Willd. spec. excl. synop. *Gentiana pulchella* Swartz. Feuchte, dünnbegraste oder nackte, steinige Orte,

Wiesen, Triften, Felser, Ufer, Waldwege, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

4. *E. emarginata* W. et Kit. Rehb. exc. *Hippocentaurium* — tum Schult. Feuchte Wiesen in Destr., Soos bei Wien, Mähren, Ungarn bei Pesth u. im Banat. 9. ☉

5. *E. tenuiflora* Link. Rehb. exc. In Dalmatien. 6—8. ☉

6. *E. spicata* Pers. K. syn. *Gentiana* — L. *Chironia* Willd. — Sumpfige Orte im südl. Littoral, Istrien, Triest bei Saul, Aquileja, Monfalcone, Dalmatien, Lombardien, Venedig an d. Mündung d. Piave; Piemont, Nizza. 7—8. ☉

7. *E. maritima* Pers. K. syn. *Gentiana* — L. *Chironia* — Willd. Wiesen am südl. Littoral, Istrien, Valle Bondon zw. Fasana u. Pola, Insel Iossino, Dalmatien. 6—8. ☉

8. *E. lutea* Bertol. Rehb. exc. *Chironia* — Bertol. Im südl. Littoral, Istrien bei Sarzana u. M. Massa, Digiano, Insel Veglia u. in Dalmatien. 6—7. ☉

Neunundsiebenzigste Ordnung.

Polemoniaceen.

Lindl. K. syn. 567. K. Taschb. 357. *Convolvulaceae* prs. Rehb. exc. p. 349.

535. *Polemonium* L. (V. 1.) *Speerkraut*. K. syn. Rehb. exc. Comp. I. 1. p. 354.

1. *P. caeruleum* L. K. syn. Feuchte Wiesen, Wälder bis in d. Boralpen, stellw. besonders im südl. Geb., Rheing., Bodensee am Friedrichshafen, Basel an d. Birse u. bei Merkt, Badischen Jura bei Hüffingen, Württemberger Jura bei Glems, Grafeneck, an d. Eschbach bei Urlau, Nassau bei Hachenburg, Kroppach; Oberbaiern, Unterharz, Ost- u. Westpreußen bis Königsberg, Danzig; Schweiz bei

Ber, Destr. Tyrol im Sulbathal, Steyermark, Krain, Croa-
tien, Siebenbürgen, Galizien, Ungarn, Lombardei. 6—7. 4

Adzigste Ordnung. Convolvulaceen.

Juss. K. syn. 568. K. Taschb. 358. Rchb. exc. p. 347.

536. *Convolvulus* L. (V. 1.) Winde. K. syn.
Rchb. exc. p. 348. Comp. I. 1. p. 355.

1. *C. sepium* L. K. syn. *C. sylvestris* Willd. *Calystegia sepium* N. v. E. R. Brow. Bäune, Hecken, dch. d. g. Geb. 6—10. 4

2. *C. sylvaticus* W. et Kit. Rchb. exc. *Calystegia*
— R. et Sch. R. Brow. *C. lacunus* Tenore. In Wäldern,
Ungarn im Banat an d. Herkulesbädern, Siebenbürgen u.
in Oberitalien. 6—7. 4

3. *C. Soldanella* L. K. syn. *Calystegia* — R. et
Sch. R. Brow. Am sandigen Seestrande an d. Nord- u. Ost-
see, Oldenburg, Insel Wangeroo, Belgien u. Holland auf
Zeeland, im südl. Littoral, Istrien, Triest, Insel St. Andria,
Aquileja, Monfalcone, Dalmatien, Venedig; Piemont bei
Oneglia. 7—8. 4

4. *C. Sabbaticus* Vivian. Rchb. exc. Oberitalien
am Cap Noli reviere de Gineß. 7—8. 4

5. *C. siculus* L. Rchb. exc. Im südl. Littoral,
Istrien, Monte Maggiore. 7. ☉

6. *C. arvensis* L. K. syn. Var. β . *hirsutus*: *C. vil-
losus* Lej. Aecker, Brachfelder, Raine u. dch. d. g. Geb.
6—7. 4

7. *C. althaeoides* L. Rchb. exc. Im südlichsten
Geb., Piemont, Ligurien. 4—6. 4

8. *C. tenuissimus* Sibth. K. syn. *C. althaeoides* M.
et K. K. syn. edit. I. *C. althaeoides* β . Lin. *C. argyreus*
DC. Fl. fr. *C. elegantissimus* Mill. Weingärten, an Hecken,
Bäunen, im südl. Littoral, Istrien, Insel Cherso, Dalmatien
u. in Ungarn. 5—7. 4

9. *C. bryoniaefolius* Sims. Rehb. exc. *C. hirsutus* Tenore non M. v. Bieb. *C. italicus* R. et Sch. *C. althaeoides* DC. Fl. fr. Am südlichsten Eittoral, Piemont um Nizza. 4—6. 4

10. *C. Cantabrica* L. K. syn. *C. terrestris* Lin. Sonnige Hügel im südl. Geb., Oestr. bei Wien, Südtirol, Eittoral, Istrien u. Inseln, bei Triest, Krain, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Lombardien, Venedig u. Oberitalien. 6—7. 4

11. *C. lineatus* L. Rehb. exc. Im südlichsten Eittoral, Piemont um Nizza. 7. 4

12. *C. Cneorum* L. Rehb. exc. Im südlichsten Eittoral, Dalmatien auf d. Insel Vessina, Piemont bei Nizza, Dneglia. 7. 3

537. *Cuscuta* L. (V. 2.) Flachseide. K. syn. 569. Rehb. exc. [Aizoidea prs. p. 585. Comp. I. 1. p. 423.

1. *C. europaea* L. K. syn. *C. major* DC. *C. vulgaris* Pers. *C. tubulosa* Presl. Auf Kesseln, Hanf, Hopfen, Weiden u. andern Pflanzen schmarogend, in Hecken, an Bäumen, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *C. Schkurhiana* Pfeiffer. Fr. W. Schultz Jahrb. d. Pharmacie. Löhr Archiv d. Pharmac. 1848. Mit *Cuscuta europaea* in Hecken. 7—8. ☉

3. *C. Epithymum* L. K. syn. *C. minor* DC. *C. europaea* γ. *Epithymum* L. Sandige Wiesen, Triften, Heiden, Nadelholzwälder; auf Heidekraut, Ginster, Quendel, Gräser u. andern Pflanzen schmarogend, stchw. dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

4. *C. planiflora* Tenore. K. syn. *C. alba* Presl. Rehb. exc. Auf *Colutea arborescens* in Südtirol bei Bozen u. Meran. 7—8. ☉

5. *C. breviflora* Visian. Fl. Dalm. II. p. 231. Maly enum. pl. austr. in add. p. 410. Auf *Ocimum Basilicum* schmarogend; Dalmatien auf d. Insel Vessina. 7—8. ☉

6. *C. trifolii* Babingt. et Gibs. Löhr Archiv f. Pharmacie 1848. *C. minor* β. *trifolii* Choisy DC. prodr.

Auf Kleeäcker in d. Rheing., um Coblenz bei Lahnstein u. auf d. Dieblacher Berge bei Winingen, Baden zc. 7—10. ☉

7. *C. Epilinum* Weihe. K. syn. *C. major* K. et Ziz. *C. densiflora* Soyer Willm. *Epilinella cuscutoides* Pfeiffer. *E. densiflora* Fr. W. Schultz. Auf Feinäckern, stellw. dch. d. g. Geb., besonders in etwas nassen Jahren auf den Feinäckern in d. Rheing. 7. ☉

8. *C. monogyna* Vahl. K. syn. *C. lupuliformis* Krock. In Gebüschern, auf Weiden, Pappeln u. anderen Sträuchern schmarotzend, stellw. im Geb., Hamburg Elb- ufer, Lauenburg bei Trittau, Schlesien bei Breslau, Weichsel in Preußen bei Tilsit; Destr. Böhmen, Steyermark, Ungarn, Lombard. 7—8. ☉

538. *Buchingera* Fr. W. Schultz. Jahrb. d. Pharmac. 1847.

1. *B. suaveolens* Schultz. Jahrb. d. Pharm. *Cuscuta hassiaca* Pfeiffer. K. syn. p. 570. *Cuscuta corymbosa* Choisy, *C. suaveolens* Sering. Pfeifferia — Buchinger, *Cuscutina* — Pfeiffer, Var. β . *Cuscuta corymbosa* β . *pau- ciflora* DC. prodr. IX. *C. trifolii* Hense. Auf Luzernefeld- bern, in d. Rheing. bei Coblenz an vielen Orten, Moselweis, Gölz, Horchheim, Mayensfeld bei Pollich zc.; auf Anthemis *Cotula*, *Sonchus asper*, *Galium verum*, *Medicago sativa* u. *M. falcata* bei Limburg, Balduinstein, Weilmünster im Nassau'schen, Pfalz, Hessen bei Kassel, Schweiz u. in Italien. 8—11. ☉

Einundachtzigste Ordnung. Boragineen.

Desv. Juss. K. syn. 570. K. Taschb. 359. *Asperifoliaceae* Rchb. exc. p. 335.

I. Gruppe. *Heliotropeen* Koch. K. Taschb. 359.

539. *Heliotropium* L. (V. 1.) Sonnenwende.

K. syn. Rchb. exc. p. 347. Comp. I. 1. p. 365.

1. *H. europaeum* L. K. syn. Cultivirte u. uncultivirte Orte, Acker, Weinberge, Ufer, mehr im südl. Geb., im mittleren stchw., Schweiz im Cant. Wallis u. bei Genf, Rheing., zerstr. von Basel bis Coblenz, Bonn u., dch. Elsaß, Baden, Schwetzingen, Heidelberg bis Frankfurt nach Nassau, Württemberg, Pfalz, Dürkheim, Grünstadt, Worms, Oppenheim u. bis Mainz, Nahe- u. Kreuznach bis Sobernheim, Kirn, Moselthal bis Trier, Luxemburg, Schwaben, Baiern, Sachsen, Schlesien; Destr. Mähren, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Dalmatien, Lombardien u. 7—8. 4

2. *H. supinum* L. Spreng. syst. Maly enum. pl. austr. p. 185. Donauufer im Banat. 7. ☉

II. Gruppe. Cynoglosseae Koch. K. Taschb.

540. *Asperugo* L. (V. 1.) Scharfsraut. K. syn.

571. Rchb. exc. p. 346. Comp. I. 1. p. 386.

1. *A. procumbens* L. K. syn. Acker, Schutt, an Wegen. schattige Bergabhänge, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Baden im Breisg. auf d. Kaiserstuhl, Elsaß, Hochbaar bei Zabern, Landau, auf d. Trifels u. Scharfenstein bei Annweiler, Mainz. bis Coblenz um Saach, Nahe- u. Glangegend, Kreuznach, Meisenheim, Mosel, Luxemburg, Thüringen Jena, Weimar, Berlin, Preußen an d. Weichsel, Hamburg u. 5—6. ☉

541. *Echinospermum* Swartz. (V. 1.) Igel-

famen. K. syn. 571. Rchb. exc. p. 345. Comp. I. 1. p. 370.

1. *E. Lappula* Lehm. K. syn. *Myosotis* — L. *Rochelia* — R. et Sch. *Cynoglossum* — Scopoli. *Lappula Myosotis* Moench. Var. β . *E. squarrosum* Rchb. exc. Sonnige Hügel, Heiden, Ratelholzwälder, Acker, Weinberge u., stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. Basel bis Coblenz, im Neckar-, Main- Nahe-, Mosel- u. Ahrthale u. 7—8. ☉

2. *E. deflexum* Lehm. K. syn. *Lithospermum* — Lehm. *Cynoglossum* — Roth. *Rochelia* — R. et Sch. *Myoso-*

tis — a Wahlenb. *M. squarrosa* W. et K. non Rechb. Schattige Kalkfelsen, auf hohen Gebirgen, besonders im südl. Geb., Rheing., in einer Bergschlucht bei Birkenfeld Flora v. Trier; Sachsen im Harz u. Schlesien in d. Sudeten im Gesenke; Destr. Böhmen, Mähren, Südtirol, Steyermark, Kärnthen, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 5—6. ☉

3. *E. marginatum* Lehm. Spr. syst. Maly enum. pl. austr. p. 185. *Myosotis* — ta M. v. Bieb. Wälder in Galizien. 6. ☉

542. *Rochelia* Rechb. (V. I.) *Rochelie*. Rechb. exc. p. 346. Comp. I. 1. p. 371.

1. *R. stellata* Rechb. Rechb. exc. *Lithospermum dispernum* L. Ungarn, sonnige Orte am Hochsberg. 6—7. ☉

543. *Cynoglossum* L. (V. 1.) Hundszunge.

K. syn. 572. Rechb. exc. p. 344. Comp. I. 1. p. 377.

1. *C. officinale* L. K. syn. *C. officinale* et *C. angustifolium* Pollich. Var. β . *C. bicolor* Willd. Steinige Orte, Hügel, Raine, Wege, Schutt, an alten Ruinen, Mauern, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., v. Basel bis Mannheim, Worms, Mainz, Coblenz, Köln, Trier, Aachen 2c. 5—7. ☉

2. *C. pictum* Aiton. K. syn. *C. cheirifolium* Scopol. *C. creticum* Vill. delph. *C. amplexicaule* Lamk. Hügel, an Wegen im südl. Vittoral, Südtirol, Istrien, Triest, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig u. Oberitalien. 5—7. ☉

3. *C. Columnae* Tenore. Visian. Fl. Dalm. Maly enum. pl. austr. in add. p. 410. Steinige, sonnige Orte in Dalmatien. 6. ☉

4. *C. cheirifolium* L. Rechb. exc. Im südlichsten Vittoral, Dalmatien, Piemont bei Eucrame, Nizza. 5—6. ☉

5. *C. montanum* Lamk. K. syn. *C. sylvaticum* Haenke. *C. Haenkei* Schult. *C. officinale* γ . Lin. *C. officinale* β . Bertoloni. *C. Dioscoridis* Vill. delph. *C. germanicum* Jacq. *C. apenninum* Fl. Germ. Gebirgswälder, stellw. im Geb., Schweiz an mehreren Stellen, Rheing.,

Basel bei Rothenfluh an d. Neubrunner Höhle, Vogesen im Elsaß, Würtemberg im Brühl bei Urbach, Baden, Pfalz am Donnersberg u. am grünen Thurme, Baiern, Hessen, Harz, Hannover; Destr. Mähren, Galizien, Ungarn, Lombard. 6—7. ☉

544. *Mattia Schultes.* (V. 1.) *Mattie.* Rchb. exc. p. 345. Comp. I. 1. p. 378.

1. *M. umbellata* Schult. Rchb. exc. *Cynoglossum umbellatum* W. et Kit. Sandige Hügel, Ungarn im Banat zw. Delibab u. Dubovaz. 4—5. ☉

545. *Omphalodes Tournef. Lehm* (V. 1.) *Ge-*
denkemein. K. syn. 572. Rchb. exc. p. 345. Comp. I. 1. p. 378.

1. *O. verna* Moench. K. syn. *O. repens* Schrank. *Omphalum vernum* Roth. *Picotia verna* R. et Sch. *Cynoglossum Omphalodes* L. Schattige Wälder im südl. Geb., Baiern bei Regensburg; Destr. Steyermark, Tyrol, Salzburg, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Lombard, Piemont. Oberitalien. 4—5. 4

2. *O. scorpioides* Lehm. K. syn. *Cynoglossum* — Haenke. Sturm. *Omphalum* — Roth. *Picotia* — R. et Sch. In Gebüsch, an schattigen, feuchten Felsen, stellw. im Geb., Baiern, Franken bei Schweinfurt, Würzburg, Wertheim, Sachsen bis Dresden, Harz bei Blankenburg, Preußen bei Thorn, Schlesien; Destr. bei Wien, Böhmen bei Prag, Mähren, Steyermark, Galizien, Ungarn, 4—5. ☉

III. **Gruppe.** *Anchuseen* Koch. K. Taschb. 360.

546. *Borago* L. (V. 1.) *Boretzsch.* K. syn. 573. Rchb. exc. p. 346. Comp. I. 1. p. 385.

1. *B. officinalis* L. K. syn. Cultivirte Orte stellw. dch. d. g. Geb., aus dem Orient stammend. 6—7. ☉

547. *Anchusa* L. (V. 1.) Schsenzunge. K. syn.

573. Rchb. exc. p. 342. Comp. I. 1. p. 373.

1. *A. tinctoria* L. Rchb. exc. Alkana — Tausch. Lithospermum — ium Andr. Sandige Aecker, Brachfelder im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Südungarn, Lombardei, Piemont u. in d. Novara. 6—7. ☉

2. *A. officinalis* L. K. syn. Var. β . *A. angustifolia* DC. et Florist. *A. arvalis* Rchb. exc. *A. arvensis* Tausch. Sandige, grasige Orte, Raine, Dämme, Wälle, Mauern, Wald- u. Wegeränder, Aecker, stellw. dch. d. g. bis ins nördl. u. südl. Geb., Rheing., Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Hagenau, Speier, Zweibrücken, Mainz, Trier, Luxemburg, Coblenz, Bonn, Gdln zc. 5—10. ☉

3. *A. leptophylla* R. et Sch. K. syn. *A. procera* Besser. *A. angustifolia* Lin. Lehmann. Rchb. exc. Uncultivirte, sandige Orte im südl. Geb., Südschweiz, Südtirol, Dalmatien, Ungarn, Lombardei. 7—8. ☉

4. *A. ochroleuca* M. v. Bieb. Rchb. exc. Gebirgs- wiesen im südl. Geb., Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. ☉

5. *A. microcalyx* Visiani Flora 1829. Maly enum. pl. austr. p. 186 In Dalmatien bei Vertica. 7—8. 4

6. *A. undulata* L. Rchb. exc. *A. hybrida* Tenore. Im südlichsten Geb., Lombardei bei Pavia. 5—7. ☉

7. *A. italica* Retz K. syn. Rchb. exc. *A. paniculata* Aiton. Rchb. exc. *A. azurea* Rchb. exc. Buglossum angustifolium, B. paniculatum, B. vulgare et B. italicum Tausch. Brachfelder, Weinberge, besonders dch. d. g. südl. Geb., Rheing., Oberbaden im Breisg. am südl. Abhänge eines Hügels zw. Ober- u. Niederrothweil am Kaiserstuhl, Südschweiz Cant. Wallis u. Tessin, Nestr. Südtirol, Eittoral, Istrien, bei Triest, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei, Venedig u. Oberitalien. 5—7. ☉

8. *A. sempervirens* L. Rchb. exc. Caryolopha —

DC. prodr. Hügel, Aecker im südl. Geb., Piemont bei Montferrat auf d. Euganischen Hügeln. 6—7. ☉

9. *A. Barrelieri* Besser. Rchb. exc. *Myosotis obtusa* W. et Kit. Buglossum Barrelieri Allion. Wälder im südl. Geb., Galizien, Südungarn im Banat, Siebenbürgen, Dalmatien bei Spalato, Lombardei, Piemont bei Rocario, in d. Novara. 5—6. ☉

10. *A. verrucosa* Lamk. Rchb. exc. *A. aegyptiaca* DC. prodr. Asperugo — Jacq. Aecker, Wege in Dalmatien. 6. ☉

548. *Lycopsis* L. (V. 1.) Krummhals. K. syn. 574.

Rchb. exc. p. 342. *Anchusa* Comp. I. 1. p. 373—374.

1. *L. arvensis* L. K. syn. *Anchusa* — M. v. Bieb. Aecker, Felder im g. Geb. 6—10. ☉

2. *L. variegata* L. K. syn. *L. bullata* Cyrill. *Anchusa* — Lehm. mon. *A. perlata* Lamk. Cultivirte Orte, Wege, Schutt, Mauern im südl. Vittoral, Istrien, Inseln Cherso, Dsero, Dalmatien um Zara, Piemont, um Nizza. 5—6. ☉

3. *L. orientalis* L. K. syn. *Anchusa ovata* Lehm. *A. verrucosa* Lej. Unter d. Getreide in Belgien, Berviers bei Stembert in d. Nähe v. Aachen. 6—7. ☉

549. *Nonnea* Medikus. (V. 1.) Nonnen. K. syn.

575. Rchb. exc. p. 338. *Lycopsis* Lehm. Comp. I. 1. p. 376.

1. *N. obtusifolia* DC. prodr. Maly enum. pl. austr. p. 187. *Lycopsis* — Willd. Saatäcker in Dalmatien. 6. ☉

2. *N. vesicaria* Rchb. exc. *N. nigricans* DC. prodr. *N. decumbens* Moench. *Lycopsis vesicaria* L. Baumg. *Lithospermum* — ium Loisl. Gebirgsstellen in Siebenbürgen bei Brasso u. 7—8. ☉

3. *N. pulla* DC. prodr. K. syn. *Lycopsis* — Lin. *Anchusa* — M. v. B. Felder, Aeckerränder, Wege, stellenw. im Geb., Thüringen, Jena, Harz, Sachsen, Braunschweig, Hannover, Brandenburg bei Berlin, Preußen bei Thorn, Grauz-

benz, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. ☉ et 4

4. *N. ventricosa* Griesebach. DC. prodr. Maly enum. pl. austr. p. 187. *Lycopsis Portenschlagiana* Petter Fl. Dalm. *Anchusa lutea* β . Bertolon. Im südl. Littoral, Dalmatien auf d. Insel Lesina. 4

5. *N. lutea* DC. Rchb. exc. *Lycopsis* — Lamk. *Anchusa* — M. v. Bieb. In Dalmatien bei Ragusa. 5—6. ☉

6. *N. ciliata* Rchb. exc. *Lycopsis* — Willd. Brachfelder in Dalmatien. 5—6. 4

550. *Symphytum* L. (V. 1.) Wallmurz. K. syn.

575. Rchb. exc. p. 346. Comp. I. 1. p. 381.

1. *S. officinale* L. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *S. patens* Sibth. Rchb. exc. — γ . *S. Bohemicum* Schmidt. Rasse, schattige Wiesen, Ufer, feuchte, schattige Orte dch. d. g. Geb. 5—6. 4

2. *S. bulbosum* Schimper K. syn. *S. filipendulum* Bischoff. *S. Clusii* Gmel. *S. punctatum* Gaud. *S. macrolepis* Gay. Gebirge, Hügel, besonders im südl. Geb., Rheing., in Weinbergen bei Heidelberg hinter d. Krappfabrik u. am rechten Neckarufer, Schweiz Cant. Tessin M. Generoso, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardie 5—6. 4

3. *S. tuberosum* L. K. syn. Gebirgswälder, stellenw. dch. d. Geb., Rheing., Elsaß bei Bensfeld, Oberbayern bei Regensburg, Sachsen bei Dresden, Erzgebirge, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Salzburg, Krain, Triest, Dalmatien, Ungarn, Südschweiz bei Lugano. 4—5. 4

4. *S. ottomanum* Frivaldzki. Maly enum. pl. austr. p. 187 et 385. Steinige, schattige Orte im Banat an d. Donau. 6. 4

5. *S. cordatum* W. et Kit. Rchb. exc. *S. cordifolium* Baumg. Nadelholzwälder in Galizien, bei Krakau, Ungarn, Siebenbürgen bei Salathna. 5—6. 4

IV. Gruppe. Lithospermeen Koch. K. Taschb. 362.

551. *Onosma* L. (V. 1.) Lotwurz. K. syn. 576.

Rchb. exc. p. 338. Comp. I. 1. p. 384.

1. *O. echioides* L. K. syn. *Cerinthe* — Scopoli. Steinige Hügel im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis; Destr. Bruck an d. Leitha bei Wien, Mähren im Godlinger Walde, bei Brünn, Südtrol. Krain, Littoral, Istrien, Fiume, Croatien, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 6—7. ☉

2. *O. Visianii* Clement. Visian. Fl. Dalm. II. p. 243. Maly enum. pl. austr. in add. p. 410. Sehr warme, uncultivirte Hügel in Dalmatien. 4

3. *O. arenarium* W. et Kit. K. syn. *O. echioides* Roth. Trockene, sandige Wiesen, stellw. im Geb., Rheing., auf dem Sande d. Fahrenwaldes hinter d. Hartmühle bei Mainz, zw. Gonsenheim, Mombach u. Bodenheim; dann in Destr. Mähren, Croatien, Ungarn. 6—7. ☉

4. *O. stellulatum* W. et Kit. K. syn. *O. echioides* α. Lin. V. β. *angustifolium*: *O. angustifolium* Lehmann. *O. stellulata* β. M. v. Bieb. *O. montanum* β. Bertolon. *O. montanum* Gaud. Sonnige Kalkfelsen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Sion etc., Cant. Waadt, Südtrol um Bogen, Krain, Littoral, Istrien, Triest, Fiume, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Siebenb., Lombardei, Venedig, Oberitalien. 6—7. 4

5. *O. montanum* Sibth. et Sm. Rchb. exc. DC. prodr. *O. cinereum* Schreb. Felsen in Dalmatien auf d. Insel Pago u. in Oberitalien. 5. 4

6. *O. orientale* Willd. Host. Fl. austr. Maly enum. pl. austr. p. 188. In Dalmatien bei Spalato u. Castello. 5. 4

552. *Cerinthe* L. (V. 1.) Wachsblume. K. syn.

577. Rchb. exc. p. 339. Comp. I. p. 382.

1. *C. major* L. K. syn. In Gebüschen d. Schweizer Alpen im Cant. Bern auf d. Stockhornkette, dann im südl. Littoral, Istrien, u. in Dalmatien. 7—8. ☉

2. *C. maculata* L. M. v. B. Rech. exc. *C. quinque-maculata* Wahlenb. *C. minor* β. Roth. Wiesen der Alpen in d. Carpathen über den Tannen u. in d. Lombardei bei Verona. 6—7. ☉

3. *C. minor* L. K. syn. *C. glabra* Scopoli. Var. β. *C. maculata* Rehb. pl. crit. Felder, Aefferränder, an Wegen, stellw. im Geb., Rheing., Oberbaden im Sundgau, Düren bei Aachen, bch. Oberbaiern bis Regensburg, Jena, Sachsen bis Dresden, Schlesien; Destr. bch. Böhmen, Mähren, Südtirol bis in d. südl. Eittoral. 5—7. ☉

4. *C. alpina* Kitaib. K. syn. *C. suevica* Mart. *C. glabra* Gaud. Rechb. exc. non Mill. Alpen, Boralpen u. mit d. Flüssen in d. Niederungen, Schweiz u. bch. d. g. Alpenkette nach Tyrol, im Allgäu, in Fiemme u. Gassa, an d. Jller, u. d. Eech bis zur Donau, Steyermark, Dalmatien, Ungarn. 6—8. 4

5. *C. aspera* Roth. Rechb. exc. *C. major* β. M. et K. *C. major* Sturm. *C. strigosa* Rechb. exc. Dürre Orte im südl. Geb., Istrien, Friaul, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. ☉

6. *C. retorta* Sibth. Rechb. exc. *C. purpurea* Visian. Fl. Dalm. *C. atropurpurea* Visian. In Wälbern an d. Borya in Dalmatien. 6—7. ☉

553. *Echium* L. (V. 1.) Natterkopf. K. syn. 577. Rechb. exc. p. 335. Comp. I. 1. p. 386.

1. *E. vulgare* L. K. syn. *E. violaceum* Schmidt boh. Var. β. *parviflorum*: *E. Wierzbickii* Haberl. Rechb. exc. Felsige, steinige Orte, Mauern, Wege, Raine, Brachfelder u. im g. Geb. 6—10. ☉

2. *E. Schifferi* Lang. Rechb. exc. Hügel in Ungarn bei Groß-Petersdorf. 7—8. ☉

3. *E. dalmaticum* Tausch. Flora. Comp. I. 1. p. 387. Steinige Orte in Dalmatien. 7—8. ☉

4. *E. pustulatum* Sibth. K. syn. *E. vulgare* ε. grandiflorum Bertol. Fl. italic. Uncultivirte Orte im südl.

Vittoral, Istrien, Inseln St. Catharina, Veglia, Dalmatien.
5—7. ☉

5. *E. rubrum* Jacq. K. syn. Walbwiesen in Destr.,
Mähren bei Brünn, am Geizen-See, Galizien, Ungarn, Sie-
benbürgen. 6—7. ☉

6. *E. italicum* L. K. syn. *E. altissimum* Jacq. *E.*
asperrimum M. v. Bieb. Hügel, Wege, Aecker im südl. Geb.,
Schweiz im Unterwallis; Destr. Südtirol, Krain, Vittoral,
Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Com-
barbei, Venedig, Piemont, Ligurien. 6—7. ☉

7. *E. violaceum* L. K. syn. *E. creticum* Lamk.
Aecker, Felder, Wege im südl. Geb., Vittoral, Istrien, Insel
Dsero, Dalmatien, Siebenbürgen, Galizien. 5—6. ☉

8. *E. plantagineum* L. Rchb. exc. An Wegen im
südl. Vittoral, Dalmatien, Piemont, Nizza. 6—7. ☉

9. *E. calycinum* Visian. Rchb. exc. *E. parviflorum*
Roth. *E. lusitanicum* Allion. *E. prostratum* Tenore. An
Mauern im südlichsten Vittoral, Dalmatien, Piemont, Genua,
Nizza. 6—7. ☉

554. *Pulmonaria* L. (V. 1.) Lungenkraut. K. syn.

578. Rchb. exc. p. 339. Comp. I. 1. p. 379.

1. *P. officinalis* L. K. syn. *P. maculata* Dietr.
Wälder, Gebüsch, Wiesenränder, stellw. dch. d. g. Geb. 3—4. 24

2. *P. saccharata* Mill. K. syn. *P. grandiflora* DC.
Feuchte Wälder, Gebüsch, stellw. im Geb., Rheing., im
Siebengebirge am Fuße d. Edwenburg, Flora v. Spa, Pom-
mern im Schrei von Garz bei Stettin, Unterlausitz bei Lufau,
Steiermark bei Piperalpen u. an d. Saue bei Gills, Sie-
benbürgen. 3—4. 24

3. *P. mollis* Wolf K. syn. *P. media* Host. *P. an-*
gustifolia Besser. Schattige, steinige Gebirgsstellen, Rheing.,
im Würtemb. u. Badischen Jura zw. Gutenberg u. Zeiningen,
bei Willingen, Luxemburg bei Habay, Wilz etc., Franken bei
Würzburg, Schweinfurt, Alpen u. Vorgebirge in Baiern;

Destr. Mähren, Steyermark, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn, Kombarbei. 4—5. 2

4. *P. angustifolia* L. K. syn. *P. tuberosa* Schrank. *P. montana* Lej. Var. β . *oblonga*: *P. oblonga* Schradr. Rchb. exc. *P. media* Rchb. Waldwiesen, Gebüsche, Heiden, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., Oberbaden, Breisg., Durlach, Wagheusel, Schwellingen bis Darmstadt u., Elsaß nach d. Pfalz am Donnersberg bei Winnweiler, Dürkheim, Neustadt a. d. Hardt, Taunus, Wiesbaden, an d. Nahe u. Glan, Kreuznach, Kirn, Meisenheim, Flora v. Trier in d. Eifel bei Prüm, Olzheim u. Luxemburg u. 4—5. 2

5. *P. azurea* Besser. K. syn. *P. angustifolia* Schrank. *P. Clusii* Baumg. *Bessera azurea* Schultes *Pulm. montana* Wolf. Wälder, Gebüsche, stchw. dch. d. Geb., Rheing., auf Schieferthön u. Porphyrgebirgen auf d. Niederwald bei Rüdesheim, auf d. Rochusberg bei Bingen u. im Hackenheimer Walde, Baiern, Thüringen u., Sachsen, Harz, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Tyrol, Ungarn, Dalmatien, Kombarbei. 4—5. 2

555. *Stenhammera* Rchb. (V. 1.) *Stenhammer*. Rchb. exc. p. 337.

1. *S. maritima* Rchb. exc. *Pulmonaria* — L., *Cerinth* — Dill., *Cynoglossum* — um Black., *Echium* — Ray., *Lithospermum* — Lehmann monog. Comp. I. 1. p. 579. Küste d. Nordsee. 5—6. 2

556. *Lithospermum* L. (V. 1.) *Steinsamen*. K. syn. 579. Rchb. exc. p. 336. Comp. I. 1. p. 371.

1. *L. officinale* L. K. syn. Rauhe Gebirgsstellen unter Gebüschen, an Waldwegen, stchw. dch. d. g. Geb., aber meistens nur einzeln, Rheing., Oberrhein an d. Ufer u. d. Inseln häufig, Pfalz v. Dürkheim bis Mainz, v. Kreuznach bis Meisenheim, Luxemburg, Trier, Coblenz bis Düsseldorf u., Destr. in allen Provinzen. 4—7. 2

2. *L. purpureo-caeruleum* L. K. syn. Gebirgs-

wälder, sonnige, mit Gebüsch bewachsene Abhänge, besonders auf Rhon u. Ralk, stellw. im g. südl. u. im mittlern Geb., nördl. bis Westphalen u. Hildesheim, Rheing., v. Basel bch. Oberbaden, Breisg. bei Freiburg, Limburg, Schwellingen, Boppard bei Coblenz, bis ins Brohler- u. Urththal, an d. Nahe Kreuznach, Meisenheim, Mosel Eurenburg, Trier bis Winningen zc. 5—6. 4

3. *L. petraeum* A. DC. *L. rosmarinifolium* Rehb. exc. *Echium petraeum* Portenschl. Felsen in Dalmatien um Umiffa. 6—7. 3

4. *L. fruticosum* L. Rehb. exc. Piemont in d. Novarese bei Premosella u. Bogogna. 4—5. 3

5. *L. graminifolium* Visiani Rehb. exc. *L. fruticosum* Vitm. *Anchusa suffruticosa* L. Gebirge in d. Höhe d. Buchen u. Tannen im südl. Geb., Südtirol im Sugana-thale, Lombardei, Venedig, Monte Summana auf d. Apuanen. 5. 3

6. *L. arvense* L. K. syn. Aecker, Brachfelder im g. Geb. 4—6. ☉

7. *L. incrassatum* Gusson. Rehb. exc. In Dalmatien um Karin u. Spalato. 4—5. ☉

8. *L. tenuiflorum* L. Rehb. exc. In Dalmatien auf d. Insel Brazza. 5—6. ☉

9. *L. apulum* Vahl. K. syn. *Myosotis apula* L. Brachfelder, Triften im südl. Littoral, Istrien bei Dignano, Insel Tessino u. in Dalmatien. 4—5. ☉

557, *Myosotis* L. (V. 1.) Vergißmeinnicht. K. syn. 580. Rehb. exc. p. 340. Comp. I. 1. p. 366.

1. *M. palustris* Wither. K. syn. *M. scorpioides* Willd. Schkr. *M. scorpioides* β . *palustris* Lin. Ehrh. *M. perennis* Moench. Var. β . *M. laxiflora* Rehb. exc. — γ . *M. strigulosa* Rehb. exc. — ϵ . *M. repens* Rehb. exc. Rasse, sumpfige Waldstellen, Wiesen, Gräben, Ufer, bch. d. g. Geb. 5—7. 4

2. *M. pusilla* Loisl. Visian. Fl. Dalm. Maly enum.

pl. austr. in add. p. 410. Uncultivirte Orte in Dalmatien um Sebenico. 6. 4

3. *M. caespitosa* Schultz. K. syn. *M. lingulata* R. et Sch. *M. uliginosa* Schrad. Gräben, Sümpfe, im Wasser, u. auf ausgetrockneten, schlammigen Orten stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

4. *M. sylvatica* Hoffm. K. syn. *M. arvensis* β . *sylvatica* Pers. *M. scorpioides sylvatica* Ehrh. *M. sylvatica* et *M. decumbens* Host. Var. β . *intermedia*: *M. lithospermifolia* Rchb. exc. *M. montana* M. v. Bieb. — γ . *lactea* K. syn. Gebirgswälder bis in d. Boralpen; Var. β . in Westphalen u. in d. Pfalz bei Bitsch. 5—7. ☉

5. *M. alpestris* Schmidt boh. Gaud. *M. sylvatica* β . *alpestris* K. syn. *M. suaveolens* Kitaib. Rchb. exc. *M. odorata* Poir. *M. rupicola* Sm. Wiesen, Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette. 6—8. 4

6. *M. variabilis* M. Angelis K. syn. Waldbregion d. Boralpen in Steyermark auf d. Rothenmann = Tauern. 6. ☉

7. *M. intermedia* Link. K. syn. *M. scorpioides* α . *arvensis* L. *M. arvensis* Lehm. Aecker, lichte Waldstellen, dch. d. g. Geb. 6—8. ☉

8. *M. hispida* Schlechtend. K. syn. *M. arvensis* Lk. *M. collina* Rchb. exc. *M. filiformis* Seleich. Hügel, Felsen, Rainen, Triften, Brachfelder u. Aecker, besonders auf Sand, dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

9. *M. versicolor* Pers. K. syn. *M. scorpioides collina* Ehr. Cultivirte, etwas feuchte Orte, dann an Rainen, Fluß- u. Bachufern, dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

10. *M. stricta* Link. K. syn. *M. arenaria* Schrad. *M. arvensis* Sibth. Rchb. exc. Var. β . *M. multicaulis* R. et Sch. Rchb. ap. Sturm. Sandige Orte, Hügel, Felsen, Rainen, Triften, Brachfelder, dch. d. g. Geb. 4—5. ☉

11. *M. sparsiflora* Mikan. K. syn. Feuchte, schattige Gebirgsabhänge, Wälder, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Luxemburg bei Helmbange; Thüringen, Jena, Harz, Sach-

fen; Hamburg, Mecklenburg, Pommern, Preußen, Schlesien; Oest. Böhmen, Mähren, Galizien, Steyermark, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. ☉

558. *Eritrichium* Schrader (V. 1.) Himmels-herold. K. syn. 582. Rchb. exc. p. 345. Comp. I. 1. p. 369.

1. *E. nanum* Schrad. K. syn. *Myosotis nana* Vill. delph. Sturm. Var. β . *E. Hacquetii* K. syn. edit. I. *M. terglovensis* Hacq. *M. nana* Wulsen. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis im Nicolaithal über Zermatten, M. Moro; Graubünden; Südtirol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Fittoral, Istrien, Galizien, Siebenbürgen; Piemont M. Genis. 7—8. 4

Zweiundachtzigste Ordnung. Solaneen.

Juss. K. syn. 583. K. Taschb. 366. Rchb. exc. p. 387.

559. *Lycium* L. (V. 1.) Bodsdorn. K. syn. Rchb. exc. p. 393. Comp. I. 1. p. 360.

1. *L. europaeum* L. K. syn. *L. salicifolium* Mill. Hecken, Gebüsche, im südl. Geb., im mittl. nördl. angepflanzt; im südl. Fittoral, Istrien, Insel Weglia bei Besca nuova, Dalmatien, Lombardien, Venedig. 5—6. ‡

2. *L. barbarum* L. K. syn. *L. halimifolium* Mill. *L. europaeum* Host. Hecken in Galizien, im übrigen Geb. angepflanzt. 6—7. ‡

560. *Solanum* L. (V. 1.) Nachtschatten. K. syn. 583. Rchb. exc. p. 390. Comp. I. 1. p. 357.

1. *S. villosum* Lamk. K. syn. *S. nigrum* γ . *villosum* Lin. *S. luteum* Mill. *S. Kitaibeli* Schult. Wege, Schutt; stellenw. bch. d. g. Geb., Rheing., Baden bei Rastatt, Schwellingen, Mannheim; Elsaß bei Hagenau, Pfalz, Trier,

Luxemburg, Coblenz, Westphalen, Hamburg, Hannover, Baiern, Sachsen, Destr. zc. 7—10. ☉

2. *S. flavum* Kitaib. Rchb. exc. *S. ochroleucum* Dun. Auf Schutt, in Ungarn u. Siebenbürgen. 7—10. ☉

3. *S. miniatum* Bernh. K. syn. *S. villosum* Mill. *S. alatum* Moench. *S. puniceum* Gmel. *S. judaicum* Bess. *S. nigrum* γ. M. et K. *S. rubrum* Rchb. exc. An Wegen, auf Schutt, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Baden, Pfalz, Zweibrücken, Nahe u. Glanthal, Kreuznach, Grumbach, Kusel, Trier, Winningen, Gils bei Coblenz, Neuwied, Andernach, Wesel, Emmerich zc. 7—10. ☉

4. *S. humile* Bernh. K. syn. *S. luteo-virescens* Gmel. bad. Cultivirte Orte, Wege, Schutt; stellw. dch. d. Geb., Rheing., Baden bei Rastatt, Mannheim, Dossenheim, an d. Nahe bei Kreuznach, an d. Saar bei Merzig, an d. Mosel bei Trier, Berncastel, Winningen, Coblenz, Andernach, Eöln, Aachen, Stollberg; Destr. Böhmen, Tyrol zc. 7—10. ☉

5. *S. nigrum* L. K. syn. *S. melanocerasum* Willd. *S. atriplicifolium* Desp. *S. pterocaulon* Rchb. exc. non Dunal. Var. β. *stenopetalum*: *S. nigrum stenopetalum* Al. Braun. — γ. *chlorocarpum*: *S. nigrum chlorocarpum* Spenn. Cultivirte Orte, an Wegen, auf Schutt, im g. Geb. 7—10. ☉

6. *S. Dillenii* Schult. Rchb. exc. *S. americanum* Mill. Comp. I. 1. p. 358. Steinige Waldstellen d. Matra in Ungarn. 7—11. ☉

7. *S. guincense* Lamk. Rchb. exc. *S. nigrum* δ. *guincense* Willd. Nordseestrand in Holland. 7—10. ☉

8. *S. Dulcamara* L. K. syn. Var. β. *tomentosum*: *S. littorale* Raab. Feuchte Gebüsch, Ufer, an Teichen, Bächen, Flüssen, Waldstellen, dch. d. g. Geb.; Var. β. Seestrand bei Swinemünde, Schweiz, Tyrol. 6—8. ‡

9. *S. tuberosum* L. K. syn. Allgemein im g. Geb. angepflanzt. 6—7. 4

10. *S. sodomium* L. Comp. I. 1. in add. p. 749. Auf Schutt in Dalmatien bei Ragusa 9. ‡

561. *Lycopersicon* Tournef. (V. 1.) Liebes-
apfel. Rchb. exc. p. 392.

1. *L. esculentum* Miller Rchb. exc. *Solanum Lycopersicon* L. *Pomum amoris* Rumpf. Südamerika, im g. südl. Geb. häufig cultivirt. 7—9. ☉

562. *Physalis* L. (V. 1.) Blasenfirsche. K. syn.
584. Rchb. exc. p. 389. Comp. I. 1. p. 361.

1. *P. Alkekengi* L. K. syn. *P. Halicacabum* Scopol. *Alkekengi officinarum* Zanich. Bewachsene Hügel, Weinberge, Raine, Dämme, Saune, in Hecken u. auf Brachfeldern, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., dch. Elsaß, Baden, Breisg., Rastatt, Knielingen, Durlach, Pfalz Dürkheim, Döfenheim bei Bingen, Kreuznach, Meisenheim, Trier bei Amelbingen, Obermosel bei Remich, Coblenz, Boppard, Andernach, Erpel zc., Destr. in allen Provinzen. 6—7. 4

563. *Capsicum* L. (V. 1.) Spanischer Pfeffer.
Rchb. exc. p. 392.

1. *C. annum* L. Rchb. exc. Aus Westindien, im südl. Geb. häufig u. im mittlern stellw. cultivirt; Dalmatien, Ungarn, Lombardei zc. 6—8. ☉

564. *Atropa* L. (V. 1.) Tollkraut. K. syn. 585.
Rchb. p. 390. Comp. I. 1. p. 360.

1. *A. Belladonna* L. K. syn. Wälder, Gebüsch auf steinigem Boden, besonders in jungen Waldschlägen, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

2. *A. physaloides* L. *Nicandra* — Gaertn. Rchb. exc. p. 390. Im südl. Littoral, Istrien, im übrigen Geb. stellw. verwildert, z. B. im Moselthale bei Winningen und oberhalb Hagenport zc. 7—9. ☉

565. *Mandragora* Tournef. (V. 1.) Atrun.
K. syn. 585. Rchb. exc. p. 390. Comp. I. 1. p. 361.

1. *M. vernalis* Bertolon. Rchb. exc. *M. officinalis* Miller *M. acaulis* Gaertn. *Atropa Mandragora* L. Im südl. Eittoral, Dalmatien Valle Straucia bei Ragusa, Combardei, Venedig. 3—4. 4

2. *M. autumnalis* Bertolon. Rchb. exc. *Atropa Mandragora* Fl. graec. Mit d. Vorhergehenden. 3—4. 4

566. *Scopolina* Schultes. (V. I.) *Scopoline*.

K. syn. 585. Rchb. exc. p. 388. Comp. I. 1. p. 365.

1. *S. atropoides* Schult. K. syn. *S. carniolica* N. v. E. *Scopola* — Jacq. *S. trichotoma* Moench. *Hyosciamus Scopolia* L. Wälder d. Borgebirge im südl. Krain bei Idria, Steyermark im Giller Kreis, Siebenbürgen, Ungarn, Galizien, dann verwildert am Niederrheine bei Goch u. in Baiern. 4—5. 4

2. *S. Hladnikiana* Freyer. K. syn. *S. viridiflora* Freyer. Wälder in Krain auf d. Monte Scheslmeje. 4—5. 4

567. *Hyoscyamus* L. (V. 1.) *Bilsenkraut*. K.

syn. 585. Rchb. exc. p. 388. Comp. I. 1. p. 364.

1. *H. niger* L. K. syn. Var. β . *annuus*: *H. agrestis* Kit. *H. pictus* Bernh. *H. reticulatus* H. Par. *H. bohemicus* Schmidt. *H. verviensis* Lej. Fl. de Spa. *H. segetalis* Wallr. — γ . *pallidus*: *H. pallidus* Kitaib. An Ruinen, Schutt, Wegen, Rainen, Bauernhöfen, Kirchhöfen u. Brachfeldern, bch. d. g. Geb., d. Var. γ . nur im südlichen. 6—7. ☉ et ☉

2. *H. albus* L. K. syn. Cultivirte Orte, an Wegen im südl. Eittoral, Istrien u. d. Inseln, Triest, M. Maggiore, Fiume, Südtirol, M. Baldo, Dalmatien, Siebenbürgen, Combardei, Venedig, Genua, Nizza u. 5—7. ☉

3. *H. canariensis* Ker. Rchb. exc. *H. varians* Visian. An Mauern, auf Schutt im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Oberitalien. 6—9. ☉

568. *Nicotiana* L. (V. 1.) *Taback*. K. syn. 585.

Rchb. exc. p. 389. Comp. I. 1. p. 363.

1. *N. Tabacum* L. K. syn. Amerika; bñ. d. g. Geb. angepflanzt. 7—8. ☉

2. *N. latissima* Mill. K. syn. *N. macrophylla* Spreng. Mit d. Borigen cultivirt. 7—8. ☉

3. *N. rustica* L. K. syn. Im g. Geb. angepflanzt. 7—8. ☉

569. *Datura* L. (V. 1.) Stechapfel. K. syn. 586. Rchb. exc. p. 389. Comp. I. 1. p. 362.

1. *D. Stramonium* L. K. syn. *D. foetidum* Scopol. *D. vulgatum* Gaertn. Felder, Hecker an Wegen, Schutt, Ufern, zerstreut bñ. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *D. Tatula* L. Rchb. exc. *D. Stramonium* β. *Chalybea* K. syn. Sumpfige Orte, stellw. besonders im südl. Geb., Belgien u. am Niederrhein; Oberitalien bei Bologna u. Ravenna häufig. 7—9. ☉

Dreihundertachtzigste Ordnung.

Verbasceen.

Bartling. K. syn. 586. K. Taschb. 368. Personatae prs. Rchb. exc. p. 379.

570. *Verbascum* L. (V. 1.) Wollfräut. K. syn. K. Taschb. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 341.

1. *V. Schraderi* Meyer. K. syn. *V. Thapsus* Schrad. Rchb. exc. *V. densiflorum* Pollini. Var. β. *pallidum*: *V. pallidum* Nees. — γ. *album*: *V. elongatum* Willd. — δ. *angustifolium*: *V. angustius* Schrank. Hügel, Abhänge, Mauern, lichte Waldstellen, Wegeränder, sandige Brachfelder bñ. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *V. thapsiforme* Schrader K. syn. *V. Thapsus* Meyer. K. syn. edit. I. Var. β. *V. cuspidatum* Schrad. Rchb. exc. Mit d. Vorhergehenden im g. Geb. 7—8. ☉

3. *V. macrourum* Tenore. Maly enum. pl. austr.

p. 194. *V. thapsiforme* β . *macrourum* DC. prodr. In Dalmatien auf d. Insel Lesina. 6—8. ☉

4. *V. montanum* Schrad. K. syn. *V. crassifolium* Schleich. Gaud. non DC. Gebirgswälder, schattige Hügel im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Sitten u. Martinach; Siebenbürgen, Dalmatien, Lombardei, Oberitalien. 7—8. ☉

5. *V. phlomoides* L. K. syn. *V. rugulosum* Willd. Var. β . *V. australe* Schrad. Rehb. exc. — γ . *V. nemorosum* Schrad. Rehb. exc. — δ . *V. condensatum* Schrad. Rehb. exc. Sandige Hügel, Abhänge, Nadelholzwälder, Flußufer, Sandfelder, stellenw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten auch im Rheiz, Glanz, Saar u. Moselthale bis Trier, Luxemburg u. 7—8. ☉

6. *V. sinuatum* L. K. syn. *V. intubaceum* Tabernam. Steinige Hügel im südl. Geb., Istrien Insel Dsero, Dalmatien, Lombardei, am Lido bei Venedig, Verona, Genua, Nizza u. 6—8. ☉

7. *V. undulatum* Lamk. Visian. Fl. Dalm. II. p. 156. Maly enum. pl. austr. in add. p. 410. Sonnige, steinige Hügel, an Mauern in Dalmatien um Scardona. 7. ☉

8. *V. banaticum* Schrad. Rehb. exc. *V. sinuatum* β . *banaticum* Rochel. Am Fuße d. Gebirge im Banat, besonders bei Vereinigung d. Tserna u. Bicla, bei Toplecz. 7—8. ☉

9. *V. versiflorum* Schrad. K. Taschb. Rehb. exc. *V. Thapso-phoeniceum* K. syn. *V. Lychniti-phoeniceum* Wieg. Sandfelder, uncultivirte Orte in Böhmen bei Prag. 7—8. ☉

10. *V. Thomaeaeum* Wirtgen. Verhandl. d. Naturhist. Vereins d. Preuss. Rheinlande 1847. *V. Thapso-nigrum* Wirtgen. Am Fuße d. Gebirge, Rheing., Coblenz im Lahnthale, bei Niederlahnstein, im Moselthale bei Winningen u. Brodebach. 7—8. ☉

11. *V. collinum* Schrad. K. Taschb. *V. Thapso-nigrum*. Schiede. K. syn. *V. nigro-Thapsum* Wirtg. *V.*

ambiguum Lej. *V. seminigrum* Fries. Steinige, uncultivirte Orte, Wege, stellw. dch. d. Geb., Rheing. bei Offenbach, Coblenz, St. Thomas bei Andernach, bei Heddesdorf, Trier, Limburg u. Lüttich in Belgien, Hessen, Harz Blankenburg, Halle, Baiern, Hessellohe oberhalb München bei Altötting; Tyrol, Steyermark bei Grätz. 7—8. ☉

12. *V. spurium* Koch. K. Taschb. *V. Thapsolychnitis*. M. et K. K. syn. *V. thapsoides* Link. *V. Lychnitis* β. *Thapsi* Smith. Hügel, Ufer, stellw. im Geb. Rheing. auf einer Rheininsel bei Friesenheim, im Mainthale bei Offenbach, im Lahnthale bei Niebern, Flora v. Coblenz, im Nahethale; Schwarzburg-Rudolstadt, Böhmen. 7—8. ☉

13. *V. ramigerum* Link. Schrad. K. Taschb. *V. thapsiformi-Lychnitis* Schiede. K. syn. Steinige, sandige Hügel, Abhänge, Ufer unter d. Stammarten, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Baden Heidelberg, Mannheim am Relaihaus, Râferthal, Pfalz, Sturzelbrunn, Bitsch, Nahethal bei Kreuznach, Cobernheim, im Lahnthale bei Niederlahnstein u., Mecklenburg, Sachsen, Baiern bei Erlangen u. u. in Dalmatien. 7—8. ☉

14. *V. nothum* Koch. K. Taschb. *V. thapsiformifloccosum* K. syn.? *V. nigro-Thapsus* Wirtg. Hügel, Wegeränder, Rheing., Mainz an d. Hardtmühle, Coblenz, Namedy bei Andernach. 7—8. ☉

15. *V. adulterinum* Koch. K. Taschb. *V. thapsiforme-nigrum*. Schiede. K. syn. Schattige Flußufer, Wege stellw. im Geb., Rheing., Flora v. Coblenz, Moselufer bis Gûls, Netzeufer bei Andernach. 7—8. ☉

16. *V. speciosum* Schrad. K. syn. K. Taschb. *V. longifolium* DC. Hügel, Waldränder im südl. Geb., Destr. bei Wien, Krain, Ungarn bei Szandab, Mehadia. 7—8. ☉

17. *V. floccosum* W. et Kit. K. syn. K. Taschb. *V. pulverulentum* Smith. Gaud. *V. heterophyllum* Morretti. Sonnige Hügel, Wege, Ufer, stellw. dch. d. Geb., Rheing. v. Basel bis gegen Bonn, Köln; Baden Raftatt, Neubreisach, Mainz, Coblenz bei Winningen, Andernach,

Breisig, Nahethal bei Kreuznach u. häufig an d. Mosel bis Trier, Luxemburg, Belgien; Südtirol, Steyermark, Krain, Istrien, Triest, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardien, Venedig; Ligurien. 7—8. ☉

18. *V. pulverulentum* Vill. delph. K. Taschb. *V. Lychnitis* — *floccosum* Ziz. K. syn. *V. Lychnitis*. β . *hungaricum* Rochel. *V. pyramidale* Host. *V. Bibersteinii* Besser. Sonnige Hügel, an Wegen, stellw. im Geb. Rheing., Elsaß bei Trebar, Baden bei Roth, Zell: Hammersbach, Mainz, Kreuznach, Trier u. an d. Mosel, stellw. bis Winnungen bei Hagenport, Eßf u. Gattenes; Jena ohne *V. floccosum*? Destr. Croatien, Ungarn; Oberitalien. 7—8. ☉

19. *V. Lychnitis* L. K. syn. Var. β . *album*: *V. album* Moench. *V. Moenchii* Schultes. Var. β . *rubellum*: *V. Weldenii* Moretti. Sonnige Abhänge, Ufer, an Mauern, Wegen. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

20. *V. majale* DC. Rechb. exc. Sandstellen am südlichsten Littoral, Piemont um Nizza. 5. ☉

21. *V. bicolor* Badarro. Rechb. exc. Im südlichsten Littoral, in Piemont um Nizza. 6. ☉

22. *V. Schottianum* Schrad. K. Taschb. *V. nigro-floccosum*. K. syn. *V. incanum* Gaud. *V. mixtum* Ramond, Thomas, Rechb. exc. Steinige Hügel, Wege, Ufer, stellw. mehr im südl. Geb., Rheing., Elsaß bei Guebweiler, Mühlenbach, Niederrhein bei Coblenz, Hönningen bei Einz, Niederbreisig; Mosel bei Trier, abwärts bei Eßf, Gattenes u. Winnungen, Nassau bei Weilburg; Schweiz bei Bevan im Cant. Waadt, Unterwallis; Destr. südl. Littoral, Istrien. 7—8. ☉

23. *V. nigrum* L. K. syn. Var. β . *V. alopecurus* et *V. parisiense* Thuill. Wald- u. Wiesenränder, Rainen, Wege, Triften im g. Geb. 7—8. ☉

24. *V. leiostachyon* Grieseb. Fl. Rumel. *Maly enum. pl. austr.* p. 195. et 385. Gebirgswälder an d. Donau im Banat. 7—8. 4

25. *V. lanatum* Schrad. K. syn. Var. β . *V. thyr-*

soideum Host. *V. nigrum* γ . DC. Gebirge, mehr im südl. Geb., Hamburg am hohen Elbufer; Destr. Steyermark, Kärnthen, Krain, Eittoral, Istrien, Lombardei. 7—8. ☉

26. *V. orientale* M. v. Bieb. K. syn. Var. β . *V. austriacum* Schott. Schrader. Rchb. exc. *V. virens* Host. — γ . *V. Chaixii* Vill. delph. Rchb. exc. *V. gallicum* Willd. *V. dentatum* Lapeyr. Uncultivirte, steinige Hügel, an Wegen, mehr im südl. Geb., Destr., Böhmen, Mähren an d. Pohlauer Bergen, Steyermark, Südtirol, Kärnthen, Eittoral, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn, Lombardei, Venedig, Piemont u. in d. südl. Schweiz. 7—8. ☉

27. *V. Schiedeanum* Koch. K. Taschb. *V. nigro-Lychnitis* Schiede. K. syn. *V. nigrum* γ . *ovatum* K. syn. edit. I. Wege, Ufer, einzeln unter d. Stammarten dch. d. Geb., Rheing., Baden bei Heidelberg am Heiligenberg, Mannheim am Waldhofs; Offenbach, Groß-Steinheim bei Hanau; Pfalz bei Neustadt u. Frankenstein, Zweibrücken, Kreuznach, Coblenz im Lahnthale, auf d. Moselfläche, bei Andernach; Moselgegend Trier bei Zurlauben u. Pallien; Thüringen, Sachsen, Baiern, u. in Tyrol. 7—8. ☉

28. *V. Dollinerianum* * *V. nigro-austriacum*. Rchb. exc. p. 380. Maly enum. pl. austr. p. 196. Destr. um Brühl bei Wien. 6—7. ☉

29. *V. rubiginosum* W. et Kit. K. Taschb. Rchb. exc. *V. nigro-phoeniceum* Fr. W. Schultz. K. syn. *V. caucasicum* Fisch. Aecker, Felder, stellw. im Geb. Baiern, Berg bei München am rechten Isar-Ufer; Destr. Böhmen, Mähren bei Brünn, Tyrol, Ungarn, Siebenbürgen; Südschweiz über Montreux am Genfersee. 6—7. ☉

30. *V. phoeniceum* L. K. syn. *V. Wallrothii* Nees. Var. β . Fl. albo. Hügel, Waldränder, Triften, mehr im südl. Gebirgszuge; Thüringen Jena, Halle, Barby, Magdeburg, Quedlinburg, Sachsen, Oberbaiern, Schlesien; Destr. Böhmen, Steyermark, Tyrol, Krain, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Preußen am Weichselufer zw.

Kreuzkrug u. d. Heubude; Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 6—7. ☉

31. *V. virgatum* Wither. *V. blattarioides* Lamk. Schrader. Rchb. exc. *V. viscidulum* Pers. *V. glabrum* Willd. *V. glandulosum* Thore. Steinige Orte im südlichsten Littoral, Lombardei, Venedig, Piemont Nizza. 7. ☉

32. *V. Doelleianum* * *V. pilosum* Doell. Flora Nro. 30. 1849. *V. thapsiforme* — *Blattaria* Doell. Unter d. Stammarten in Baden in d. Gegend v. Karlsruhe bei Darland an einem Altwasserdamme des Rheines, welcher längs dem einmündenden Federbach aufgeworfen ist. 7—8. ☉

33. *V. repandum* Willd. Rchb. exc. *V. Pseudo-Blattaria* Schleich. K. Taschb. 372. *V. Lychnitis-Blattaria* Koch. K. syn. *V. blattarioides* Gaud. *Celsia heterophylla* Pers. Aefferränder in d. südl. Schweiz Cant. Wallis. 6—7. ☉

34. *V. Blattaria* L. K. syn. Var. β , *albiflorum*. Kieselige, feuchte Orte, Ufer, Wege, stellenw. dch. d. g. Geb., Rheing., Baden bei Rastatt, Rnielingen, Heidelberg, Mannheim, Bergstraße bis Darmstadt 2c., Pfalz Landau, Speier, Dürkheim, Frankenthal. Rheing., Boppard, Coblenz, Binz, u. einzeln bis Eöln 2c., Moselufer bei Trier, Saarufer bei Merzig 2c., südl. Oestr. bis in d. Lombardei u. nördl. bis nach Preußen an d. Weichsel. 6—7. ☉

35. *V. divaricatum* Kittel. Taschb. d. Fl. v. Deutschl. p. 352. *V. phoeniceo* — *Blattaria* Kitt. Sandige Orte in d. unteren Maingegend, Rittel. 7. ☉

36. *V. pyramidatum* M. v. Bieb. Rchb. exc. Ungarn im Banat. 7—8. ☉

571. *Celsia* L. (XIV. 1.) Gelfie. Rchb. exc. p. 379. Comp. I. 2. p. 388.

1. *C. orientalis* L. Rchb. exc. *Blattaria* — Buxbaum, *Verbasum* — le Allioni. Im südlichsten Littoral, Dalmatien auf d. Insel Lesina, Piemont. 6—7. ☉

572. *Scrophularia* L. (XIV. 2.) Braunwurz.

K. syn. 592. Rehb. exc. p. 376. Comp. I. 2. p. 388.

1. *S. nodosa* L. K. syn. Etwas feuchte, schattige Orte, Waldwege, Felsen, Ufer, Gräben, Raine, im g. Geb. 6—8. 4

2. *S. auriculata* L. Rehb. exc. An Gräben im südlichsten Littoral, Piemont um Nizza. 6—7. 4

3. *S. Ehrharti* C. A. Steven. K. syn. *S. aquatica* Lin., Pollich. et Auct. DC. prodr. K. syn. edit. I. Nasse Orte, Quellen, Gräben, Teiche, Fluß- u. Bachufer, nasse Wiesen u., dch. d. g. Geb. 7—9. 4

4. *S. Balbisii* Hornem. K. syn. *S. aquatica* Lin. secund. Steven. *S. betonicaefolia* Fl. v. Luxemburg. Teiche, Gräben, Ufer, stchw. dch. d. Rheingebiet, Elsaß bei Langensand, Baden bei Rnielingen, an d. oberen Saar, Trier an d. Oermosel bei Perl, Sierf, Luxemburg bei Schengen, bis Metz u. Nancy, häufig bei Aachen, Eupen, Verviers bis Pepinster, Jülich, zw. Eöln u. Mühlheim, Coblenz, Nassau bei Winkel u. dch. d. g. Moselthal bei Moselweiß, Cobern bis Cochem u. in d. Lombardei. 6—7. 4

5. *S. Neesii* Wirtgen. K. syn. An Bach- u. Fluß- ufern, Rheing., Bodensee zw. Criskirch u. Friedrichshafen, Mittelrhein in Weidengebüsch an d. Kette hinter d. Chaufseehaufe gegen Neuwied über, Coblenz im Sieghausthale, Ehrenbreitstein, an d. Bahn oberhalb Niederlahnstein, Balduinstein, Düsseldorf am Rheinufer, dann in Böhmen bei Prag u. Salzburg bei Mondsee. 7—9. 4

6. *S. Scopolii* Hoppe. K. syn. *S. glandulosa* W. et Kit. Rehb. exc. *S. auriculata* Scopol. *S. Scorodonia* Host. Hoppe. Gebüsch d. Boralpen u. in Gebirgswäldern, stchw. Schlesien; Mähren, Steyermark, Kärnthen, Krain, Littoral, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. ☉

7. *S. Scorodonia* L. Rehb. exc. Nasse Orte im übllichsten Geb., Piemont, um Nizza. 6—7. 4

8. *S. betonicaefolia* L. Rehb. exc. *S. grandidentata* Tenore. Piemont. Nizza. 6—7. 4

9. *S. laciniata* W. et Kit. Rehb. exc. *S. lucida* M. v. Bieb. Kalkalpen im südl. Geb., Croatien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. 4

10. *S. lucida* L. Rehb. exc. *S. glauca* Host. *S. filicifolia* Sibth. Sandige Orte im südl. Eittoral, Dalmatien, Piemont, Nizza. 6—7. 4

11. *S. canina* L. K. syn. *S. atropurpurea* Moretti. *Ruta canina* Clus. Gebirgsstellen, Felsen u. im Riese d. Flüsse, stchw. dch. d. Geb., Rheing., v. d. Schweiz am Rheinufer entlang bis Mannheim, Freiburg, Breisach, Kehl, Rastatt, dch. Elsaß bis Speier, Langenkandel u. einzeln bis Neuwied; Schweiz, Tyrol, Destr. Kärnthen, Krain, Eittoral, Dalmatien, Istrien, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

12. *S. chrysanthemifolium* M. v. Bieb. Rehb. exc. *S. bicolor* Smith. Thäler im südl. Geb., Südtirol, Krain, Eittoral, Istrien, Triest, Oberitalien. 6—7. 4

13. *S. Hoppii* Koch. K. syn. *S. canina* β . et γ . DC. *S. canina* Hoppe Sieb. *S. canina* β . Wydler. *S. multifida* Willd. *S. juradensis* Schleicher. Alpenthäler mehr in d. südl. Kette u. auch da in d. Niederungen; Schweiz im Jura, Südtirol auf d. Schlehern, Steyermark, Kärnthen im Bogenenthal u. auf d. Loibl, Krain M. Maras, Eittoral, Istrien, Lombardei. 7—8. ☉ u. 4

14. *S. vernalis* L. K. syn. *S. vernalis* et *S. latifolia* Host. austr. Gebüsche, Hecken, Abhänge, Wege, stchw. dch. d. Geb., mehr im südl., Schwaben, Rheing., Pfalz in d. höchsten Gebirgswäldern, d. Vogesensandstein zw. Stürzelbrunn u. Eppenbrunn bei Bitsch u. Pirmasens, auf Acker am Glanufer bei Weisenheim Flora v. Trier, Luxemburg am Mont Calèvre, Belgien, Holstein, Sachsen bei Dresden, Baiern bis Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Steyermark, Galizien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 5—6. ☉

15. *S. peregrina* L. K. syn. *S. geminiflora* Lamk.

Cultivirte Orte, Wege, Schutt; am südl. Eittoral, Istrien u. Inseln, Beglia, Dalmatien, Croatien. 4—5. 4

Vierundachtzigste Ordnung.

Antirrhineen.

Juss. K. syn. 595. K. Taschb. 374. Personatae prs. Rchb. exc. p. 365.

573. *Gratiola* L. (II. 1.) Gnadenkraut. K. syn. Rchb. exc. p. 376. Comp. I. 1. p. 31.

1. *G. officinalis* L. K. syn. Feuchte Wiesen, Triften, Ufer, Gräben, stellw. dch. d. g. Geb., südl. bis in d. Lombardei u. nördl. am Weichselufer in Preußen, Rheing., v. Bodensee bis Köln, Rastatt, Mannheim, Speier, Coblenz, Deuß, in d. g. Moselthale, Luxemburg, Trier bis Coblenz, im Donau-, Neckar-, Main-, Nahe- u. Glanthalen u. 7—8. 4

574. *Digitalis* L. (XIV. 2.) Fingerhut. K. syn. Rchb. exc. p. 378. Comp. I. 2. p. 394.

1. *D. purpurea* L. K. syn. Gebirgswälder, schattige Abhänge, Gebüsche an Feld- u. Wegerändern, stellw. im Geb., von d. nördl. Grenze d. Schweiz dch. d. Vogesen u. Gebirge d. linken Rheinseite bis in d. Eifel u. Ardennen bis Aachen, auf d. rechten Rheinseite dch. d. Schwarzwald, Odenwald, Hessen bis z. Niederrheine, dch. Westphalen nach Hamburg u. Harz, Thüringerwald, Jena, im Süden nur in d. Lombardei u. sonst nicht im ganzen Destr. 6—8. ☉

2. *D. Thapsi* L. Rchb. exc. Steinige Gebirgsstellen im südl. Geb., in Savoyen. 6—7. ☉

3. *D. purpurascens* Roth. K. syn. *D. longiflora* Lej. *D. erubescens* R. Br. *D. purpureo-lutea* Meyer. Steinige, bewachsene Abhänge auf Porphyr- u. Mandelstein-, Trapp- u. Basaltgebirge in d. Rheingegenden, an d. Nahe u. d. Glan, Remigiusberg, Rummelsbacher Kopf bei Kusel unter *D. purpurea* u. *D. lutea*, bei Oberstein, Kirchenbollenbach,

Grünbach, Erzweiler, Oberkirch, Grumbach, Baumholder, Luxemburg bei Fölschette, Malmédy, Lüttich. 6—8. ☉

4. *D. grandiflora* Lamk. K. syn. *D. ambigua* Murr. *D. ochroleuca* Jacq. *D. lutea* Pollich. Var. α . *acutiflora*: *D. grandiflora* Rchb. exc. *D. ambigua* Sturm. *D. ochroleuca* Lindl. — β . *obtusiflora*: *D. ochroleuca* Rchb. exc. *D. ambigua* Lindl. Steinige Gebirgswälder, Abhänge bis in d. Alpen, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

5. *D. media* Roth. K. syn. *D. intermedia* Pers. *D. grandiflora* Host. *D. obtusata* Moench. *D. ambigua lutea* Meyer. Steinige, bewaldete oder mit Gesträuche bewachsene Abhänge im Porphyre Mandelstein- u. Trappgebirge im Rheingebiete, in d. Nahe- u. Glan- u. Slangegend, auf d. Remigiussberg, Trimbach bei Kusel, Niederalben, Erzweiler, Grünbach, Grumbach, Baumholder, Winterhauch bei Wieselbach, Oberstein, auf vulkanischem Boden d. Mayenfeldes bei Mayen Flora v. Coblenz, Belgien bei Berviers, Schweiz selten, in d. Thälern d. Juras u. wohl immer in Gesellschaft von *D. grandiflora* u. *D. lutea*, nach Host soll d. Pflanze auch in Ungarn wachsen. 7—8. ☉

6. *D. lutea* L. K. syn. *D. parviflora* Lamk. *D. acuta* Moench. Gebirgswälder, schattige Hügel, Felsen bis in d. Boralpen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., vom Elsaß nach d. Pfalz, d. Nahe-, Glan-, Saar- u. Moselgegenden bis an d. Maas bei Lüttich, Kreuznach bis Oberstein, Baumholder u., Trier, Luxemburg u. auf d. Mayenfeld bei Coblenz, von d. Schweiz dch. d. Schwarzwald, Oberschwaben, Obenwald, Baiern; Oestr. Südtirol bis in d. Lombardei, fehlt in Ost- u. Norddeutschland. 6—8. ☉

7. *D. micrantha* Roth. Rchb. exc. Südschweiz im Cant. Wallis. 6—7. 4

8. *D. fuscescens* W. et Kit. K. syn. *D. lanatolaevigato-ambigua* Meyer. Chl. hann. Gebirgswälder, Felsen im südl. Eitthal, Istrien bei Fiume, Croatien u. Ungarn. 7. ☉

9. *D. laevigata* W. et Kit. Steinige Hügel am südl.

Vittoral, Innerkrain, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Croatien. 7. ☉

10. *D. ferruginea* L. K. syn. Steinige Orte im südl. Geb., Destr. Krain, Vittoral, Istrien Fiume, Triaul, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Ungarn. 7—8. ☉

11. *D. lanata* Ehrh. W. et Kit. Rehb. exc. Weingärten, Gebüsche in Ungarn u. Siebenbürgen. 6. ☉

575. *Antirrhinum* L. (XIV. 2.) Löwenmaul.

K. syn. 598. Rehb. exc. p. 376. Comp. I. 2. p. 407.

1. *A. majus* L. K. syn. Alte Mauern, Flußkies, besonders im g. südl. u. im mittl. Geb., Rheing., stellw. von Basel längst d. Rheines bis in d. Niederlanden, im Rheinu. Moselthale; dch. g. Destr. bis in d. Lombardei. 6—8. 4

2. *A. latifolium* Mill. Rehb. exc. K. syn. *A. diffusum* Bernh. Felsen, Mauern in Piemont. 6—8. ☉ et 4

3. *A. Orontium* L. K. syn. *Orontium arvense* Pers. Aecker, Felder, Brachäcker, Schutt, stellw. dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

576. *Linaria Tournef.* Mill. (XIV. 2.) Leinfraut.

K. syn. 598. Rehb. exc. p. 373. Comp. I. 2. p. 400.

Erste Rotte. *Cymbalaria* DC. K. syn.

1. *L. Cymbalaria* Mill. K. syn. *Antirrhinum* — *L. Cymbalaria muralis* Fl. Wett. Felsen, Weinbergen, Mauern, besonders im g. südl. u. im westl. Geb., im nördl. seltener; Südschweiz, Rheing., stellw. am g. Rheine, abwärts v. Basel bis Köln, Heidelberg, Mannheim, Hagenau, Worms, Kreuznach, Boppard, Linz, Köln, Düsseldorf, Luxemburg u. fehlt in d. Pfalz u. an d. Mosel, Schwaben, Baiern, Hannover, Sachsen bei Leipzig, Dresden, Wittenberg, Jena. 6—8 4

2. *L. pilosa* Spreng. Maly enum. pl. austr. p. 198. *Antirrhinum pilosum* Host. Felsen, Mauern im südlichsten Vittoral, Dalmatien. 6—7. 4

3. *L. Elatine* Mill. K. syn. *Antirrhin.* — *L.* Aecker,

Brachfelder, besonders auf Lehm u. Kalk, stellw. dch. d. g. Geb. 7—10. ☉

4. *L. commutata* Bernh. K. syn. Aecker im südl. Vittoral, Istrien, Insel Brioni, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 8—9. ☉

5. *L. spuria* Mill. K. syn. Antirrhin. spurium L. Aecker, Brachfelder, an Wegen, auf Lehm- u. Kalkboden, stellw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., nördl. seltener, Hannover bei Göttingen u. in Schlesien. 7—8. ☉

6. *L. cirrhosa* Spreng. Maly enum. pl. austr. p. 198. Antirrhin. — sum Jacq. Host. Dalmatien auf d. Insel Pesina. 6—8. ☉

Zweite Rotte. *Chaenorhinum* DC. K. syn.

7. *L. minor* Desfont. K. syn. *L. viscida* Moench. Antirrhin. minus L. Cultivirte u. uncultivirte Orte, besonders auf Lehm- u. Kalkboden im g. Geb. 7—10. ☉

8. *L. littoralis* Bernh. K. syn. Im südl. Vittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Piemont. 6—7. ☉

Dritte Rotte. *Linariastrum* DC. K. syn.

9. *L. triphylla* Mill. K. syn. Antirrhin. — um L. Cultivirte u. uncultivirte Orte, Hügel, im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien u. Inseln, Lombardei bei Venedig. 6—7. ☉

10. *L. alpina* Mill. K. syn. Antirrhin. alpinum L. Steinige, kiesige Orte d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg bis ins südlichste Geb. mit d. Flüssen in d. Niederungen, Rheing., mit der Aach am Bodensee, Oberbadon auf d. Rheininseln bei Neuenburg u. mit d. Isar bei München. 7—8. ☉

11. *L. Pelisseriana* Mill. K. syn. Antirrhin. — *L. Var. β.* Antirrhin. gracile Pers. Steinige, uncultivirte Orte im südl. Vittoral, Istrien u. d. Inseln, Dalmatien, Lombardei, Pavia, Nizza. 5—6. ☉

12. *L. laxiflora* Desfontain. Walp. Rep. III. p. 216. Maly enum. pl. austr. p. 199. In Dalmatien. 6. ☉

13. *L. glauca* Willd. Rchb. exc. Antirrhin. — cum *L. Linaria maritima* DC. Acker am südlichsten Littoral, Lombardei, Piemont um Nizza. 5—6. ☉

14. *L. arvensis* Desfont. K. syn. *L. arvensis* α. Desf. Antirrhin. arvense Willd. Steinige, sandige Orte Felsen, Brachfelder, Acker, Felder, stellw. dch. d. Geb., Rheing., stellw. von Basel bis nach d. Niederlanden, in d. Neckar-, Main-, Nahe-, Glan-, Saar- u. Moselgegend, Trier bis Luxemburg u. dch. d. mittl. u. nördl. Geb., Schlesien, Preußen bei Thorn, Schwaben, Baiern, Thüringen, Sachsen, Hannover, Franken u.; Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Dalmatien bis in d. Lombardei. 7—8. ☉

15. *L. parviflora* Desfont. Maly enum. pl. austr. p. 199. Antirrhin. parviflorum Host. austr. II. p. 199. In Dalmatien auf d. Insel Lissa. 6—7. ☉

16. *L. simplex* DC. Fl. fr. K. syn. Antirrhin. — Willd. *A. parviflorum* Jacq. *A. arvense* β. Lin. Acker, stellw. besonders im südl. Geb., Rheing., Luxemburg bei Neuschateau, Belgien bei Lüttich, Schweiz um Pfungen bei Winterthur, Dalmatien Insel Lesina, Lombardei. 7—8. ☉

17. *L. striata* DC. Fl. fr. K. syn. *L. decumbens* Moench. Antirrhin. repens Smith. *A. repens* et *A. monspessulanum* L. *A. striatum* et *A. galioides* Lamk. Var. β. *A. purpureum* Schkr. *L. striata* Hornem. Sonnige, unbebaute Hügel, stellw. im Geb., Rheing., Oberelsaß bei Siegersheim, im St. Amarinthale bei Wesserling, Wildenstein, Geishausen, Luxemburg bei Ufeldang. Belgien bei Maastrich, Preußen Westerplatte bei Danzig, Memel; Schweiz im Cant. Waadt, Dalmatien u. in d. Lombardei. 7—8. 4

18. *L. chalepensis* Mill. K. syn. *L. alba* Moench. Antirrhin. album Lamk. *A. chalepense* L. Steinige Orte im südl. Littoral, Istrien, Fiume, Insel Veglia, Cherso, Dalmatien, Lombardei, Verona. 5—6. 4

19. *L. supina* Desf. Rchb. exc. Antirrhin. supinum L. Triften im südlichsten Geb., am Po bei Pavia, Novarese. 5—7. ☉

20. *L. Loeselii* Schweigg. et Koert. *L. maritima* Loesl. Rchb. exc. *L. juncea* Rchb. pl. crit. *L. odora* Cavann. Antirrhin. odoratum M. v. Bieb. *A. odoratissimum* Gölldenstern. *A. linifolium* Lin.? Sandige Küste d. Ostsee, Kurische Nehrung in Preußen, Pommern, Dämme bei Danzig bis Pillau, Königsberg. 6—7. 4

21. *L. genistifolia* Mill. K. syn. Antirrhin. — *lium* L. Var. β . *L. chloraefolia* Rchb. exc. Sonnige Hügel, stellenw. besonders im südl. Geb., Sachsen im Erzgebirge am Schlosse Bieberstein; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Lombardei, Piemont. 7—8. 4

22. *L. italica* Treviran. K. syn. *L. genistifolia* DC. Fl. fr. *L. angustifolia* Rchb. exc. *L. paniculata* Vest. *L. linifolia* Rochel ban. Antirrhin. *genistifolium* Vill. delph. Var. *A. pallidiflorum* Lamk. *A. Bauhini* Gaud. *A. angustissimum* Loisl. Sonnige, steinige Orte im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis im Vispachthale bei Stalden u. im Saßthale, Südtirol bei Bolzen, Steyermark bei Marburg, Galizien, Ungarn, Lombardei, Piemont. 7—9. 4

23. *L. dalmatica* Mill. Rchb. exc. Antirrhin. — *cum* L. In Dalmatien, Siebenbürgen. 7—8. 4

24. *L. vulgaris* Mill. K. syn. Antirrhin. *Linaria* L. Var. *Peloria Linariae vulgaris*. Uncultivirte Orte, Raine, Wege, Brachfelder u. im g. Geb. 7—9. 4

577. *Anarrhinum* Desfontain. (XIV. 2.) Lochschlund. K. syn. 602. Rchb. exc. p. 373. Comp. I. 2. p. 408.

1. *A. bellidifolium* Desf. K. syn. Antirrhin. — *L.* Sonnige Gebirgsstellen, Felsen, Abhänge des bunten Sandsteins u. Thonschiefer, an d. Mosel u. Saar in d. Umgegend v. Trier, Steinhäuschen bei Pallien, am Rockelsberg, Grünsberg, im Ruwertal bei Waldrach, bei Lawern, Kernscheid, Hammer-Fahr, nicht bei Berncastel, Schweiz bei Genf, Lombardei bei Mailand. 7—8. 4

578. *Erinus* L. (XIV. 2.) Leberbalsam. K. syn. 602. Rchb. exc. p. 373. Comp. I. 2. p. 400.

1. *E. alpinus* L. K. syn. Steinige, grasige Orte d. Alpen u. Hochgebirge, dch. d. Schweiz besonders im g. Jura, M. Chasseral, Weissenstein, Rheing., im Jurazuge bei Basel u. im südl. Elsaß, Boralberg bei Bregenz, Schwaben, Baiern; Südtirol, Destr. 6—7. 4

579. *Veronica* L. (II. 1.) Ehrenpreis. K. syn. K. syn. 603. Rchb. exc. p. 365. Comp. I. 1. p. 16.

Erste Rotte. *Chamaedrys* K. syn.

1. *V. scutellata* L. K. syn. Var. β . *pubescens*: *V. parvularia* Poit. et Tarp. Feuchte u. nasse Orte, Sümpfe, Gräben, Torfboden, dch. d. g. Geb. 6—9. 4

2. *V. Anagallis* L. K. syn. Var. β . *V. tenerrima* Schmidt. *V. aquatica* Bernh. — γ . *V. anagalloides* Gussoni. Stehende Wasser, Quellen, Gräben, Ufer, im g. Geb. Var. γ . in Dalmatien, Ungarn. 5—8. 4

3. *V. Beccabunga* L. K. syn. *V. limosa* Lej. Stehende Wasser, Gräben, Bäche, Ufer, im g. Geb. 5—8. 4

4. *V. urticaefolia* L. K. syn. *V. latifolia* Scopol. Wälder, Gebüsche d. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpen: Kette nach Schwaben, Baiern, Salzburg, Destr. 2c. u. mit d. Flüssen in d. Niederungen. 5—7. 4

5. *V. petraea* Baumgart. Rchb. exc. *V. Baumgartenii* R. et Sch. Felsen d. Alpen in Ungarn u. Siebenbürgen, M. Wartulo, Foti, Thekla 2c. 7—9. 4

6. *V. Chamaedrys* L. K. syn. Var. β . *pilosa*: *V. pilosa* Schmidt. *V. plicata* Pohl. — γ . *procerior*: *V. lamii-folia* Hayne. *V. divarigata* Tausch. Waldränder, Gebüsche, Wiesen, Raine, Wegeränder, dch. d. g. Geb. 4—5. 4

7. *V. montana* L. K. syn. Schattige, feuchte Laubwälder, Gebüsche, stellenw. dch. d. g. Geb., Schweiz selten, Rheing., v. Basel dch. Elsaß, Baden bei Ettlingen, Rastatt, Karlsruhe, im Obenwalde u. längst d. Bergstraße, Taunus,

Pfalz bis Zweibrücken, Kreuznach, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Mosel abwärts bis Coblenz, Eifel bis Aachen, Bonn, Düsseldorf u., Schwaben, Baiern, Thüringen, Franken, Sachsen, Hannover bis Preußen, Destr. u. 5—6. 4

8. *V. pyrenaica* Allion. pedm. Rechb. exc. *V. Allionii* Vill. delph. Triften d. Alpen im südlichsten Geb., Piemont. 7. 4

9. *V. officinalis* L. K. syn. Var. β . *V. Tournefortii* Schmidt. *V. Mülleriana* Vest. — γ . *V. Allionii* Schmidt. — δ . *V. spadana* Lej. — ϵ . *V. Froelichiana* Rechb. exc.? Wälder, Heiden, Triften, dch. d. g. Geb.; Var. β ., γ . u. ϵ . auf d. Alpen, δ . bei Limburg in Belgien. 6—7. 4

10. *V. aphylla* L. K. syn. *V. depauperata* W. et Kit. *V. subacaulis* Lamk. Steinige, grasige Orte d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. bis in d. Lombardei u. in Schlesien auf d. Babia Gora. 6—8. 4

11. *V. prostrata* L. K. syn. Wälder, sonnige Hügel, Triften, Heiden, Weinberge, stchw. dch. d. Geb., Rheing., dch. Elsaß bei Straßburg, Schwarzwald, Baden, Breisgau, Karlsruhe, Mannheim am Relaishaus, im Käferthal, Bergstraße bis Darmstadt, Frankfurt, Pfalz an d. Hardt, Dürkheim, Deidesheim, Callstadt, Grünstadt bis Obernheim, Mainz, Kreuznach, Trier bei Merzig, Perl, Luxemburg, fehlt am Niederrheine. Westphalen, Hamburg, Hannover, Sachsen, Harz, Berlin, Preußen u.; Destr. in fast allen Provinzen. 5—6. 4

12. *V. austriaca* L. K. syn. Var. α . *pinnatifida*: *V. austriaca* L. M. et K. Jacq. *V. polymorpha* Willd. Lk. *V. Jacquini* Schott. R. et Sch. var. *V. tenuifolia* M. v. Bieb. — β . *bipinnatifida*: *V. multifida* Lin. Jacq. *V. Teucrium multifida* Wallr. — γ . *V. pilocarpa* Link. *V. trichocarpa* R. et Schult. mant. Trockene Gebirgswiesen, grasige Hügel mehr im südl. Geb., Schwarzburg bei Frankenhausen, Baiern bei München, Schlesien; Destr. Steyermark, Krain, Littoral, Dalmatien, Ungarn u. 6—7. 4

13. *V. Schmidtii* R. et Sch. Comp. I. 1. p. 25.

V. austriaca α . *dentata* K. syn. *V. dentata* Schmidt. *V. dentata* et *V. Teucrium* Host. *V. latifolia* β . *heterophylla* Rochel ban. Grasige Gebirgsstellen, Sachsen bei Jena, Baiern, Schlessien bei Troppau; Destr. Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

14. *V. latifolia* L. K. syn. *V. Pseudo-Chamaedrys* Jacq. *V. Teucrium* β . Tratt. austr. Var. α . *major* Schrad. — β . *minor* Schrad. *V. Teucrium* Vahl. Schattige, trockene Orte, Waldränder, Abhänge, Raine, Wiesen, Begeränder, dch. b. g. Geb. 6—7. 4

Zweite Rotte. *Pseudo-Lysimachium* K. syn.

15. *V. spuria* L. K. syn. *V. paniculata* Lin. Var. α . *Schraderi* K. syn. *V. spuria* Schrad. — β . *laxiflora*: *V. spuria* Spreng. *V. laxiflora* Lej. — γ . *foliosa*: *V. foliosa* W. et Kit. *V. nitida* Ehrh. *V. brevifolia* M. v. B. — δ . *subcordata* K. Taschb. 381. *V. glabra* Ehrh. *V. grandis* Fisch. Schattige, grasige Orte, Gebüsche, stellw. im Geb., Rheing., Aachen bei Dolhain, Limburg u. bei Berviers in Belgien, Thüringen bei Halle; Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

16. *S. media* Schrader. Comp. I. 1. p. 16. Rchb. exc. *V. longifolia* Roth. *V. arguta* Schrad. Rchb. exc. Schattige Wiesen, stellw. im Geb., mehr im südl.; Sachsen; Belgien bei Berviers u.; Schlessien, Destr. Böhmen bis in d. Lombardei. 7—8. 4

17. *V. villosa* Schrader. Host. Fl. austr. Maly enum. pl. austr. p. 201. Wälder in Ungarn. 6—7. 4

18. *V. paludosa* Lej. Fl. Spa. Comp. Fl. germ. I. 1. p. 17. *V. crenulata* Hoffm. Rchb. exc. *V. carnea* Host. *V. spicata* β . *latifolia* K. syn. Sümpfe selten in Belgien bei Lüttich. 6—7. 4

19. *V. incana* W. et Kit. Maly enum. pl. austr. p. 201. *V. neglecta* Vahl. *V. pallens* Host., *V. canescens* Schrader. Grasige Gebirgswälder, Destr. Galizien, Ungarn. 7—8. 4

20. *V. longifolia* L. K. syn. Var. α . *cordifolia*: *V. longifolia* Schrad. *V. elatior et longifolia* Host. — β . *maritima*: *V. maritima* Schrader. Fl. Dan. *V. elata* Host. — γ . *inciso-serrata*: *V. maritima* Rchb. exc. *V. Hostii* Host. Fl. austr. *V. complicata* Hoffm. *V. grossa, acuta et ambigua* Mart. *V. persicifolia et V. azurea* Schott. *V. ciliaris* Hoffm. — ϵ . *V. quatrifolia* Schkr. — ζ . *glabra*: *V. glabra* Schrader. — η . *V. geniculata* Host. Feuchte Wiesen, an Ufern, Gräben, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Baden bei Pforzheim, Mannheim, von Straßburg bis Bingen, Speier, Worms, Oppenheim, Nierstein, Nassau bei Schierstein u., an d. Nahe u. d. Glan, Kreuznach, Meisenheim, Aachen bei Dolhain, Berviers in Belgien u.; Baiern, Schwaben, Franken, Thüringen, Sachsen bis Preußen bei Königsberg; Destr. Böhmen bis in d. Lombardei. 7—8. 4

21. *V. orchidea* Crantz. Rchb. exc. *V. cristata* Bernh. *V. hybrida* M. v. Bieb. *V. crassifolia* Kitaib. *V. spicata* ζ . *cristata* K. syn. Sonnige Waldhügel, mehr im südl. Geb., Rheing. im Nahe Thal bei Kreuznach auf d. Gans; Destr. Ungarn, Siebenbürgen. 7—9. 4

22. *V. spicata* L. K. syn. Var. α . *vulgaris*: *V. spicata* Auct. *V. Clusii* Schott. *V. squamosa* Presl. Rchb. exc. — β . *latifolia*: *V. hybrida* Lin. *V. australis* Schrad. — γ . *lancifolia*: *V. alternifolia et V. media* Lej. Fl. Spa. — δ . *nitens*: *V. nitens* Host, *V. Sternbergiana* Bernh. Host. ϵ . *setulosa*: *V. Barrelieri* Schott. — ζ . *arguta*: *V. arguta* Moretti *V. spicata* γ . Bertolon. Trockene, sonnige, besonders sandige Orte, Triften, Heiden, Sandfelder, Waldstellen, besonders in Nadelholzwäldern, Hügel, Abhänge u., stellw. dch. d. g. Geb., besonders im g. südl., Rheing., Oberbaden von Konstanz nach dem Breisgau, bei Waghäusel, Mannheim bis Frankfurt, Hanau, Würtemberg, Schweiz dch. d. Jura nach Elsaß, Pfalz u. Speier dch. d. Harbtgebirge bis Mainz, Nieberingelheim, Nahegegend bei Kreuznach, am Lemberg, Moselgegend u. im Urthale bei Bonn, Schwaben, Baiern, Franken, Thüringen, Sachsen, Hannover u.

nördl. nach Preußen, Königsberg, Rastenburg; Destr. in allen Provinzen. 7—8. 4

23. *V. Ticiniensis* Pollini. Bertol. Fl. ital. Maly enum. pl. austr. p. 201 et 386. *V. Hostii* Moretti. Sümpfe im südl. Geb., Ungarn, Lombardei. 6—7. 4

24. *V. Bachofenii* Heuffel. Fl. 1835. Comp. II. in add. p. 745. Felsen d. Alpen, Ungarn im Banat an d. Hercules-Bädern, Siebenbürgen. 7—8. 4

25. *V. crassifolia* Wierzb. Comp. II. in addent p. 745. *V. spicata* var. DC. Kalkfelsen im Banat a. d. M. Szimon. 7—8. 4

Dritte Rotte. *Veronicastrum*. K. syn.

26. *V. bellidioides* L. K. syn. Grasige, steinige Orte d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. Tyrol u.; Schlesien; Böhmen u. in d. Sudeten. 7—8. 4

27. *V. fruticulosa* L. K. syn. *V. frutescens* Scop. Grasige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. Tyrol u. 7—8. 4

28. *V. saturejoides* Visian. Fl. Dalm. Maly ennm. pl. austr. in add. p. 411. Steinige Orte d. Alpen im südl. Littoral; Dalmatien auf d. M. Dinara u. M. Prologh. 7—8. 5

29. *V. saxatilis* L. K. syn. *V. fruticulosa* Fl. Dan. Felsige, grasige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. Tyrol u., Rheing. in d. Vogesen auf d. Felchen, Hohenack u. in Oberbaden auf d. Felsberg. 7—8. 4

30. *V. alpina* L. K. syn. *V. integrifolia* et *rotundifolia* Schrank, *V. Gebhardiana* Vest. *V. pumila* Allioni, *V. pygmaea* Schkr. *V. grandifolia* Vest. Grasige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Tyrol u., u. auf d. Sudeten in Schlesien, Böhmen u. Mähren. 7—8. 4

31. *V. serpyllifolia* L. K. syn. *V. neglecta*

Schmidt, *V. tenella* Allion. Naöte Stellen auf Wiesen, Heiden, Triften, feuchte Brachfelder, Haine, Wald: u. We: geränder im g. Geb. 4—9. 4

32. *V. acinifolia* L. K. syn. Saatäcker, Felder, stellw. im Geb., Rheing. v. Basel bch. Oberelsaß bei Holz: heim, Darlisheim, Straßburg, Oberbaden bei Mühlheim, Karlsruhe, zw. Wiesloch u. Heidelberg, Bingen, gegenüber auf Kleeäckern, um Rudesheim, bei Leimen an d. Bürger: mühle, Nahegegend bei Kreuznach; Schweiz bei Zürich u. im Rhonethal; Destr. Steyermark, Littoral Istrien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig. 4—5. ☉

33. *V. arvensis* L. K. syn. *V. polyanthos* Thuill. *V. nana* Lamk. *V. Bellardi* Allioni, *V. romana* Schmidt bohm. Cultivirte u. uncultivirte Orte, Aecker, Brachfelder, Haine 2c. bch. d. g. Geb. 3—4. ☉

34. *V. peregrina* L. K. syn. *V. romana* L. mant. Pohl. *V. carnosula* Lamk. *V. caroliniana* Walt. Cultivirte Orte; stellw. im Geb., Hamburg am Wege nach Flottbeck bei d. hohen Luft; Friesland, Böhmen, Siebenbürgen; Holz: land bei Gröningen. 4—5. ☉

35. *V. verna* L. K. syn. *V. Dillenii* Crantz, *V. pin: natifida* Lamk. Var. β . *V. Bellardi* Wulf. — γ . *V. suc: sulenta* Allion. pedm. — γ . *polygonoides* Lamk. Unfrucht: bare Sandfelder, Brachäcker, Triften, Heiden, Waldstellen, Nadelholzwälder, Felsen, Haine, stellw. bch. d. g. Geb., Rheing. zw. Mannheim u. Schwetzingen, Bergstraße bis Hanau, nach Nassau, Pfalz, Mainz, an d. Nahe, Saar u. Mosel, Kreuznach, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Coblenz, Mayenfeld, Flora v. Bonn auf d. Roderberg 2c. 4—5. ☉

36. *V. triphyllus* L. K. syn. *V. romana* All. pedm. Sandige Aecker, Felder, Brachfelder, bch. d. g. Geb. 3—5. ☉

37. *V. praecox* Allioni K. syn. *V. romana* Scopol. *V. acinifolia* Thuill. Aecker, Brachfelder, stellw. bch. d. g. Geb., Rheing. bch. Elsaß, v. Bodensee bch. Baden, Mann: heim, Pfalz, Hardtgegend, Frankenthal, Worms bis Mainz, Nassau, Coblenz, Bonn, Köln bei Deuß, Düsseldorf, Nahegegend,

Kreuznach bis Baumholder, Trier, Luxemburg u., Schwaben, Baiern, Thüringen, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren bis in d. Eittoral. 3—5. ☉

Vierte Rotte. *Alsinoïdes* K. syn.

38. *V. agrestis* L. K. syn. *V. pulchella* Bast. Gusson *V. versicolor* Fries. *V. didyma* Tenore. Aecker u. cultivirte Orte dch. d. g. Geb. 3—10. ☉

39. *V. polita* Fries. Rchb. exc. K. syn. *V. didyma* K. syn. edit. I. Var. β . *V. calycida* Fries. Aecker u. cultivirte Orte dch. d. g. Geb., besonders in d. Rheingegenden. 3—11. ☉

40. *V. opaca* Fries. Rchb. icon. K. syn. *V. agrestis* var. DC. Aecker, cultivirte Orte, stchw. dch. d. Geb., mehr im nördl. u. mittl., Rheing. an vielen Orten, doch seltener als vorige, auch in Destr. u. Lombardei. 3—5. ☉

41. *V. Buxbaumii* Tenore K. syn. *V. hospida* M. et K. *V. persica* Poir. *V. Tournesortii* Gmel bad. *V. filiformis* DC. *V. cymbalariaefolia* Schmidt. Aecker, cultivirte Orte, Weinberge, stchw. dch. d. g. Geb., besonders im g. südl., Schweiz; Schwaben, Baiern, Sachsen, Destr. u., Rheing., Elsaß, Basel, Mühlheim, Rastatt, Karlsruhe, Schwegingen, Mannheim, Weßlar, Biberich, Coblenz bei Saach, Neuwied, Düsseldorf, Elberfeld, Trier, Jülich bei Aachen u. 4—5. ☉

42. *V. hедераefolia* L. K. syn. *V. triloba* Opitz. Var. β . *V. Lappago* Schrank. Aecker, Brachfelder, Wege, Raine u. im g. Geb. 3—5. ☉

43. *V. Cymbalaria* Bodard. K. syn. *V. cymbalariaefolia* Vahl. *V. hедераefolia* β . Lin. *V. panormitana* Gusson. Cultivirte Orte, alte Feldmauern, im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Dalmatien bei Spalato; Lombardei, Venedig, Oberitalien. 3—4. ☉

580. *Paederota* L. (II. 1.) *Paederote*. K. syn.

611. Rchb. exc. p. 372. Comp. I. 1. p. 30.

1. *P. Bonarota* L. K. syn. *P. caerulea* L. *P. cha-*

maedryfolia Suffren. *Wulfenia* Bonarota Smith. *W. chamaedryfolia* Host. Var. *P. Bonarota* β . Bertolon. *P. chamaedryfolia* Brignol. Felsenspalten, besonders in d. Kalkalpen d. südl. Bugeß; Steyermark an d. Sulzbacher Alpe, Südkärnthen, Südtirol M. Schlehren, Kirchbaumer Alpe, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 6—7. 4

3. *P. Ageria* L. K. syn. *P. lutea* Host. *P. urticaefolia* Brignol. *P. Bonarota* Jacq. *Bonarota chamaedryfolia* Scopol. *Wulfenia Ageria* Smith. *W. lutea* L. fil. *P. Ageria* β . Bertolon. Var. β . *P. Zannichelli* Brignoli. Felsen d. Gebirge u. Alpen im südl. Geb., Steyermark an d. Sulzbacher Alpe, Kärnthen, Südtirol, Krain an d. Steiner u. Wocheiner Alpen, Fria um Görz, Littoral Istrien, Canziano bei Triest, Lombardei, Venedig u. 6—7. 4

581. *Wulfenia* Jacq. (II. 1.) *Wulfenie*. K. syn.

612. Rehb. exc. p. 373. Comp. I. 1. p. 31.

1. *W. carinthiaca* Jacq. K. syn. *Paederota nudicaulis* Lamk. Fetter Boden d. Alpen in Oberkärnthen, auf d. Ruhweger Alpe bei d. Kapelle Hermagop. 7. 4

582. *Lindernia* L. (XIV. 2.) *Lindernie*. K. syn.

612. Rehb. exc. p. 385. Comp. I. 2. p. 409.

1. *L. pyxidaria* Allion. K. syn. *Capraria gratioloides* L. *Gratiola inundata* Kitaib. *Anagalloides procumbens* Krok. Rasse, schlammige, lehmige, im Winter überschwemmte Orte, Gräben, Pfützen, Ufer, stellenw. im Geb., Schweiz bei Genf, Basel bei Michelfelden, Rheing., Oberelsaß, Baden im Breisg. an d. Hansbüchern bei Hugstatten, bei Kehl, Karlsruhe bei Scheibenhardt, Mannheim bei Friedrichsfelden am rothen Loch, Pfalz bei Hagenau, Lauterburg, Baiern bei Regensburg, Wittenberg, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Kärnthen bei Klagenfurt, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Lombardei. 7—8. ☉

583. *Limosella* L. (XIV. 2.) *Sumpffraut*. K.

syn. 612. Rehb. exc. p. 387. Comp. I. 2. p. 410.

1. *L. aquatica* L. K. syn. Var. β . *caulescens* K. syn. *L. tenuifolia* Hoffm. Ueberschwemmt gewesene, nasse, sandige Orte, an Fluß-, Bach- u. Teichufern, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., dch. d. g. Rheinthal, an d. Nahe, Saar, Mosel bei Trier häufig u., bis ins südlichste u. nördl. Geb. 7—8. ☉

Fünfundachtzigste Ordnung.

Orobancheen.

Juss. K. syn. 612. K. Taschb. 384. Personatae pars Rchb. exc. p. 353.

584. *Orobanche* L. (XIV. 2.) Sommerwurz.
K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 430.

1. *O. cruenta* Bertolon. K. syn. Var. β . *O. gracilis* Smith. Rchb. exc. *O. vulgaris* Gaud. *O. caryophyllacea* Schultz. Beitr. 8. Grasige Orte, Wiesen auf *Hippocrepis comosa* u. *Lotus corniculatus* etc., besonders im südl. Geb. auf *Dorycnium herbaceum*; Schweiz gemein bei Bregenz u. Lindau, dch. Baiern, Isar-Inseln bei München, Regensburg bis in d. Boralpen nach Destr. Tyrol, Salzburg, Kärnten, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

2. *O. condensata* Moris. K. Deutl. Fl. IV. p. 433. Comp. I. 2. p. 432. Rchb. pl. crit. *O. foetida* Bivon. Grasige, schattige Orte auf d. Leguminosen, z. B. *Spartium*, *Genista* etc., im südl. Geb., Südtirol, Vittoral, Istrien bei Fiume, Croatien, Oberitalien. 5. 4

3. *O. foetida* Desfontain. Walp. Rep. III. p. 475. Maly enum. pl. austr. p. 208. In Dalmatien auf d. Insel Lesina. 5—6. 4

4. *O. Rapum* Thuill. K. syn. *O. major*. DC. Rchb. exc. et pl. crit. Trockene, lichte Waldstellen, Heiden, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Oberbaden M. Kniebis, auf d. Breitenberg, Vogesen bei Raon sur Plaine, Coblenz bei Saach, im Siebengebirge, Bonn, Köln, Düsseldorf, Opladen, Trier

in d. Eifel, Neuerburg, Wachsweiler, Schöneck, Birresborn, Berncastel an d. Mosel, Nassau; Destr. bei Wien, Böhmen, Lombardei. 5—6. 4

5. *O. procera* Koch. K. syn. Felder, besonders auf Kleeäcker auf *Cirsium arvense* in d. Rheing., Oberelsaß zw. Ruffach u. Pfaffenheim, Baden zw. Neckarau u. Mannheim, zw. Oppau u. d. Rheinschanze, dann in Mähren. 6. 4

6. *O. Scabiosae* Koch. K. syn. Triften d. Alpen auf *Scabiosa Columbaria*, Baiern, Destr. Tyrol, Berchtesgaden bei Isfer, Steyermark. 6. 4

7. *O. pruinosa* Lapeyrous K. syn. Rechb. pl. crit. Auf *Vicia Faba* mehr im südl. Geb., Schlesien am Gypfgraben bei Dirschel, Ettoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Croaticen. 6—7. 4

8. *O. Hyperici* Unger über d. Einfluß des Bodens p. 321. Comp. I. 2. p. 434. Auf *Hypericum dubium* in d. Tyroler Alpen am Geschöß. 6. 4

9. *O. platystigma* Rechb. exc. Alpen auf Leguminosen; Salzburg auf d. Trattberg, Ungarn im Banat. 6—7. 4

10. *O. pallidiflora* Wim. et Grab. K. syn. *O. speciosa* Dietr. DC. Auf *Cirsium arvense* stellw. im Geb., Sachsen bei Dresden, Schlesien, Frankfurt a. d. Ober; Destr. Steyermark, Tyrol. 6. 4

11. *O. Epithymum* DC. Fl. fr. K. syn. Rechb. icon. pl. crit. *O. rubra* Hooker Smith. Rechb. icon. *O. sparsiflora* Wallr. sched. Steinige Hügel, Heiden, Triften, lichte Waldstellen, sandige Brachfelder auf *Thymus Serpyllum*, *Origanum* u. sonstige Labiaten stellw. dch. d. g. Geb., Schweiz, Rheing., dch. Elsaß, Baden bis Mannheim, über Darmstadt bis Hanau, nach Nassau, Pfalz bis Mainz, Bingen, Boppard, Coblenz bis Bonn bei Obercassel, Rheg. von Kreuznach bis Oberstein u. Trier bei Merzig a. d. Saar; Württemberg, Baiern, Sachsen bei Dresden; Boralpen, Destr. Steyermark, Kärnthen, Dalmatien, Ungarn, Lombardei. 6—7. 4

12. *O. Galii* Duby. K. syn. *O. caryophyllacea* Smith. *O. vulgaris* DC. Fl. fr. *O. bipontina* Schultz. Beitr. *O.*

Galii, *O. strobiligena* et *O. laxiflora* Rchb. exc. et pl. crit. *O. vulgaris* Rchb. icon. *O. major* Pollich. Steinige Hügel, Waldränder, Felder, auf *Galium verum*, *G. Mollugo* u. anderen Pflanzen, stchw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

13. *O. Avellanae* Pfund. Flora. XXVI. p. 182. *Maly enum. pl. austr. p. 208.* Auf d. Wurzeln d. *Coryllus Avellana* in Böhmen bei Prag. 6. 4

14. *O. rubens* Wallr. K. syn. *O. elatior* Koch et Ziz. Rchb. pl. crit. *O. Medicaginis* Fr. W. Schultz. *O. Buekii* Dietr. *O. lutea* Baumgarten. Triften, Felder auf *Medicago falcata* u. *M. sativa* u. sonstige Leguminosen, stchw. dch. d. Geb., dch. d. g. Rheing. stchw. in d. Pfalz, an d. Nahe, Mosel u. Saar 2c. 5—6. 4

15. *O. atrorubeus* F. W. Schultz. Fl. d. Pfalz. *O. Teucris* F. W. Sch. K. syn. Steinige Orte d. Kalkgebirge, auf *Teucrium Chamaedrys*, *Thymus montanum*, *Serpyllum*, besonders in d. Rheing., Elsaß, bei Darlisheim, Bitsch, Saargemünd, Pfalz auf d. Harbtgebirge, Zweibrücken, Coblenz auf d. Hochstein bei Obermendig, Trier an d. Obermosel, oberhalb Tzel; Tyrol u. Salzburg. 6—7. 4

16. *O. stigmatodes* Wim. et Grab. K. syn. *O. confusa* F. W. Schultz. *O. elatior* Sutton. Uncultivirte Orte, Ackerländer, auf *Centaurea Scabiosa*, stchw. im Geb., Rheing., auf dem Muschelkalk im Elsaß bei Straßburg, Pfalz zw. Bitsch u. Zweibrücken, an d. Obermosel, Flora v. Trier bei Perl, Sierk u. Luxemburg, Schlessien an d. Gypsgrube bei Dirschel. 7—8. 4

17. *O. Kochii* F. W. Schultz. Flora. 1847. *O. stigmatodes pars* K. syn. *Maly enum. pl. austr. p. 209.* *O. amethystea* Maly. Felsige Orte, auf *Centaurea Scabiosa*, *Anthericum ramosum* u. anderen Pflanzen, in Steyermark auf d. Schloßberge bei Gräß. 7—8. 4

18. *O. variegata* Wallr. Rchb. exc. et pl. crit. VII. icon. f. 903—904. Auf *Spartium scoparium*, Tyrol bei Innsbruck. 6—7. 4

19. *O. loricata* Rchb. exc. p. 355. K. syn. *O. major*

Bull. *O. elatior* Schleich. Steinige Bergabhänge, auf *Artemisia campestris*, stellw. im Geb., Thüringen an d. Westerbergen bei Aschersleben u. Frankenhäusen; Südschweiz Cant. Wallis; Ungarn. 6. 4

20. *O. Picridis* F. W. Schultz. K. syn. *O. pallens* F. W. Sch. Fl. d. Pfalz. Steinige Felser, Raine, besonders auf Muschelfalk u. Gyps, auf *Picris hieracioides*, stellw. im Geb., Rheinpfalz bei Arzheim, Wolmesheim u. Göklingen, zw. Bitsch, Saargemünd u. Zweibrücken, Trier nahe an d. Mündung d. Sauer in d. Mosel oberhalb Tzel; Destr. Steyermark, Krain im Karstgebirge, 6. ☉

21. *O. flava* Martius K. syn. *O. Krausii* Dietr. Etwas feuchte Tristen auf *Tussilago nivea*; *Peucedanum Cervaria*, Labiaten u. anderen Pflanzen, stellw. im Geb., Baiern auf d. Isarauen bei München; Destr. Steyermark, auf d. Blabusch bei Gräß, Tyrol, Ungarn. 6. 4

22. *O. lucorum* Al. Braun. K. syn. *O. loricata* Rehb. icon. f. 918. Var. β . *Rubi* K. syn. Auf den Wurzeln von *Berberis vulgaris* et *Rubus*; Baiern bei München, Alpen bei Partenkirchen, Südtirol. 6—7. 4

23. *O. Salviae* F. W. Schultz. K. syn. *O. alpestris* F. W. Sch. ap. Kittel. Boralpen auf *Salvia glutinosa*. Stellw. im Geb. Baierrische Alpen zw. Lengries u. d. Glashütte, Ramsau in Berchtesgaden in Salzburg, Destr. bei Wien, Steyermark, Kärnthen. 6—7. 4

24. *O. Hederae* Vauch. Walp. Rep. III. *O. barbata* Poir. Rehb. exc. *O. minor* Bertolini. Bergabhänge auf *Hedera Helix*, besonders im südl. Geb. Rheing., Boppard, Coblenz am Ehrenbreitstein, an d. Burg Hammerstein; Siegburg auf Mauern Flora v. Bonn; Südtirol; Piemont. 6. 4

25. *O. minor* Sutton. K. syn. *O. apiculata* Wallr. Var. β . *O. nudiflora* Wallr. Rehb. exc. Kleeäcker auf *Trifolium pratense*, sativum etc., stellw. im Geb., besonders im südl., Rheing. bei Landau, Speyer, Rochusberg bei Bingen, Godesberg u. Muffendorf bei Bonn, Glanz u. Mosel-

gend, Meisenheim, Trier; Destr. bei Wien, Südtirol, Littoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Südschweiz Cant. Wallis u. Cant. Waadt. 6—7. ☉

26. *O. alsatica* F. W. Schultz. Fl. gall. et germ. exsicc. Löhr Fl. v. Trier. *O. brachisepala* F. W. Sch. Kalkhügel auf Peucedanum Cervaria in d. Rheing. im Elsaß, dann an d. Obermosel im Luxemburgischen bei Schengen u. weiter hinauf bis Metz u. Nancy. 6—7. 4

27. *O. amethystea* Thuill. K. syn. *O. Eryngii*. Duby. *O. elatior*. DC. *O. elatior* β . *microglossa* Wallr. Stellw. im Geb. auf Erynium campestre, besonders in d. Rheing., Oberbaden im Breisg. bei Freiburg, auf d. Roßberg bei Bingen, an Felsen d. Burgen Sternberg u. Liebenfels, Bonn bei Obercassel; Destr. Tyrol. 6—7. 4

28. *O. Buekiana* Koch. K. syn. *O. elatior* Dietr. *O. rubens* var. Walp. Rep. III. Auf Medicago sativa, in d. Neumark auf d. Cassow-Berg bei Frankfurt an d. Ober. 6. 4

29. *O. fragrans* Koch. K. syn. In Unterösterreich. 6. 4

30. *O. caerulescens* Stephan. K. syn. Rchb. pl. crit. Rießige Ufer auf Artemisia campestris, stellw. im Geb., Baiern bei Regensburg, Preußen, Westerplatte bei Danzig; Mähren, Destr. 6—7. 4

31. *O. crinita* Visian. Fl. Dalm. Maly enum. pl. austr. in add. p. 411. Dalmatien Insel Sesina. 4

32. *O. caerulea* Vill. K. syn. *O. laevis* Schkr. *O. purpurea* Jacq. austr. Auf Achillea Millefolium stellw. bch. d. Geb., Rheing. an vielen Orten bch. d. Rheinthal u. d. Nebenthäler u. 6—7. 4

33. *O. lavandulacea* Rchb. icon. VII. f. 935. Philippia — Visian. Fl. Dalm. Maly enum. pl. austr. in add. p. 411. Auf d. Wurzel d. Vicia Faba u. andern Pflanzen in Dalmatien. 4

34. *O. arenaria* Borkh. K. syn. *O. comosa* Wallr. *O. rubusta* Dietr. Auf Artemisia campestris stellw. bch.

d. Geb., Rheing. v. Basel nach Baden, Breisg. bei Heimbach, Fahr, Durlach, Wiesloch, Mannheim, Bergstraße, Elsaß bei Straßburg, Lauterbach, Pfalz Dürkheim, Callstadt, Grünstadt in d. Nadelholzwaldungen bei Mainz, Mombach, Heidesheim, Boppard, Coblenz auf d. Ehrenbreitstein, Winningen u. Hammersteinburg, Nahegegend bei Kreuznach Martinstein; Ostpreußen, dch. Baiern nach Regensburg etc.; Destr. Böhmen, Galizien, Ungarn, Tyrol, Dalmatien. 7—8. 4

35. *O. ramosa* L. K. syn. Auf d. Wurzeln v. *Cannabis*, *Nicotiana*, *Solanum nigrum* u. *Zea Mays* etc., stellw. dch. d. g. Geb., oft in großer Menge u. wieder große Strecken fehlend. 6—8. ☉

585. *Lathraea* L. (XIV. 2.) Schuppenwurz. K. syn. 620. Rchb. exc. p. 356. Comp. I. 2. p. 445.

1. *L. Squamaria* L. K. syn. *Squamaria Orobauche* Scopol. Auf Baumwurzeln, besonders auf *Coryllus Avelana*, *Alnus glutinosa* in schattigen Gebüsch, Wäldern, Ufern, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Bodensee bei Bregenz, Oberbaden bei Hülzingen, Roteln, Weißweil, Heidelberg am Haarlaß; Elsaß in d. Ruprechtsau, Rheinwaldungen Borheim bei Frankenthal, am Donnersberg, Nassau im Taunus, Nahegegend bei Kreuznach, Saargegend bei Saarbrücken, Trier an d. Mosel bei Berncastel, Luxemburg, Malmédy, Aachen, Eifel bei Blankenheim, Schwaben, Baiern, Franken, Sachsen, Thüringen, Hamburg bis Memel, Königsberg in Preußen etc., Destr. bis in d. Lombardei. 3—4. 4

Sechshundachtzigste Ordnung.

Bignoniaceen.

R. Brow. prodr. p. 326. Juss. Annal. d. Mus. 1804.

586 a. *Sesamum* L. (XIV. 2.) Sesam. Rchb. apud Moesl. II. B. p. 1010.

1. *S. orientale* L. Maly enum. pl. austr. p. 208.
Im südl. Littoral, Istrien, fast wüß bei Triest. 7. ☉

Siebenundachtzigste Ordnung. Rhinanthaceen.

DC. Fl. fr. K. syn. 620. K. Taschb. 390. Rchb.
Personat. prs. p. 357.

586b. *Tozzia* L. (XIV. 2.) *Tozzie*. K. syn. Rchb.
exc. Comp. I. 2. p. 430.

1. *T. alpina* L. K. syn. Schattige, feuchte Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz; u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern; Salzburg, Destr. bis in d. Lombardei; auf d. Sudeten u. v. d. Alpen herab in d. Niederungen am Bodensee u. Rheine. 7—8. 4

587. *Melampyrum* L. (XIV. 2.) *Nachtelweizen*.
K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 428.

1. *M. cristatum* L. K. syn. Trockene Waldwiesen, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

2. *M. arvense* L. K. syn. Saatäcker, Felder, besonders auf Kalk- u. Lehmboden, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

3. *M. barbatum* W. et Kit. K. syn. Saatäcker im südl. Geb., Destr. bei Wien, Mähren, Krain, Littoral, Istrien, Fiume, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 5—6. ☉

4. *M. nemorosum* L. K. syn. Wälder, Gebüsche, im g. nordöstlichen u. südl. Geb., fehlt in d. Rheing. 7—8. ☉

5. *M. pratense* L. K. syn. *M. vulgatum* Pers. *M. commutatum* Tausch. *M. sylvaticum* Sturm. Trockene, feuchte u. selbst torfhaltige Orte, Wälder, Gebüsche, Heiden, dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

6. *M. sylvaticum* L. K. syn. *M. alpestre* Pers. Wiesen, Triften, Gebüsche d. Boralpen, Schweiz u. dch. d.

g. Alpenkette nach Baiern, Schwaben; Destr. u., Rheing., auf d. Vogesen M. Hohenack, Oberbaden bei Billingen, auf d. Schwarzwalde bis z. Wildsee bei Seebach, auf Hornisgründen, oberhalb Baden-Baden; Thüringer-Wald, Harz, Schlesien in d. Sudeten, Böhmen. 7—8. ☉

7. *M. saxosum* Baumgarten. Rchb. exc. *M. sylvaticum* var. DC. Auf d. Alpe Robna, in Siebenbürgen M. Gottin. 7—9. ☉

588. *Pedicularis* L. (XIV. 2.) Käsekraut. K. syn. 621. Rchb. exc. p. 361. Comp. I. 2. p. 419.

1. *P. Jacquini* Koch. K. syn. *P. rostrata* Jacq. Feuchte Orte d. Alpen; v. d. Hochalpen Baierns nach Tyrol, Destr. Kärnthen, Steyermark, Krain, Vittoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardei, Benedig. 6—8. 4

2. *P. rostrata* L. K. syn. *P. caespitosa* Sieber Cent. Etwas feuchte, grasige Orte d. Hochalpen, Schweiz auf d. Grimsel, Gotthard, Simplon. Alpe Tolu in Tessin; Tyrol auf d. Zeilalp u. an d. Alpe im Sulbenthale, Alpe la Solem zw. Val de Sole u. Ulten, Salzburg, Lombardei u. Siebenbürgen 7—8. 4

3. *P. asplenifolia* Floerke. K. syn. Feuchte Orte d. höchsten Granitalpen, Tyrol Zillertal, Schlehen, Roskogel, Steyermark, Kärnthen, Heiligenbluter-Tauern, Salzburg auf d. Gubberg, Mauristhal, Rothhausberg, Krain u. Siebenbürgen. 7—8. 4

4. *P. Portenschlagii* Sauter. K. syn. *P. geminiflora* Portenschl. Feuchte, grasige Granitfelsen d. Hochalpen in Obersteiermark in d. Seckauer-Alpen, Rottenmanner-Tauern, Hohenschwab, Destr. 6—7. 4

5. *P. fasciculata* Bellard. K. syn. Rchb. exc. *P. gyroflexa* Gaud. helv. Alpen u. Voralpen in d. südlichsten Gebirgszüge; Schweiz Cant. Tessin M. Generoso, M. Genis, M. Famor, M. Calbège; über d. Wirthshaus Bracon in Tesino, Südtirol, Lombardei M. Baldo, Corni di Canzo bei Como. 7—8. 4

6. *P. gyroflexa* Vill. delph. t. 9. Rchb. exc. *P. cenisia* Gaud. Alpen im südlichsten Zuge; Combarbei am Seeufer d. M. Genis, Piemont. 7—8.

7. *P. tuberosa* L. K. syn. *P. gyroflexa* b. Vill. delph. *P. adscendens* Hoppe et Sternb. Schleicher. Var. β . pilosa: *P. sumana* Pollini. Feuchte Orte d. Hochalpen, Schweiz M. Grimsel, Gotthard; Gemmi, Simplon u. nach Destr., Tyrol an d. Kirschbaumer-Alp, Salzburg, Kärnthen, Krain, Siebenbürgen, Combarbei, Venedig, Oberitalien. 7—8. 4

8. *P. Barrelierii* Rchb. exc. K. syn. *P. adscendens* Gaud. helv. *P. tuberosa* β . Pollini. Kalkalpen, Schweiz zw. d. Alpenjochen d. Cant. Bern u. Wallis M. Gemmi, M. Ravnall u., Combarbei; Savoyen. 7—8. 4

9. *P. incarnata* Jacq. K. syn. Feuchte, grasige Felsen d. Alpen, Schweiz Cant. Wallis, M. Pennina bei St. Pierre, Valle d'Aost, Saffertal M. Moro, Nicolaital über Zermatten, Cant. Graubünden; Destr. Kärnthen, Steyermark, Salzburg auf d. Untersberg, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Combarbei. 7—8. 4

10. *P. atrorubeus* Schleicher. K. syn. Grasige Orte d. Hochalpen, Schweiz St. Bernhard nicht fern v. Kloster; M. Abula in Graubünden. 7—8. 4

11. *P. sylvatica* L. K. syn. Schlechte, moosige Wiesen, Heiden Torfmoore, feuchte Wälder, dch. d. g. Geb. 5—7. ☉ u. 4.

12. *P. palustris* L. K. syn. Sümpfe, sumpfige Wiesen, Heiden dch. d. g. Geb. 5—7. 4 u. ☉

13. *P. sudetica* Willd. K. syn. *P. incarnata* Krock. Masse, grasige Orte d. höheren Subeten, Schlesien, Böhmen, Mähren besonders in d. weißen Wiesen. 6—7. 4

14. *P. Friederici-Augusti* Tommasini. K. syn. Gebirgswiesen im südl. Littoral auf d. Slavonik zw. Krain u. Istrien, Dalmatien. 5. 4

15. *P. comosa* L. K. syn. Triften d. Alpen u. Vor-alpen in d. südl. Kette, Südtirol, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Combarbei, Venedig, Piemont M. Genis. 6—8. 4

16. *P. foliosa* L. K. syn. Rieselige, grasige Orte d. Alpen u. Boralpen, besonders auf Granit; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. Mähren bis in d. Kombardei u. in d. Vogesen auf d. Hohenack. 6—8. 4

17. *P. Hacquetii* Graf. K. syn. Alpen, Krain in d. Wocheiner-Alpen, M. Javernick u. Zhernaperst, Vittoral, Istrien auf d. M. Maggiore. 5. 4

18. *P. recutita* L. K. syn. *P. obsoleta* Crantz. Feuchte Wiesen, Triften, an Quellen d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. Tyrol bis in d. Kombardei u. nach Piemont zc. 7—8. 4

19. *P. P. rosea* Wulf. Jacq. K. syn. *P. hirsuta* Allion. Auf Wiesen, Triften, besonders auf Kalkalpen; Destr. M. Schneeberg, Steyermark M. Kalbing bei Admont, Tyrol a. d. Ruhwegeralp, Kärnthen, Vittoral, Istrien, Kombardei, Südschweiz, Savoyen in d. Novarese, Monte Moro, Turlo, Val d'Aost, M. Genis zc. 7—8. 4

20. *P. versicolor* Wahlenb. K. syn. *P. flammea* Wulf. Feuchte, kieselige Orte, Felsenspalten d. Alpen; Schweiz Berner-Alpen, M. Stockhorn, Neunenen, Luzern M. Pilatus u. dch. d. Alpenkette nach Baiern; Destr. Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Vittoral, Istrien, Galizien, Ungarn, Kombardei, Venedig, Piemont M. Genis. 6. 4

21. *P. acaulis* Scopoli. K. syn. Sonnige, feuchte Abhänge unter Gebüsch, nasse Wiesen, im südl. Geb., Südtirol bei Fione in Giudicarie, Krain v. Laibach bis z. M. Baldo, Vittoral, Istrien, Kombardei, Venedig. 4—5. 4

22. *P. verticillata* L. K. syn. Feuchte, grasige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette. 7—8. 4

23. *P. Sceptum Carolinum* L. K. syn. Sumpfige Torfwiesen im nördl. Geb., Ostpreußen bei Königsberg, Memel, Thorn zc., Neubrandenburg, Mecklenburg; sumpfige Triften d. Boralpen im südöstl. Geb., Oberbaiern bei Augsburg, München; Destr. Mähren, Galizien, Steyermark, Tyrol, Ungarn, Siebenbürgen. 6—8. 4

589. *Rhinanthus* L. (XIV. 2.) Klappertopf.

K. syn. 626. K. Taschb. 395. *Alectorolophus* Rehb. exc. p. 357. Comp. I. 2. p. 416.

1. *R. minor* Ehrh. K. syn. *R. Crista-galli* Pollich. Host. *R. Crista-galli* β . *minor* L. *Alect. parviflorus* Wallr. *Alect. minor*. Rehb. exc. Var. β . *fallax*: *Alect. minor* β . *fallax*. Wim. et Grab. — γ . *angustifolius*: *Alect. minor* β . Rehb. Rhin. *minor* β . *alpinus* Gaud. helv. Wiesen, dch. d. g. Geb. Var. γ . in d. Alpen. 5—6. ☉

2. *R. major* Ehrh. K. syn. *R. glaber* Lamk. *Alect. grandiflorus* Wallr. *Alect. major*. Rehb. exc. Var. β . *angustifolius* Fries. Wiesen, dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

3. *R. Alectorolophus* Pollich. K. syn. *R. Crista galli* γ . Lin. *R. villosus* Pers. *R. hirsutus* Lamk. *Alect. grandiflorus* β . *pubescens* Wallr. *Alect. hirsutus* Allion. Rehb. exc. *Mimulus Alectorolophus* Scopol. Ketter, Saatsfelder, stellw. dch. d. g. mittl. u. südl. Geb., im nördl. fast fehlend. 5—6. ☉

4. *R. Reichenbachii* Drejer. Fl. exc. hafn. K. syn. *R. major* Smith, *R. baccalis* Wallr. Fl. 1825. p. 504. *R. major* δ . *exaltatus* F. W. Schultz Fl. d. Pfalz p. 346. Wiesen im nördl. Geb. in d. Gegend von Hamburg. 6—7. ☉

5. *R. alpinus* Baumgarten K. syn. Var. β . *R. angustifolius* Gmel. bad. K. syn. edit. I. *R. Crista-galli* γ . *angustifolius* Gaud. helv. *Alectorol. serotinus* Schoenheit. Alpen, Boralpen, lichte Waldstellen, Waldwiesen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern nach Tyrol bis in d. Karpathen u. Sudeten; Var. β . Rheing. bei Basel, Oberbaden im Breisg. bei Freiburg am Schloßberge, Durlach, Wiesloch, Bergstraße, im Vogesensandsteine bis Sturzelbrunn, Bittsch, Trier auf d. Kyllgebirge, Sauergegend bei Naltingen, Echternach, Luxemburg, Coblenz am Rad bei Metternich, Narnedj bei Andernach; Unterharz u. 7—8. ☉

590. *Bartsia* L. (XIV. 2.) Bartie. K. syn. 627.

Rehb. exc. p. 360. Comp. I. 2. p. 416.

1. *B. alpina* L. K. syn. Riesige, feuchte, grasige Orte, Wiesen, Triften d. Alpen, Voralpen u. mit d. Flüssen in d. Niederungen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Schwaben; Oestr. bis in d. Lombardei u. in d. Subeten u. Karpathen; Rheing. Oberbaden im Breisg. auf d. Feldberg, Schwarzwald, Elsaß u. d. Vogesen auf d. Hohenack; im Frankenthale M. Kastelberg. 7—8. 4

591. *Trixago* Link. (XIV. 2.) *Trixage*. K. syn. 627. Rchb. exc. p. 360. Comp. I. 2. p. 416.

1. *T. latifolia* Rchb. exc. K. syn. *T. purpurea* Steven. *Bartsia latifolia* Smith. *Euphrasia* — Lin. Steinige Hügel, dürre Triften, im südl. Geb., Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Oberitalien. 4—5. ☉

2. *T. viscosa* Rchb. exc. *Bartsia* — L. *Lasiopera* — Link. Var. β . *Bartsia bicolor* DC. Rasse, sumpfige Orte am südlichsten Littoral, Dalmatien, Piemont um Nizza. 3—4. ☉

3. *T. apula* Rchb. exc. *Bartsia Trixago* Lamk. Host. *Rhinanthus Trixago* Lin. *Lasiopera rhinantina* Lk. et Hofmeg. Var. β . *versicolor*: *Rhinanthus versicolor* L. *Rhinanth. maximus* L. *Bellardia Trixago* Allion pedm. Trockene, steinige Orte im südlichsten Littoral, Dalmatien, Piemont um Nizza. 4—5. ☉

592. *Euphrasia* L. (XIV. 2.) *Augentrost*. K. syn. 627. Rchb. exc. p. 358. Comp. I. 2. p. 411.

Erste Rotte. *Euphrasia* K. syn.

1. *E. officinalis* L. K. syn. Var. α . *pratensis*: *E. pratensis* Rchb. exc. Fries. *E. Rostkowiana* Hayne — β . *neglecta* Wim. et Grabow. *E. nemorosa* β . *pectinata* Rchb. exc. — γ . *nemorosa*: *E. off.* β . *nemorosa* Pers. *E. stricta* Host. — δ . *alpestris*: *E. nemorosa* α . Rchb. exc. *E. offic. alpestris* Wim. et Grab. *E. caerulea* Tausch, *E. micrantha* Rchb. exc. Lichte, grasige Waldstellen, Haine, Gebüsche, Wiesen, dch. d. g. Geb. Var. δ . auf Alpen, Vor-

alpen u. höheren Gebirgen, Rheing. auf d. Porphyr d. Donnersberges, an d. Nahe bei Kreuznach u. auf vulkanischem Boden bei Coblenz auf d. Mayenfeld u. in d. Eifel. 7—8. ☉

2. *E. minima* Schleicher. K. syn. *E. pratensis* α. Rchb. exc. Wiesen, Triften d. Alpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette. 7—8. ☉

3. *E. salisburgensis* Funk. K. syn. *E. alpina* DC. Gaud. helv. *E. officinalis* var. Bertoloni. Wiesen, Triften d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. südl. Alpenkette nach Tyrol, Salzburg, Oestr. bis in d. Lombardei. 7—8. ☉

4. *E. tricuspidata* L. K. syn. Kalkgebirge u. Boralpen; Südtirol nördl. bis z. Eingänge v. Val di Non, Krain M. Balbo, Croatien, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

Zweite Rotte. *Odontites* Duby. K. syn.

5. *E. serotina* Lamk. K. syn. *E. Odontites* β. L. *Odontites serotina* Rchb. exc. *Bartsia* — Bertolon. Trockene Gebirgsstellen im südl. Geb., Südschweiz, Südtirol, Littoral, Istrien, Dalmatien Mont. Vellebit, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

6. *E. Odontites* L. K. syn. *Odontites verna* Rchb. exc. Var. β. *E. littoralis* Fries. *E. verna* Bellard. Feuchte Aecker u. auf im Winter überschwemmten Orten zc. im g. Geb. Var. β. an d. Nord- u. Ostsee. 6—10. ☉

7. *E. lutea* L. K. syn. *Odontites* — Rchb. exc. Var. β. *tenuifolia*: *E. tenuifolia* Lamk. Gebirgsabhänge, steinige Hügel, dürre Triften, besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., im nördl. bis Pommern; Rheing. vom Bodensee bei Bregenz nach Oberbaden bei Freiburg. Durlach, Schwellingen, Bergstraße, Elsaß bei Mutzig, Pfalz am Harbtgebirge, Mainz, Nassau. Nahe bei Laubenheim, Kreuznach, Saar bei Saarbrücken, Saargemünd, Coblenz, oberhalb d. Laubach, an d. Mosel auf d. Lauer-Lay bei Winnigen u. bei Gils; Schwaben, Baiern, Maingegend bis Thüringen, Jena, Sachsen bei Dresden zc. 7—8. ☉

8. *E. lanceolata* Koch. D. Fl. IV. *E. lutea* DC. *Odontites lanceolata* Rchb. exc. in add. p. 862. Felder im südlichsten Geb., Savoyen bei Chambery auf Weizenfeldern bei St. Jean d'Arvey, Val di Lanzo. 6. ☉

9. *E. viscosa* L. K. syn. *E. linifolia* β. L. *Odontites viscosa* Rchb. exc. Wiesen, Tristen, Waldstellen in d. südl. Kalkgebirgskette; Schweiz im mittl. Wallis, im Walde Finges bei Baron, M. Leitern, Lenk im Walde Salges; Lombardei, Venedig, Piemont. 7—8. ☉

Achtundachtzigste Ordnung.

Acanthaceen.

Juss. K. syn. 664. K. Taschb. 417. Personatae prs.

Rchb. exc. p. 364.

593. *Acanthus* L. (XIV. 2.) Bärenklau. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 387.

1. *A. mollis* L. K. syn. *A. sativus* Dod. Gräßige Felsen unter Gesträuchen im südl. Eittoral, Istrien bei Fiume, Dignano, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Verona. 5—7. 4

2. *A. longifolius* Host. K. syn. In Gebüschen am südl. Eittoral, Istrien Insel Scaglio degli Olivi im Hafen v. Pola, Dalmatien, Croatien. 7. 4

3. *A. spinulosus* Host. austr. II. 217. Maly enum. pl. austr. p. 207. Unter Gebüschen im südl. Eittoral. 7. 4

4. *A. spinosus* L. Rchb. exc. *A. sylvestris* Dod. Unter Gesträuchen im südl. Geb., Dalmatien, Ungarn im Banat. 6—7. 4

5. *A. spinosissimus* Desf. Rchb. exc. Host. austr. Paine, Gebüsche, im südl. Eittoral; Dalmatien bei Spalato, Croatien. 6—7. 4

Neunundachtzigste Ordnung.

Labiaten.

Juss. K. syn. 630. K. Taschb. 398. Rchb. exc. p. 306.

XIV. Cl. I. Ordn. Lin.

I. Gruppe. Ocymoideen Benh. K. Taschb. 398.

594. *Ocymum* L. (XIV. 2.) Basilienkraut. K. syn. K. Taschb.

1. *O. Basilicum* L. K. syn. Aus Indien, im g. Geb. cultivirt. 7—8. ☉

595. *Lavandula* L. Lavendel. K. syn. 631. Rchb. exc. p. 326. Comp. I. 2. p. 316.

1. *L. vera* DC. K. syn. *L. Spica* M. et K. *L. Spica* α. Lin. *L. angustifolia* Ehrh. *L. officinalis* Chaix. Trockene, uncultivirte Hügel, Felsen, besonders im südl. Geb., Rheing. im Naheethal auf d. Lavendelberge bei Laubenheim, zw. Bingen u. Kreuznach, Schwaben, Schweiz bei Bully zw. Murten u. d. Neuenburger-See; Südtirol bei Trient, Dalmatien, Lombard, Venedig, Piemont, Nizza u. 6—7. 4 u. 5

2. *L. Spica* DC. *L. latifolia* Ehrh. Rchb. exc. *L. Spica* β. Lin. Im südlichsten Geb., Lombard, auf d. Euganischen Hügeln u. in Piemont. 7—8. 5

3. *L. Stoechas* L. Rchb. exc. Sonnige Hügel am südlichsten Eittoral, Piemont bei Nizza. 7—8. 5

II. Gruppe. Menthoiden Benh. K. Taschb. 398.

596. *Elsholtzia* Willd. Elsholtzie. K. syn. 631. K. Taschb.

1. *E. cristata* Willd. K. syn. *Hyssopus ocymifolius* Lamk. *Mentha Patrini* Lepech. *M. ovata* Cavanill. Aecker, Felder im nördl. Geb., Hamburg bei Mitscher, Nienstädten, Oldenburg um Zeven, Stettin bei Hohenzaden u. Bölschendorf, Mecklenburg bei Neu-Strelitz. 7—8. ☉

597. *Mentha* L. Münze. K. syn. 631. Rchb. exc. p. 306. Comp. I. 2. p. 317.

1. *M. rotundifolia* L. K. syn. *M. macrostachya* Tenore, *M. rugosa* Lamk. Roth. *M. fragrans* Presl. *M.*

suaveolens Ehrh. An Gräben, Quellen, Ufern, feuchten Orten, stellenw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Rheing. dch. d. g. Rheinth. bis in d. Flora v. Spa, im Neckar-, Main-, Rahe-, Saar- u. Moselthal, Schwaben, Baiern, Thüringen, Halle; Böhmen, Steyermark, Tyrol, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

2. *M. sylvestris* L. K. syn. Var. α . vulgaris: *M. sylvestris* Willd. *M. hybrida* Schleicher. *M. villosa* Sole, *M. canescens* Roth. Rchb. exc. *M. candicans* Mill. *M. nemorosa* Becker. *M. sylvestr. nemorosa* Rchb. icon. *M. longifolia* Huds. *M. gratissima* Lej. — β . nemorosa: *M. nemorosa* Willd. *M. serotina* Tenore, *M. candicans* Opitz, *M. sylvestris* Becker, Sole, *M. sylvestris* δ . Smith, *M. reflexifolia* Opitz, *M. Halleri* Gmel. — γ . mollissima, *M. mollissima* Borkh. *M. sylvestris* α . mollissima Benth. *M. Chalepensis* Mill. *M. candicans* Crantz, *M. niliaca* Jacq. — δ . undulata: *M. undulata* Willd. Rchb. exc. *M. foliosa* Opitz, *M. crispa* Tenore, *M. tomentosa* Hornsch et Hoppe, *M. Lamarkii* Tenore — ϵ . glabra: *M. Rosani* Tenore, *M. Eisenstadtiana* Opitz. Uncultivirte, steinige Orte, an Wegen, Gräben, Ufern, Gebüschen, Wiesen u., im g. Geb. 7—8. 4

3. *M. piperita* L. K. syn. Rchb. exc. *M. Pimentum* Nees. Rchb. exc. Var. α . Langii: *M. Langii* Steudel, *M. pyramidalis* Tenore, *M. suavis* Gussoni. — β . officinalis: *M. glabrata* Vahl. Bachufer, etwas feuchte, bewachsene Orte, besonders im südl. Geb., Rheing., Oberbaden am Klemmbach bei Mühlheim, Coblenz bei Horchheim, Luxemburg bei Diekirch u. Tüel, Baiern in Wassergräben, Loberthal bei Michhofen unweit Regensburg; Tyrol bei Ruffstein, Dalmatien, Croatien, Lombardei. 7—8. 4

4. *M. viridis* L. Rchb. exc. *M. sylvestris* δ . glabrata K. syn. *M. Michellii* Tenore Rchb. exc. *M. grata* Host. *M. spicata* Crantz, *M. brevispicata* Lehm. Var. β . laevigata: *M. laevigata* Willd. Bachufer, unter Gesträuchen, Ufer, stellenw. dch. d. Geb. bis in d. Süden; Rheing.,

Oberbaden bei Mühlheim, Raftatt, Raftau bei Eltville, im Nahe- u. Glanthal, Kreuznach, Sobernheim, Meisenheim, Grünbach, Zweibrücken, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Mosel im Ehrenburger-Thale, Baiern, Sachsen, Thüringen 2c., Oestr. Böhmen, Krain, Dalmatien, Ungarn bis Venedig. 7—8. 4

5. *M. crispata* Schrader Rchb. exc. *M. sylvestris* ε. *crispata* K. syn. *M. hircynica* Röhl. *M. crispa* Roth. tent. Bachränder, feuchte Gräben, Gebüsche, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Pfalz bei Oppenheim, Raftau bei Ems, Rönigsstein 2c., Hasen bei Ehrenbreitenstein, Mosel aufwärts im Gondethal bei Winnigen, Kaiserslautern, Eifel bei Hilleshcim, Saarbrücken, Nahehal, Spabrück, Kronweiler, Winterburg, Westphalen, Harz 2c. 7—8. 4

6. *M. nepetoides* Lejeun. K. syn. *M. hirta* Willd. Rchb. exc. *M. pubescens* Willd. Rchb. exc. *M. aquatica-sylvestris* Meyer. Chlor. han. Gräben, Ufer, feuchte Gebüsche stchw. dch. d. Geb., Rheing., Heidelberg, Mannheim, Frankfurt a. M., im Nahe- u. Glanthal, Kreuznach bis Meisenheim, Trier, Coblenz 2c. im südl. Geb., in Dalmatien u. d. Lombardei. 7—8. 4

7. *M. balsamea* Willd. Rchb. exc. In Oberitalien. 7—8. 4

8. *M. aquatica* L. K. syn. *M. palustris* Mill. *M. hirsuta* Smith, *M. pedunculata* Pers. *M. criganifolium* Lejeun. Var. α. *hirsuta*: *M. hirsuta* L. *M. dubia* Vill. *M. riparia* Schreb. *M. hirsuta*, *intermedia* et *purpurea* Host. — β. *nemorosa*: *M. aquatica* L. Roth. — γ. *glabrata*: *M. citrata* Ehrh. Rchb. exc. *M. odorata* Sole. Rchb. exc. *M. stricta* Becker, *M. urticaefolia* Tenore, *M. glabra* Nees v. E. *M. adspersa* Moench., *M. nigricans* Mill. — δ. *subspicata*: *M. paludosa*, *palustris* et *rivalis* Sole. — ε. *crispa*: *M. crispa* Lin. An Flüssen, Bächen, Teichen, Ufern, Gräben, sumpfige Wiesen, dch. d. g. Geb. Var. γ. u. ε. nur stchw. 7—8. 4

9. *M. sativa* L. K. syn. *M. palustris* Mnch., *M. verticillata* Roth. Var. β. *glabra*. *M. rubra* Smith. *M. arven-*

sis *δ. rubra* Benth. *M. sativa* Agardhiana Fries — *γ. crispa-pilosa*: *M. dentata* Roth, *M. sativa* Tausch. — *δ. crispa-glabra*: *M. dentata* Moench. Rchb. exc. *M. cillata* Opitz. — *ε. parviflora*: *M. parviflora* Schultz. *M. austriaca* Jacq. *M. dalmatica* Tausch. Fluß- u. Bachufer, an Teichen, dch. d. g. Geb., die Var. *γ*, *δ* u. *ε*. nur stchw. dch. d. Geb. 7—8. 4

10. *M. gentilis* L. K. syn. Meyer, Sole, Smith. *M. pratensis* Sole, *M. gracilis* *γ*. Sm. *M. rubra* Huds. Rchb. exc. *M. dubia* Schreb. *M. Rothii* Nees v. E. Var. *β. acutifolia*: *M. acutifolia* Rabenhorst Sm. Rchb. exc. *M. verticillata* Mill. Fries, *M. hortensis* Tausch. — *γ. gracilis*: *M. gracilis* Smith. — *δ. crispa*: *M. pratensis* *β. crispa* Benth. Nasse, sumpfige Orte, Ufer, stchw. dch. d. Geb. 7—8. 4

11. *M. arvensis* L. K. syn. Benth. var. *δ. et ζ*. Var. *β. vulgaris*: *M. arvensis* *ζ*. Benth. *M. arvensis* Sole. *M. agrestis* Sole. — *β. glabriuscula*: *M. arvensis* *η*. Benth. *M. gracilis* *α*. Sm. *M. gracilis* Sole. *M. sativa* et *M. variegata* Sole. — *γ. glaberrima*: *M. praecox* Sole. menth. brit. *M. rubra* Smith herb. — *δ. diffusa* Lejeun. *M. decumbens* Thuill. — *ε. M. nummularia* Schreb. Früchte u. nasse Orte, Ufer, Gräben, Felder, Wald- u. Begeränder etc., im g. Geb. 7—8. 4

598. *Pulegium* Miller. Poley. K. syn 636. Rchb. exc. p. 311.

1. *P. vulgare* Mill. K. syn. *Mentha Pulegium* Lin. *M. simplex* Host. austr. Früchte u. sumpfige Orte, sumpfige Wiesen, Gräben, Triften, stchw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

599. *Lycopus* L. (II. 1.) Wolfssuß. K. syn. 636. Rchb. exc. p. 306. Comp. I. 1. p. 34.

1. *L. europaeus* L. K. syn. *L. aquaticus* Moench. *L. palustris* Lamk. Früchte, nasse u. sumpfige Orte, Gräben, Teiche, Ufer, Gebüsche, Feld- u. Wiesenränder dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *L. exaltatus* L. K. syn. Rasse, schattige Orte, besonders im südl. Geb., Rheing., Mainz an d. Main-Spiße bei Bischoffsheim u. Rostheim; Eurenburg bei Blachette; Böhmen an d. Elbe; Eittoral, Istrien am großen Teiche bei Capricia auf Veglia, Dalmatien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Pavia, Piemont u. 7—8. 4

III. Gruppe. Monardeen Benth. K. Taschb. 401.

600. *Rosmarinus* L. (II. 1.) Rosmarin. K. syn. 636. Rchb. exc. p. 316. Comp. I. 1. p. 36.

1. *R. officinalis* L. K. syn. Steinige, sonnige Hügel, im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Sitten, Montreux; Eittoral, Istrien bei Fiume, Piemont, Nizza u. 4—5. 3

601. *Salvia* L. (II. 1.) Salben. K. syn. 637. Rchb. exc. p. 332. Comp. I. 1. p. 36.

1. *S. hispanica* L. Rchb. exc. *S. tetragona* Mch. Im südlichsten Geb., Piemont, Ligurien bei Dneglia. 7—8. ☉

2. *S. Horminum* L. Rchb. exc. Gebirge, Felsen, im südl. Eittoral, Dalmatien u. Inseln d. adriatischen Meeres, Lombardei, Venedig u. 5—6. ☉

3. *S. viridis* L. Rchb. exc. Bewachsene Orte im südlichsten Eittoral, Dalmatien, Piemont, Ligurien bei Dneglia. 5—6. ☉

4. *S. Verbenaca* L. Rchb. exc. *S. clandestina* Thore. *S. micrantha* Desf. *S. praecox* Loisl. Grasige Orte im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Pavia, Venedig, Piemont, Genua, Nizza u. 6—8. 4

5. *S. clandestina* L. K. syn. Rchb. exc. *S. Verbenaca* Vahl. M. et K. *S. polymorpha* Link. *S. praecox* Savi, *S. elongata* Rchb. pl. crit. Var. β . *S. multifida* Sibth. Rchb. exc. *S. clandestina* Vahl. *S. Visiani* Spreng. Grasige Orte im südlichsten Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei u. 4—8. 4

6. *S. austriaca* L. K. syn. Rchb. exc. Grasige

Hügel, Ackerländer, im südl. Geb.; Destr. Mähren, Steyermark, Ungarn, Siebenbürgen 5—6. 4

7. *S. Aethiopis* L. K. syn. Rehb. exc. Uncultivirte Orte, Wege, Schutt, besonders im südl. Geb., Hessen am Meißner im Höllenthal bei d. Schlosse Bielfstein; Destr. Wien, Neustadt, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei, Piemont, Nizza. 6—7. ☉

8. *S. argentea* L. Walpers Rep. III. 15. Maly enum. pl. austr. p. 174—383. *S. patula* Desf. Brachfelder in Dalmatien. 6. 4

9. *S. Sclarea* L. K. syn. Rehb. exc. *S. Simsiana* R. et Sch. Grasige Hügel, an Wegen unter Gebüsch, besonders im südl. Geb., Rheing., Luxemburg bei Vianden u. Neuschateau, Flora v. Spa, Verviers bei Aachen, Schweiz Cant. Wallis im Rhonethal; Destr. Tyrol, Steyermark, Mähren, Krain, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Verona u. 6—7. 4

10. *S. glutinosa* L. K. syn. Rehb. exc. Wälder, Gebüsch d. Alpenthäler bis in d. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Schwaben, Tyrol, Destr. u. längst derselben nach Oberbaden, M. Kaiserstuhl, Schwaben bei Salem, Küssen bei Donaueschingen, Hohenkrähen bei Bodmann, Schlesien Landeck bei Hultschin u., Böhmen u. 6—7. 4

11. *S. verticillata* L. K. syn. Steinige Hügel, Wege, Feldränder, dch. d. mittl. u. dch. d. g. südl. Geb., Schweiz bis Bregenz, Rheing., Oberbaden bei Engen, Stockach, Billingen, Ettlingen, Carlsruhe, Mannheim im Käferthal, Weinheim, Forstfeld bei Lauterburg, Nassau bei Weilmünster, Höchst u., Hochspeier nach Kaiserslautern, Weßlar, Württemberg bis Mergentheim, Neckar bis Ladenburg, Oberbaiern, Sachsen, Thüringen, Jena, Schlesien; Preußen an d. Weichsel; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Krain u. bis in d. südlichste Littoral. 7—8. 4

12. *S. nutans* W. et Kit. Rehb. exc. *S. pendula* Bess. Grasige Hügel, Wiesen, Siebenbürgen, Ungarn u. Galizien. 5—6. 4

13. *S. betonicaefolia* Etling. Rehb. exc. *S. pendula* Vahl. Hügel, Weinberge in Siebenbürgen. 5—6. 4

14. *S. pratensis* L. K. syn. Hügel, Wiesen, Triften, Wegeränder u. im g. Geb. 5—6. 4

15. *S. variegata* W. et Kit. Rehb. exc. *S. pratensis* β . *variegata* Maly enum. pl. austr. Wiesen, in Destr. bei Wien, Ungarn im Banat. 5—6. 4

16. *S. viscosa* Jacq. Rehb. exc. Im südlichsten Geb., Lombardei auf d. Euganeen u. 6. 4

17. *S. sylvestris* L. K. syn. Rehb. exc. Var. β . *S. nemorosa* L. Rehb. exc. *S. elata* Host. Bewachsene Hügel, Feld- u. Wegeränder, stellenw. im Geb., Rheing., zw. Aachen u. Limburg, Offenbach bei Frankfurt, Nassau bei Weilmünster, Höchst u., Schwaben, Baiern, Thüringen, Jena, Aulhausen u. u. mit d. Eble nach Sachsen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Krain, Galizien. Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

18. *S. amplexicaulis* Lamk. Rehb. exc. in add. p. 860. *S. valentina* Vahl. Wälder, Ungarn im Banat bei Mehadia. 7. 4

19. *S. scabrida* Bertolon. Fl. ital. I. 855. Maly enum. pl. austr. p. 174 et 384. In der Lombardei bei Lecco. 4

20. *S. officinalis* L. K. syn. Felsen, Abhänge, im südl. Geb., Schweiz Cant. Tessin, Littoral. Istrien bei Fiume, Duino, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont, Nizza, Gartenpflanze auch verwildert. 6—7. 5

IV. Gruppe. Satureineen Benth. K. Taschb. 402.

602. *Origanum* L. Dosten. K. syn. 639. Rehb. exc. p. 313. Comp. I. 2. p. 325.

1. *O. vulgare* L. K. syn. Var. β . *megastachyum*. *O. vulgare* β . *prismaticum* Gaud. helv. *O. creticum* DC. Lin. herb. et β . Lin. spec. *O. monspeliense* Tabern. *O. megastachyum* et *O. macrostachyum* Link. *O. creticum* Hayne. *O. heracleoticum* Rehb. exc. non Lin. — γ . *virens*: *O. virens* Lk. et Hoffm. — δ . *O. thymiflorum* Rehb. exc.

O. stoloniferum Besser. Uncultivirte Orte, Raine, Wege, schattige Bergabhänge, Waldränder, Gebüſche, bch. d. g. Geb.; d. Variet. nur ſtellw., beſonders im ſüdl. Geb. 7—8. 4

2. *O. humile* Desf. Rehb. exc. Schweiz auf d. Jura M. Thuiry. 7—8. 4

3. *O. hirtum* Link. K. syn. *O. heracleoticum* L. non Rehb. exc. *O. creticum* Sieb. *O. smyrnaeum* Sm. Sonnige, uncultivirte Orte im ſüdl. Littoral, Iſtrien, Inſeln Veſſino Piccolo, Dſero, Dalmatien. 6—7. 4

4. *O. Onites* L. Maly enum. pl. austr. p. 174. *O. smyrnaeum* Lin. Host. *O. pallidum* Desf. *Majorana Onites* Benth. Comp. I. 2. p. 327. Im ſüdl. Littoral, Iſtrien, Dalmatien. 4

5. *O. Majorana* L. K. syn. *O. majoranoides* Willd. spec. *Majorana hortensis* Moench. Aus Afrika, im g. Geb. in Gärten angepflanzt. 7—8. ☉ et 4

603. *Thymus* L. Thymian. K. syn. 640. Rehb. exc. p. 312. Comp. I. 2. p. 327.

1. *T. vulgaris* L. K. syn. Var. β . *incanus*: *T. adscendens* Bernh. Steinige Hügel, Felſen im ſüdl. Littoral, Iſtrien, Dalmatien, Piemont, Nizza u., dann außerdem im Geb. in Gärten cultivirt. 5—6. ‡

2. *T. Serpyllum* L. K. syn. Var. α . *latifolius*: *T. Chamaedrys* Fries Rehb. exc. *T. Serpyllum* Pers. *T. Serpyllum* β . Lin. *T. Serpyllum*, *citriodorus*, *subcitratum* et *sylvestris* Schreb. *T. diffusus* Host. — β . *lanuginosus*: *T. lanuginosus* Schkr. *T. Serpyllum* γ . et δ . Lin. *T. citriodorus* L. — δ . *pulegioides*: *T. pulegioides* Lang. — ϵ . *angustifolius*: *T. angustifolius* Pers. *T. Serpyllum* Fries Rehb. exc. *T. reflexus* Lej. *T. arenarius* Bernh. *T. inodorus* Lej. *T. lanuginosus* Link. *T. spinulosus* Tenore. *T. nervosus* Gay. *T. ciliatus* Lamk. *T. humifusus* Bernh. Rehb. exc. Var. *T. sudeticus* et *T. serratus* Opitz. Uncultivirte Orte, Hügel, ſandige Heiden, Felder, Wege u. Walde

ränder, an Rainen, Dämmen, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 7—10. ‡

3. *T. pannonicus* All. pedm. Rehb. exc. K. syn. edit. I. p. 558. *T. Serpyllum* δ . *pannonicus* K. syn. edit. II. Var. β . *T. montanus* W. et Kit. — γ . *T. nummularius* M. v. Bieb. — δ . *T. collinus* M. v. Bieb. *T. Marschallianus* Willd. *T. glabrescens* Willd. *T. odoratissimus* M. v. Bieb. — ϵ . *T. lanuginosus* Miller. *T. hirsutus* M. v. Bieb. *T. austriacus* Bernh. Sonnige, steinige Orte, besonders dch. d. g. südl. Geb. bis in d. Boralpen; Sachsen, Schlessen; Destr. Böhmen, Mähren, Südtirol, Littoral, Istrien u., Südschweiz. 7—8. ‡

4. *T. Zygis* L. Maly enum. pl. austr. in add. p. 409. *T. acicularis* W. et Kit. *T. angustifolius* α . Rehb. exc. Sonnige Orte im südl. Littoral, Dalmatien, Croatien. 6—7 ‡

5. *T. bracteosus* Visiani in Benth. Comp. I. 2. p. 329. Im südl. Littoral, Dalmatien bei Spalato. 7—8. ‡

6. *T. capitatus* Link. Walp. Rep. III. p. 703. Maly enum. pl. austr. p. 175. *Satureja capitata* Lin. Bertol. fl. ital. Sonnige Felsen im südl. Littoral, Dalmatien. ‡

604. *Satureja* L. Pfefferkraut. K. syn. 641. Rehb. exc. p. 311. Comp. I. 2. p. 330.

1. *S. hortensis* L. K. syn. Flußfließ, Ufer im südl. Geb., Südtirol, Krain am Isonzo, Dalmatien, Lombardien, Venedig u., außerdem im Geb. angepflanzt u. verwildert. 7—10. ○

2. *S. rupestris* Wulfen. *S. thymifolia* Scopol. *Calamintha* — K. syn. (non Host.) *C. thymifolia* et *C. alba* Rehb. exc. *C. rupestris* Host. *Cuspidocarpus* — Nees v. E. *Melissa alba* W. et Kit. Sonnige Felsen im südl. Geb., Kärnten, Krain, bei Görz, Littoral, Istrien am Isonzo, Triest, Insel Cherso, Dalmatien, Venedig. 7—8. 4

3. *S. montana* L. K. syn. *Micromeria* — Rehb. exc. p. 311. Sonnige, steinige Gebirgsstellen im g. südl. Geb.,

Südtirol, Krain, Vittoral, Istrien &c, Piemont, Oberitalien.
7—8. ‡

4. *S. variegata* Host. K. syn. *Micromeria* — Rehb. exc. in add. p. 859. Sonnige, steinige Gebirgsstellen im südl. Vittoral, Krain, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Croatien. 7—8. ‡

5. *S. pygmaea* Sieber. K. syn. *Micromeria* — Rehb. exc. Sat. *subspicata* Visian. *S. illyrica* Host. austr. Felsen im südl. Vittoral, Krain, Istrien bei Fiume, Dalmatien. 7—8. ‡

6. *S. virgata* Visian. Fl. Dalm. Comp. I. 2. p. 331. *Micromeria spicata* Rehb. exc. p. 311. Sat. *fasciculata* Tausch. Felsige Orte im südl. Vittoral, Dalmatien bei Sebenico u. Venzia. 7—8. ‡

7. *S. Tymbra* L. Rehb. exc. *Thymus Tragoriganum* L. Satur. — Tausch. Steinige Hügel im südl. Vittoral, Dalmatien, Croatien, Piemont um Nizza. 6—7. ‡

605. *Micromeria* Benth. *Mifromerie*. K. syn.

642. Rehb. exc. p. 311. Comp. I. 2. p. 332.

1. *M. Juliana* Benth. K. syn. *Satureja* — Lin. Sonnige, steinige Orte im südl. Vittoral, Istrien Inseln Cherso u. Dsero, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Nizza. 7—8. 4

2. *M. graeca* Benth. K. syn. *Satureja* — L. *S. micrantha* Link et Hffg. *S. hirta* Host. Var. β . *longiflora*: Sat. *consentina* Tenore. Dürre Felsen im südl. Geb. Schweiz Cant. Tessin bei Gandria, Dalmatien bei Spalato, Piemont, Nizza. 7. 4

3. *M. parviflora* Rehb. exc. in add. p. 859. *M. tenuifolia* Rehb. exc. p. 311. Satur. *parviflora* Visian. *S. inodora* Host. austr. *S. tenuifolia* Tenore. Im südl. Geb., Dalmatien an d. Gebirgen bei Pastovich. 7. ‡

4. *M. approximata* Rehb. exc. in add. p. 859. Satur. — Bivona. *Thymus fruticulosus* Bertolon. Gebirgsstellen im Destr. Albanien bei d. Kloster Staniovidh. 9. ‡

5. *M. subcordata* Visian. in Benth. labiat. Comp. I.

2. p. 334. *Thymus subcordatus* Visian. Fl. Dalm. In Dalmatien. 8. 4

6. *M. Piperella* Beuth. Comp. I. 2. p. 335. *Calamintha* — *Rchb. exc.* p. 328. *Thymus* — *Lin.* *Allion.* *W. et Kit.* *Calamintha croatica* Host. Sonnige Kalkfelsen im südl. Eittoral, Dalmatien, Croatien a. d. Plissivicza, Piemont M. d'Ormeau. 6—7. 5

7. *M. Pulegium* Benth. Comp. I. 2. p. 335. *Calamintha subnuda* *Rchb. exc.* p. 329. *Calam. subnuda et organifolia* Host. *Melissa subnuda* *W. et Kit.* *Mel. Pulegium* Rochel Ban. *Thymus subnudus* Spreng. Kalkfelsen im südl. Geb., Krain, Croatien, Ungarn auf d. Urtayberg, Hercules-Bäder im Banat. 7. 4

8. *M. marifolia* Benth. Comp. I. 2. p. 335. *Calamintha cretica* *Rchb. exc.* p. 328. *Melissa* — *Lamk.* *M. fruticosa* *L.* *Thymus creticus* *DC.* *Th. marifolius* *Willd.* *Nepeta* — *lia* *Cavan.* *N. serpyllifolia* *M. v. B.* *N. incana* *Sieber.* Im südl. Geb., Piemont bei Lucerame. 7—8. 5

606. *Calamintha* Moench. meth. Calaminthe.

K. syn. 643. *K. Tasehb.* 405. *Rchb. exc.* p. 328.

1. *C. Acinos* Clairville. *K. syn.* *C. arvensis* *Lamk.* *Acinos thymoides* Moench. *Rchb. exc.* p. 327. *A. vulgaris* *Pers.* *Thymus Acinos* *L.* *Melissa* — *Beuth.* *Comp.* I. 2. p. 338. Trockene, uncultivirte Orte, sandige Hügel, Dämme, Ufer, Raine, Triften, Brachfelder u. d. g. Geb. 6—8. ☉

2. *C. alpina* *Lamk.* *K. syn.* *Acinos* — *Moench.* *Rchb. exc.* p. 327. *Thymus alpinus.* *L.* *Melissa* — *a.* *Benth.* *Comp.* I. 2. *Var. β.* *Acinos villosus* *Pers.* *Rchb. exc.* p. 327. Alpen u. Boralten mit d. Flüssen in d. Thäler hinab z. B. an d. Isar bei München, Schweiz u. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Salzburg, Oestr. mit d. Jura nach Oberelsaß u. 7—8. 4

3. *C. patavina* *Host.* *austr.* *Acinos* — *us.* *Pers.* *Rchb. exc.* p. 327. *Thymus* — *Jacq.* *Melissa* — *a.* *Benth.*

Comp. I. 2. Var. β . *Acinos rotundifolius* Pers. *Rechb. exc.*
 Sonnige Felsen d. Alpenthäler im südl. Geb. Dalmatien,
 Croatien, Siebenbürgen, Ungarn, Lombardei, Verona, Pie-
 mont. 7—8. ☉

4. *C. graveolens* Link. *enum. Melissa* — Benth.
 Comp. I. 2. p. 339. *Thymus* — M. v. B. *Th. exiguus*
Sibth. Th. canus Steven. *Acinos* — *Rechb. exc.* p. 327.
 In Siebenbürgen. 6—7. ☉

5. *C. grandiflora* Moench. K. syn. *Rechb. exc.*
C. montana β . Lamk. *Melissa grandiflora* L. *Thymus* —
 us. Scopol. Schattige Felsen d. Alpen. Boralpen u. Ge-
 birge, mehr in d. südl. Kette; Schweiz Cant. Bern, Monte
 Ganterich, im Simmenthal; Südtirol, Steyermark, Kärn-
 then, Krain, Vitoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lom-
 bardei; Piemont bei Eugano, Savoyen Col de Bonhomme,
 7—8. 4

6. *C. officinalis* Moench. K. syn. *C. montana* α .
 Lamk. *C. menthaefolia* Host. *C. umbrosa* *Rechb. exc.*
 (non M. v. Bieb.) *Thymus Calamintha* DC. *Melissa* —
 Lin. Waldwiesen, schattige Felsen, steinige, bewachsene Orte
 d. Gebirge u. Thäler im g. südl. u. mittlern Geb., Schweiz
 u. stchw. dch. d. g. Rheing, Oberbaden, Heidelberg, Schwe-
 zingen bis gegen Bonn, im Siebengebirge, Neckar-, Main-
 u. Rhathal, Moselthal v. Coblenz bis Trier, Luxemburg,
 Aachen bis Spa rc., Schwaben, Franken, Jena; Südtirol,
 Kärnthen, Steyermark bis in d. südl. Vitoral. 7—8. 4

7. *C. Nepeta* Clairv. Link. K. syn. *C. parviflora*
 Lamk. *C. trichotoma* Moench. *C. rotundifolia* Host. *C.*
obliqua Host. *Melissa Nepeta* L. *Thymus* — Smith. *Th.*
Calamintha Scopol. Var. β . *athonicus*: *Th. athonicus*
 Bernh. Sonnige Felsen, Mauern mehr im südl. Geb., Süd-
 schweiz v. Jura nach d. südl. Elßaß; Baiern, Stadtmauer
 bei Nürnberg, v. Regensburg am Schloßberge bei Stauf bis
 Destr. Steyermark, Salzburg. Tyrol, Vitoral, Istrien, bei
 Triest, Krain, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Verona, Pie-
 mont. 7—8. 4

8. *C. thymifolia* Host. non Reichb. *Melissa thymifolia* Walp. Rep. III. 727. Sonnige Felsen im südlichsten Geb., Dalmatien, Venedig. 7—8. 4

607. *Clinopodium* L. Wirbelborste. K. syn.

644. Rechb. exc. p. 328. Comp. I. 2. p. 339.

1. *Cl. vulgare* L. K. syn. *Cl. aegyptiacum* Lamk. *Melissa Clinopodium* Benth. Var. β . *Cl. plumosum* Sieber. Rechb. exc. Richte Waldstellen, Zäunen, Hecken, Wiesen u. Ufergränder u. dgl. d. g. Geb. Var. β . in Dalmatien bei Spalato. 7—8. 4

V. Gruppe. Melissineen Benth. K. Taschb. 405.

608. *Melissa* L. Melisse. K. syn. 645. Rechb. exc. p. 329. Comp. I. 2. p. 340.

1. *M. officinalis* L. K. syn. Var. β . *villosa* Benth. *M. graveolens* Host. austr. *M. romana* Miller. *M. hirsuta* Hornem. *M. cordifolia* Pers. *M. altissima* Sibth. Gebirgswälder, an Zäunen im südl. Geb., Südschweiz; Rheing. Unterelsaß bei Ingelsheim im Weinberge, Flora v. Erier im Sauerthale bei Amelbingen, Luxemburg bei Isel; Destr. Steyermark, Südtirol, Vitorral, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Lombardien, Venedig, Gartenpflanze u. verwildert. 7—8. 4

609. *Horminum* L. Drachenmaul. K. syn. 645.

Rechb. exc. p. 330. Comp. I. 2. p. 324.

1. *H. pyrenaicum* L. K. syn. *Melissa* — ca. Jacq. Sonnige, grasige Orte d. Alpen u. Boralpen, in d. südl. Kette; Südschweiz Cant. Graubünden, Wormserjoch, M. Umbrail, Cant. Tessin M. Salbege; Südtirol M. Schlehen, Salzburg im Kalkboden auf Saatkäfern, Krain auf d. Suchalpe, Lombardien, Venedig. 7—8. 4

610. *Hyssopus* L. Isop. K. syn. 645. Rechb. exc. p. 316. Comp. I. 2. p. 332.

1. *H. officinalis* L. K. syn. Sonnige, steinige Orte dch. d. g. südl. Geb., im mittleren stellw. verwildert, auch angepflanzt; Schweiz Cant. Wallis bei Leuk; Destr. Südtirol bei Novoredo, Steyermark, Vittoral, Istrien, Siebenbürgen, Dalmatien bis in d. Lombardei nach Venedig zc. 7—8. 4

VI. Gruppe. *Nepeteen* Benth. K. Taschb. 406.

611. *Nepeta* L. Katzenmünze. K. syn. 645. Rchb. exc. p. 316. Comp. I. 2. p. 346.

1. *N. Cataria* L. K. syn. *N. vulgaris* Lamk. Var. β . *N. citriodora* Becker. Steinige Orte, Schutt, Mauern, Bäume, an Wegen, auf Triften, stellw. dch. d. g. Geb. 6—8. 4

2. *N. Nepetella* L. K. syn. *N. austriaca* Host. *N. amethystina* Poir. *N. paniculata* Miller. Sonnige Thäler am Fuße d. Alpen im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis im Tormanche-Thal u. am Matterhorn; Lombardei, Unteröstr. 7—8. 4

3. *N. graveolens* Vill. Rchb. exc. *N. lanceolata* Lamk. *N. angustifolia* Vahl. *N. Nepetella* β . *humilis* Comp. I. 2. p. 447. Alpenthäler im südl. Geb., Südschweiz, Piemont, Savoyen M. Genis. 7—8. 4

4. *N. nuda* L. Jacq. K. syn. *N. ucranica* M. v. B. Var. β . *violacea*: *N. pannonica* Jacq. Rchb. exc. *N. violacea* Vill. Rchb. exc. *N. paniculata* Crantz. Steinige Hügel, Waldränder dch. d. g. südl. Geb., im mittleren, stellw. Thüringen am Schlosse Gleichen bei Wandersleben, Erfurt, Eisleben, Baiern; Schlesien; Destr. Mähren bei Muschau, Böhmen, Steyermark, Südtirol, Krain u. im g. südl. Vittoral, Istrien zc., Südschweiz bei Berx, um Verbier u. Bagnes. 7—8. 4

5. *N. ucranica* L. Walp. Rep. III. Maly enum. pl. austr. p. 177 et 384. *N. sibirica* M. v. B. Bergwiesen bei Kološvár in Siebenbürgen. 4

612. *Glechoma* L. *Gundermann*. K. syn. 646.

Rchb. exc. p. 316. Comp. I. 2. p. 448.

1. *G. hederacea* L. K. syn. *Calamintha* — *Scopol. Nepeta* — Benth. Var. β . *major* Gaud. — γ . *villosa*: *G. heterophylla* Opitz. Rchb. exc. *Saine, Gebüſche, Zaune, Ufer, auf Wiesen im g. Geb.* 4—5. 4

2. *G. hirsuta* W. et Kit. K. syn. *Nepeta Glechoma* β . *hirsuta* Benth. *Wälder, Zaune im südl. Geb., Deſtr. bei Petersdorf, Giller in Steyermark, Mähren, Krain, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen.* 5—6. 4

613. *Dracocephalum* L. *Drachenkopf*. K. syn.

647. Rchb. exc. p. 330. Comp. I. 2. p. 349.

1. *D. Moldavica* L. K. syn. *Moldau, ſtellw. in Gärten angepflanzt u. wohl nur verwilbert in d. Neumark? in Galizien.* 7—8. ☉

2. *D. Ruyschiana* L. K. syn. *Ruyschiana spicata* Miller. *Wälder, Triſten d. Alpen u. Gebirge ſtellw. im Geb. Oſtpreußen, Forſt bei Johanniſburg u. Silgenburg bei Königsberg. Marienwerder u., Baiern bei Kiſſingen, Schweinfurt bei Rheingrafenfeld; Südſchweiz, Alpen im Cant. Wallis u. Aelen; Südtyrol, Galizien, Ungarn.* 6—8. 4

3. *D. austriacum* L. K. syn. *Felſige Bergſtellen unter Gebüſchen, ſtellw. mehr ſüdl. im Geb.; Deſtr., Gegend v. Wien bei Petersdorf, Bertholdsdorf, Baden u. Gaißberg, Böhmen bei Carlſtein, Tyrol, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen; Schweiz Cant. Wallis über d. Rhone am M. Roſa u. Diable.* 5—6. 4

VII. *Gruppe*. *Stachydeen* Benth. K. *Taschb.* 407.

614. *Melittis* L. *Immenblatt*. K. syn. 648. Rchb.

exc. p. 330. Comp. I. 2. p. 350.

1. *M. Melissophyllum* L. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *grandiflora*: *M. grandiflora* Sm. Rchb. exc. M.

Melissophyllum Curt. Waldstellen, Gebüsche stellw. im g. südl. u. mittleren Geb. bis in d. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, Oberschwaben, Oberbaiern, Franken auf d. Ries-
 selberg, Thüringen bis zum Harz, Rheing. v. Basel nach
 Oberbaden bei Billingen, Mühlheim, Breisg. M. Kaiserstuhl,
 Oberelsaß, Nassau im Taunus b. Königstein, Eorsbach zc. 7—8. 4

615. *Lamium* L. Wienensaug. K. syn. 648. Rehb.
 exc. p. 321. Comp. I. 2. p. 351.

1. *L. Orvala* L. K. syn. *L. pannonicum* Scopol.
Orvala lamiioides DC. Rehb. exc. Uncultivirte, schattige
 Orte am Fuße d. Gebirge, Waldränder, Säune im südl.
 Geb., Steyermark, Kärnthen, Südtirol, Krain, Vittoral,
 Istrien, Ungarn, Lombardei, Venedig, Piemont. 4—5. 4

2. *L. pedemontanum* Rehb. exc. *L. Gargnicum*
 Lin. *L. longifolium* Tenore. Im südlichsten Geb., Piemont
 Chateau de Tende. 4—5 4

3. *L. amplexicaule* L. K. syn. *Pollichia* — is
 Roth. Acker, Felder zc. im g. Geb. 3—11. ☉

4. *L. intermedium* Fries. K. syn. Acker im nördl.
 Geb., Oldenburg bei Barel, Hamburg, Holstein, Preußen
 bei Königsberg, Tilsit, Mecklenburg. 3—10. ☉

5. *L. incisum* Willd. K. syn. *L. dissectum* Wither.
 Rehb. exc. *L. purpureum* β. Smith. Var. β. *hybridum*:
L. hybridum Mill. Rehb. exc. DC. *L. urticaefolium* et *L.*
guestphalicum Weihe. Cultivirte Orte, Acker, Felder,
 stellw. im Geb., Rheing. Luxemburg bei Fischbach, Westpha-
 len, Hamburg, Holstein, Schleswig, Mecklenburg bei Rostock;
 Preußen Königsberg, Tilsit zc., Schweiz bei Ber; Unter-
 steyermark, Lombardei. 3—10. ☉

6. *L. purpureum* L. K. syn. Var. β. *decipiens*:
L. purpureum β. *decipiens* Sonder. — γ. *molle*: *L. molle*
 Aiton. Auf cultivirtem Lande dch. d. g. Geb. 3—10. ☉

7. *L. bifidum* Cyrill. Host. austr. II. *Maly enum.*
 pl. austr. p. 178. Wälder in Dalmatien. 4—9. 4

8. *L. maculatum* L. K. syn. *L. album* β. Pollich.

L. vulgatum Aiton. Var. β . *L. laevigatum* Rehb. — γ . *L. rugosum* Rehb. *L. hirsutum* Lamk. Rehb. exc. Waldränder, Gebüſche, ſchattige Begeränder dch. d. g. Geb. 4—10. 24

9. *L. album* L. K. syn. *L. vulgatum* β . *album* Benth. Waldränder, Hecken, Säune u. im g. Geb. 4—9. 24

10. *L. inflatum* Heuffel ined. *Maly enum. pl. austr.* p. 179. Schattige Felsen im Banat bei Krasſova. 4—7. 24

616. *Galeobdolon* Huds. Waldneſſel. K. syn. 650. Rehb. exc. p. 323.

1. *G. luteum* Huds. K. syn. *G. vulgare* Pers. *Galeopsis Galeobdolon* Lin. Pollich. Willd. *Leonurus* — Scopol. — Crantz. *Comp. I. 2. p. 357.* Feuchte, ſchattige Wälder, Gebüſche dch. d. g. Geb. 5—6. 24

617. *Galeopsis* L. Hohlzahn. K. syn. 650. Rehb. exc. p. 322. *Comp. I. 2. p. 357.*

1. *G. Ladanum* L. K. syn. Var. α . *latifolia*: *G. Ladanum* α . *latifolia* Wim. et Grab. *G. latifolia* Hoffm. *G. Ladanum* Rehb. exc. — β . *latifolia-parviflora*: *G. intermedia* Vill. Rehb. exc. *G. parviflora* Lamk. — γ . *canescens*: *G. canescens* Schultes M. v. B. *G. grandiflora* Bl. et Fingh. — δ . *angustifolia*: *G. angustifolia* Ehrh. Rehb. exc. *G. Ladanum* β . *angustifolia* Wim. et Grab. — ϵ . *angustifolia-parviflora*. Steinige Hügel, Felsen, Weinberge, Mauern, Gebüſche, Saat- u. Brachfelder im g. Geb. 7—8. ☉

2. *G. ochroleuca* Lamk. K. syn. *G. cannabina* Pollich. *G. villosa* Huds. *G. grandiflora* Roth. *G. segetum* Reichard. *G. dubia* Leers. Cultivirte u. uncultivirte Orte, Aecker, Felber, beſonders auf Sand u. Thonschiefer, Heiden, Hecken u., ſtellw. dch. d. ſüdl. u. mittl. Geb., ſeltener im nördl. bis Hamburg, Rheing. an vielen Orten. 7—8. ☉

3. *G. Tetrahit* L. K. syn. Var. β . *G. acuminata*

Rchb. exc. Feuchte, schattige Orte, Wälder, Säune, Wege etc.,
 dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

4. *G. bifida* Boenningh. Fl. monast. K. syn. Etwas
 feuchte Felder, Aecker, seltener an Wegen, stellw. wohl dch.
 d. g. Geb. 7—8. ☉

5. *G. versicolor* Curt. K. syn. *G. cannabina* Roth.
G. Tetrahit β. Lin. In Hainen, an Gräben, Flußfließ, stellw.
 dch. d. Geb., Rheing., Straßig bei Aachen, Eurenburg bei
 Rockelscheuer, Württemberg im Donaugebiet, Baiern, Thürin-
 gen, Sachsen, dch. d. g. nördl. Deutschl., v. Westphalen nach
 Hamburg, Preußen, Schlesien, Böhmen, Tyrol, Destr. in
 allen Provinzen; Schweiz im Unterengadin. 7—8. ☉

6. *G. pubescens* Besser. K. syn. *G. Walterina* v.
 Schlechtend. *G. cannabina* Gmel. *G. versicolor* Spenn.
 Var. β. *G. mollis* Tausch. Eichte Waldstellen, Wege, Aecker,
 stellw. dch. d. g. Geb., Schweiz, Rheing., Hardtwald bei
 Karlsruhe, Hockenheim, Landdorf bei Mannheim, Pfalz bei
 Speier, fehlt am Mittel- u. Niederrhein in Westphalen,
 Hannover u. Mecklenburg, wächst wieder dch. d. nördl. Geb.
 nach Preußen; Destr. in allen Provinzen etc. 7—8. 4

618. *Stachys* L. Ziest. K. syn. 652. Rchb. exc. p. 318.
 Comp. I. 2. p. 360.

1. *S. heraclea* Allion. Rchb. exc. *S. intermedia*
 Tenore. *S. phlomoides* Willd. Var. β. *S. obliqua* W. et
 Kit. Rchb. exc. Sonlige, uncultivirte Orte im südlichsten
 Geb., Croatien, Dalmatien, Piemont, Nizza. 6—8. 4

2. *S. italica* Miller. K. syn. *S. salviaefolia* Tenore.
 Rchb. exc. Var. β. *S. pungens* Russel. Hügel, Weinberge,
 Wege, im südl. Geb., Krain, Vittoral, Istrien, Fiume, Dal-
 matien bei Zara. 7—8. 4

3. *S. germanica* L. K. syn. *S. lanata* Crantz. *S.*
polystachya Tenore. *S. pannonica* Lang. Var. β. *S. bien-*
nis Roth. *S. germanica* Fl. Dan. *S. intermedia* Aiton.
 Sonlige, steinige Hügel, Weinberge, Waldränder, Krain,

Brachfelder, Wege, besonders auf Kalk-, Lehm- u. Schieferboden, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing nicht selten. 7—8. ☉

4. *S. lanata* L. Rchb. exc. Jacq. Aiton. Host. Steirische Orte in Krain u. Ungarn. 6—7. 4

5. *S. alpina* K. syn. Gebirgswälder bis in d. Voralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern nach Tyrol u. Nestr. ic., Rheing., auf d. Jura bei Basel, Oberelsaß im württembergischen u. badischen Jura bei Mundelfingen u. Willingen, Pfalz, Nassau bei Herborn u. Dillenburg, Eöln bei Bensberg, Trier im Herresdorfer Busch im Rödterwalde, Eifel an d. Altenburg bei Schönecken, Obermosel, Luxemburg bei Rambourg, Wilz, Dubelange, Hessen bei Cassel, Franken auf d. Hesselberg, Schlesien, Böhmen ic. 7—8. 4

6. *S. sylvatica* L. K. syn. Etwas feuchte Waldstellen, Gebüsch, Ufer, Wiesenränder, dch. d. g. Geb. 6—8. 4

7. *S. ambigua* Smith. K. syn. *S. palustri-sylvatica* Schiede. *S. palustris* β . *ambigua* F. Schultz. Fl. d. Pfalz. Feuchte, schattige Orte, stchw. dch. d. Geb., Rheing, Heidelberg, Trier bei Saarbrücken, Meisenheim, Luxemburg, Coblenz bei Winningen u. im Ehrenburger Thale a. d. Mosel, im nördl. Geb. v. Westphalen nach Hamburg, Lauenburg, Pommern bei Rostock, im südl. Tyrol u. Krain. 7—8. 4

8. *S. palustris* L. K. syn. Var. β . *S. segetum* Hagen. Rasse, schattige Orte, Ufer, sumpfige Wiesen, Aecker, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

9. *S. arvensis* L. K. syn. *Glechoma Marubiastrum* Vill. delph. *Trixago cordifolia* Moench. Aecker, Brachfelder, stchw. dch. d. g. Geb. in d. Schweiz und besonders im g. südl. Geb., nördl. bis Preußen bei Danzig ic., Rheing., v. Basel bis Mainz, Coblenz, Eöln, Düsseldorf, Aachen, Trier, Luxemburg ic. 7—9. ☉

10. *S. annua* L. K. syn. *Betonica* — Lin. spec. edit. I. Aecker, Saat- u. Brachfelder, besonders auf Kalk- u. Lehm-boden, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. häufig. 7—9. ☉

11. *S. pubescens* Tenore. Rchb. exc. *S. fragilis*

Visian. Gebirge in Dalmatien zw. Sabionella u. Almissa am Wege auf d. Monte Biočova u. Sella. 7. 4

12. *S. maritima* L. K. syn. Sandige Küste im südl. Littoral, Istrien bei Triest u. Monfalcone, Dalmatien, Combarbei, Venedig, Piemont, Nizza. 6—7. 4

13. *S. spinulosa* Sibth. Rchb. exc. Im südl. Littoral, Istrien bei Pola, Dalmatien. 7—8. ☉

14. *S. hirta* L. Rchb. exc. *S. inscripta* Rchb. Im südlichsten Geb., Piemont um Nizza. 7—8. ☉

15. *S. menthaefolia* Visian. Fl. Dalm. Comp. I. 2. p. 368. *S. grandiflora* Host. Steinige, dürre Orte in Dalmatien. 7. 4

16. *S. recta* L. K. syn. *S. Betonica* Scopol. *S. Sideritis* Vill. delph. *S. procumbens* Lamk. *S. busonia* Thuill. Var. β . *decumbens*: *S. decumbens* Rchb. exc. Steinige Gebirgsstellen, Abhänge, Felsen unter Gebüsch, Ufer, Hecken, Raine, dch. d. Geb. 6—9. 4

17. *S. subcrenata* Visian. K. syn. *S. recta* β . Bertol. *S. ramosissima* Rochel ban. Felsen, steinige Orte, Brachfelser, im südl. Geb., Krain, Littoral, Istrien bei Fiume, Inseln Veglia u. Cherso, Dalmatien, Ungarn, Combarbei, Venedig. 7—8. 4

619. *Betonica* L. Betonie. K. syn. 654. Rchb. exc. p. 320. Comp. I. 2. p. 361.

1. *B. officinalis* L. K. syn. *Stachys Betonica* Benth. Var. α . *hirta*: *B. hirta* Leysser Rchb. exc. — β . *glabrata*: *B. officinalis* Leysser Rchb. exc. — γ . *stricta*: *B. stricta* Aiton. Rchb. exc. — δ . *serotina*: *B. serotina* Host. austr. Lichte Waldstellen, schattige Wiesen, Triften, Heiden, Gebüsch u., dch. d. g. Geb. 6—8. 4

2. *B. incana* Aiton. Rchb. exc. Galizien um Mogilany bei Krakau. 8. 4

3. *B. hirsuta* L. K. syn. *B. densiflora* Benth. *B. danica* Miller. *B. Monnierii* Gouan. *Stachys densiflora* Benth. lab. Triften, Wiesen in d. südl. Alpenkette, Schweiz

Walliser Alpen, M. Genis in d. Novara, Südtirol an d. Neva seconda in Primiero, im Thale della Cima del Frate in Giudicarie, Brixen, M. Balbo, Krain, Galizien, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

4. *B. Alopecurus* L. K. syn. *Stachys* — Benth. *Sideritis* — Scopol. Wiesen, Triften in d. südl. Alpenkette; Schweiz Cant. Tessin; Destr. Kärnthen, Steyermark, Salzburg, Südtirol, Valle Isobbia, Krain, Veltoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, Savoyen. 7—8. 4

620. *Sideritis* L. Gliedkraut. K. syn. 655. Rchb. exc. p. 326. Comp. I. 2. p. 369.

1. *S. scordioides* L. K. syn. Var. β . *grandiflora*: *S. subspinos*a Cavanill. — γ . *elongata*: *S. hyssopifolia* Schkr. *S. hirta* Roth. *S. foetida* Poir. — δ . *alpina*: *S. alpina* Vill delph. — ϵ . *glabra*: *S. hyssopifolia* Gaud. Rchb. exc. — ζ . *angustifolia*: *S. hyssopifolia* Lin. Felsige Abhänge in d. südl. Tirolkette, Schweiz Monte Dole u. M. Thoiry, Piemont u. Savoyen. 7—8. 4

2. *S. hirsuta* L. Rchb. exc. Hügel, unter Gebüsch, im südl. Geb., Piemont um Nizza. 7—8. 4

3. *S. incana* L. Rchb. exc. In Piemont zw. l'Escarene u. Roccatalliba. 7—8. 4

4. *S. montana* L. K. syn. *Burgsdorffia* — Rchb. exc. p. 327. *Hesiodia* — Du Mort. *Hes. bicolor* Mch. Hügel, Weinberge, Brachfelder, stellenw. dch. d. Geb., mehr im südl., Halle bei Hornburg u. Ebersrode, Baiern; Destr. Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien, Lombardei. 7—8. ☉

5. *S. romana* L. K. syn. *Burgsdorffia* — Link. Rchb. exc. *Bur. rigida* Moench. Acker u. auf d. Sande d. Küste im südl. Veltoral, Istrien, Inseln Cherso, Veglia bei Pola, Dignano, Dalmatien, Lombardei, Venedig, M. Castelli bei Verona; Piemont, Nizza. 7—8. ☉

6. *S. purpurea* Talbot. Maly enum. pl. austr. p. 409. in add. Brachacker in Dalmatien. 7. ☉

621. *Marubium* L. Andorn. K. syn. 656. Rehb. exc. p. 325. Comp. I. 2. p. 372.

1. *M. candidissimum* L. K. syn. *M. incanum* Desrous. Koch. D. Fl. *M. peregrinum* Rehb. *M. catariaefolium* Rehb. pl. crit. *M. supinum* Scopol. Steinige Orte im südl. Eittoral, Krain, Istrien bei Duino, Triest, Dalmatien u. Croatien. 7—8. 4

2. *M. peregrinum* L. K. syn. *M. pauciflorum* Wallr. sched. Var. α . *latifolium*: *M. peregrinum* Willd. *M. remotum* Kitaib. *M. affine* Host. *M. paniculatum* Desr. Rehb. *M. pannonicum* Rehb. exc. — β . *angustifolium*: *M. peregrinum* β . L. *M. peregrinum* Jacq. *M. creticum* Miller. Lob. Rehb. exc. Uncultivirte Orte, Wege, Dämme, Schutt, stellw. besonders im südl. Geb., Mannsfeld, Erdeborn bei Halle; Oestr. bei Wien, Mähren, Tyrol, Krain, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Galizien, Ungarn, Lombard. 7—8. 4

3. *M. vulgare* L. K. syn. Sandige Orte, Brachfelder, Wege, an Mauern, Schutt, stellw. dch. d. Geb., besonders im g. südl., Rheing. zerstr. v. Basel bis in d. Niederlande, dann bis Trier u. Luxemburg u. 7—9. 4

4. *M. apulum* Tenore. Rehb. exc. An Wegen, Schutt, im südlichsten Geb. Piemont. 7—9. 4

5. *M. hirsutum* Willd. Rehb. exc. *M. rupestre* Bivona. *M. saxatile* Raffn. *M. hispanicum* Schkr. *M. cinereum* Lamk. *Ballota hispanica* Benth. Comp. I. 1. p. 374. *B. rupestris* Visiani Fl. Dalm. *B. saxatilis* Sieb. Felsige Orte in Dalmatien um Spalato. 7—8. ☉

6. *M. Pseudo-dictamnus* L. *Ballota* — Benth. Maly enum. pl. austr. in add. p. 409. *Beringeria* — Rehb. Fl. exsicc. Trockene, steinige Orte, Lombard bei Verona. ‡

622. *Ballota* L. Ballote. K. syn. 657. Rehb. exc. p. 324. Comp. I. 2. p. 374.

1. *B. nigra* L. K. syn. *B. vulgaris* Host. Var. α . foetida: *B. foetida* Lamk. Rchb. exc. *B. nigra* Smith. *B. alba* Lin. *B. hirta* hort. berol. V. *borealis* Schweigg. — β . ruderalis: *B. nigra* Rchb. exc. *B. ruderalis* Smith. Fries. *B. vulgaris* Link. — γ . urticaefolia: *B. urticifolium* Ortm. Rchb. exc. Uncultivirte, steinige Orte, Zäune, Wege, Mauern, Schutt u. im g. Geb. 6—8. 4

623. *Beringeria* Necker. *Beringerie*. Rchb. exc. p. 325.

1. *B. frutescens* Rchb. exc. *Molucella* — *L. Balota spinosa* Link. Comp. I. 2. Felsen im südlichsten Geb., Piemont Valle di Tenda. 6. 5

624. *Leonurus* L. Löwenschwanz. K. syn. 658. Rchb. exc. p. 324. Comp. I. 2. p. 355.

1. *L. Cardiac*a L. K. syn. *Cardiac*a vulgaris Mnh. Var. β . villosus: *L. villosus* Desf. *Leon. condensatus* Hornem. *L. lacerus* Lindl. *L. canescens* Du Mort. *L. neglectus* Schrank. — γ . crispus: *L. crispus* Murr. Steinnige, sandige Orte, Zäune, Hecken, Wege, Schutt u. stellw., aber immer nur vereinzelt, dch. d. g. Geb. Var. β . in Galizien. 7—8. 4

2. *L. sibiricus* L. Rchb. pl. crit. Walp. Rep. III. p. 812. Maly enum. pl. austr. p. 181. In Galizien. ☉

625. *Chaiturus* Host. Raßenschwanz. K. syn. 658. Rchb. exc. p. 317.

1. *Ch. Marubias*trum Rchb. exc. K. syn. *Ch. leonuroides* Mnh. *Leonurus Marubias*trum L. Comp. I. 2. p. 356. Uncultivirte Orte, Wege, Schutt, Dämme, besonders im südl. Geb., stellw. im mittl. u. nördl., Rheing. im Oberelsaß bei Ostheim, Guemar u. Illhisen; Preußen Thorn, Tilsit u. dann wieder von Holstein nach Hannover, Brandenburg, Sachsen, Schlesien, Baiern; Destr. Böhmen, Mäh-

ren, Steyermark, Tyrol, Galizien, Ungarn, Dalmatien, Lombardei. 7—8. ☉

626. *Phlomis* L. Filzfraut. K. syn. 658. Rchb. exc. p. 324. Comp. I. 2. p. 376.

1. *P. Lychnitis* L. Rchb. exc. Im südlichsten Littoral, Piemont um Nizza. 7—8. ☿

2. *P. pungens* L. Rchb. exc. In d. östl. Carpathen in Galizien u. d. Bucowina. 7. ♀

3. *P. Herba-venti* L. Host. austr. II. p. 175. Maly enum. pl. austr. p. 182. An Zäunen, in Weinbergen im südl. Geb., Dalmatien. 7. ♀

4. *P. fruticosa* L. Rchb. exc. Sonnige Bergabhänge, im südl. Geb., Dalmatien, u. d. Inseln im adriat. Meere, um Ragusino, Val di Breno, Lombardei auf d. Euganeen. 7—8. ☿

5. *P. tuberosa* L. K. syn. Rchb. exc. *Phlomit* — Nees v. E. Schattige Wiesen, an Gräben, Wegen, Weinbergen, Waldrändern, am Fuße d. Gebirge in d. südl. Kette, Destr. zw. Bruck u. Lenth, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien. 6—7. ♀

VIII. Gruppe. Scutellarineen Benth. K. Taschb. p. 414.

627. *Scutellaria* L. Helmfraut. K. syn. 658. Rchb. exc. p. 331. Comp. I. 2. p. 344.

1. *S. orientalis* L. Rchb. exc. *S. Sieversii* Bunge. Var. β . *pinnatifida* Rchb. pl. crit. Felsen, Gebirgsabhänge, besonders auf Kalk im südl. Littoral, Dalmatien, Croatien. 7—8. ♀

2. *S. lupulina* L. Rchb. exc. *S. verna* Besser. In Galizien am Dniester-Flusse. 4—5. ♀

3. *S. alpina* L. K. syn. *S. altaica* Fisch. *S. variegata* Spr. fil. Alpen in d. südl. Kette; Schweiz auf d. M. Foully am See, am Wege über Bagnes, Chateau d'Vez;

Piemont im Valle Aosta, Lombardei, Venedig, Croatien.
7—8. 4

4. *S. Columnae* Allion pedm. Rchb. exc. *S. hirsuta* Kitaib. *S. peregrina* Fl. graec. *S. altissima* A. Hamilton. Gebirgswälder im südl. Geb., Dalmatien; Ungarn bei Ofen; Piemont. 7—8. 4

5. *S. commutata* Gussoni Comp. I. 2. p. 345. *S. peregrina* W. et Kit. Rchb. exc. *S. rubicunda* Hornem. Wälder im südl. Geb., Dalmatien, Ungarn bei Eger, Siebenbürgen. 7—8. 4

6. *S. pallida* M. v. Bieb. Rchb. exc. *S. hirta* et *S. decumbens* Sieber. In Ungarn. 7—8. 4

7. *S. galericulata* L. K. syn. Rasse Orte, Ufer, Gräben, Teiche, Wiesen, Gebüsche 2c. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

8. *S. hastifolia* L. K. syn. Rasse Wiesen, Grabenränder, stellw. dch. d. Geb., Rheing. bei Speier u. v. Döpenheim bis Mainz an beiden Ufern, Laubenheim, Bodenheim, Nackenheim, Bingen bei Sporkenheim, Nahe bei Kreuznach, Sieg bei Kirchen, Esch bei Eschkirchen Flora v. Köln; dann wieder im nördl. Geb., Hamburg an d. Wille nach Preußen, Memel, Graudenz 2c., in Destr. Ungarn Siebenbürgen. 7—8. 4

9. *S. minor* L. K. syn. Sumpfige, moosige Wiesen, Gräben, Torfswümpfen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Schwarzwald, Bergstraße bis Offenbach u. Frankfurt, Pfalz, Gerolstein, Oggersheim, Dürkheim, Mardorf, Frankenthal, Nassau bei Königstein, Luxemburg, Aachen, Mühlheim bei Köln, Sinzig, Bonn, Wesel, Cleve dch. Westphalen, Hamburg nach Holstein, Hannover, Bremen, Oldenburg; Sachsen; Destr. Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

628. *Prunella* L. Brunelle. K. syn. 659. Rchb. exc. p. 330. Comp. I. 2. p. 341.

1. *P. hyssopifolia* L. Rchb. exc. Sonnige, trockene Orte im südlichsten Geb., Piemont, Genua, Nizza. 6—7. 4

2. *P. vulgaris* L. K. syn. Var. β . *P. parviflora*: *P. parviflora* Poir. — γ . *pinnatifida*: *P. vulgaris* β . *pinnati-*

fida Rehb. icon. *P. pinnatifida* Pers. *P. intermedia* Link. *P. laciniata* β . et γ . Lin. *P. laciniata* Gaud. helv. *P. vulgaris* b. *intermedia* K. et Ziz. Wiesen, Triften, lichte Waldstellen, etwas feuchte Heiden, Felder, dch. d. g. Geb., die Var. β . nur stchw. 6—9. 4

3. *P. grandiflora* Jacq. K. syn. *P. vulgaris* β . *grandiflora* L. Var. β . *pinnatifida*: *P. grandiflora* β . *pinnatifida* K. et Ziz. Gaud. helv. Steinige, mit Gebüsch bewachsene Gebirge, Hügel, lichte Waldstellen, besonders auf Kalk, stchw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

4. *P. alba* Pallas. K. syn. Var. β . *pinnatifida*: *P. laciniata* Lamk. Jacq. Rehb. pl. crit. *P. laciniata* Lin. excl. var. β . et γ . *P. vulgaris* ζ . Benth. Steinige, mit dünnem Gras, bewachsene Hügel, Felsen, Waldwiesen, vorzugsweise auf Kalk, stchw. besonders im südl. u. mittl. Geb., Rheing. bei Niederbrunn, Hardtgebirge, Königsbach, Deidesheim, Niedereingelheim bei Mainz, Ockelheimer-Spitze bei Bingen, Rochusberg, Nassau bei Lorch, Nahe bei Laubenheim, Rothenfels bei Kreuznach, Zweibrücken, Lauscheid bei Weisenheim, Trier oberhalb Tzel bis an die Sauer, Obermosel, Luxemburg, Perl, Schengen, Ehnlen; Harz bei Blankenburg; Destr. Südtirol bis ins südlichste Geb. 7—8. 4

IX. Gruppe. Prasieen Benth. K. Taschb. 415.

629. *Prasium* L. Nicoline. K. syn. 660. Rehb. exc. p. 334. Comp. I. 2. p. 377.

1. *P. majus* L. K. syn. *P. minus* L. sec. cl. Beuth. Steinige, uncultivirte Hügel im südl. Littoral, Istrien Insel Cherso u. in Dalmatien. 3—5. 3

X. Gruppe. Ajugoideen Benth. K. Taschb. 415.

630. *Ajuga* L. Günzel. K. syn. 661. Rehb. exc. p. 313. Comp. I. 2. p. 383.

Erste Rotte. *Ajuga* Lin. *Bugula* Tournef.

1. *A. reptans* L. K. syn. *A. repens* et *A. reptans*

Host. austr. *Bugula reptans* Scopol. Var. β . *alpina*: A. *alpina* Vill. delph. Gaud. Wiesen, Triften, dch. d. g. Geb., bis in d. Alpen. 5—6. 4

2. A. *genevensis* L. K. syn. A. *alpina* Lin. A. *montana* Rchb. exc. A. *genevensis* et A. *rugosa* Host. Var. β . A. *foliosa* Schleicher Tratt. Trockene Hügel, Heiden, lichte Waldstellen, Nadelholzwälder, Waldränder, Brachfelder, Raine, Wege, besonders auf Sand u. Kalk, dch. d. g. Geb. bis in d. Gebirge. 5—6. 4

3. A. *pyramidalis* L. K. syn. A. *latifolia* Host. Var. β . A. *rupestris* Schleicher. Eichte Waldstellen, Nadelholzwälder, Triften d. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette; Rheing. auf d. Vogesensandstein v. Kaiserslautern nach d. Vogelweh bei Entersweiler oberhalb Lauterspring u., Nahe bei Niederhausen; Luxemburg bei Rambrouch, Folschette, Altenburg bei Boppard Flora v. Coblenz; Nassau, Thüringen bei Eisenach, Hannover u. Halle, Mark Brandenburg bei Berlin, Pommern, Preußen bei Königsberg, Mehlsack; Destr. Mähren, Böhmen bis in d. Lombardei. 5—6. 4

Zweite Rotte. *Chamaeptytis* Tournef. K. syn.

4. A. *Iva* Schreber Rchb. exc. *Teucrium Iva* L. T. *Moschata* Lamk. Aj. — Schreb. Var. β . A. *Pseudo-Iva* DC. Fl. fr. A. *Iva* Fl. graec. Uncultivirte Orte, Triften im südlichsten Vittoral, Dalmatien, Piemont, Oneglia, Nizza, Ligurien, Novara. 5—6. 3

5. A. *Chamaeptytis* Schreb. K. syn. *Teucrium* — L. *Bugula* — Scopol. Steinige, sonnige Orte, Brachfelder, Aecker, besonders auf Kalk, Lehm u. kalkhaltigem Sande, stellw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., Rheing. v. Basel bis Schwellingen, Pfalz bei Landau u., Kreuznach, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Coblenz, Linz, Münster-eifel, Flora v. Eöln u. Schlesien; Destr. in allen Provinzen. 6—9. 0

6. A. *Chia* Schreb. K. syn. Trockene, bürre Aecker im südl. Vittoral, Istrien, zw. Rovigno u. Dignano. 6. 4

631. *Phleboanthe* Tausch. Ueberblume. Rchb. exc. p. 315.

1. *P. Loxmanni* Tausch. Nees v. Esenb. Rchb. exc. *Teucrium* — *L. Ajuga* — Benth. Trockene, steinige Orte, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—7. ☉

632. *Teucrium* L. Gamander. K. syn. 662. Rchb. exc. p. 314. Comp. I. 2. p. 378.

1. *T. Arduini* L. Host. austr. *Scorodonia* — Rchb. xc. p. 315. Sonnige Felsen in Dalmatien. 7—8. 4

2. *T. Scorodonia* L. K. syn. *Scorodonia heteromalla* Moench. Rchb. exc. Steinige Hügel, Abhänge, Waldränder, Gebüsch, Raine, stellw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., seltener im nördl. bei Hamburg, Rheing. besonders auf Sand u. Thonschiefer u. Kalk dch. d. g. Rheinthäl bis in d. Nebenthäler an vielen Stellen häufig. 7—8. 4

3. *T. euganeum* Visian. Comp. I. 2. p. 379. Waldstellen im südlichsten Geb., Lombardei auf d. Euganeen bei Pavia. 7—8. 4

4. *T. Scordium* L. K. syn. Sumpfige Orte, Wiesen, Gräben, Begeränder, stellw. dch. d. g. Geb., besonders im nördl., Rheing. Karlsruhe, Mannheim, Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Pfalz, Speyer, Erpolsheim zw. Marbois, Frankenthal u. Oggersheim, Saarbrücken, Luxemburg, Bornheim bei Bonn u. 7—8. 4

5. *T. scordioides* Schreb. K. syn. *T. Scordium* Eng. Bot. *T. lanuginosum* Link. Gräben im südl. Littoral, Istrien Inseln Beglia, Dsero, bei Monfalcone, Dalmatien, Lombardei. 6—7. 4

6. *T. Botrys* L. K. syn. Steinige, sonnige Orte, Hügel, Raine, Saat- u. Brachfelder, besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten dch. d. g. Rheinthäl bis in d. Nebenthäler. 7—9. ☉

7. *T. lucidum* L. Rchb. exc. Felsen am Fuße d. Gebirge im südlichsten Geb., Piemonter Seite d. St. Bernhard, Savoyen u. Novara. 7—8. 3

8. *T. Chamaedrys* L. K. syn. *T. Pseudo-Chamaedrys* Wenderoth. Felsen d. Gebirge, Hügel, Weinberge, Waldränder, Triften, Wege, Mauern, besonders auf Kalk stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen. 7—9. 4

9. *T. Marum* L. Rchb. exc. *T. maritimum* Lamk. Im südl. Geb. Dalmatien, Oberitalien. 7—8. 3

10. *T. flavum* L. K. syn. Steinige Orte d. Gebirge im südl. Geb., Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Görz, Cantabello, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig u. Piemont um Nizza. 7—8. 3

11. *T. flavicans* Lamk. Rchb. exc. *T. tomentosum* Vill. Im südlichsten Geb. Piemont um Nizza. 7—8. 3

12. *T. Polium* L. K. syn. Var. β . *vulgare*: *T. Pseudo-Hyssopus* Schreb. *T. Teuthrion* et *T. Belion* Schreb. *T. album* Poir. — β . *angustifolium*: *T. capitatum* L. Rchb. exc. *T. flavescens* et *T. valentinum* Schreb. — δ . *purpurascens*: *T. Achaemonis* Schreb. Steinige, sonnige Orte im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Aquileja, Dalmatien, Venedig, Piemont, Nizza. 7—8. 4

13. *T. montanum* L. K. syn. *T. supinum* L. Jacq. Steinige, sonnige Orte, Triften, lichte Waldstellen im g. südl. u. stellw. im mittleren Geb., besonders auf Kalk, Sand u. Thonschiefer, Rheing. Basel nach Oberbaden im Breisg. auf d. Kaiserstuhl, dch. Elsaß, Pfalz bei Zweibrücken zw. d. Kirschbacher: u. Wallbacher-Hof, zw. Blieskastel u. Saarbrücken, Luxemburg bei Wäpfern und Neuschateau, Eifel zw. Blankenheim u. Altdorf im oberen Altrhale an d. Ruine Dollendorf gegenüber u., Oberschwaben, Baiern, Franken, Hessen, Sachsen, Schlesien, Preußen, Destr. bis Venedig. 7—8. 4

Neunzigste Ordnung. Verbenaceen.

Juss. K. syn. 663. K. Taschb. 417. Rchb. exc. p. 334.

633. *Verbeña* L. (XIV. 2.) Eisenkraut. K. syn.

664. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 386.

1. *V. officinalis* L. K. syn. Uncultivirte, steinige Orte, Wege, Schutt u. dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

2. *V. supina* L. Clusius. Rchb. exc. Salzboden in Ungarn am Theiß u. bei Tokay. 7—9. ☉

3. *V. nodiflora* L. Smith. *V. repens* Bertoloni. *Zapania nodiflora* Pers. Rchb. exc. p. 334. *Lippia repens* Michx. *Baeria* — Gaertn. Feuchte, sandige Orte im südlichsten Eittoral, Oberitalien. 7—8. 4

634. *Vitex* L. (XIV. 2.) Müllen. K. syn. 663. Rchb. exc. p. 334. Comp. I. 2. p. 387.

1. *V. Agnus-castus* L. K. syn. Sandige Orte, Saune, Felsen im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Fiume; Dalmatien, Croatien, Piemont, Nizza, Genua. 7—8. 5

Einundneunzigste Ordnung.

Lentibularieen.

Richard. K. syn. 664. K. Taschb. 417. Rchb. exc. p. 386.

635. *Pinguicula* L. (II. 1.) Fettkraut. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 32.

1. *P. alpina* L. K. syn. *P. flavescens* Floerk. Schrad. Rchb. exc. *P. alba* Kuchl. *P. purpurea* Willd. *P. alpestris* Pers. Moosige Wiesen, Tristen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Oestr. u. u. stchw. auf moorigen Wiesen in d. Niederungen herabsteigend. 4—5. ☉

2. *P. vulgaris* L. K. syn. Rchb. exc. Var. β . *alpicola* Rchb. pl. crit. — γ . *minor*: *P. Gypsophila* Wallr. — δ . *longifolia*: *P. longifolia* Ramond in DC. Rchb. exc. K. syn. edit. I. *P. grandiflora* Lamk. Schwammige, moosige Wiesen, stchw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, aber auf großen Strecken nicht, Rheing. v. Constanz am Bodensee nach Würtemberg bei Rothenberg nach Oberbadon bis

Billingen, Breisg., Feldberg, Neufußheim u. Waghäusel, v. Basel an d. Wasserfall, am Rheine bei Rheinfelden u. Auggt, auf d. Vogesen M. Hoheneck, Rheinhessen bis Frankfurt; Wetterau, Nassau, Baiern; nördl. bis Hamburg; Preußen bei Memel u. Danzig; scheint in d. Pfalz u. an d. linken Rheinufer bis Köln, Aachen nicht zu wachsen, soll aber am Niederrheine vorkommen? Var. γ . feuchte Orte d. Gypsgebirges am Vorderharze; Var. ? δ . in d. südl. Alpenzüge d. Schweiz, Jura M. Thoiry u. Chasseral, Piemont. 5—7. 4

3. *P. leptoceras* Rchb. exc. *P. grandiflora*. Gaud. *P. vulgaris* γ . *grandiflora* K. syn. *P. vulgaris micrantha* Tausch. Nassau, kieselige Orte d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis im Saßthale am Matt-Mar-See, M. Grimsel; Tyrol, Salzbdrg. 7—8. 4

4. *P. lusitanica* L. Rchb. exc. in add. p. 863. In Piemont auf d. Winadischen Alpen. 6—7. 4

636. *Utricularia* L. (II. 1.) *Wasserschlauch*. K. syn. 665. Rchb. exc. p. 386. Comp. I. 1. p. 33.

1. *U. vulgaris* L. K. syn. Stehende Wasser, Sümpfe, Gräben, Lehm- u. Torfgräben, stellw. dch. d. g. Geb. 6—8. 4

2. *U. intermedia* Hayne K. syn. *U. media* Schum. Stehende Wasser in Torfmooren, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. Bodensee nach Würtemberg, Baiern, in d. Vogesen-sandstein v. Kaiserslautern, Bitsch, Wisau, Limbach, Saarbrücken, Speyer, Darmstadt, zw. d. Bensheimer Hof, d. Rheindamm u. d. Schwedensäule, ist am Niederrheine bis jetzt, wie es scheint, noch nicht gefunden; Thüringen bei Jena; Hamburg im Eppendorfer Moore, Oldenburg, Hannover; Destr. 7—8. 4

3. *U. neglecta* Lehmann. K. syn. Stehende Wasser, stellw. im Geb., Hamburg, besonders bei Eppendorf, Oldenburg, Holstein b. Kiel, Unterharz; Ungarn u. Venedig. 7—8. 4

4. *U. Bremii* Heer. K. syn. *U. pulchella* Lehm. Sümpfe, Fischteiche, Moorboden im Moose u. in Gräben

stellw. im Geb., Preußen bei Braunsberg, Schweiz am Rösensee bei Zürich u., nicht in Destr. 8—9. 4

5. *U. minor* L. K. syn. Moorboden, in stehendem Wasser, Sümpfen, Gräben, in Torfwiesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. dch. d. g. Rheinfläche u. Nebenthälern, Pfalz bis Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Siegburg bei Bonn, Mühlheim bei Köln bis zum Niederrheine, Westphalen, Hamburg nach Holstein u., nördl. bis nach Preußen bei Danzig u., Destr. Böhmen, Tyrol, Kärnten, Lombardien, Venedig. 6—8. 4

Zweiundneunzigste Ordnung.

Primulaceen.

Vent. K. syn. 666. K. Taschb. 418. Lysimachiaceen
Rchb. exc. p. 398.

637. *Trientalis* L. (VII. 1.) *Trientale*. K. syn.
Rchb. exc. p. 409. Comp. I. 2. p. 1.

1. *T. europaea* L. K. syn. Masse, schwammige, mit Moos bewachsene Torfheiden, nasse, moosige Waldstellen der Gebirge, stellw. im Geb., mehr im nördl.; Schweiz im Ufern-Thale; Rheing., Schwarzwald, Oberbaden im Breisg. auf d. Feldberg, Taunus am Fuße des Altkönigs, Trier in d. Eifel bei Prüm, Kronenburg, Montjoie, Malmédy, Waldungen der hohen Venn bei Eupen und Aachen, am Niederrheine bei Romar, Leichlingen, Elberfeld; Schwaben, Baiern, Sachsen, dch. d. nördl. Geb. nach Preußen, Danzig, Memel u.; Vogelsberg, Fichtelgebirge, Hamburg, Hannover, Holstein, Harz, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol im Wintschau, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 5—7. 4

638. *Lysimachia* L. (V. 1.) *Lysimachie*. K.
syn. 667. Rchb. exc. p. 409. Comp. I. 1. p. 336.

Erste Rotte. *Naumburgia* Moench. K. syn.

1. *L. thyrsiflora* L. K. syn. *Naumburgia* — Rchb. exc. p. 409. *N. guttata* Moench. *Thyranthus palustris* Schrank. Tiefe Sümpfe, Gräben, Fischteiche, stellw. dch. d. Geb., im nördl.; Schweiz bei Solothurn, Yverdon, Neuchâtel; Rheing., Oberbaden bei Immenbingen, Mähringen, Gaisingen, Rastatt, Pfalz, Kaiserslautern zw. Blieskastel u. St. Ingbert, Würzburg, Rirkel, Homburg, zw. Zweiz u. Saarbrücken, Frankfurt bei Offenbach am Buchrainweiher, Nassau bei Seeburg, Niederrhein zw. Goch u. Gennep 2c., Westphalen, Hamburg, Hannover nach Schlesien, Baiern, Thüringen, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Steyermark, Galizien Siebenbürgen. 6—7. 4

Zweite Rotte. *Lysimastrum* Dub. K. syn.

2. *L. verticillata* Willd. Rchb. exc. Waldbiesen, Gräben, Zäune in Ungarn bei Szanto. 7—8. 4

3. *L. vulgaris* L. K. syn. Var. β . *L. paludosa* Baumg. — γ . *L. westphalica* Weihe. *L. guestphalica* Rchb. exc. Nasse, sumpfige, schattige Orte, Ufer, Wiesen, Gebüsche, dch. d. g. Geb., Var. β . Salzburg u. Siebenbürgen, Var. γ Nassau, Westphalen. 6—7. 4

4. *L. punctata* L. K. syn. *L. villosa* Schum. Stehende Wasser, Sümpfe, nasse Wiesen, Ufer, stellw. dch. d. Geb., besonders im südl., Schweiz bei Zürich, Rheing., Luxemburg bei Ehnen an d. Obermosel, Belgien, Westphalen bei Motteln, Thüringen bei Jena; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark bis in d. Lombardei. 6—7. 4

5. *L. ciliata* L. K. syn. Sumpfige Orte, Gräben, Ufer, stellw. im Geb., Rheing., Aachen bei Limburg u. Berviers, Fl. v. Spa an einem Bache zw. Theux u. Enfiwat bei Lüttich. 6—7. 4

6. *L. nemorum* L. K. syn. *Ephemerum* — Rchb. exc. p. 409. Feuchte, schattige Orte in Gebirgswäldern u. Thälern, an Quellen, Bachufern, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

7. *L. Nummularia* L. K. syn. Feuchte, grasige Triften, Gräben, Bachränder, Raine, Wald- u. Wiesenränder, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

Dritte Rotte. *Asterolinum* Lk. K. syn.

8. *L. Linum-stellatum* L. K. syn. Astrolinon — Lk. Rchb. exc. p. 409. Trockene, sonnige Hügel, Weinberge, im südl. Geb., Rheing., Flora v. Spa bei Berviers unweit Aachen; Eittoral, Istrien, Dalmatien, Piemont bei Susa, Nizza. 6. ☉

639. *Anagallis* L. (V. 1.) Gauchheil. K. syn. 668. Rchb. exc. p. 408. Comp. I. 1. p. 339.

1. *A. arvensis* L. K. syn. *A. phoenicea* Lamk. A. Mas. Vill. delph. Var. β . *A. carnea* Schrank. Cultivirte Orte, Aecker, Felder, Brachfelder, Weinberge u. dch. d. g. Geb. 6—9. ☉

2. *A. coerulea* Schreb. K. syn. *A. foemina* Vill. delph. A. Monelli Rchb. exc. Cultivirte Orte, Aecker, Felder u., besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. Geb., seltener als die Vorige; Rheing. auf d. Tertiär- u. Muschelskalk, besonders auf d. Rheinfläche im Weststriche stellw. häufig. 6—9. ☉

3. *A. verticillata* Rchb. exc. A. Monelli Lin. Comp. I. 1. p. 340. Im südlichsten Eittoral, Piemont um Nizza. 4—5. ☉

4. *A. latifolia* L. Rchb. exc. In Ungarn bei Tolnau. 5—6. ☉

5. *A. tenella* L. K. syn. *Lirasekia* — Rchb. exc. p. 408. Nees ab. Es. I. alpina Schmidt (Laseckia). Sumpfige moorige Wiesen, in Torfmooren stellw. im Geb., Rheing., Grefeld im Kleibruche, Oberelsaß bei Remberviller, Westphalen zw. Scherembeck u. Dorsten, Ostfriesland im Hochmoore bei Aurich; Schweiz Cant. Waadt bei Lausanne, Vevey; Belgien, Holland; Tyrol, Eittoral, Lombardei, Verona, Benedig; Piemont, Oneglia, Nizza. 7—8. 4

640. *Centunculus* L. (V. 1.) Kleinling. K.
syn. 669. Rchb. exc. p. 408. Comp. I. 1. p. 236.

1. *C. minimus* L. K. syn. Rasse, sandige Orte, Waldb- u. Wegeränder, Heiden, Triften, Aecker, stellenw. dch. b. g. Geb. 6—7. ☉

641. *Androsace* L. (V. 1.) Mannschild. K.
syn. 669. K. Taschb. 420. Comp. I. 1. p. 319.

a. *Aretia* L. Rchb. exc. p. 398.

1. *A. helvetica* Gaud. K. syn. *Andr. bryoides* DC. *Aretia helvetica* Haller, Schkr. *Ar. bryoides* Lois. *Diapensia helvetica* Lin. Felsen d. Hochalpen, Baierschen Alpen auf d. Spitze d. hohen Dumen; Schweiz auf d. Gemmi um d. Taube; Tyrol M. Schlehern, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

2. *A. imbricata* Lamk. K. syn. *Andr. Aretia* Lapeyr. *An. argentea* Gaertn. *A. tomentosa* Schleich. exsicc. Gaud. *An. multiflora* Vandel, *A. imbricata* β . DC. *Aretia tomentosa* Schleich. Rchb. exc. Granitfelsen d. Hochalpen, besonders in d. Schweiz, Cant. Wallis auf d. Gruben, Smuth u. Fineln über Zermatten im Nicolai-Thale, am Gletscher des Monte Rosa über Macugnana; Südtirol. 6—7. 4

3. *A. Heerii* Koch. K. syn. *Aretia* — Hegestsch. Rchb. exc. Hochalpen d. Schweiz sehr selten u. nur in d. Alpenzuge d. Cant. Glarus, dem Kleinthale gegen d. Martinsloch 7—8000' hoch. 7—8. 4

4. *A. glacialis* Hoppe. K. syn. *An. pennina* Gaud. helv. *An. alpina* Lamk. DC. *An. intermedia* Hegestschw. *An. pedunculata* Clairv. *Aretia alpina* Wulf. Jacq. *Ar. glacialis* Schleich. Rchb. exc. Var. β . *Aret. Wulfeniana* Sieb. — γ . *Aretia brevis* Hegestsch. Fl. helv. p. 487. Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz in d. Alpenzuge v. Glarus, Cant. Wallis Nicolaithal, über Zermatten u. Graubünden nach Tyrol, Steyermark, Salzburg, Kärnthen, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

5. *A. pubescens* DC. Fl. fr. K. syn. *An. alpina* Gaud. *Aretia alpina* L. Rehb. exc. Im südl. Hochalpenzuge d. Schweiz, Cant. Glarus, Cant. Waadt über Ber, Genf auf d. Sonnet u. in d. Combardei. 6—7. 4

b. *Androsace* L. Rehb. exc. p. 309.

6. *A. villosa* L. K. syn. Jacq. collect. *An. villosa* α. M. et K. Grasige, bewachsene Felsen d. Alpen, Schweiz auf d. höchsten Jochen d. Jura, M. Dole, Creur du Van, M. Chasseron; Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Eittoral, Dalmatien, Ungarn, Combardei, Venedig. 6—8. 4

7. *A. Chamaejasme* Host. K. syn. *A. villosa* Jacq. Austr. *An. villosa* β. M. et K. Bewachsene Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. Böhmen, Galizien, Steyermark, Tyrol, Siebenbürgen u. Combardei. 7—8. 4

8. *A. obtusifolia* Allion. pedm. K. syn. *A. Chamaejasme* Wulf. *An. Lachenalii* Gmel. bad. *An. lactea* Vill. delph. Var. *An. obtusifolia* β. *aretoides* Gaud. Felsen d. Hochalpen, besonders im Urgebirge, Schweiz Cant. Wallis, Nicolaital über Zermatten u. stellw. dch. d. g. südl. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Destr. bis in d. Combardei u. nach Venedig, Böhmen in d. kleinen Schneeegrube d. Suedeten u. in Galizien. 6—7. 4

9. *A. lactea* L. K. syn. *A. pauciflora* Vill. delph. Felsen d. Kalkalpen, Schweiz auf d. höchsten Jochen d. Jura, M. Creur du Van, M. Chasseral, Weissenstein, Paswang, M. Wasserfall, Vogelberg, Chasseron, Dole u., Tyrol, Salzburg a. d. Untersberg, Destr. Mähren, Steyermark, Galizien, Ungarn, Combardei, Piemont. 7—8. 4

10. *A. carnea* L. K. syn. *Aretia Halleri* L. Gra- nitfelsen d. Alpen u. Boralpen, stellw. Rheing. in d. Vogesen a. d. M. Ballon; Schweiz in d. Appenzeller-Alpen, Cant. Wallis im Nicolaitale, M. Fineln, über Zermatten,

M. Fouly, M. Rosa, St. Bernhard; Tyrol auf d. Seiser-
alpe, Lombardei, Piemont M. Genis. 7—8. 4

11. *A. elongata* L. K. syn. *A. nana* Hornem. Son-
nige, uncultivirte Hügel, sandige Aecker, Brachfelder, sehr
zerstreut dch. d. Geb., Rheing. im Nahethale bei Kreuznach,
Schloß Böckelheim, Niederhausen, Coblenz zw. Dhtendung
u. Pleidt, Franken bei Würzburg, Baiern bei Regensburg,
Thüringen, Sachsen, Schlesien bei Troppau; Destr. Böh-
men, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 4—6. ☉

12. *A. septentrionalis* L. K. syn. *A. brevifolia*
Vill. delph. Sandige Aecker, stellw. im Geb., Maing., Frank-
furt, Großsteinheim bei Hanau, Baiern, Wertheim, Würz-
burg, Oberhessen bei Schotten, Sachsen, Schlesien, vereinzelt
nach Preußen bis Danzig, Thorn, Königsberg; Destr. Böh-
men, Mähren, Galizien, Siebenbürgen; Schweiz Cant.
Wallis im Nicolaithale. 5—6. ☉

13. *A. maxima* L. K. syn. Saat- u. Brachäcker, an
Wegen, stellw. besonders auf Kalk- u. Lehmboden; Rheing.,
Pfalz bei Ellerstadt, Mardorf, Lambsheim, Oggersheim,
Frankenthal zw. Worms u. Kleinniedesheim, Herrheim, Grün-
stadt, Marnheim, Kirchheimboland, zw. Oppenheim u. Mainz,
Nahethal Bingen, Kreuznach, Pfaffenschwabenheim, Boben-
heim, Posenheim, Langlonsheim, Coblenz bei Mülheim,
Rübennach, Mayen, Nassau um Wiesbaden u. Mosbach,
Schwaben, Baiern; Schweiz im Mittel-Wallis; Destr. Un-
garn, Siebenbürgen, Lombardei. 4—5. ☉

642. *Aretia* Gaud. helv. (V. 1.) *Aretie*. K. syn. 672.
K. Taschb. 422. Comp. I. 1. p. 324.

1. *A. Vitaliana* L. Willd. K. syn. *Androsace* —
Lapeyr. Rehb. exc. p. 400. *Primula* — L. spec. *Gregoria*
— Duby. Granitfelsen d. Hochalpen in d. südl. Alpenzoge,
Schweiz Cant. Wallis M. Simplon, Nicolaithal über Zer-
matten, Südtirol Seiseralpe, Lombardei, Novara, Piemont.
7—8. 4

643. *Primula* L. (V. I.) *Primel.* K. syn. 673.

Rchb. exc. p. 401. Comp. I. 1. p. 324.

1. *P. farinosa* L. K. syn. *Androsace* — Spreng. Roth. enum. Sumpfige Moorigen Ebenen u. Gebirgen bis in d. Alpen, Schweiz u. d. g. Alpenkette bis in d. Niederungen, Rheing. von d. Niedwiesen am Bodensee nach d. württembergischen u. badischen Juragegenden bei Krauchenwies, Sigmaringen, Tuttlingen, Billingen, Schaffhausen nach Oberelsaß, Oberschwaben, Eisenach, Oberbaiern, zerstreut bis Würzburg, Schweinfurt, Ansbach nach Destr. bis in d. Lombardei; dann im Norden von Mecklenburg nach Pommern, Preußen Danzig, Tilsit, Memel u. 6—8. 4

2. *P. stricta* Hornem. Rchb. exc. *P. Hornemanniana* Lehm. *P. farinosa* β. Wahlenb. *P. farinosa* β. *denutata* K. syn. *Androsace stricta* Hartm. Sumpfige Orte d. Vor-alpen in Tyrol. 6—8. 4

3. *P. longiflora* Allion. pedm. K. syn. Grasige Orte, Triften d. Hochalpen, Schweiz nur an d. Mont-Mar-Gletscher über d. Saßthale u. im Nicolaithal über Zermatten am Galenberg, im Cant. Wallis; häufiger in Destr. Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Lombardei, Venedig, Piemont. 6—7. 4

4. *P. acaulis* Jacq. K. syn. *P. veris* γ. *acaulis* L. *P. elatior* β. *acaulis* Willd. *P. vulgaris* Smith. *P. variabilis* α. *acaulis* Tratt. *P. grandiflora* Lamk. *P. hybrida* Schrank. *P. sylvestris* Scopol. *P. uniflora* Gmel. Var. β. *caulescens*: *P. brevistyla* DC. Wälder d. Gebirge u. Vor-alpen bis in d. Ebenen, stellw. d. Geb., von d. Schweiz besonders im Jura nach Oberschwaben, Rheing., Oberbaden, Deuz bei Gölz, Baresbeck bei Elberfeld, Westphalen, Mecklenburg, Ostfriesland, Halle, Oberbaiern bis Destr. u. 4—5. 4

5. *P. elatior* Jacq. K. syn. *P. veris* β. *elatior* L. *P. veris officinalis* Fl. Dan. *P. variabilis* β. *elatior* Tratt. *P. inodora* Hoffm. Var. β. *P. elatior* γ. *calycantha* Willd. — γ. *P. Flüggeana* Lehm. Etwas feuchte, grasige Wal-

stellen, Waldwiesen, stchw. dch. d. g. Geb.; Var. γ . Gebirge im südlichsten Geb., Bassano bei Venedig. 3—4. 4

6. *P. officinalis* Jacq. K. syn. *P. veris* α . *officinalis* L. *P. veris* Lehm. *P. veris elatior* Fl. Dan. *P. variabilis* ϵ . Tratt. Var. β . *inflata* Lehm. Trockene Wiesen, Triften, Heiden, lichte Waldwiesen, Waldränder, dch. d. g. Geb. 4—5. 4

7. *P. suaveolens* Bertoloni K. syn. *P. Columnae* Tenore. Bergwiesen im südl. Littoral, Istrien M. Maggiore u. M. Plavnik, Dalmatien. 4—5. 4

8. *P. Auricula* L. K. syn. Grasige Felsen der Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette bis Destr. u. stchw. in d. Niederungen, Rheing. auf dem Elsass Jura M. Belchen, Schwarzwald, Breisgau in d. Hölle beim Hirschsprung, Torfgründe in Oberschwaben u. Oberbaiern bei München. 5—7. 4

9. *P. ciliata* Moretti. Rchb. exc. *P. Balbisii* Lehm. *P. Auricula* β . *ciliata* K. syn. Auf der südlichsten Alpenkette, Südtirol M. Sumano im Vicentinischen, Lombardei M. Generoso bei Mailand. 5. 4

10. *P. crenata* Lamk. Rchb. exc. *P. marginata* Curt. Felsen d. Hochalpen, Steyermark auf d. Hohenschwab, Schweiz M. Rosa, M. Turlo; Banzone in d. Novarese, Col. di Tenda in Piemont. 6. 4

11. *P. pubescens* Jacq. K. syn. *P. helvetica* Schleich. Don. Rchb. exc. in add. Felsen d. Alpen, Schweiz Cant. Graubünden, zw. Chiavenna u. d. Wormserbad, Tyrol auf d. Pregratischen Alpen bei Pregraten u. Windisch-Matray, Salzburg im Blimbeck auf d. Murmelthier-Felsen, Piemont Rizza. 4—5. 4

12. *P. villosa* Jacq. Willd. K. syn. *P. hirsuta* DC. *P. viscosa* Rchb. pl. crit. *P. viscosa* β . Gaud. Var. β . *P. viscosa* Allion. pedm. *P. decora* Sims. Granitfelsen d. Hochalpen, Südschweiz M. Gotthard, Scheideck, Foully, St. Bernhard u., Tyrol, Kärnthen. 5. 4

13. *P. rhaetica* Gaud. K. syn. *P. alpina* Rchb. exc.

in add. p. 864. Hochalpen, Schweiz Cant. Graubünden u. in Tyrol. 4—5. 2

14. *P. pedemontana* Thomas K. syn. Südliche Alpenkette, Schweiz Cant. Graubünden, Cant. Wallis, Combardei Valle de Aanzo, Piemont M. Genis. 6—7. 2

15. *P. hirsuta* Rehb. exc. *P. ciliata* Schrank. *P. viscosa* Vill. delph. *P. viscosa* α. Gaud. Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Piemont. 5—6. 2

16. *P. latifolia* Lapeyr. K. syn. *P. graveolens* Hegestsch. *P. villosa* M. et K. *P. viscosa* DC. Var. β. *P. hirsuta* Allion. pedm. In d. südl. Hochalpenkette d. Schweiz Cant. Wallis, M. Javenaz über Ber, Graubünden, Engadin, Piemont. 6—7. 2

17. *P. venusta* Host. K. syn. *P. carniolica* β. DC. *P. Freyeri* Hoppe. *P. multiceps* Freyer. Gebirge u. Vor-alpen im südl. Geb., Südtirol, Krain, Idria in Illyrien, Ungarn, Combardei. 4—5. 2

18. *P. carniolica* Jacq. K. syn. *P. integrifolia* Scopol. Alpen, Krain, Tyrol am Fuße d. Robila-Alpe. 5. 2

19. *P. spectabilis* Tratt. K. syn. Var. α. *ciliata*: *P. integrifolia* Jacq. *P. Clusiana* Tausch. — β. *denticulata*: *P. integrifolia* Tausch. Kalkfelsen d. Gebirge u. Alpen; Destr. Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. 2

20. *P. integrifolia* L. K. syn. *P. Candolleana* Rehb. exc. Feuchte Orte d. Hochalpen, in d. östl. Schweiz M. Gott-hard, M. Furka, Tyrol, Dalmatien, Combardei. 7—8. 2

21. *P. Polliniana* Moretti. Rehb. exc. in add. p. 864. *P. carniolica* Pollini. *P. integrifolia* Marzar. Gebirgswiesen im südl. Tyrol, M. Sumano u. M. Baldo. 4—5. 2

22. *P. glaucescens* Moretti Rehb. exc. *P. calycina* Duby. *P. integrifolia* Wulf. Alpen in d. Combardei bei Como auf d. Corni di Conzo über d. See Lario. 6. 2

23. *P. Dinyana* Lager. K. syn. *P. Muretiana* Moritzi Fl. helv. Hochalpen d. Schweiz auf d. Abula im Cant. Graubünden. 6—7. 2

24. *P. glutinosa* Wulf. L. fil. K. syn. Granitfelsen, an d. Schneegrenze d. Hochalpen, Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen u. Lombardei. 6—8. 4

25. *P. Allioni* Loiseleur K. syn. *P. glutinosa* Allion. pedm. Kalkfelsen d. Alpen, Tyrol M. Castellaza di Paneveggio in Fiemme u. von da östlich bis zur obersten Baumgrenze, Lombardei. 7. 4

26. *P. Floerkeana* Schrad. K. syn. *P. intermedia* Tratt. *P. minima hybrida* Rehb. pl. cr. Granitfelsen d. Hochalpen, Salzburg, Südtirol u. Oberkärnthen. 7—8. 4

27. *P. minima* L. K. syn. *P. Sauteri* Schultz. Var. β . pubescens: *P. truncata* Lehm. monogr. Rehb. exc. Feuchte, grasige, felsige Orte d. Kalk- u. Granitalpen, Schweiz auf d. Gotthard u. in Graubünden nach Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen nach Destr., Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Galizien, Böhmen u. auf d. Schneefuppe in d. Sudeten. 7—8. 4

644. *Hottonia* L. (V. 1.) *Hottonie*. K. syn. 679. Rehb. exc. p. 398. Comp. I. 1. p. 336.

1. *H. palustris* L. K. syn. Stehende u. stillfließende Wasser, Gräben, Teichen, Bächen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Baden, Elsaß, Pfalz v. Landau bis Worms, Mainz, Nassau, Kreuznach, Saarbrücken u. Luxemburg, dann am Niederrheine Siegburg, Bonn am Ausfluß d. Sieg bei Mühlheim, Düsseldorf, Wesel nach Westphalen, Hamburg, Hannover u. dch. d. nördl. Geb. nach Preußen zc.; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Venedig. 5—6. 4

645. *Cortusa* L. (V. 1.) *Cortuse*. K. syn. 679. Rehb. exc. p. 405. Comp. I. 1. p. 332.

1. *C. Matthioli* L. K. syn. Rasse, schattige Orte, Quellenränder d. Alpenthäler u. Boralpen; Schwaben, Baiern, auf d. Finkerskopf, Schlessien im Riesengebirge; Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Piemont. 5—6. 4

646. *Soldanella* L. (V. 1.) *Alpenglöckchen*. K. syn.

679. Rehb. exc. p. 406. Comp. I. 1. p. 333.

1. *S. montana* Willd. K. syn. *S. alpina* Schmidt boh. *S. Clusii* Sims. *S. alpina major* Clus. Schwammige Torfmoore d. Boralpen u. Bergwäldungen, stellw. Baiern bei Passau; Destr. bei Wien, Böhmen, Salzburg bei Mondsee, Kärnthen, Steyermark, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 5—7. 4

2. *S. alpina* L. K. syn. *S. Clusii* Schmidt. boh. Alpen am Schneerande bis in d. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. bis in d. Lombardei u. Rheing., Oberbaden im Breisg. auf d. Feldberg Sudeten Babia Gora u. auf d. Carpathen in Mähren. 5. 4

3. *S. pusilla* Baumgarten. K. syn. *S. Clusii* Gaud. helv. Hochalpen beim Wegschmelzen d. Schnees; Schweiz stellw. dch. d. Alpenkette nach Boralberg bis Bregenz, Destr. Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 5—7. 4

4. *S. minima* Hoppe. K. syn. Bewachsene Kalkfelsen d. Alpen u. Boralpen; Destr. Steyermark, Tyrol, Kirchbaumer-Alpe, Kärnthen in Fodenthale u. M. Loibl, Krain, Vittoral, Ungarn. 6—7. 4

647. *Cyclamen* L. (V. 1.) *Erdscheibe*. K. syn.

680. Rehb. exc. p. 406. Comp. I. 1. p. 334.

1. *L. europaeum* L. K. syn. Gebirgswälder u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. bis ins südl. Geb., dann in Schlesien, Böhmen, Mähren. 8—10. 4

2. *C. aestivum* Purk. Rehb. exc. *C. europaeum* Lamk. *C. Clusii* Smith. *C. littorale* Sadler. Im südlichsten Geb., Dalmatien, Lombardei, Oberitalien. 6—9. 4

3. *C. hederifolium* Aiton. Gaud. helv. K. syn. *C. ficariifolium* Rehb. exc. *C. subhastatum* Rehb. exc. *C. Poli* Dell.-Chiaje. Var. β . *C. neapolitanum* Tenore. Son:

nige, felsige Orte, in dem südl. Gebirgszuge, Schweiz in d. Alpen von Graubünden u. im Cant. Wallis; Oestr. Eittoral, Dalmatien; Ligurien. 8—9. 4

4. *C. repandum* Sibth. K. syn. *C. vernum* DC. *C. hederifolium* Tenore. Wälder u. Gebüsche im südl. Eittoral, Istrien. 4. 4

648. *Samolus* L. (V. 1.) Bungen. K. syn. 681.

Rchb. exc. p. 411. Comp. I. 1. p. 319.

1. *S. Valerandi* L. K. syn. Feuchte Wiesen, Gräben, besonders auf Lehm u. salzhaltigem Boden, stellw. u. sehr zerstr. dch. d. Geb. bis in d. Lombardei zc., Rheing. dch. Baden besonders auf d. g. Rheinfläche bei Huttenheim, Leimen, Ilgen, Heidelberg, Pfalz bei Dürkheim, Lambsheim, Frankenthal, Worms bis Mainz, Saarbrücken, Flora v. Trier und wieder am Niederrheine bei Grefeld u. dch. Westphalen bei Münster, Rheda, nördl. nach Hannover, Preußen; Oestr. zc. 6—8. 4

649. *Glaux* L. (V. 1.) Milchkraut. K. syn. 681.

Rchb. exc. p. 409. Comp. I. 1. p. 341.

1. *G. maritima* L. K. syn. Masse, salzhaltige Orte, an d. Küsten d. Ost- u. Nordsee, Hannover, Oldenburg, Holstein, Bremen, nach Preußen, bei Danzig, Memel zc., u. an Salinen d. Binnenlandes stellw. dch. d. Geb., Rheing., Pfalz an d. Salinen bei Dürkheim, salzhaltige, grasige Orte bei Frankenthal, Oggersheim, Wetterau, Salinen bei Nauheim, Wiffelsheim, Nassau bei Eoden; Thüringen; Oestr. Böhmen, Mähren, Dalmatien, Siebenbürgen. 5—6. 4

650. *Coris* L. (V. 1.) Coris. Rchb. exc. p. 410.

Comp. I. 1. p. 340.

1. *C. monspeliensis* L. Rchb. exc. Hügel, Felsen am südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Piemont, Nizza am Cap Noli. 4—5. 5

Dreiundneunzigste Ordnung.

Globularieen.

DC. K. syn. 681. K. Taschb. 428. Personatae pars
 Rchb. exc. p. 364.

651. *Globularia* L. (IV. 1.) Kugelblume. K.
 syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 214.

1. *G. vulgaris* L. K. syn. Steinige, sonnige Kalk-
 hügel, trockene, steinige Wiesen, besonders auf Kalk- u. Sand-
 boden, stellw. dch. d. Geb. bis in d. Boralpen; Rheing. v.
 Basel dch. Elsaß, auf d. Würtemberger-Jura am Roßberg
 bei Tuttlingen, nach Oberbaden bei Müllheim, Freisg. am
 Kaiserstuhl; Bergstraße bei Weinheim, Pfalz am Hardtge-
 birge bei Deidesheim, Dürkheim bis Grünstadt, Alzen zw.
 Mainz, Niederingsheim u. Bingen, Kreuznach, Martinsstein,
 Saarbrücken, Trier in d. Eifel, Giesdorf bei Schönecken,
 Prüm, Münstereifel, Luxemburg bei Han, Schwaben, Baiern,
 Thüringen, Sachsen, Schlesien nach Destr. 2c. 5—6. 4

2. *G. incanescens* Visiani. Rchb. exc. Im süd-
 lichsten Geb.; an d. Marmorbrüchen v. Carrara u. auf d.
 Apuanischen u. Etrurischen Alpen. 5. 4

3. *G. nudicaulis* L. K. syn. Sonnige Kalkfelsen
 d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach
 Baiern, Destr. Lombardei u. Oberitalien, mit d. Flüssen
 stellw. in d. Niederungen, wie an d. Isar bei München.
 5—7. 4

4. *G. cordifolia* L. K. syn. Felsen d. Alpen u.
 Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern,
 Destr. 2c., besonders auf d. Jura, u. mit d. Flüssen in d. Nie-
 derungen nach Schwaben, Baiern, Schlesien, südl. bis Istrien
 bei Triest, Lombardei nach Oberitalien. 5—6. 4

5. *G. alypum* L. Rchb. exc. Dürre Hügel im süd-
 lichsten Eittoral, Piemont bei Nizza, Niegia. 3 u. 8—9. 3

Vierundneunzigste Ordnung.

Plumbagineen.

Juss. K. syn. 682. K. Taschb. 428. Rchb. exc. p. 189.

652. *Armeria* Willd. (V. 5.) Graßnelke. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 540. *Statice* L. K. syn.

1. *A. plantaginea* Willd. Rchb. exc. *Statice* — Allion. K. syn. Uncultivirte, sandige Orte, stellw. mehr im südl. Geb., Rheing. im Rießerwalde zw. Mainz u. Niederengelheim, bei Gonsenheim u. auf d. Niederwerth unterhalb Coblenz; Südschweiz Cant. Wallis nach d. Lombardei u. Piemont. 6—7. 4

2. *A. scorzonrifolia* Willd. Rchb. exc. *Statice* *Armeria* major Jacq. Felsen im südlichsten Geb., Lombardei, Sotto il Gropo bei Pavia. 6—7. 4

3. *A. elongata* * *A. vulgaris* Rchb. exc. *Statice* *elongata* Hoffm. K. syn. *Statice armeria* β . *elongata* DC. *St. armeria* Pollich, *St. arenaria* Pers. *Armeria littoralis* Willd. Var. β . *pubescens*: *Armeria vulgaris* β . *pubescens* Dethard. Sandige, uncultivirte Orte, Triften, Begeränder, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Baden bei Schwegingen, Mannheim, Ladenburg, Weinheim, Eberstadt, Dürkheim in d. Pfalz, Commern bei Köln, Düsseldorf, Aachen, Baiern, Schwaben, Sachsen u., an d. Nord- u. Ostseeküste, Königsberg, Danzig u. 4—9. 4

4. *A. denticulata* Rchb. exc. *Statice* — Bertolon. *St. canescens* Host. Gebirge im südl. Littoral, Dalmatien, Ligurien bei Sarzana. 6. 4

5. *A. purpurea* Koch. Flora. bot. Z. *Statice* — K. syn. Baiern auf d. Ried bei Memmingen. 7—8. 4

6. *A. maritima* Willd. Rchb. exc. *Statice* — Miller. K. syn. *St. pubescens* Hayne. *St. Armeria* Smith. Auf d. Dünen d. Nordsee, Cuxhaven bei Hamburg, Holstein, Schleswig u. dch. g. Ditmarsen; Belgien, Holland. Auch häufig in Gärten angepflanzt. 6—7. 4

7. *A. Halleri* Wallr. Statice-Garke. Flora v. Nord- u. Mitteldeutschland, p. 273. Grasstellen im Harz bei Herzberg u. Badenhausen. 5. 4

8. *A. alpina* Hoppe. Willd. Rchb. exc. Statice — Hoppe. K. syn. Triften d. Alpen, Schweiz Cant Wallis; Destr. Steyermark, Kärnthen, Tyrol, Krain, Vittoral, Istrien, Siebenbürgen. 7—8. 4

653. *Statice* L. (V. 5.) Seefstrandśnellke. K. syn.

684. Rchb. exc. p. 190. Comp. I. 1. p. 541.

1. *St. Gmelini* Willd. K. syn. Rchb. pl. crit. Salzhaltige Orte in Ungarn, Destr. im südl. Vittoral. 7—8. 4

2. *St. Limonium* L. K. syn. Rchb. exc. Var β . *St. Pseudo-Limonium* Rchb. exc. *St. Behen* Dreyer. An d. Seefstrande d. Nord- u. Ostsee u. im südl. Vittoral. 8—9. 4

3. *St. serotina* Rchb. exc. Im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien, Venedig. 9—10. 4

4. *St. angustifolia* Tausch. Rchb. exc. in add. p. 846. Vittoral d. adriatischen Meeres in Destr. mit voriger. 7. 4

5. *St. scoparia* Pall. Rchb. exc. et pl. crit. p. 391. Feuchter Salzboden, Wiesen, Triften in Ungarn. 7—9. 4

6. *St. tatarica* L. Rchb. exc. Grassiger Salzboden im südl. Geb., in Dalmatien, Siebenbürgen bei Kolosvar. 6—8. 4

7. *St. globulariaefolia* Desfont. K. syn. Rchb. exc. *St. auriculaefolia* Buching. Am südl. Vittoral, Istrien auf d. Dünen v. Primiero zw. Grado u. d. Mündung d. Sponzo, Lombardei, Venedig. 5—7. 4

8. *St. oleaefolia* Pourr. Rchb. exc. Im südl. Geb., Dalmatien, Ungarn. 6. 4

9. *St. rupicola* Badarro. Rchb. exc. *St. acutifolia* Rchb. pl. crit. Küste in Piemont bei Genua. 6. 4

10. *St. pubescens* DC. Rchb. exc. Im südlichsten Vittoral, Piemont, Nizza, Villafranca, Cap Noli, Ligurien. 5—6. 4

11. *St. bellidifolia* Gouan. Rchb. exc. Im südlichsten Littoral, Lombardei, Venedig um Caorle, in d. Marene. 5—6. 4

12. *St. echiioides* L. Rchb. exc. *St. aristata* Smith. Im südlichsten Geb., Piemont um Ventimiglio. 5. ☉

13. *St. caspia* Willd. K. syn. Rchb. exc. *St. bellidifolia* DC. Fl. fr. *S. reticulata* M. v. Bieb. Sandige Orte im südl. Littoral, Istrien bei Grado, Insel Caorle, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

14. *St. articulata* Loisl. Rchb. pl. crit. II. f. 303. Maly enum. pl. austr. p. 303. Im südl. Littoral, Dalmatien, Venedig. 6. 4

15. *St. reticulata* L. Rchb. exc. *St. oleaefolia* Host. Felsen im südl. Littoral, Dalmatien. 5—6. 4

16. *St. cordata* L. Rchb. exc. Felsen am südlichsten Littoral in Piemont. 5—6. 4

17. *St. cancellata* Bernh. K. syn. *St. pubescens* K. syn. edit. I. *St. furfuracea* Rchb. exc. an Lagasca? Felsen im südl. Littoral, Istrien bei Scoglio, Telvego, Trieste, Fiume, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 5—6. 4

18. *St. ferulacea* L. Visian. Fl. Dalm. Maly enum. pl. austr. in add. p. 403. Im südl. Littoral, Dalmatien, Insel Sabbioncello bei Rosario. 6. 4

654. *Plumbago* L. (V. 1.) Bleimurz. K. syn.

685. Rchb. exc. p. 191. Comp. I. 1. p. 293.

1. *P. europaea* L. K. syn. Uncultivirte Orte, an Zäunen, Hecken, am südl. Littoral, Istrien bei Pola, Isola St. Nicolo, Fiume, Dalmatien, Croatien. 8—9. 4

Fünfundneunzigste Ordnung.

Plantagineen.

Juss. K. syn. 685. K. Taschb. 430. Rchb. exc. p. 394.

655. *Littorella* L. (XXI. 3.) Strändling. K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 663.

1. *L. lacustris* L. K. syn. Ueberschwemmter Sandboden an u. in Teichen, Seen u. am Seestrande, sehr zerstreut dch. d. Geb. bis in d. Lombardei; Rheing. bei Constanz zw. Staad u. d. Lorettowald, in d. Vogesen am See Gerardmer bei Wächtersbach, Flora v. Trier Gimsweiler bei Birkenfeld, Luxemburg bei Etalle, Niederrhein, Siegburg bei Bonn, Wesel, Grefeld, Essen u. dch. Westphalen, Hamburg, Hannover, Mecklenburg, Bremen, Sever nach Preußen bei Danzig, Baiern, Sachsen nach Destr. 11. 6—7. 4

656. *Plantago* L. (IV. 1.) Wegetritt. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 228.

1. *P. maxima* Aiton. Rchb. exc. *P. cucullata* Lamk. Feuchte Orte, im südl. Geb., Ungarn, Lombardei, Venedig. 6—10. 4

2. *P. major* L. K. syn. Var. β . *nana*: *P. nana* Tratt. *P. minima* DC. — γ . *P. media procera* Sonder. Cultivirte u. uncultivirte Orte, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen; Var. β . auf nassem Sandboden; Var. γ . auf salzhaltigen Wiesen bei Olbesloe u. bei Rissingen. 7—10. 4

3. *P. uliginosa* Baumgart. Rchb. exc. in add. p. 863. Sumpfige Orte d. Boralpen in Ungarn im Banat, Siebenbürgen bei Szuruluj 11. u. in Piemont. 7—8. 4

4. *P. Cornuti* Gouan. K. syn. *P. Gouani* Spreng. *P. limosa* Kitaib. *P. Tabernamontani* Baumgarten, *P. maritima latifolia* Zannichel., *P. adriatica* Campan. Salzhaltige Wiesen am südl. Littoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

5. *P. crispa* Jacq. Rchb. exc. *P. crassifolia* Roth. *P. crassa* Willd. Im südlichsten Geb., Oberitalien Val Della Strona. 6—7. 4

6. *P. media* L. K. syn. Wiesen, Raine, Wege, Triften, im g. Geb. bis in d. Alpen. 5—6. 4

7. *P. altissima* L. K. syn. *P. lanceolata* β . DC. Sumpfige Wiesen im südl. Geb., Südtirol, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Venedig 11. 4—5 4

8. *P. lanceolata* L. K. syn. Var. β . *capitellata* K. syn. *P. lanceolata* γ . *spaerostachya* M. et K. *P. lanceolata* ϵ . DC. *P. lanceolata* var. *capitellata* Sonder. — γ . *lanuginosa*: *P. hungarica* W. et Kit. — δ . *humifusa*: *P. humifusa* Bernh. *P. decumbens* Bernh. Rchb. exc. Sturm. *P. lanceolata* δ . M. et K. — ϵ . *alpina* Gaud. helv. *P. lanata* Portenschl. ap. Host. Wiesen, Triften, Raine, Wege, Felser, im g. Geb. bis in d. Alpen. 4—10. 4

9. *P. victorialis* Poir. K. syn. DC. *P. sericea* W. et Kit. Rchb. exc. K. syn. edit. I. *P. argentea* Vill. delph. non Lamk. *P. capitata* Hoppe, *P. monspeliensis* Willd. Sonnige, steinige Orte, im südl. Geb., Südtirol, Krain, Eittoral, Istrien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig u. 5—6. 4

10. *P. rubens* Portenschl. apud Host. Fl. austr. Rchb. exc. *P. sericea* var.? Maly enum. pl. austr. p. 101. Auf d. höchsten Alpenjochen in Dalmatien M. Biočovo. 5—6. 4

11. *P. albicans* L. Rchb. exc. Var. β . *P. velutina* Poir. Gebirge, Hügel, im südlichsten Geb., Piemont, Nizza, Novarese u. Oberitalien. 5—6. 4

12. *P. Lagopus* L. Rchb. exc. Sonnige, steinige Orte im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Piemont, Nizza. 4—5. 4

13. *P. eryostachia* Tenore. Rchb. exc. Am südlichsten Eittoral in Oberitalien. 5—6. ☉

14. *P. montana* Lamk. K. syn. *P. atrata* Hoppe, Roth. *P. alpina* Jacq. Vill. *P. spaerocephala* Poir. *P. quinquenervia* Schlecht. Triften d. Kalkalpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnten, Krain, Dalmatien bis in d. Lombardien, Schlesien im Kessel d. Sudeten. 7—8. 4

15. *P. saxatilis* M. v. Bieb. Rchb. exc. K. syn. Var. β . *holosericea*: *P. montana* β . *holosericea* Gaud. Alpen d. Schweiz in d. südl. Kette, Cant. Valais über Leuf u. im Nicolaithale über Zermatten. 7—8. 4

16. *P. pilosa* Pourret. K. syn. Roth. *P. holostea* Lamk. *P. Bellardi* Allion. pedm. Rchb. exc. *P. lanata* Poir. Im g. südl. Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Venedig zc. 7. ☉

17. *P. alpina* L. K. syn. Var. α . *ovina* Vill. delph. — β . *P. bidentata* Murrit. Gaud. helv. — γ . *P. capitella* DC. — δ . *P. incana* DC. Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Vorarlberg, Tyrol, Salzburg, Mähren, Kärnthen, Siebenbürgen, Lombardien, Piemont. 6—7. 4

18. *P. tenuiflora* W. et Kit. Rchb. exc. *P. Loefflingii* M. v. Bieb. non Jacq. *P. pusilla* Nutt. Salzhaltiger Sandboden in Ungarn, St. Jwan bei Pesth u. in Gumanien. 5—6. ☉

19. *P. maritima* L. K. syn. Var. α . *genuina*: *P. maritima* Roth. *P. Wulfenii* Willd. *P. subulata* Roth. — β . *dentata*: *P. dentata* Roth. *P. graminea* Lamk. Rchb. exc. in add. p. 863. — γ . *ciliata*: *P. Wulfenii* M. et K. *P. aspera* Gaud. helv. *P. alpina* Sieb. *P. graminea* Schleich. *P. serpentina* Rchb. exc. — δ . *squamaria*: *P. squamaria* Fl. Dan. Rasse, feuchte Orte an d. Seelüsten d. Ost- u. Nordsee u. am südl. Littoral, an Salinen u. auf salzhaltigem Boden im Binnenlande, stchw. dch. d. Geb. bis in d. Alpen; Var. β . et γ . Alpen, Schweiz, Tyrol, Destr. bis in d. Süden d. Geb., Rheing. in d. Wetterau an d. Salinen bei Nauheim u. Bieselheim zc. 7—10. 4

20. *P. subulata* L. Rchb. exc. *P. triquetra* Pers. Sonnige, steinige Orte, Felsen im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Venedig. 5—6. 4

21. *P. Weldenii* Rchb. exc. et pl. crit. *P. parvula* et *P. pumila* Welden. Im südl. Geb., Dalmatien im Narenta-Thale an d. Salinen v. Stagno. 4. ☉

22. *P. serpentina* Lamk. K. syn. *P. carinata* Schrad. Rchb. exc. *P. Wulfenii* Schreb. *P. subulata* Wulfen. *P. Gerardi* Schult. Austr. *P. holosteum* Scopol. Var. β . *longebracteata* K. syn. Sonnige, steinige Orte, Felsen im südl. Geb., Südtirol, Krain, Littoral, Istrien

bei Fiume, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig, Oberitalien, Piemont. 7—9. 24

23. *P. recurvata* L. K. syn. Murray. *P. maritima* DC. Sandige Orte im südl. Littoral, Istrien auf d. Dünen v. Primiero zw. Grado u. d. Ausflüsse d. Sonzo, Lombardei, Venedig. 7—8. 24

24. *P. Serraria* L. Bertolon. Fl. ital. Maly enum. pl. austr. p. 101. Dalmatien, Insel Cesina. 7. 24

25. *P. Coronopus* L. K. syn. *P. integrifolia* Gaud. helv. *P. neglecta* Gusson. Var. β . *P. coronopifolia* Roth. — γ . *P. Columnae* Gouan. *P. Cornuti* Jacq. *P. Jacquini* R. et Schult. Uncultivirte, grassige Orte, stellw. im Geb. u. an d. Seeküsten; Westphalen, um Rheine bei Münster, Holstein, Mecklenburg, Oldenburg, Pommern, Preußen bei Danzig, Schlesien, Schweiz bei Genf; Südlittoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 7—8. 24

Zweite Rotte. *Psyllium* Tournef. K. syn.

26. *P. Psyllium* L. K. syn. Sandige Küste am südl. Littoral; Istrien u. d. Inseln, Steyermark bei Gräß, Dalmatien, Siebenbürgen, Piemont, Genua, Nizza. 7—8. 24

27. *P. pumila* L. Rehb. exc. *P. exigua* Murray. Trockene Sandwiesen in Siebenbürgen. 7—9. 24

28. *P. arenaria* W. et Kit. K. syn. *P. Psyllium* Sturm. Sandebenen, stellw. dch. d. Geb., Südschweiz bei Genf u., Rheing., Elsaß, Mühlhausen, Colmar, Baden bei Karlsruhe, Schwellingen am Relaishaus, Mannheim, Darmstadt, am Hanhof bei Speier, zw. Mainz u. Nieder- ingelheim, Niederrhein bei Düsseldorf, Uerdingen bis nach Belgien; Erlangen, Dresden, Berlin, Hamburg, Jever u. längs d. Küste hin nach Preußen, Schlesien; Oestr. Böhmen, Südtirol, Krain u. stellw. im südl. Littoral. Dalmatien, Lombardei, Venedig, Ungarn. 7—8. 24

29. *P. Cynops* L. K. syn. *P. suffruticosa* Lamk. C. *Cynops* et *P. genevensis* DC. Fl. fr. Uncultivirte, sandige Orte u. an den Seeküsten im südl. Geb., Südschweiz

bei Genf u. im Cant. Waadt; Destr. um Baden bei Wien, im südl. Vittoral, Istrien bei Monfalcone, Dalmatien, Combarbei, Piemont, Nizza, Novara. 6—7. ☞

Vierte Unterklasse.

Monochlamydeen. Blumenlose.

K. Taschb. p. 433.

Sechshundneunzigste Ordnung.

Amaranthaceen.

Juss. K. syn. 690. K. Taschb. 433. Aizoideae prs. Rchb. exc. p. 584.

657. *Amaranthus* L. (XXI. 5.) *Amaranth*. K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 667.

1. *A. sylvestris* Desfon. K. syn. *A. viridis* Allion. pedm. Cultivirte Orte u. an Wegen, besonders im südl. Geb., Rheing., Pfalz bei Speier zw. d. Baumschule gegen d. Rhein hin, an d. Straße zw. Mutterstadt u. Oggersheim, früher auch bei Karlsruhe; Destr. bei Wien, Böhmen, Steyermark, Tyrol, Dalmatien, Croatien, Combarbei. 7—8. ☉

2. *A. Blitum* L. K. syn. Rchb. exc. *Albertia*-Kunth. *Amar. adscendens* Loisl. Rchb. exc. *A. viridis* Pollich. Cultivirte u. uncultivirte Orte, besonders an Mauern der Straßen, in Dörfern u. Städten, stchw. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

3. *A. prostratus* Balb. K. syn. Rchb. exc. et pl. crit. Aecker, Wege, besonders im südl. Vittoral; Destr. Ungarn, Dalmatien, Croatien, Combarbei bei Pavia, Venedig, Piemont, Oberitalien. 7—8. ☉

4. *A. retroflexus* L. K. syn. Rchb. exc. *A. viridis* Baumgart. Transyl. t. 267. test. Brassais et Fuss. Rchb

exc.? Gebauter Boden, an Wegen auf Schutt, besonders im g. südl. u. zerstr. dch. d. mittl. u. seltener im nördl. Geb., Rheing., Oberbaden bis Schwegingen, am Bohrhof bei Eberstadt, Pfalz bei Reichshofen, Gundershofen, Griesbach, Hagenau, Kronau, Speier, Mardorf, Nassau bei Bieberich, Hochheim bei Mainz, Hanau u., nördl. bis z. Weichsel; Destr. u., fehlt am g. Niederrheine. 7—9. ☉

5. *A. spicatus* Lamk. Rchb. exc. *A. chlorostachys* Moretti. Aecker, Schutt, im südl. Geb., Ungarn, Lombardien, Venedig, Oberitalien. 7—9. ☉

6. *A. albus* L. Rchb. exc. Im südlichsten Geb., Piemont bei Turin, Ligurien. 7—8. ☉

Siebenundneunzigste Ordnung.

Phylotaceen.

Rob. Brow. K. syn. 691. K. Taschb. 434. Rchb. exc. Aizoideae prs. p. 536.

658. *Phytolaca* L. (X. 5.) Kermeßbeere. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 2. p. 151.

1. *P. decandra* L. K. syn. Sandige Orte, Mauern, Felsen im südl. Eittoral u. im g. südl. Geb., Dalmatien u.; cultivirt u. verwildert, Südschweiz, Südtirol u. 7—8. 4

Achtundneunzigste Ordnung.

Chenopodeen.

Vent. K. syn. 692. K. Taschb. 434. Rchb. exc. Aizoideae prs. p. 576.

659. *Schoberia* C. A. Meyer. (V. 2.) Schoberia. K. syn. 692. Rchb. exc. p. 582. Comp. I. 1. p. 438.

1. *Sc. fruticosa* Meyer. K. syn. *Salsola* — Lin. *Chenopodium* — sum Allioni, Schrader. Felsen am südl. Eittoral, Istrien am Theresienlazareth in Triest, Dalmatien, Piemont, Nizza. 7—8. 3

2. *Sch. maritima* Meyer. K. syn. *Salsola* — M. v. Bieb. Visian. *S. trigyna* Willd. *Chenopodium maritimum* L. *Suaeda maritima* Moquin. *Suaeda chenopodoides* Pall. An d. nördl. u. südl. Seeküsten u. stellw. an Salinen im Binnenlande, dann an d. Sau in Steyermark bei Gills, Ostseeküste bei Memel, Königsberg zc. 8—9. ☉

3. *Sch. salsa* Meyer. Rchb. exc. *Salsola* — Lin. *Chenopodium salsum* Lin. *Suaeda maritima* β. *salsa* Visian. Im südl. Littoral, Dalmatien auf d. Insel Lissa, sumpfige Orte am Theiß in Ungarn. 8—9. ☉

660. *Salsola* L. (V. 2.) Salzfraut. K. syn. 692. Rchb. exc. p. 583. Comp. I. 1. p. 437.

1. *S. Kali* L. K. syn. *Kali Tragus* Scopol. Var. α. *S. Kali* Lin. — β. *S. Tragus* Lin. Sandige Orte an d. Seeküsten u. stellw. dch. d. g. Binnenland d. Geb., Rheing., Speier, zw. Mannheim u. Schwetzingen bis Birnheim, Lampertheim u. Großgerau bei Darmstadt, Mainz, Gonsenheim, Mombach, Niederengelheim bis Bingen, Bonn bei Oberkassel, Düsseldorf, Baiern, Sachsen, Westphalen, Hannover, Oldenburg bis Preußen zc.; Var. β. mehr im südl. Littoral. 7—8. ☉

2. *S. Soda* L. K. syn. *Kali Soda* Scopol. An d. Küste u. an Salzseen im südl. Geb., Littoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Ungarn, Lombardien, Verona, Venedig, Nizza. 7—9. ☉

3. *S. lanata* Baumgarten. Rchb. exc. *Polycnemum salsum* M. v. Bieb. *P. Volox* Spreng. *Halimocnemis Volox* C. A. Meyer. Monquin - Tandon. Salzboden, häufig in Siebenbürgen bei Kolos u. Zorda. 8—9. ☉

4. *S. sativa* L. Rchb. exc. *Halageton sativus* Visian. Im südl. Geb. cultivirt, Dalmatien. 7—8. ☉

661. *Salicornia* L. (II. 1.) Glaßschmalz. K. syn. 693. Rchb. exc. p. 576. Comp. I. 1. p. 9.

1. *S. herbacea* L. K. syn. *S. acetaria* Pallas. S.

annua Smith. Var. β . *S. prostrata* Pall. *S. procumbens* Smith. Seefüsten u. um Salinen stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an d. Salinen in d. Wetterau, bei Soben, Nauheim u. Wiesselsheim u., an d. Ost- u. Nordsee u. im südl. Littoral. 8—9. ☉

2. *S. radicans* Smith. Rchb. exc. *S. herbacea* β . *pachystachya* K. syn. Sandige, thonige Ufer am Heiligensee bei Potsdam, Dithmarscher Außenteiche, Holstein u. a. d. Ostsee. 9. 4

3. *S. fruticosa* L. K. syn. *Arthrocnemum fruticosum* Moquin. Tandon. Im südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Inseln Dsero, Cassion, Veglia, Dalmatien, Lombardei, Venedig an d. Lagunen. 7—8. 5

4. *S. macrostachya* Moricand. Rchb. exc. *S. fruticosa* β . *pachystachya* K. syn. Im südl. Littoral, Dalmatien auf d. Insel Galogera, Lombardei, Venedig an d. Lagunen. 8—9. 5

662. *Corispermum* L. (V. 2.) Wanzenfamen.

K. syn. 694. Rchb. exc. p. 584. Comp. I. 1. p. 452.

1. *C. Marchallii* Steven. K. syn. *C. bracteatum* Visiani Rchb. exc. *C. elatum* Host. *C. squarrosum* Lin. Sandige Felder, Aecker im südl. Geb., Rheing., bei Schwegingen in Baden; Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

2. *C. canescens* Kitaib. Host. Fl. austr. *Malyenum*. pl. austr. p. 89. *C. patens* R. et Schl. Sandige Aecker, Felder in Ungarn. 8. ☉

3. *C. intermedium* Schweigg. K. syn. Sandige Orte an d. Ostsee bei Königsberg, v. Danzig bis Memel; Ungarn im Stadtwalde bei Pesth u. in Croatien. 7—8. ☉

4. *C. hyssopifolium* L. K. syn. Steinige Orte, stellw. im Geb., am Donau-Ufer bei Lobau Gegend v. Wien, Rheing. bei Darmstadt, Galizien u. auf d. Dünen d. Nordsee, Ooververn in Belgien. 7—9. ☉

5. *C. nitidum* Kitaib. K. syn. *C. purpurascens* Host. *C. hyssopifolium* α . Neilreuter vind. Steinige, sandige Orte

in Destr. auf d. Donauinseln, auf d. Brigittenau bei Wien, Ungarn, bei Pesth u. in Croatien. 7—8. ☉

6. *C. microspermum* Host. austr. Rchb. exc. *C. tenue* Link. Sandfelder in Ungarn bei Pesth. 7—8. ☉

663. *Polycnemum* L. (II. 1.) Knorpelfraut.

K. syn. 694. Rchb. exc. p. 583. Comp. I. 1. p. 63.

1. *P. arvense* L. K. syn. *P. pumilum* Hoppe. *P. recurvum* Gussoni. *P. inundatum* Schrank. Aecker, Wege, kieselige Orte, besonders auf Sand- u. Thonboden, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Oberbaden, Breisgau bei Freiburg, Carlsruhe, Mannheim bis Frankfurt, Hanau, Nassau, Pfalz Hagenau, Donnersberg, Zweibrücken, Saarlouis, Trier an d. Sauer bei Roth, Luxemburg, Nahethal bei Martinstein, Kreuznach, Coblenz auf dem Mayenfelde, Neuwied u. 7—8. ☉

2. *P. majus* Alex. Braun. K. syn. Felder, an Wegen, stellw. mit d. Vorigen dch. d. Geb., Rheing., Baden bei Durlach, Sinsheim, Heidelberg, Mannheim am Relaishaus, Pfalz Rheingönnheim am Donnersberg, bei Heimkirchen, Kusel u. dch. d. g. Nahe- u. Glangegegend von Kreuznach bis Martinstein, Mainz, Nassau bei Dillenburg, Blums Ley bei Winnigen, Thüringen bei Naumburg. 7—8. ☉

3. *P. verrucosum* Lang. Rchb. exc. Dürre, sandige Orte in Ungarn bei Pesth u. in Cumanien. 6—9. ☉

4. *Heuffelii* Lang. Rchb. exc. Sandhügel in Wäldern, Ungarn im Comitat Pesth. 8—9. ☉

664. *Kochia* Roth. (V. 2.) Kochie. K. syn. 695.

Rchb. exc. p. 581. Comp. I. 1. p. 439.

1. *K. scoparia* Schrader. K. syn. *Salsola* — Host. *Chenopodium scoparium* L. Aecker, Wege, Schutt, besonders im südl. Geb., Thüringen früher bei Gisleben am Salzsee; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark um Grätz, Vitorral, Istrien bei Triest, Görz, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Lombardei, Venedig. 7—9. ☉

2. *K. arenaria* Roth. K. syn. *Salsola* — W. et Kit.

Spreng. Willemetia — Maerkl. *Chenopodium arenarium* Fl. Wetterau. Var. α . longifolia: *Camphorosma monspeliense* Pollich. — β . brevifolia: *Camphorosma acuta* Pollich. non Lin. Sandige Orte, Felder, Aecker, an Wegen, besonders in d. Rheing., von Schwezingen bis Mannheim, Bensheim, Zwingenberg u. Darmstadt, von Mannheim bis Worms, Mainz, Niederingelheim, Hartmühle; dann in Destr. Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Venedig. 5—7. ☉

3. K. prostrata Schrad. K. syn. *Salsola* — L. *Chenopodium villosum* Pers. [Ch. angustanum Allcn. pedm. Sandfelder, besonders im südl. Geb.; Destr. Mähren an d. Maulnitzer Hutweide bei Brünn, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont. 7—9. 4

4. K. hirsuta Nolte. K. syn. *Salsola* — L. *Suaeda* — Rchb. exc. *Chenopodium hirsutum* Wahlenb. *Echinopsilon* — Moquin. An d. Küsten d. Nordsee u. am Adriatischen Meere selten, Holstein um Großenbrode bei Heiligenhafen, bei Büsum u. Deichland, Lütjenburg, Mecklenburg bei Warnemünde; Holland u. in d. Lombardei bei Venedig. 8—9. ☉

5. K. hyssopifolia Roth. Comp. I. 1. p. 441. *Suaeda* — Rchb. exc. Sandige Orte im südl. Geb., Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—9. ☉

6. K. sedoides Schrader. Comp. I. 1. p. 441. *Suaeda sedifolia* Rchb. exc. p. 551. *Salsola sedoides* Pallas. *Salsola cinerea* W. et Kit. Hügel, Weinberge, Wege, in Ungarn bei Pesth. 7—9. ☉

665. *Chenopodium* L. (V. 2.) Gänsefuß. K. syn.

696. Rchb. exc. p. 578. Comp. I. 1. p. 449.

1. Ch. hybridum L. K. syn. Cultivirte u. uncultivirte Orte, Aecker, Wege, Schutt, im g. Geb. 7—8. ☉

2. Ch. urbicum L. K. syn. Ch. deltoideum Lamk. Var. α . Ch. melanospermum Wallr. Ch. chrysomelanospermum Balb. — β . Ch. intermedium DC. M. et Kit. Ch. urbicum Smith. Ch. rhombifolium Mühlenb. An Mauern, Zäunen, Schutt, Wegen, Aeckern, stellenw. dch. d. g. Geb.,

Rheing., Karlsruhe bis Schwezingen, Mannheim, Worms, Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Nassau, Kreuznach, Trier, Binningen, Coblenz, Ehrenbreitenstein u. 8—9. ☉

3. *Ch. murale* L. K. syn. Schutt, Wege, Zäune, im g. Geb. 7—9. ☉

4. *Ch. album* L. K. syn. Smith. *Ch. leiospermum* DC. Var. α . *spicatum*: *Ch. album* L. — β . *cymigerum*: *Ch. viride* L. Willd. — γ . *lanceolatum*: *Ch. lanceolatum* Merat. *Ch. concatenatum* Thuill. — δ . *viride-album*: *Ch. glomerulosum* Rehb. exc. — ϵ . *albo-viride*: *Ch. pagannum* Rehb. exc. Necker, Wege, Zäune, Schutt, im g. Geb. 7—9. ☉

5. *Ch. opulifolium* Schrader. K. syn. *Ch. erosum* Bast. An Wegen, Zäunen, Aeckern, Schutt, zerstr. dch. d. g. Geb., Rheing., von Basel stchw. bis Westphalen u. 7—9. ☉

6. *Ch. ficifolium* Smith. K. syn. *Ch. viride* Curt. *Ch. serotinum* Huds. *Ch. trilobum* DC. An Wegen, Rainen, Dämmen, auf Feldern, stchw. dch. d. Geb., Rheing., besonders um d. Dörfer dicht am Rheine, von Basel stchw. bis Karlsruhe, Durlach, Bruchsal, Mannheim, Ludwigshafen, Pfalz Speier, Maxdorf, Frankenthal, Oppau, Mainz, Bingen, Kreuznach, Luxemburg bis Belgien, von Bingen Rhein abwärts, nur einmal bei Coblenz, scheint am Niederrhein zu fehlen, Hamburg auf d. Elbinseln, Sachsen bei Dresden, Schlesien an d. alten Oder; Destr. Böhmen, Mähren, Dalmatien, Ungarn. 7—8. ☉

7. *Ch. ambrosioides* L. K. syn. *Ambrina* — Spach. Aus Mexico; cultivirte Orte und auf Flußkies an Hecken, Zäunen, besonders im südl. Geb., Rheing., Baden bei Rastatt, am Ufer d. Murg in Menge, Baiern; Destr. Steyermark an d. Mur bei Gräß u. Marburg, Ungarn, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardie, Venedig. 6—7. ☉

8. *Ch. polyspermum* L. K. syn. Var. β . *acutifolium*: *Ch. acutifolium* Kitaib. Rehb. exc. Cultivirte u. uncultivirte Orte, Necker, Wege, Schutt, Zäune, Ufer, im g. Geb. 8—9. ☉

9. *Ch. aristatum* L. Bertol. Fl. italic. III. p. 42. Maly enum. pl. austr. p. 91. Weingärten im südl. Geb., Lombardei, Venedig bei St. Giobbe. 7. ☉

10. *Ch. vulvaria* L. K. syn. *Ch. olidum* Curt. Rechb. exc. *Ch. foetidum* Lamk. An Mauern, Wegen, Straßen, Zäunen, auf Schutt, dh. d. g. Geb. 7—8. ☉

11. *Ch. Botrys* L. K. syn. *Ambrina* — Moquin. *Botrydium aromaticum* Spach. An Wegen, Flußufern, Schutt, besonders im südl. Geb., Nassau, Südschweiz im Cant. Wallis, im Rhone- u. Saßthale, von Vispach nach Stalten u., Baiern, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Südtirol, Galizien, Ungarn, Croatien, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

12. *Ch. multifidum* L. Bertol. Fl. italic. Maly enum. pl. austr. p. 91. An Wegen, Schutt, im südlichsten Geb., Lombardei, Mailand bei Belgiojoso in Insubrien. 7. ☉

666. *Blitum* L. (V. 2.) Erdbeerspinat. K. syn. 698. Rechb. exc. p. 582. Comp. I. 1. p. 447.

a. *Blitum* Lin.

1. *B. capitatum* L. K. syn. Cultivirte u. kieselige Orte im südl. Geb., sonst wohl nur Gartenflüchtling; Schweiz im Cant. Graubünden, Rheing. Oberbaden, Schlesien; Destr. Tyrol, Steyermark, Littoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardei, Oberitalien. 6—8. ☉

2. *B. virgatum* L. K. syn. Cultivirte Orte u. an Wegen, Ufern, besonders im südl. Geb., im übrigen nur verwildert? Schweiz Cant. Wallis, Rheing. bei Bingen, Neuwied, an d. Nahe bei Kreuznach, Meisenheim, Moselufer bei Trier, bei Verviers in Belgien, Schlesien; Destr. Mähren, Tyrol, Siebenbürgen, Lombardei. 6—8. ☉

3. *B. chenopodoides* Lamk. Besser Fl. Galiz. *B. virgatum* β . *chenopodoides* Rechb. exc. An Wegen, auf Schutt, in Galizien bei Krakau. 6—8. ☉

b. *Orthospermum* C. A. Meyer.

4. *B. Bonus-Henericus* Meyer K. syn. *Cheno-*

podium — L. Agathophyton — Moquin. Steinige, fette Orte um Dörfer u. Höfe, an Wegen, Hecken, Schutt, im g. Geb. 5—8. 4

5. *B. rubrum* Rehb. exc. K. syn. *B. polymorphum* Meyer. *Chenopodium rubrum* Lin. *Agathophytum* — Rehb. Fl. Saxon. V. β . *acuminatum*: Ch. *blitoides* Lej. Fl. Spa. — γ . *paucidentatum*: *B. crassifolium* Rehb. exc. *Chenopodium* — Schrader. Ch. *botryoides* Smith. Wegeränder, Schutt, an alten Mauern, Ufern, dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

6. *B. glaucum* Koch. K. syn. *Chenopodium* — Lin. Rehb. exc. p. 579. Wegeränder, Ufer, Gräben, Schutt, um Städte u. Dörfer, dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

667. *Beta* L. (V. 2.) Mangold. K. syn. 699. Rehb. exc. p. 580. Comp. I. 1. p. 446.

1. *B. vulgaris* L. K. syn. Var. α . *maritima* Koch. *B. maritima* M. v. Bieb. *B. foliosa* Schreb. — β . *Cicla* Koch. *B. Cicla* L. Rehb. exc. *B. hortensis* Miller. — γ . *rapacea* K. *B. vulgaris* Lin. excl. var. ζ . et η . *B. vulgaris* Miller. Am südl. Littoral d. Adriat. Meeres, im übrigen Geb. nur angebaut. 7—9. ☉ u. ☹

2. *B. maritima* L. K. syn. Sumpfige Orte an d. Küsten d. Nordsee u. am Adriat. Meere; Belgien, Holland, Istrien, Lombardien, Venedig. 7—8. 4

3. *B. trigyna* W. et Kit. Rehb. exc. Gartenzdune in Ungarn im Gymer Comit. 5—6. 4

668. *Camphorosma* L. (V. 2.) Kampferkraut. K. syn. 770. Rehb. exc. p. 581. Comp. I. 1. p. 441.

1. *C. ovata* W. et Kit. Rehb. exc. Salzhaltiger Boden, Aecker in Ungarn am Theiß. 7—9. ☉

2. *C. monspeliaca* L. K. syn. *C. perenne* Pallas. *C. acuta* Host. Dürre Sandboden im südl. Littoral, Istrien auf d. Insel Veglia, Dalmatien. 7—8. 4

669. *Spinacia* L. (XXII. 3.) Spinat. K. syn. 700.

Rchb. exc. p. 578. Comp. II. p. 727.

1. *S. inermis* Moench. K. syn. *S. glabra* Mill. *S. oleracea* β . Lin. Cultivirt als Sommerspinat. 5—7. ☉ u. ☉

2. *S. spinosa* Moench. K. syn. *S. oleracea* Mill. *Soleracea* α . Lin. Cultivirt als Winterspinat. 5—7. ☉ u. ☉

670. *Eurotia* Adans. (XXI. 3.) Eurotine. K. syn.700. K. Taschb. 439. *Diotis* Rchb. exc. p. 576. Comp. II. p. 664.

1. *E. ceratoides* C. A. Meyer. K. syn. *Oxyris* — L. *Diotis* — Willd. Rchb. exc. K. syn. edit. I. *Ceratosperrum papposum* Pers. *Achyranthes* — Forsk. Uncultivirte Orte in Niederösterreich bei Ehrenbrunn, Mähren bei Reg. 8—9. ☿

671. *Halimus* Wallr. (V. 2.) Reilmelde. K. syn.

700. Rchb. exc. p. 576. Comp. I. 1. p. 442.

1. *H. portulacoides* Wallr. *Atriplex* — L. *Obione* — Moquin. Feuchte Orte am Seestrande der Nord- u. Ostsee, Warnemünde, Jever u. am südl. Littoral. 7—8. ☿

2. *H. pedunculatus* Wallr. K. syn. *Atriplex* — ta L. *Obione* — Moquin. *Diotis atriplicoides* M. v. Bieb. *D. atriplicina* Spreng. Seeküste d. Nord- u. Ostsee u. an d. Salinen, in Oldenburg bei Jever, Barby bei Magdeburg, Staßfurt, Bernburg, Artern in Thüringen. 8—10. ☉

672. *Atriplex* L. (V. 2.) Melde. K. syn. 701.

Rchb. exc. p. 577. Comp. I. 1. p. 442.

1. *A. hortensis* L. K. syn. Var. β . *rubra*: *A. ruberrima* DC. Aus d. Tatarei. Cultivirt u. verwildert. 7—8. ☉

2. *A. nitens* Rebentisch. K. syn. *A. acuminata* W. et Kit. *A. Hermannii* Willemet. *A. sagitata* Borkh. *A. lucida* Desfont. An Wegen, steinigten Orten, auf Schutt,

stellw. dch. d. Geb., Rheing., Basel, Coblenz bei Ehrenbreitenstein, Trier am Moselufer selten, Hamburg auf d. Elbinseln, Berlin, Frankfurt a. d. Oder, Schlesien, Thüringen, Preußen bei Thorn, Danzig, Elbing u., Sachsen bei Hildesheim u. Dresden; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Galizien, Siebenbürgen, Ungarn. 7—9. ☉

3. *A. veneta* Willd. Rchb. exc. In Ungarn u. im südl. Littoral bei Venedig. 7—9. ☉

4. *A. tatarica* L. K. syn. *A. oblongifolia* W. et Kit. K. syn. edit. I. Var. β . *angustifolia*: *A. campestris* K. et Ziz. An Wegen, Feldrändern, Dämmen, Weinbergen, Hügeln, stellw. im mittlern u. südl. Geb., Rheing. v. Basel bis Bingen, vereinzelt bis Coblenz, häufig im Elsaß u. v. Speier bis Mainz, Bingen, Mannheim, Dürkheim, Kallstadt, an d. Nahe v. Kreuznach bis Sobernheim; Thüringen, Halle, Wittenberg, Dresden, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien. 7—8. ☉

5. *A. patula* L. K. syn. Pollich. *A. patula* et *A. angustifolia* Host. *A. angustifolia* Smith. Var. β . *microcarpa*: *A. erecta* Smith. Cultivirte u. uncultivirte Orte, an Wegen, Zäunen, Schutt, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

6. *A. latifolia* Wahlenb. K. syn. *A. patula* Smith. *A. hastata* Pollich. Schkr. Var. β . *A. deltoides* Babington. Cultivirte u. uncultivirte Orte, Wege, Zäune, Gräben u., im g. Geb. 7—8. ☉

7. *A. microsperma* W. et Kit. Rchb. exc. *A. ruderalis* Wallr. *A. mucronata* Baumgarten. *A. latifolia* β . *microsperma* K. syn. Mit d. Vorhergehenden mehr an etwas feuchten, fetten Orten. 7—8. ☉

8. *A. Sackii* Roskow. *A. triangularis* Willd. Rchb. exc. *A. oppositifolia* DC. *A. latifolia* γ . *salina* K. syn. *A. patula* var. *salina* Wallr. sched. *A. patula* γ . *farinosa* D. Fl. *A. prostrata* Babingt. DC. Seeufer, besonders an d. Ost- u. Nordsee u. an d. Salinen im Binnenlande, dch. d. Geb., Rheing. an d. Salinen v. Kreuznach u. Eiden u. 7—9. ☉

9. *A. hastata* L. K. syn. *A. hastata* γ. *calotheca* Schumach. Auf Schutt, an Wegen, Zäunen, besonders im nördl. Geb., Berlin, Frankfurt a. d. Oder, Pommern Insel Rügen, Preußen bei Königsberg; dann in Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. ☉

10. *A. littoralis* L. K. syn. Var. β. *A. marina* Dethar. Rchb. exc. Seefüße u. auf salzhaltigem Boden am nördl., östl. u. südl. Seestrande; Mecklenburg bei Rostock u. Warnemünde, Preußen an d. Ostsee bei Danzig, Memel; Dalmatien, Ungarn, Venedig. 7—8. ☉

11. *A. laciniata* L. K. syn. *A. sinuata* Hoffm. *A. rosea* β. *foliosa* Pers. *A. diffusa* Tenore. *A. astrachanica* Balb. *A. incisa* M. v. Bieb. Auf Schutt, an Wegen, stellenw. im Geb. u. am nördl. u. südl. Seestrande; Baiern, Würzburg, Mecklenburg bei Warnemünde; Destr. Böhmen bei Prag, Mähren, Galizien, Ungarn, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

12. *A. rosea* L. K. syn. *A. alba* Scopol. Rchb. exc. *A. albicans* Pers. Besser. *A. verticillata* Lagasc. *A. Besseriana* R. et Schult. *A. laciniata* β. Wahlenb. *A. laciniata* Smith. *A. polysperma* Tenore. An Zäunen, Wegen, Mauern, auf Schutt, an Salinen, stellenw. bis zum Norden; Rheing. v. Frankenthal bis Mainz bei Kleinniedesheim, Hesseheim, Worms, Oppenheim in den Steinbrüchen, Nassau bei Lorch, Baiern, Westphalen, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Preußen, Thüringen, Jena, Sachsen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Littoral, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

673. *Theligonum* L. (XXI. 5.) Hundskohl.

K. syn. 703. Rchb. exc. p. 588. Comp. II. p. 672.

1. *T. Cynocrambe* L. K. syn. Schattige Felsenspalten, an Mauern, im südl. Littoral, Istrien, Insel Cherso bei Triest, Dalmatien u. d. Inseln. 6. ☉

Neunundneunzigste Ordnung.

Polyganeen.

Juss. K. syn. 704. K. Taschb. 441. Rchb. exc. Portulacae pars p. 568.

674. *Rumex* L. (VI. 3.) Ampfer. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 626.

Erste Rotte. *Lapathum* Tournef. K. syn.

1. *R. maritimus* L. K. syn. *R. anthoxanthum* Murr. *R. aureus* Wither. Schkr. *R. acutus* Pollich. An Rändern d. Gräben, Teiche, Seen, Sümpfe, Flußufer u. am Seestrande, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., an vielen Orten v. Basel bis zum Niederrheine, besonders in d. Altwasser d. Rheines meistens nur einzeln, dann am Neckar, Main, Nahe, Saar, Mosel rc., Mainz, Kreuznach, Kaiserslautern, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Coblenz, Eöln rc. 7—8—9. ☉ u. ☉

2. *R. palustris* Smith. K. syn. *R. maritimus* Hoffm. *R. maritimus* β. Huds. *R. limosa* Thuill. In Sümpfen, Gräben, an Ufern d. Teiche, Seen u. Flüsse, stchw. mit der Vorhergehenden, doch seltener dch. d. Geb., Schweiz bei Rheinfelden im Aargau, Bregenz u. Basel, Rheing mit *R. maritimus* bei Philippsburg, Speier, Neckarau, Mannheim, Oggersheim, Oppau, Frankenthal bis Worms, v. Aschaffenburg bis Mainz, St. Goar, Neuwied bis Eöln, Düsseldorf, Mosel bei Trier, an d. Saar bei Saarbrücken, Luxemburg, Wetterau, Westphalen bei Dissen, Hamburg, Hannover, Oldenburg, Mecklenburg nach Preußen, Schlesien; Destr. Mähren, Tyrol, Galizien, Ungarn rc. 7—8. ☉

3. *R. Steinii* Becker. K. syn. Ufer, Gräben; Mainufer um Frankfurt bei Offenbach, Stockach, Fechheim; Destr. 7—8. 4

4. *R. conglomeratus* Murray. K. syn. *R. glomeratus* Schreb. *R. nemolapathum* Ehrh. Rchb. exc. *R. acu-*

tus Smith. *R. paludosus* Wither. *R. crispus* β . Pollich. *R. undulatus* Schrank. *R. virgatus* Haenke. Gräben, Sümpfe, Ufer, feuchte Wiesen, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

5. *R. sanguineus* L. K. syn. Smith, Gaudin. *R. nemorosus* Meyer. Chlor. hannov. *R. nemolapathum* Wallr. sched. Var. α . *viridis*: *R. sanguineus* β . *viridis* Smith, *R. Nemolapathum* α . *exsanguis* Wallr. *R. nemorosus* Schrad. Rechb. exc. *R. Nemolapathum* DC. Fl. fr. — β . *genuinus*: *R. sanguineus* I. Gaud. helv. *R. Nemolapathum* β . *sanguineus* Wallr. sched. Feuchte, schattige Orte, Wälder, Gebüsch, Waldränder, Waldwiesen, besonders in d. Gebirgen dch. d. g. Geb. 7—8. 4

6. *R. pulcher* L. K. syn. Var. β . *R. divaricatus* L. Cultivirte Orte, Aekerränder, Wege, in Weinbergen, besonders im südl. Geb., Rheing., Oberbaden im Breisg. bei Sasbach u. Limburg, Elsaß bei Straßburg; Südschweiz, Genf bis ins Unterwallis u. Tessin, Bellenz, Lugano; Destr. Tyrol, im Etschlande, Ungarn, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardie, Venedig. 5—6. ☉

7. *R. obtusifolius* L. K. syn. Var. β . *discolor* Wallr. sched. *R. purpureus* Poir. — γ . *sylvestris*: *R. sylvestris* Wallr. *R. obtusifolius* L. sec. *R. acutus* Tausch. Feuchte Wiesen, Raine, Säune, Wegeränder, an Gräben um Dörfern u. Höfen dch. d. g. Geb.; Var. γ . in Wäldern. 7—8. 4

8. *R. pratensis* M. et K. K. syn. *R. acutus* K. et Ziz. Willd. *R. cristatus* Wallr. *R. obtusifolius* Gaertn. Etwas feuchte, fette Wiesen, stellenw. dch. d. g. Geb., Rheing. auf d. g. Rheinfläche v. Basel bis Westphalen, Heidelberg, Mannheim bis Darmstadt, Speier, Lambsheim, Dürkheim bis Kreuznach, Wieselbach, Kusel, Homburg, Blieskastel, Zweibrücken, Merzig, Trier, Coblenz; Thüringen an d. Saale bei Halle, bei Rudolstadt, bei Suhl; Baiern, Sachsen, Preußen, Schlesien; Destr. r. 7—8. 4

9. *R. crispus* L. K. syn. Feuchte Wiesenränder, Tristen, Raine, Aekerränder, im g. Geb. 7—8. 4

10. *R. domesticus* Hartm. K. syn. Rehb. icon. f. 526. An d. Elbufer u. auf d. Elbinseln bei Hamburg, Ostfriesland an d. Ihringsfehn. 7—8. 4

11. *R. Patientia* L. K. syn. An Gräben, um d. Dörfer u. Höfen im südl. Geb., im mittl. u. nördl. in Gärten gepflanzt; Rheing. bei Basel, Elsaß bei Muzig; Destr. Tyrol, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

12. *R. Hydrolapathum* Huds. K. syn. *R. aquaticus* Pollich, Smith. *R. Britannica* Huds. Roth. *R. acutus* Wahlenb. *R. maximus* Gmel. Sumpfige Wiesen, an Gräben, Teichen, stillfließendem Wasser, an Bach- u. Flußufern, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

13. *R. maximus* Schreber K. syn. *R. heterophyllus* Schultz starg. *R. acutus* Hartm. *R. aquaticus* α. *heterophyllus* Meyer Chlor. hann. Rasse, fette Wiesen, an Gräben, Teichen, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Pfalz bei Zweibrücken, Saarbrücken bei St. Johann, Forbach, Emmerweiler, Nahegegend bei Cobernheim, Franken, Thüringen, Erlangen, Sachsen, Neubrandenburg, Preußen bei Königsberg, Danzig; Destr. Krain. 7—8. 4

14. *R. aquaticus* L. K. syn. *R. Hippolapathum* β. Fries. *R. latifolius* Meyer. Chlor. hann. Rasse Wiesen, Wassergräben, Teiche, Bachränder, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., Baden, Karlsruhe a. d. Alb, Heidelberg am Neckar, Zweibrücken in d. Blies, bei Limbach, bei Schwarzenacker, Saarbrücken bei Emmerweiler, Roßbrück, Oermsel, Luxemburg, Kreuznach, Eifel bei Prüm Flora v. Trier, Coblenz bei Winningen, Bonn, Aachen bei Jülich u. 7—8. 4

15. *R. alpinus* L. K. syn. Triften d. Alpen u. Vor-alpen, besonders um d. Sennerhütten, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Tyrol, Destr., Rheing. Oberbaden bei Randel, Schauinsland, Breisg. auf d. Feldberg, M. Belchen, Schwarzwald; auf d. höheren Ruppen d. Sudeten in Schlessien, Mähren bei Karlsbrunn u. 7—8. 4

16. *R. bucephalophorus* L. Rehb. exc. Weingär-

ten, Felder im südlichsten Geb., Dalmatien, Piemont im Valle d'Aost, Nizza. 4—5. ☉ u. ☉☉

Zweite Rotte. *Acetosa* Tournef. K. syn.

17. *R. scutatus* L. K. syn. *R. hastifolius* M. v. Bieb. Var. β . *triangularis*: *R. glaucus* Jacq. coll. Bergabhänge, Felsen, Mauern, Weinberge, steinige Orte v. d. niederen Gebirgen bis in d. Boralpen u. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern; Salzburg, Destr. u. Rheing. dch. Elsaß, Würtemberg, Baden bei Heidelberg an d. Hirschgasse u. Rastau, Nubethal v. Bingen bis Kreuznach, Coblenz, Ahrthal u. Siebengebirge bei Bonn, Mosel bei Berncastel, Trarbach, Eifel, Luxemburg bis Belgien bei Lüttich, Hessen, Thüringen, Schlesien u. 5—8. 4

18. *R. nivalis* Hegestsch. et Heer. K. syn. Im Gerölle d. Hochalpen, Schweiz, Baiern; Destr. Krain, Vittoral. 7—8. 4

19. *R. arifolius* Allion. pedm. K. syn. *R. montanus* Poir. *R. hispanicus* Gmel. bad. Wiesen, Triften d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Salzburg, Destr., Rheing. auf d. Schwarzwalde, Vogesen auf d. Belchen, Blauen, Feldberg im Breisg., Hoheneck; auf d. Brocken, Thüringerwald, d. Sudeten u. Carpathen. 7—8. 4

20. *R. hispanicus* K. syn. *Acetosa hispanica maxima* Manting. *R. acetosa* Bertolon. Fl. italic. In Gärten cultivirt. 5—6. 4

21. *R. Acetosa* L. K. syn. *R. Pseudo-Acetosa* Bertol. *Lapathum pratense* Lamk. *Acetosa pratensis* Mill. Var. β . *auriculatus* Wallr. — γ . *fissus*: *R. Acetosa* γ . Lin. *R. intermedius* Sturm. Wiesen, Triften, Raine, lichte Waldstellen, Gebüsch dch. d. g. Geb. 5—6. 4

22. *R. Acetosella* L. K. syn. *Lapathum* — Scopol. *Acetosa hastata* Moench. Var. β . *multifidus*: *R. multifidus* Lin. Sturm. *R. Acetosella* δ . *lacerus* et γ . *multifidus* Wallr. Sandige Wiesen, Triften, Felder, Brachäcker, lichte Waldstellen an Kohlenmeilern im g. Geb. 5—6. 4

23. *R. tuberosus* L. Rehb. exc. Schattige Gräben im südl. Geb. Dalmatien, Kombardei bei Verona zw. d. Thoren Zeno u. del Palio, Piemont, Nizza. 5. 4

675. *Oxyria* Hill. (VI. 3.) Säuerling. K. syn.

710. Rehb. exc. 568. Comp. I. 1. p. 625.

1. *O. digyna* Campder. K. syn. *O. reniformis* Hooker. *Rumex digynus* L. *Donia sapida* R. Brow. *Rheum digynum* Wahlenb. *Lapathum* — Lamk. Felsen d. Alpen, Schweiz, Pilatus, Furka, St. Bernhard; Destr. Kärnthen, Krain, Tyrol, Salzburg, Steyermark, Ungarn, Siebenbürgen, Kombardei. 7—8. 4

676. *Polygonum* L. (VIII. 3.) Knöterich. K.

syn. 710. Rehb. exc. p. 571. Comp. I. 2. p. 25.

Erste Rotte. *Bistorta* Tournef. K. syn.

1. *P. viviparum* L. K. syn. Wiesen, Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette u. mit d. Flüssen in d. Niederungen, z. B. im Badischen Jura bei Füssen unweit Donaueschingen, Preußen bei Thorn, Osterode u. 7—8. 4

2. *P. Bistorta* L. K. syn. Var. β . *P. bistortioides* Prsh. Nasse Wiesen d. Ebenen u. Gebirge; besonders in Waldgegenden u. auf Moorboden dch. d. g. Geb. nördl. bis Holstein, Preußen. 6—7. 4

Zweite Rotte. *Persicaria* Tournef. K. syn.

3. *P. amphibium* L. K. syn. Var. α . *natans* Moench. — β . *coenosus* M. et K. — γ . *terrestre* K. syn. *P. amphibium* β . *terrestre* Leers. — δ . *maritimum* Dethar. Stehende u. stillfließende Wasser, nasse u. feuchte Gräben, Wiesen, im g. Geb; Var. β . am Seeufer. 6—7. 4

4. *P. lapathifolium* L. K. syn. *P. Persicaria* var. Roth. Var. β . *P. nodosum* Pers. Rehb. exc. — γ . *P. incanum* Schmidt. *P. tomentosum* Schrank. *P. Persicaria* γ . Lin. — δ . *P. laxum* Rehb. exc. Feuchte, cultivirte u. un-

cultivirte Orte, Wiesen, Gräben, Wege, Ufer, Zäune, Aecker, besonders feuchte Kartoffeläcker, dch. d. g. Geb. 7—10. ☉

5. *P. Persicaria* L. K. syn. *P. biforme* Wahlenb. *P. rivulare* Roth. *P. lapathifolium* α. Roth. Mit d. Vorhergehenden an ähnlichen Orten dch. d. g. Geb. 7—10. ☉

6. *P. mite* Schrank. K. syn. Meyer Chlor. hann. *P. laxiflorum* Weihe Rehb. exc. *P. dubium* Stein. *P. Braunii* Bl. et Fgh. Var. β. *condensatum* F. W. Schultz Fl. d. Pfalz. *P. bitense* F. Schultz. *P. dubio* — *Persicaria* Alex. Braun. Feuchte, nasse Orte, Wiesen, Gräben, Ufer, ausgetrocknete Teiche, Wege, Felder, stellw. dch. d. Geb., Schweiz, Elsaß, Baden, Pfalz, Wetterau, Mainz, Kreuznach, Saarbrücken, Trier, Coblenz, Bonn, Köln nach Westphalen, Holstein bis nach Preußen, Baiern, Schlesien nach Destr. Dalmatien, Ungarn u.; Var. β. bei Carlruhe, Mannheim, Bittsch. 7—10. 4

7. *P. Hydropiper* L. K. syn. Sumpfsige, nasse Orte, in Gräben, dch. d. g. Geb. 7—10. ☉

8. *P. minus* Huds. K. syn. *P. angustifolium* Roth. *P. Persicaria* β. *angustifolium* Lin. *P. pusillum* Lamk. *P. strictum* Allion. pedm. Nasse, sumpfsige Orte, an Gräben, Teichen, Ufern, feuchter Moorboden, sumpfsige Heiden u. Aecker, dch. d. g. Geb. 7—10. ☉

9. *P. Braunianum* F. W. Schlitz. Fl. d. Pfalz. *P. minore* — *Persicaria* Alex. Braun. Schattige, feuchte Aecker an einem Waldrande bei Carlruhe, einzeln u. selten unter *P. minus* u. *P. Persicaria*. 7—10. ☉

Dritte Rotte. *Avicularia* Meisn. K. syn.

10. *P. aviculare* L. K. syn. Var. β. *erectum* Roth. — γ. *littorale*: *P. littorale* Link. Cultivirte u. uncultivirte Orte, Wege, Raine, Schutt, Aecker, Brachfelder u., im g. Geb.; Var. γ. an d. Secküste. 7—10. ☉

11. *P. maritimum* L. K. syn. Sandige Orte d. Küste im südl. Littoral, Istrien bei Monfalcone, auf d. Insel Sansego, Dalmatien, Lombardien, Venedig. 7—8. 4

12. *P. arenarium* W. et Kit. Rehb. exc. *P. pulchella* Lois. Var. β . *P. controversum* Gussone. Bewachsene, dürre Sandstellen im südl. Geb., Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn, Galizien. 8—10. ☉

13. *P. Bellardi* Allion. pedm. K. syn. *P. patulum* M. v. Bieb. Grasige u. cultivirte Orte im südl. Vittoral, Istrien bei Triest, Insel Veglia, Dalmatien, Lombardei, Piemont u. in Ungarn. 6—7. ☉

14. *P. Kitaibelianum* Sadler. Rehb. exc. *P. strictum* Ledeb. Weinberge, Wiesen in Ungarn, am Block- u. Adlersberg bei Pesth. 8. ☉

Vierte Rotte. *Helxine* DC. K. syn.

15. *P. Convolvulus* L. K. syn. Sandige Aecker, Felder, an Zäunen u., dch. d. g. Geb. 7—10. ☉

16. *P. dumetorum* L. K. syn. *Fagopyrum* — v. Boeningh. Hecken, Zäune, an Wald- u. Wiesenrändern, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

Fünfte Rotte. *Aconogonum* Meisn. K. syn.

17. *P. alpinum* Allion. pedm. K. syn. Fruchtbare Wiesen, Tristen d. höchsten Alpenthäler, Schweiz im Ursern- u. Idsthale im Cant. Uri, Wallis im Binnthale, in Tessin; dann in Ungarn, Siebenbürgen u. in d. Lombardei. 7—8. 4

Sechste Rotte. *Fagopyrum* Tournesf. K. syn.

18. *P. Fagopyrum* L. K. syn. Cultivirt dch. d. g. Geb. u. stellw. verwildert. 7—8. ☉

19. *P. tataricum* L. K. syn. *Fagopyrum* — Gaertn. Mit d. Vorhergehenden cultivirt u. stellw. auf Aecker mit dieser verwildert. 7—9. ☉

Hundertste Ordnung.

Thymeleen.

Juss. K. syn. 714. K. Taschb. 446. Rehb. exc. p. 163.

677. *Passerina* Lin. Wickstr. (VIII. 1.) Vogelkopf. K. syn. *Stellera* Rehb. exc. Comp. I. 2. p. 7.

1. *P. annua* Wickstr. K. syn. *Stellera Passerina* L. Rehb. exc. Sonnige Saat- u. Brachäcker, besonders auf Kalk u. Mergel, auch auf Sand, stellw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Rheing., Baden bei Durlach, Knielingen, Pfalz, Worms, Dürkheim, Oggersheim, zw. Mainz u. Niederengelheim, Nassau, Frankenthal, Landau, Zweibrücken, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, an d. Nahe bei Kreuznach, Norheim, Coblenz, Schwaben, Baiern bei Erlangen, Würzburg, Jena, Sachsen, Schlessien, Preußen bei Thorn; Destr. 2c. 7—8. ☉

2. *P. hirsuta* L. K. syn. Steinige, dürre Orte im südl. Littoral, Istrien, Insel Canibole piccolo bei Vossino, Sansego, Dalmatien, Piemont, Nizza, Ligurien. 5. ‡

3. *P. Thymelaea* DC. Rehb. exc. *Daphne* — Lin. Im südlichsten Littoral, Piemont um Nizza. 2—4. ‡

4. *P. Tarton-raira* DC. Schrad. Rehb. exc. *Daphne* — Lin. *Thymelaea* — Allion. pedm. Var. β . *P. Thomasii* Duby Rehb. icon. Hügel im südlichsten Littoral, Piemont, Nizza, Insel Antioco. 5—7. ‡

5. *P. dioica* Ramond. Rehb. exc. *Daphne* — Gouan. *Thymelaea* — Allion. pedm. Hügel im südlichsten Geb., Piemont Mine de Tenda. 4—5. ‡

678. *Daphne* L. (VIII. 1.) Kellershalz. K. syn. 714. Rehb. exc. p. 164. Comp. I. 2. p. 4.

1. *D. Mezereum* L. K. syn. *Thymelaea* — Scopol. Wälder, Haine, Gebüsche, dch. d. g. Geb. bis in d. Vor-alpen. 2—3. ‡

2. *D. Laureola* L. K. syn. *Thymelaea* — Scopol. Gebirgswälder, besonders im südl. Geb., Rheing., an d. Oberrhein bei Wolfersdange in Luxemburg, bei Nancy, Baiern, südwestl. Schweiz im Jura b. Genf auf d. Salève, bei Nyon, Röll, Piestal, Basel, Langenbrück, M. Wasserfall 2c.; Destr. bei Wien, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Krain, Littoral,

Isfrien, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Oberitalien. 3—4. ‡

3. *D. alpina* L. K. syn. *Thymelaea candida* Scopol. Felsen d. Alpen, Schweiz, besonders im Jura, Weissenstein, Creux du Van, Salève u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Steyermark, Krain, Isfrien, Siebenbürgen, Dalmatien, Croatien, Lombardei. 5—7. ‡

4. *D. Gnidium* L. Rehb. exc. Schattige Hügel im südl. Eittoral, Dalmatien bei Cattaro, Piemont, Genua u. Nizza. 3—8. ‡

5. *D. glandulosa* Bertolon. Rehb. exc. Gebirge, Alpen im südl. Geb., Südtirol? Piemont, Apuanen auf d. Giova Pizzo d'uccello u. in Westligurien. 5—7. ‡

6. *D. collina* Smith. K. syn. Steinige Orte im südl. Eittoral, Isfrien im Isongo-Thale. 3—4. ‡

7. *D. Blagayana* Freyer. K. syn. Gebirgswälder im südl. Geb., Krain auf d. Lorenziberge bei Willighgräß (nicht in Steyermark). 5. ‡

8. *D. striata* Trattin. K. syn. *D. Cneorum* Wahlenb. helv. *D. Cneorum* γ. M. et K. Felsen d. Alpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Destr. Kärnthen, Krain, Lombardei. 7—8. ‡

9. *D. Cneorum* L. K. syn. Trockene Triften, Heiden, lichte Waldstellen, Nadelholzwaldungen auf d. Gebirgen u. in d. Niederungen auf kieseligem, sandigem, etwas torfhaltigem Boden; Schweiz auf d. Jura bei Genf, Basel auf d. Hauenstein, Bern; Rheing., Oberbaden, Trosselsingen auf d. Saar, Donaueschingen, Vogesen, Elsaß auf d. Hochfelde, Pfalz, Kaiserslautern auf d. Remigelsberg u. im Grubenthälchen bei Mölschbach, Fischbach, Steinbach, Eppenbrunn, Sturzelbrunn, bei d. Höfen Ziesel, Herzogland, Hozard, Zweibrücken u. Frankfurt a. M., Nassau Wald bei Schwanheim, (fehlt am Niederrheine); Schwaben, Baiern, Regensburg, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Eittoral, Isfrien, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 6—7. ‡

Hundertunderste Ordnung.

Laurineen.

DC. K. syn. 715. K. Taschb. 447. Rehb. exc. p. 183.

679. *Laurus* L. (IX. 1.) Lorbeere. K. syn. Rehb. exc. Comp. I. 1. p. 36.

1. *L. nobilis* L. K. syn. Im südlichsten Geb., an Zäunen, Oberitalien, Dalmatien, im südl. Littoral u. Südtirol verwildert u. im g. Geb. cultivirt. 4—5. 3

Hundertundzweite Ordnung.

Santalaceen.

R. Brow. K. syn. 716. K. Taschb. 447. Rehb. exc. p. 157.

680. *Thesium* L. (V. 1.)leinblatt. K. syn. Rehb. exc. Comp. I. 1. p. 290.

Erste Rotte. *Thesiosyris* Comp. I. 1.

1. *T. elegans* Rochel. bann. Rehb. exc. Comandra — Rehb. fil. Rehb. icon. Sandige Hügel in Ungarn, Bicco-Verbo am Römerwall im Banat. 5—6. 3

Zweite Rotte. *Thesium* Comp. I. 1.

α. *Tribracteata* K. syn.

2. *T. montanum* Ehrh. K. syn. *T. Linophyllum* Hayne, *T. bavarum* Schrank. Steinige, walbige Gebirgsstellen, an Felsen, stellw. dch. d. nördl. bis ins südl. Geb., Rheing., Schaffhausen, Basel, Oberbaden bei Mundelfingen, Breisg., Vogesen bei Sulzbach am Hohenstauff, Schwaben auf d. Fahn u. Spitzberge, Pfalz. Hardtgebirge auf d. Rupertusberge, an d. Nahe bei Kreuznach, Baiern, Thüringen bei Jena; dann in Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Ungarn, Lombard. 7—8. 4

3. *T. intermedium* Schrader. K. syn. *T. Linophyllum* Lin. Pollich. Rehb. exc. Var. β. *T. fulvipes*

Griesselich. Trockene, sandige, steinige Wiesen, unter Ge-
sträuchen, auf Heiden, in Nadelholzwaldungen, stellw. dch.
d. g. Geb., Rheing., Bodensee. Basel dch. Baden, bis Darm-
stadt, Frankfurt, Nassau, dch. Elsaß u. d. Vogesen bis Bitsch,
Weisenburg, Niederbrunn, Landau, Steinbach, Kaiserslautern,
dch. d. g. Pfalz, Harbtgebirge bis Bingen, Rochus-Kapelle,
Ockelheimer Hörnchen, Kreuznach, Flora v. Trier in d. Eifel
bei Prüm, Luxemburg bei Neuchateau 2c. Var. β . bei Bitsch.
7—9. 4

4. *T. divaricatum* Jan. K. syn. Gebirgsstellen im
südl. Eittoral, Destr. Istrien, Monte Spaccato bei Triest,
Fiume, Dalmatien, Croatien, Genua, Piemont bei Tenda.
7—8. 4

5. *T. humifusum* DC. K. syn. Hügel u. Ackerän-
der in Destr., Wien bei Wagram. 6—7. 4

6. *T. ramosum* Hayne. K. syn. *T. palatinum* Roth.
Trockene Bergwiesen, Triften u. Brachäcker im südl. Geb.,
Destr. bei Wien an d. Türkenchanze, Saarberg, bei Laren-
burg, Marschfeld bei Ragrau, Stadlau, Aspern, Wagram,
Steiermark bei Maria Zell, Ungarn, Siebenbürgen, Dal-
matien. 7—8. 4

7. *T. humile* Vahl. K. syn. *T. decumbens* Dolliner.
Brachäcker in Destr. zw. Wiener-Neustadt u. Kagelsdorf;
Mähren bei Brünn, Dalmatien. 6—7. 4

8. *T. pratense* Ehrh. K. syn. *T. decumbens* Gmel.
T. Linophyllum Smith, *T. brevicolla* Presl. Alpen u.
Gebirgswiesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. im Jura v.
Württemberg u. Baden bei Tuttlingen, Mundelfingen, Vo-
gesen am Mattenberge, Pfalz bei Grünstadt, Boppard, Co-
blenz, Mayen, Hochwald bei Hermeskeil, Simmern, auf d.
g. Nahegebirge v. Kreuznach bis Oberstein; Trier, Eifel bei
Schönecken, Prüm, Saarbrücken, Luxemburg 2c., Hessen, Thü-
ringen, Nordgrenze am Unterharz bei Blankenburg; Destr. 2c.
7—9. 4

9. *T. tenuifolium* Sauter. K. syn. Steinige, gra-
sige Orte, stellw. im Geb., Destr. an d. Ufer d. Steyer

bei Steyer; Schweiz am Uto u. Inchel im Cant. Zürich. 6—7. 4

10. *T. alpinum* L. K. syn. Grasige Abhänge, Triften, Heiden d. Alpen, Boralpen, Gebirge u. Niederungen, Schweiz dch. d. g. Alpenkette u. d. Berggeb. nach Schwaben, Baiern, Sachsen, Schlesien nach Destr. Tyrol 2c., Rheing. in d. Nadelholzwaldungen, v. Bregenz bis Basel, Vogesen auf d. Hoheneck, Sulzer-Ballon, Breisg. auf d. Belchen, Feldberg, bei Randel, Oberweiler, auf d. Vogesensandstein v. Niederbrunn bis Weisenburg, dann längs d. g. Harthgebirges häufig bis Grünstadt, Kaiserslautern, Eppensbrunn bis Bitsch. Auf d. Subeten u. Brocken 2c. 6—7. 4

ß. *Unibracteata* K. syn.

11. *T. ebracteatum* Hayne. K. syn. *T. comosum* Roth. Rchb. exc. *T. pratense* Vahl. Grasige Hügel, lichte Waldstellen in Thälern, stellw. mehr im nördl. Geb., Thüringen, Hamburg, Mecklenburg, Preußen bei Königsberg, Tilsit, Danzig 2c., Brandenburg, Schlesien; Destr. zw. Larenburg, Münchdorf u. Guntramsdorf, Wien bei Moosbrunn, Siebenbürgen. 6—7. 4

12. *T. rostratum* M. et K. K. syn. Alpen u. Boralpen im Gerölle d. Bergströme, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette bis Schaffhausen; Baiern bis in d. Isarauen bei München; Tyrol, Salzburg. 6—7. 4

681. *Osyrys* L. (XXII. 3.) Harnkraut. K. syn.

718. Rchb. exc. p. 157. Comp. II. p. 722.

1. *O. alba* L. K. syn. Steinige, dürre Orte im südl. Eittoral, Krain, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Oberitalien. 4—5. 5

Hundertunddritte Ordnung.

Elaeagneen.

R. Brow. K. syn. 719. K. Taschb. 449. *Porteaceae* pars
Rchb. exc. p. 162.

682. *Elaeagnus* L. (IV. 1.) Oleaster. K. syn.
Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 261.

1. *E. angustifolia* L. K. syn. Steinige bürre Hügel im südl. Littoral, Istrien Insel Dsero, Dalmatien, Siebenbürgen, Piemont. 5—6. ‡

683. *Hippophaë* L. (XXII. 4.) Sanddorn. K.
syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 727.

1. *H. rhamnoides* L. K. syn. Osyris — Scopol. Seeküste u. an d. Giesbächen d. Flüsse; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette mit d. Flüssen in d. Niederungen, Rheing. dch. Oberbaden bis Knielingen bei Karlsruhe, abwärts bis zur Pfalz bei Pforz auf d. Rhininsel Goldgrund; Elsaß, Schwaben, Baiern, Nord- u. Ostsee-Küste, v. Holstein nach Pommern u. Preußen bei Danzig; Oestr. bis Dalmatien, Combardei, Venedig u. 4—5. ‡

Hundertundvierte Ordnung.

Cytineen.

A. Brogn. K. syn. 719. K. Taschb. 450. Rchb. exc.
in add. p. 843.

684. *Cytinus* L. (XXI. 6.) Hypocyst. K. syn.
Rchb. exc. Comp. II. p. 586.

1. *C. Hypocistis* L. K. syn. *Hypocistis rubra* Clus. Auf d. Wurzeln d. Cistus-Arten im südl. Littoral u. d. Inseln; Istrien, Dsero, Beglia, Fossino; Dalmatien, Combardei, Oberitalien. 5. 4

Hundertundfünfte Ordnung.

Aristolochieen.

Juss. K. syn. 720. K. Taschb. 450. Rchb. exc. p. 182.

685. *Aristolochia* L. (XX. 6.) Osterluzen. K.
syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 557.

1. *A. rotunda* L. K. syn. Wiesen, uncultivirte Orte unter Gesträuch, im südl. Geb.; Destr. Krain, Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Ungarn, Dalmatien, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig; Südschweiz Cant. Tessin bei Lucano. 4—5. 4

2. *A. pallida* Willd. K. syn. *A. lutea* Bertolon. Desf. Gebirgsstellen, unter Gebüsch im südl. Geb.; Destr. in Untersteiermark bei Gills, Krain, Vittoral, Istrien Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei, Venedig, Oberitalien, Südschweiz, Cant. Tessin im Valle Bergami, Valle d'Aost. 3—4. 4

3. *A. longa* L. Reh. exc. Weingärten im südl. Geb., Ungarn, Lombardei, Piemont, Nizza. 4—5. 4

4. *A. Clematitis* L. K. syn. Weinberge, Bäume, Aeferränder, stchw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Rheing. nicht selten, im nördl. Geb. nur verwildert. 5—6. 4

686. *Asarum* L. (IX. 1.) Haselwurz. K. syn. 721. Reh. exc. p. 183. Comp. I. 2. p. 153.

1. *A. europaeum* L. K. syn. Schattige Gebirgswälder, unter Gebüsch, Hecken, stchw. dch. d. g. Geb. 3—4. 4

Hundertundsechste Ordnung.

Empetreen.

Nuttal. K. syn. 721. K. Taschb. 450. Rutaceae prs. Reh. exc. p. 765.

687. *Empetrum* L. (XXII. 3.) Rauschbeere. K. syn. Reh. exc. Comp. II. p. 723.

1. *E. nigrum* L. K. syn. Steinige, etwas feuchte Orte d. Hochalpen, in sumpfigen Dorfgegenden d. Boralpen u. höheren Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette bis ins südlichste Geb., Rheing. auf d. Schwarzwalde, d. Vogesen, Oberbaden auf d. Feldberg, M. Kniebis beim kalten Brunnen, wilder Hornsee, Hornesgründen, Badener Höhe, v. West-

phalen dch. Sachsen, Rhöngedberge, Harz, Brocken nach Preussen u. nach d. Subeten zc. 4—5 u. 7. 3

Hundertundsiebente Ordnung.

Euphorbiaceen.

Juss. K. syn. 721. K. Taschb. 451. Rutaceae prs. Rchb. exc. p. 752. et icon. Tab. 131—153.

688. *Buxus* L. (XXI. 3) Burbaum. K. syn. 722. Rchb. exc. p. 765. Comp. II. p. 660.

1. *B. sempervirens* L. K. syn. *B. arborescens* Lamk. *B. myrtifolia* Lamk. *B. angustifolia* Miller. Var. β . *humilis* K. syn. *B. suffruticosa* Lamk. Sonnige Gebirgsstellen, Felsen, besonders im südl. Geb., Schweiz auf d. Jura, Basel, Krenzach, Rheing. Oberelsaß bei Belfort u. Altkirch, Oberbaden, an d. Mosel bei Alken, Ehrenburg, Carden bis Berterich, Zell, Trarbach bis Berncastel unterhalb Trier, Obermosel, Luxemburg bei Uhn; Thüringen im Schwarzaithale, Destr. bei Steyer, Krain, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Kombardei, Benedig, Oberitalien. 3—4. 3

689. *Andrachne* L. (XXI. 6.) Andrachne. K. syn. 722. Rchb. exc. p. 765. Comp. II. p. 687.

1. *A. telephioides* L. K. syn. *Telephioides graecum* Tournef. Dill. Sonnige, sandige Orte im südl. Vittoral, Istrien auf d. Insel Brioni, Dalmatien bei Spalato. 5—6. ☉

690. *Euphorbia* L. (XXI. 1.) Wolfsmilch. K. syn. 722. Rchb. exc. p. 755. Comp. II. p. 564.

Erste Rotte. *Anisophyllum* Roeper. K. syn.

1. *E. Chamaesyce* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 131. fr. 4750. Var. β . *villosa*. *E. canescens* L. Rchb. exc. et icon. fr. 4751. Jacq. In Wein- u. Olivengärten, auf Aecker im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien, Ungarn

Kloster Bassas im Banat, Lombardei, Venedig, Piemont u. in Belgien. 6—8. ☉

2. *E. maculata* L. Jacq. Rchb. exc. et icon. f. 4752. *E. trinervia* Bertolon. Hügel in d. Lombardei bei Verona u. Pavona häufig. 8—9. ☉

3. *E. Peplis* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. f. 4753. *Tithymalus* — Scopol. Sandige Orte am südl. Vittoral, Istrien u. auf d. Inseln, Triest gegen Cervola, Croatien, Dalmatien, Venedig u. 7—8. ☉

4. *E. obscura* Loisl. Rchb. exc. et icon. Im südlichsten Geb., Piemont. 7—8. ☉

Zweite Rotte. *Tithymalus* Tournef. K. syn.

5. *E. helioscopia* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. Cultivirte Orte im g. Geb. 7—9. ☉

6. *E. platyphylla* L. K. syn. *E. platyphyllos* K. syn. edit. I. Rchb. exc. et icon. t. 138. f. 4758. Var. β . *literata*: *E. literata* Jacq. Acker, Wiesen, Grabenränder, Wege, Zäune, im g. südl. u. mittl. Geb., seltener im nördl., Rheing. fast allenthalben, besonders auf Lehm u. Kalk. nördl. bis in das Weichselgebiet bei Danzig, Thorn u.; Var. β . in Destr. bei Steyer, im südl. Vittoral. Istrien bei Triest, Monfalcone u. 7—9. ☉

7. *E. stricta* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. f. 4757. *E. platyphylla* β . Neilr. *E. dubia* Dierbach. *E. foetida* Hoppe. Var. β . *E. micrantha* Rchb. icon. f. 4756. et exc. Etwas feuchte Orte in Wäldern, Gebüsch, an Zäunen, Ufern, stchw. dch. d. Geb., Rheing. nicht selten, besonders auf d. Rheininseln, im Neckar-, Main-, Rahe-, Saar- u. Moselthale u., Trier, Luxemburg, Belgien, Baiern, Schwaben, Hannover, Preußen Weichselgegend, Sachsen u.; Destr. Tyrrol, Lombardei; d. Var. β . nur in d. Lombardei. 6—9. ☉

8. *E. dulcis* Jacq. Lin. K. syn. *E. solissequa* Rchb. exc. et icon. t. 134. f. 4759. *Tithymalus dulcis* Scopol. Var. β . *E. purpurata* Thuill. Rchb. icon. f. 4759 b. — γ . *E. ambigua* W. et Kit. Waldwiesen, schattige Waldbäche,

Wälder d. Gebirge u. Boralpen, stchw. dch. d. Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Salzburg, Destr. bis ins südl. Geb., Rheing. dch. Oberelsaß, Baden bei Heidelberg am Haarlaß, bei Schriesheim bis Darmstadt, Nassau bei Hadamar, Pfalz im Hagenauer Forst, Niederbrunn, Jägerthal bei Bitsch, Nahegegend bei Kreuznach, Mosel bei Berterich, Trarbach, Berncastel, Winingen, Coblenz, Heisterbach u. Rolandsseck bei Bonn; Luxemburg bei Grevenmacher, Remich, Ehnen, Straßig, Hessen, Thüringen, Harz, Schlesien, Böhmen, Mähren. 4—5. 4

9. *E. capitulata* Rehb. exc. p. 873. icon. t. 136. f. 4759. a. *E. soliflora* Visian. In Dalmatien auf d. höchsten Spitze d. Biokovo u. auf d. Triglav. 5—6. 4

10. *E. angulata* Jacq. K. syn. Rehb. exc. et icon. t. 135. f. 4762. Gebirgswälder mehr im südl. Geb., Destr. Mähren bei Brünn, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Krain um Laibach an d. Save, Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn, Galizien von Krakau bis Lemberg. 5—6. 4

11. *E. viridiflora* W. et Kit. Rehb. exc. et icon. t. 135. f. 4761. *E. nodiflora* Host. *E. nemoralis* Kitaib. Gebirgswälder in Croatien um d. Schloß Merszin. 6. 4

12. *E. carniolica* Jacq. K. syn. Rehb. exc. et icon. t. 134. f. 4760. *Tithymalus pilosus* Scopol. Sonnige Hügel im südl. Geb., Tyrol bei Roveredo, Steyermark, Krain bei Idria, Limbarska Gora, Vittoral, Istrien bei Fiume, Croatien, Kombardei, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen. 4—5. 4

13. *E. verrucosa* Lamk. DC. K. syn. *E. dulcis* L. Smith. Fl. graec. Rehb. exc. et icon. t. 135. DC. Schattige Raine. Wege, in Gebüsch, stchw. dch. das Geb., Rheing. in Oberelsaß, auf dem Babilchen u. Württemberger Jura, Kalkhügel in Baden bei Müllheim, im Breisg. auf dem Kaiserstuhl, einzeln bei Trier u. Luxemburg, nördl. bis Würzburg u. Hildburghausen bei Seidenstadt, Regensburg, Preußen Weichselgegend bei Thorn, Schweiz u. dch. d. g. südl. Alpenkette nach Baiern, Destr. Tyrol, Steyermark, Vittoral, Istrien, Kombardei, Venedig, Ungarn u. Siebenbürgen. 5—6. 4

14. *E. lingulata* Heuffel. Fl. 1835. Comp. II. p. 568. Graßige Orte, Ungarn im Banat auf d. Domuglett bei d. Herculesbädern. 5. 4

15. *E. epithymoides* Jacq. K. syn. Lin. Fl. graec. Rechb. exc. et icon t. 136. f. 4764. Schattige, steinige Hügel, besonders im südl. Geb., Baiern Aigenbach bei Landshut; Destr. Mähren, Steyermark am Lorenziberg bei Willischgrätz, Krain im Walde v. Pippiza, Tyrol, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien. 5—6. 4

16. *E. fragifera* Jan. K. syn. Rechb. exc. et icon. t. 136. f. 4765. *E. spinosa* Wulf. *Tithymalus Pithyusa* Scopol. Steinige Gebirgsstellen im südl. Geb.; Destr. Krain auf d. Karst, Littoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Kombarbei, Venedig. 4—5. 4

17. *E. spinosa* L. Rechb. exc. et icon. t. 137. f. 4766. *E. pungens* Lamk. *E. linearifolia* Willd. Sonnige Felsen im südlichsten Geb., Dalmatien am Wasserfalle d. Kerka, Kombarbei auf d. Monte Penice bei Pavia, Piemont, Nizza Col de Brause, Col di Tenda, Ligurien. 4—5. 3

18. *E. hiberna* L. Rechb. exc. et icon. t. 137. f. 4767. In Galizien. 5—6. 4

19. *E. palustris* L. K. syn. Rechb. exc. et icon. Feuchte, schattige Orte, Wiesen, Gräben, Ufer, stellenw. dch. d. g. Geb. bis in d. Süden, Rheing., besonders auf d. oberen Rheinfläche an vielen Orten, von Basel bis unterhalb Eöln, Baden bei Rehl, Rastatt, Mannheim, Darmstadt, Elsaß, Pfalz bei Landau, Speier, Ludwigshafen, Maxdorf, Frankenthal, Worms bis Mainz, Bieberich, Bingen, Kreuznach, Oberwesel, Braubach, Neuwied, Ahrmündung bei Bonn, Mühlheim bei Eöln, Luxemburg an d. Ufer d. Semoi bei Alzel, Baiern, Schwaben, Thüringen, Sachsen bis Preußen, Destr. zc. 5—6. 4

20. *E. procera* M. v. Bieb. K. syn. *E. pilosa* L. Rechb. exc. et icon. *E. procera* Rechb. pl. crit. et icon. *E. villosa* W. et Kit. Var. β . *trichocarpa*: *E. coralloides* L. Rechb. exc. et icon. t. 137. f. 4768. *E. mollis* Gmel. bad. — γ . *tuberculata*: *E. villosa* Willd. — δ . *lasiocarpa*: *E.*

pilosa Rochel ban. *E. filicina* Portenschl. — *ε. E. illyrica* Lamk. Feuchte Waldbstellen, in Gebüsch, an Bächen, besonders im südl. Geb., Oberbaden, Schlesien am Geyersberg; bei Ohlau u. Oppeln; Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol bei Roveredo an d. Etsch, am Gardasee; Kärnthen, Krain, Ungarn bis in d. Lombardei nach Venedig zc. 6—7. 4

21. *E. dendroides* L. Rehb. exc. et icon. t. 140. f. 4772. *E. lacta* Aiton. *E. divaricata* Jacq. Sonnige Felsen im südl. Eittoral, Dalmatien bei Ragusa u. Canosa; Piemont Nizza, Oneglia, Villafranga am M. Albano; Ligurien a. d. Porto-fino. 2—4. 4

22. *E. Gerardiana* Jacq. K. syn. Rehb. exc. et icon. *E. Cajogala* Ehrh. *E. Esula* Pollich. palat. *E. linariaefolia* Lamk. Sonnige, sandige Orte, Wege, Ufer, Sandfelder, sandige Kalkhügel, besonders im g. südl. u. mittlern Geb., Rheing. auf d. g. Rheinfläche v. Basel bis nach Westphalen, im Mainthale v. Würzburg bis Frankfurt, im Rarthale bei Kreuznach, Flora v. Trier, an d. Obermosel bei Perl; Luxemburg bei Schengen, Remich bis nach Belgien; Thüringen bei Halle, Sachsen bei Meissen, Dresden, Mannsfeld, Hannover; Destr. bei Wien auf d. Donauinseln, Böhmen, Mähren, Südtirol, Südschweiz zc. 6—7. 4

23. *E. serrata* L. Rehb. exc. et icon. Jacq. icon. pl. rar. Im südlichsten Geb., Lombardei, Monte Baldo im Valle d'Artillon am Fuße d. Lessines'schen Alpen; Piemont Valle d'Aost u. bei Nizza. 5—6. 4

Dritte Rotte. *Esula* Roep. K. syn.

24. *E. amygdaloides* L. K. syn. Rehb. exc. et icon. t. 150. f. 4799. *E. sylvatica* Jacq. Austr. Gebirgswälder u. Boralpen im g. südl. Geb., im mittleren stchw., Rheing. aus d. Jura bis Basel, Baden bei Mühldorf, Breisg. auf d. Kaiserstuhl, Oelsberg, bch. Württemberg bei Eßlingen, Maingegend; Elsaß, Pfalz bei Kaiserslautern, Gölzheim, Pfalzburg, Luxemburg bei Dubelange, Beaufort; Trier im Kyllthale bei Rordel, Mettenborn, Mosel abwärts

bei Berncastel, Winningen im Gondelthal, Eifel bei Montjoie, Steinstraß, Flora v. Aachen, bei Eupen u. Düren, Thüringen, Harz, Göttingen, Schlesien um Niederlangenau bei Glas, Ekersdorf bei Troppau u. bei Danzig; Destr. in allen Provinzen bis in d. Lombardei. 4—5. 4

25. *E. Wulfenii* Hoppe. K. syn. *E. Characias* Wulf. *E. veneta* Willd. Rchb. exc. et icon. Steinige, sonnige Orte, an Felsen, im südl. Vittoral u. d. Inseln, Istrien auf Beglia, Abhänge bei Castel Muschio, Dalmatien. 4—5 4

36. *E. Characias* L. Rchb. exc. et icon. t. 150. f. 4800. Felsen u. Mauern im südl. Vittoral, Dalmatien bei Spalato, Piemont, Nizza, Genua, an d. Mauern alla Cava. 3—4. 4

27. *E. Cyparissias* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. Var. β . *E. pinifolia* Lamk. — γ . *E. esuloides* DC. Sandige Orte, Wege, Ufer, Raine, Dämme, Brachfelder im g. Geb. 4—5. 4

28. *E. Esula* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. Var. β . *E. ramosa* Tausch. *E. tristis* M. v. Bieb. Etwas feuchte, schattige Wiesen, Ufer, Gräben, Wege u. Triften, dch. d. g. Geb., zweifelhaft für d. Schweiz. 6—8. 4

29. *E. salicifolia* Host. austr. K. syn. Rchb. exc. et icon. Var. β . *angustata* Rochel ban. Wiesen, Wege, Weinberge, stellw. im südl. Geb., Destr. bei Wien, Ungarn bei Ofen, Galizien, Siebenbürgen. 5—6. 4

30. *E. provincialis* Willd. Rchb. exc. et icon. t. 146. f. 4790. *E. neapolitana* Tenore. Steinige Orte im südl. Vittoral, Dalmatien, Lombardei, auf d. Euganeen am östl. Abhänge d. Monte Venda. 4—5. 4

31. *E. virgata* W. et Kit. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 147. f. 4792. *E. uralensis* Fischer ap. Link. *E. segetalis* var. Baumgart. Transyl. Hügel, Wege, Wiesen, Ackerländer, im südl. Geb., Destr. Böhmen bei Brandeis, Steyermark, Mähren, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn. 5—6. 4

32. *E. Tommasiniana* Bertol. Fl. ital. V. p. 78.

E. virgata β . *montana* Rehb. icon. t. 147. f. 4792. Im südl. Vittoral, Istrien bei Triest am Monte Spaccato. 5—6. 4

33. *E. lucida* W. et Kit. K. syn. Rehb. exc. et icon. t. 149. f. 4797. *E. pallida* Willd. Var. α . *latifolia*. — β . *salicifolia*. — δ . *linearifolia*. Rasse, schattige Wiesen, in Gräben, unter Gebüsch, theilw. im Geb., Schlesien an d. alten Oder bei Scheitnich, Pöpelwitz, Borteln, Sandberg, Dömitz, Bohlau, Frankfurt a. d. Oder bis Freienwalde, Preußen bei Danzig, Thorn, Marienburg; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn bei Pesth am Bache Rakes; Dalmatien. 7—8. 4

34. *E. saxatilis* Jacq. Austr. K. syn. Rehb. exc. et icon. t. 144. f. 4786. Sonnige Kalkfelsen im südl. Geb., Destr. bei Wien. Mödlin, Gutenstein u. bei Baden, Steyermark, Südtirol, Krain, Vittoral im Friaul am Monte Mariana bei Tolmezzo, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei. 5—6. 4

35. *E. Baselicis* Tenore. Rehb. icon. t. 144. f. 4782. Steinige Orte im südl. Geb., Südtirol, Venedig gegen Agordo, u. Cadore. 6. 4

36. *E. portlandica* L. Rehb. exc. et icon. t. 145. f. 4787. *E. congesta* Willd. Hügel im südl. Vittoral, Dalfos; Dalmatien bei Ragusa. 6—7. 4

37. *E. pannonica* Host. K. syn. Rehb. icon. t. 148. f. 4795. b. *E. pulverulenta* Kitaib. *E. oleifolia* et *E. nicaeensis* Sadler. Sonnige, steinige Orte; Destr. Wien bei Langendorf u. Himberg; Ungarn bei Ofen. 6. 4

38. *E. nicaeensis* Allion. pedm. Jacq. Austr. K. syn. Rehb. exc. et icon. t. 148. f. 4795. *E. multicaulis* Thuill. *E. oleaefolia* Gouan. Var. β . *glareosa*: *E. glareosa* M. v. Bieb. *E. serotina* Host. austr. Rehb. exc. et icon. Steinige Orte, Begeränder, Ackerränder, Gebirgswiesen im südl. Geb., Südtirol bei Brixen, Vicent, Roveredo am Gardasee, Padouano, Krain, Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Piemont, Nizza. 7—8. 4

39. *E. Paralias* L. K. syn. Rehb. exc. et icon. t.

145. f. 4789. *E. paralia* Smith. Sandige Küste im südl. Vittoral u. d. Inseln, Istrien auf Dsero, Dalmatien, Kombarbei, Benedig, Piemont u. Nizza, auf d. Dünen d. Nordsee in Belgien u. Holland. 6. 4

40. *E. Myrsinites* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 148. f. 4796. *Tithymalus* — *Clusius Tithym. myrtifolius* Lob. Sonnige Felsen am südl. Vittoral, Istrien am Sponzo zw. Monfalcone u. Aquileja, Insel Cherso, Dalmatien auf d. Monte Biokovo, Ungarn, Kombarbei, Piemont, Nizza. 6—7. 4

41. *E. aleppica* L. Rchb. exc. et icon. t. 142. f. 4781. Felder in Dalmatien bei Lussin. 6—7. 4

42. *E. Pithyusa* L. Rchb. exc. et icon. *E. nummularifolia* Willd. Sandige Orte im südlichsten Vittoral, Piemont um Bagnola; in Savoyen; auf d. Dünen d. Nordsee in Belgien? 5—6. 4

43. *E. pinea* L. K. syn. Bertoloni, Gussoni. Rchb. exc. et icon. *E. caespitosa* et *E. linifolia* Tenore, *E. ragusana* Rchb. exc. in add. p. 873. *E. coscinosperma* Rchb. Fl. germ. exsicc. Steinige Orte im südl. Vittoral, Istrien auf d. Insel Cherso, Scoglio de la Madonna di Veruba, südl. v. Pola, Dalmatien Dmbla-Thal bei Ragusa; Piemont, Nizza. 5—6. ☉

44. *E. juncea* Aiton. Rchb. exc. et icon. t. 142. f. 4779. Acker in Dalmatien. 6—8. ☉

45. *E. segetalis* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. Saatäcker, besonders im südl. Geb., Rheing., Frankfurt a. Main, Thürigen Jena bei Ziegenhayn u. Saasdorf, Schlesien; Destr. Mähren, Steyermark, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien; Schweiz im Cant. Wallis. 6—7. ☉

46. *E. pubescens* Vahl. Rchb. exc. et icon. Im südlichsten Geb., Vittoral, Piemont bei Nizza. 6. 4

47. *E. Peplus* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. Cultivirte Orte im g. Geb. 6—11. ☉

48. *E. peploides* Gouan. K. syn. Rchb. exc. et

icon. t. 140. f. 4774. *E. rotundifolia* Loisl. Uncultivirte Orte, unter Gebüſchen, beſonders im ſüdl. Vittoral, Iſtrien zw. Pola u. Beruda, bei Dignano, Coſſino-piccolo, Dalmatien, Lombardei; nach Rehb. bei Iſere in Savoyen u. Allen im Cant. Waadt. 4—5. ☉

49. *E. terracina* L. Rehb. exc. et icon. *E. taurinensis* Allion. pedm. Im ſüdlichſten Geb., Dalmatien auf d. Monte Marian; Piemont bei Luſengo in d. Gegend von Turin. 6. ☉

50. *E. dalmatica* Visiani ined. Maly enum. pl. austr. p. 322. In Dalmatien. 5—6. ☉

51. *E. falcata* L. K. syn. Rehb. exc. et icon. *E. arvensis* Schleich. exsicc. Var. β . minor: *E. acuminata* Lamk. Tenore Fl. neapol. *E. obscura* Loisl. Fl. gall. Tenore Syllog. Aecker, Weinberge u. Weingärten, beſonders im g. ſüdl. Geb., im mittleren ſtellw., Südſchweiz; Rheing. bei Rödtersheim, Aſſenheim, Speier, Worms bis Mainz, Bingen, Boppard, einzeln bis Neuwied unterhalb Coblenz, an d. Nahe bis Kreuznach, Niedgegend v. Darmſtadt, an d. Mosel bei Trier; Thüringen bei Erfurt, Franckenhausen; Deſtr. Böhmen bei Tepliz, Mähren, Südthrol, Vittoral, Iſtrien u. 6—10. ☉

52. *E. variabilis* Cesati stir. rar. italic. Bertoloni Fl. italic. Maly enum. pl. austr. p. 322. Im ſüdlichſten Geb., Lombardei bei Como am Corno di Cango. 4

53. *E. exigua* L. K. syn. Rehb. exc. et icon. Var. β . truncata: *E. exigua* β . retusa Roth. *E. diffusa* Jacq. pl. rar. t. 88. Host. Fl. austr. — γ . tricuspitata: *E. tricuspidata* Lapeyr. *E. retusa* Rehb. exc. et icon. *E. exigua* γ . Loisl. *E. rubra* DC. Cultivirte Orte, Aecker, Frachfelber, dch. d. g. Geb., beſonders auf Lehm u. Kalk. 6—10. ☉

54. *E. Lathyris* L. K. syn. Rehb. exc. et icon. Cultivirte Orte, an Zäunen, beſonders im ſüdl. Geb., Südſchweiz, Südthrol, Steyermark, Galizien, Siebenbürgen, Vittoral in Dalmatien, Croatien, Lombardei; im mittl. u. nördl. Geb. ſtellw. verwildert. 6—7. ☉

691. *Mercurialis* L. (XXII. 8.) Bingelfraut.

K. syn. 731. Rchb. exc. p. 764. Comp. II. p. 738.

1. *M. perennis* L. K. syn. *M. longifolia* Host. *M. Cynocrambe* Scopol. Var. β . *intermedia*: *M. perennis* β . *ovata* Döll. rh. Fl. Schultz. Gebirgswälder dch. d. g. Geb.; Var. β . stchw. in schattigen Bergschluchten, Pfalz, an d. Nahe u. Glan u. an d. Mosel bei Berncastel zc. 4—5. 4

2. *M. ovata* Hoppe et Sternb. K. syn. *M. livida* Portenschl. Steinige Orte in Gebirgswäldern, mehr im südl. Geb., Baiern, Regensburg bei Mading, Brockdorf; Destr. Baden u. im Briel bei Wien, Böhmen, Steyermark bei Gräß, Südtirol, Kärnthen, Krain am Lorenzberg bei Billiggräß, Siebenbürgen, Vitoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei. 4—5. 4

3. *M. annua* L. K. syn. Cultivirte u. uncultivirte Orte im g. südl. u. mittl. Geb., nördl. in Preußen bis Königsberg, Danzig. 6—10. ☉

4. *M. ambigua* L. fil. Rchb. exc. et icon. f. 4802. *M. annua* β . *androgyna* Comp. II. p. 738. Im südl. Vitoral, Istrien auf d. Insel Cherso; Belgien bei Tournay. 7—11. ☉

692. *Ricinus* L. (XXI. 6.) Wunderbaum. Rchb. exc. p. 764. Comp. II. p. 686.

1. *R. communis* L. Rchb. exc. Nordafrika; besonders im südl. Geb. cultivirt, Lombardei bei Venedig, Verona auf Acker verwildert. 8—9. ☉

693. *Crotophaga* Necker. (XXI. 6.) Fackmuspflanze. Rchb. exc. p. 764. Comp. II. p. 686.

1. *C. tinctoria* Juss. Rchb. exc. et icon. *Croton tinctorium* Lin. Cultivirte u. uncultivirte Orte im südl. Vitoral, Dalmatien bei Zara, Spalato, Rotticelle, Torette, Piemont, Nizza. 7. ☉

Hundertundachte Ordnung.

Urticeen.

Juss. K. syn. 732. K. Taschb. 457. Rchb. exc. p. 178. et icon. t. 651—660.

694. *Urtica* L. (XXI. 3.) Nessel. K. syn. Rchb. exc. p. 181. Comp. II. p. 661.

1. *U. pilulifera* L. K. syn. Aecker, Felder, Schutt, stellw. im südl. u. mittl. Geb., Thüringen bei d. Dorfe Windhausen bei Heringen, an d. alten Schloß Mansfeld, Sena, um Ellrich u. Queblinburg im Harze; Dalmatien, Nizza u. in d. Novara. 6—10. ☉

2. *U. membranacea* Poir. Visiani Fl. Dalm. I. p. 217. Maly enum. pl. austr. p. 87. An Mauern in Dalmatien, bei Ragusa, Cattaro u. auf d. Insel Guippana. 2—8. ☉

3. *U. glabrata* Clementi iter. Visiani Fl. Dalm. I. p. 217. Maly enum. pl. austr. p. 87. In Dalmatien auf d. Monte Biofovo. 5—7. 4

4. *U. Dotarii* L. Rchb. icon. f. 1323. In Belgien. 6—7. ☉

5. *U. dioica* L. K. syn. Feuchte Waldstellen, in Hecken, Zäunen, auf Schutt &c., im g. Geb. 7—9. 4

6. *U. urens* L. K. syn. Gärten, Aecker, an Wegen, Schutt &c., im g. Geb. 7—9. ☉

695. *Parietaria* L. (IV. 1.) Glasfkraut. K. syn. Rchb. exc. p. 181. Comp. I. p. 261.

1. *P. erecta* M. et K. K. syn. *P. officinalis* Willd. Rchb. exc. DC. An Mauern, Zäunen, Straßen, Schutt, stellw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Rheing., Basel, Baden bei Freiburg, Heidelberger Schloß, Elsaß, Pfalz Gebweiler, Neustadt an d. Hardt, Deidesheim, Darmstadt, Eöln, Düsseldorf, Kreuznach, Luxemburg bei Ansemburg, Coblenz Mosel aufwärts &c., dch. Westphalen nach Preußen; Destr. &c. 7—10. 4

2. *P. diffusa* M. et K. K. syn. *P. officinalis* Pollich, Smith. *P. judaica* Hoffm. Schkr. *P. ramiflora* Moench. Alte Mauern an Wegen, seltener an Felsen, stchw. dch. d. südl. u. mittl. Geb., Rheing. v. Heidelberg dch. d. g. Rheinthälern Neckar, Main, Nahe, Mosel bis Luxemburg, Baiern, Schwaben, Nassau, Hessen, Westphalen bei Dülmen, Minden, Hannover, Göttingen; Südschweiz, Destr. Steyermark, Südtirol, Littoral, Dalmatien. 7—10. 4

696. *Cannabis* L. (XXII. 5.) Hanf. K. syn. 733.
Rehb. exc. p. 179. Comp. II. p. 730.

1. *C. sativa* L. K. syn. Aus Indien, stchw. dch. d. g. Geb. cultivirt. 7—8. ☉

697. *Humulus* L. (XXII. 5.) Hopfen. K. syn. 733.
Rehb. exc. p. 179. Comp. II. p. 730.

1. *H. Lupulus* L. K. syn. Hecken, Säune, dch. d. g. Geb., stchw. auch im Großen cultivirt. 7—8. 4

698. *Ficus* L. (XXI. 3.) Feigenbaum. K. syn. 734.
Rehb. exc. p. 178. Comp. II. p. 662.

1. *F. Carica* L. K. syn. In Felsenspalten, an alten Mauern im südl. Geb., Südschweiz im Cant. Wallis bei Sitten, Südtirol bei Bozen, Meran, Littoral. Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardien, Venedig u. cultivirt in d. wärmern Gegenden d. Geb. 7—8. ‡

699. *Morus* L. (XXI. 3.) Maulbeerbaum. K. syn. 734. Rehb. exc. p. 179. Comp. II. p. 662.

1. *M. alba* L. K. syn. Stchw. dch. d. g. Geb. angepflanzt. 5. ‡

2. *M. rubra* L. Rehb. exc. in add. p. 846. In Siebenbürgen angepflanzt. 5. ‡

3. *M. nigra* L. K. syn. Im g. Geb. einzeln angepflanzt. 5. ‡

700. *Celtis* L. (V. 1.) Zürgelbaum. K. syn. 734.
Rchb. exc. p. 179. Comp. I. 1. p. 421.

1. *C. australis* L. K. syn. Steinige Gebirgsstellen unter Gesträuche im südl. Geb., Südschweiz im Cant. Wallis; Südfteyermark, Südtirol, Eittoral, Istrien, auf d. Karst bei Duino, Krain im Tsonzo-Thale bei Görz, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardien, Venedig 2c. 4—5. 3

701. *Ulmus* L. (V. 1.) Rüster, Ulme. K. syn. 734.
Rchb. exc. p. 180. Comp. I. 1. p. 421.

1. *U. campestris* L. K. syn. Rchb. exc. Var. α . *glabra*: *U. glabra* Mill. Rchb. exc. *U. nuda* Ehrh. *U. campestris* Smith. *U. glabra*, *U. tiliaefolia* et *U. tortuosa* Host. Austr. Rchb. exc. — β . *scabra*: *U. excelsa* Borkh. *U. montana* Smith. *U. campestris* α . *latifolia* Meyer. *U. campestris*, *U. corylifolia*, *U. montana* et *U. major* Host. Austr. In Gebirgswäldern u. als Strauch in Gebüsch, Hecken, an Wiesen, Wege u. Feldrändern, bch. d. g. Geb. 3—4. 3

2. *U. suberosa* L. Rchb. exc. *U. campestris* β . *suberosa* K. syn. *U. major* Smith. Rchb. exc. *U. suberosa* Ehrh. *U. hollandica* Mill. *U. tetrandra* Schkr. *U. nemorosa* Borkhaus. *U. campestris* Schkr. Wälder d. Gebirgen u. Ebenen, Gebüsch, stchw. mit voriger bch. d. g. Geb. 4. 3

3. *U. effusa* Willd. K. syn. *U. ciliata* Ehrh. Rchb. exc. *U. octandra* Schkr. *U. racemosa* et *U. effusa* Borkh. *U. scabra* du Roi. Gebirgswälder, stchw. bch. d. g. Geb. auch angepflanzt. 3—4. 3

Hundertundneunte Ordnung.

Juglandeem.

DC. K. syn. 735. K. Taschb. 458. Terebinthaceae pars.
Rchb. exc. p. 489.

702. *Juglans* L. (XXI. 5.) Walnuß. K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 675.

1. *J. regia* L. K. syn. Var. β . *J. macrocarpa*. Pferdenüsse, im g. südl. u. mittl. Geb. allgemein angepflanzt. 5. 3

Hundertundzehnte Ordnung.

Cupulifereen.

Richar. K. syn. 735. K. Taschb. 458. Amentaceae pars.
Rchb. exc. p. 165 et icon. t. 632—650.

703. *Fagus* L. (XXI. 5.) Buche. K. syn. 736. Rchb. exc. p. 176. Comp. II. p. 675.

1. *F. sylvatica* L. K. syn. Var. β . *purpurascens*. Im g. Geb. auf fruchtbarem nicht sandigem Boden aus d. Ebenen bis 4000 Fuß hoch in d. Boralpen hinauf, an vielen Orten Hauptbestand d. Wäldungen; Var. β . in Südtirol. 5. 3

704. *Castanea* Tournef. (XXI. 5.) Kastanienbaum. K. syn. 736. Rchb. exc. p. 176. Comp. II. p. 674.

1. *C. vulgaris* Lamk. K. syn. *C. vesca* Gaertn. Rchb. exc. *C. sativa* Mill. dict. *Fagus Castanea* L. Wälder im g. südl. Geb., im mittl. stchw. verwildert, Rheing. bei Trier; Destr. bei Wien u. stchw. angepflanzt bis nach Sachsen u. 5—6. 3

705. *Quercus* L. (XXI. 5.) Eiche. K. syn. 736. Rchb. exc. p. 176. Comp. II. p. 675.

1. *Q. sessiliflora* Smith. K. syn. *Q. sessilis* Ehrh. *Q. Robur* Roth. Schkr. Rchb. exc. *Q. Robur* β . Lin. Var. β . *Q. aurea* Wierzb. *Q. conglomerata* Pers. Rchb. icon. Wälder, besonders in d. Gebirgen dch. d. g. Geb. u. bis 3000 Fuß hoch in d. Boralpen. 5. 3

2. *Q. pubescens* Willd. K. syn. *Q. lanuginosa* Thuill. *Q. collina* Schleich. *Q. Robur* δ . *lanuginosa* Lamk. *Q. faginea* Rohr et May. Var. β . *pinnatifida*. Gebirgs- u. Hügelwälder, besonders im südl. Geb., im mittlern Geb. Rheing., Basel bei Disberg u. Dietisberg, Baden im Breisg.

auf d. Kaiserstuhl, bei Badenweiler u. am Isteiner-Kloße, Kalkhügel im Oberelsaß; Thüringen bei Jena, Südschweiz im Jura nach Destr. Böhmen, Mähren, Ungarn, Eittoral u. 5. ‡

3. *Q. conferta* Kit. Rchb. icon. t. 646. Im Banat. 5. ‡

4. *Q. pedunculata* Ehrh. K. syn. Schkr. *Q. Robur* Smith. *Q. Robur* α. Lin. *Q. foemina* Fl. Dan. *Q. racemosa* Lamk. Waldbaum in d. Ebenen u. im Hügel-lande, geht nicht in d. Alpen. 5. ‡

5. *Q. apennina* Lamk. Rchb. exc. Gebirgswälder in d. Rheing., Oberelsaß im Kastelwalde bei Colmar, Oberbaden am Isteiner Kloße. 5. ‡

6. *Q. Esculus* L. Rchb. exc. Wälder, Gebüsche, im südl. Geb., Südbungarn, Lombardei bei Verona, Oberitalien, schattige Hügel in Piemont u. Novara. 4. ‡

7. *Q. Cerris* L. K. syn. *Q. crinita* Lamk. *Q. Cerris* et *Q. austriaca* Willd. Rchb. exc. *Q. Aegilops* Scop. Gebirgswälder im südl. Geb., Destr. Steyermark, Tyrol, Krain, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn, Lombardei, Piemont, Südschweiz. 5. ‡

8. *Q. Pseudo-Suber* Santi. Rchb. exc. Wälder im südlichsten Geb., Piemont, Ligurien, Oberitalien. ‡

9. *Q. Suber* L. K. syn. Bewachsene Hügel im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Ungarn, Dalmatien, Lombardei, Venedig u. d. Inseln; Piemont, Nizza. 5. ‡

10. *Q. Ilex* L. K. syn. *Ilex coccifera* Blackw. Quer. Alzina Lapeyr. Var. β. *Q. Ilex* β. *Smilax* Lin. spec. Gaud. Hügel im südl. Geb., besonders am südl. Eittoral, Südschweiz Cant. Tessin, Südtirol im Val di Sarca am M. Baldo, Ungarn, Istrien bei Triest, auf d. Inseln Osero, Gherzo, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza. 5. ‡

11. *Q. coccifera* L. K. syn. *Ilex* — Tabernam. Bewaldete, steinige Hügel im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza. 5. ‡

706. *Corylus* L. (XXI. 5.) Haselnußstrauch. K. syn. 738. Rchb. exc. p. 175. Comp. II. p. 678.

1. *C. Avellana* L. K. syn. Wälder, Gebüſche, Hecken, dch. d. g. Geb. 2—3. ‡

2. *C. tubulosa* Willd. K. syn. *C. rubra* Guimp. et Hayne. Borkh. *C. maxima* Du Roi. Wälder, Gebüſche, im ſüdl. Geb., Ungarn, Siebenbürgen, Eittoral, Iſtrien bei Triest, Lombardei, Oberitalien. 2—3. ‡

3. *C. Colurna* Willd. Rchb. exc. Wälder, Ungarn im Banat u. in Oberitalien. 4—5. ‡

707. *Carpinus* L. (XXI. 5.) Hainbuche. K. syn. 738. Rchb. exc. p. 175. Comp. II. p. 679.

1. *C. Betulus* L. K. syn. Var. β . *incisa* K. syn. Wälder, beſonders in Gebirgsgegenden, dch. d. g. Geb. 4—5. ‡

2. *C. intermedia* Wierzb. Rchb. icon. Im Banat gegen Kircharuſch bei Steyerſdorf. ‡

3. *C. Carpinizza* Host. Fl. austr. II. p. 626. Maly enum. pl. austr. p. 85. Wälder in Siebenbürgen. 4. ‡

4. *C. duinensis* Scopol. K. syn. *C. orientalis* Lamk. Host. Fl. austr. Rchb. exc. Wälder im ſüdl. Geb., beſonders am g. ſüdl. Eittoral; Südtyrol, Ungarn, Krain auf d. Karſt bei Duino, Iſtrien, Dalmatien u. 4—5. ‡

708. *Ostrya* Micheli. (XXI. 5.) Hopfenbuche. K. syn. 738. Rchb. exc. p. 175. Comp. II. p. 680.

1. *O. carpinifolia* Scopol. K. syn. *O. vulgaris* Host. Fl. austr. *O. italica* Michel. *Carpinus Ostrya* L. Wälder, ſchattige Flußufer, im ſüdl. Geb., Südſchweiz Cant. Teſſin; Deſtr. Steyermark, Kärnthen, Südtyrol, Eittoral, Iſtrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei, Oberitalien, Piemont, Ligurien, Genua. 4—5. ‡

Hundertundelfte Ordnung. Salicineen.

Richard. K. syn. 739. K. Taschb. 460. Amentaceae prs.
Rchb. exc. p. 165. et icon. Tab. 557—619.

709. *Salix* L. Tournef. Weide. K. syn. Rchb. exc.
Comp. II. p. 694. Wimmer d. Weiden Schlesiens Fl.
1839. Nr. 3. u. 4.

1) Fragiles, Bruchweiden K. syn.

1. *S. pentandra* L. K. syn. *S. polyandra* Schrank, *S. tinctoria* Smith. Var. β . *latifolia* Hartm. *S. pentandra* β . L. Feuchte, torfige Wälder, Gebüſche, bruchige Waldwiesen d. Alpen und Boralpen u. mit d. Flüssen in d. Niederungen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, Rheing. im ſüdweſtl. Jura, Württemberg im Molaffengeb. bei Willingen, Oberbaden im Kinzigthale, bei Gießen an d. Lahn u. nördl. bis z. Harze nach Preußen u. Schlefien; Böhmen, Mähren, Deſtr. bis in d. ſüdl. Vittoral; auch ſtellw. einzeln im Geb. angepflanzt. 5—6. $\frac{1}{2}$

2. *S. cuspidata* Schultz. Fl. starg. K. syn. *S. Meyerriana* Willd. Guimp. *S. pentandra-fragilis* Wimmer Flora 1849. p. 38. Sumpfige Waldwiesen, ſtellw. im Geb., Hamburg, Mecklenburg, Pommern bei Stettin; Schlefien um Weigelsdorf u. Bunken bei Breslau, Sachſen; Deſtr. Salzburg bei Mitterſill. 5—6. $\frac{1}{2}$

3. *S. fragilis* L. K. syn. Var. α . *vitellina*: *S. decipiens* Hoffm. Smith. — β . *viridis*: *S. fragilis* Smith. *S. Wargiana* Lejeun. *S. excelsa* Tausch. — γ . *glauca*: *S. Russeliana* Smith. Rchb. exc. *S. gracilentia* Tausch. *S. fragilis* Sturm. *S. pendula* Sering. Sal. helv. *S. fragilior*, *S. fragilissima*, *S. palustris* et *S. excelsior* Host. Fl. austr. *S. hexandra* Ehrh. *S. Erhartiana* Smith. Encycl. Feuchte, sumpfige Orte, Ufer, Hecken, Bäume, Wiesen zc. dch. d. g. Geb. 4—5. $\frac{1}{2}$

4. *S. alba* L. K. syn. Var. β . *glabrescens*: *S. caerulea* Smith. — γ . *vitellina*: *S. vitellina* L. Feuchte Orte, Ufer, Triften u., dch. d. g. Geb., auch häufig angepflanzt. 4—5. ‡

2) *Amygdalinae*, Mandelblätterige Weiden. K. syn.

5. *S. amygdalina* L. K. syn. Var. α . *discolor*: *S. triandra* Smith, Sturm, *S. amygdalina* L. Vill. delph. *S. Hoppeana* Willd. *S. Villarsiana* Willd. *S. spectabilis*, *S. semperflorens*, *S. tenuiflora*, *S. venusta*, *S. varia*, *S. amygdalina* et *S. speciosa* Host. Fl. austr. — β . *concolor*: *S. triandra* Smith, Willd. Lin. *S. ligustrina* Host., *S. alopecuroides* Tausch. Feuchte u. sumpfige Orte, an Ufern d. Flüsse, Bäche, Teiche, dch. d. g. Geb. Var. β . mehr in Berggegenden. 4—5. ‡

6. *S. undulata* Ehrh. K. syn. Var. β . *S. lanceolata* Smith. Flußufer, an Bächen, stellw. mehr im nördl. Geb., Rheing., Nassau bei Elville, Coblenz im Brohlthale, am Niederrheine, Nahe Thal bei Kreuznach; Westphalen an d. Lippe, Thüringen, Jena u. in Galizien u. 4—5. ‡

7. *S. hippophaefolia* Thuill. K. syn. *S. violacea* Hollander Fl. de la Moselle, *S. triandra-viminalis* Wimmer Fl. 1849. Var. α . *planifolia* K. syn. — β . *undulaefolia* K. syn. *S. lanceolata* Treviran. test. Wimmer. Flußufer, feuchte Orte, an Uferändern, stellw. im Geb. Rheing., Baden bei Heidelberg, Mannheim, Coblenz, Neuwied, Eöln; im Main-, Nahe- u. Moselthale, Kreuznach, Trier; bei Bremen, Schlesien; Böhmen. 4—5. ‡

3) *Pruninosae*, Schimmelweiden K. syn.

8. *S. acutifolia* Willd. K. syn. *S. pruninosa* Wendl. Rehb. exc. *S. violacea* Smith. *S. caspica* hort. Ufer an Flüssen im nördl. Geb., Hamburg, Berlin nach Preußen bei Memel, Königsberg u., Pommern, Schlesien. 3—4. ‡

9. *S. daphnoides* Villars. delph. K. syn. *S. prae-*

cox Willd. Hoppe, Sturm, Guimp. *S. cinerea* Host. austr. *S. bigemmis* Hoffm. Var. β . *ramulis hirsutis*: *S. cinerea* Willd. — γ . *angustifolia*: *S. pomeranica* Willd. In Voralpensthälern, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Salzburg, Steyermark bis in d. südl. Littoral; mit d. Flüssen in d. Niederungen bis zur Donau; Rheing. am Rheine bis Mannheim, bei Rheinfelden an d. Wiese u. Dreisam, bei Bensfeld, Straßburg in d. Gansau, Nastatt, Pforzheim, Darland, Knielingen, Leopoldshafen, an d. Pfingz bei Graben u. an mehreren Stellen bei Mannheim, Trier an d. Sauer bei Weilerbach unweit Echternach, Preußen, Flußufer, Seestrand bei Danzig, Memel, Pillau, Schlesien bei Oppeln, Troppau; Destr. Böhmen, Mähren, Ungarn, Galizien u. in Sümpfen im nördl. Geb. 3—4. $\frac{1}{2}$

4) *Purpureae*, Rothweiden. K. syn.

10. *S. Pontederana* Schleicher. K. syn. Willd. *S. discolor* et *S. austriaca* Host. Fl. austr. *S. cinerea-purpurea* Wimmer Fl. 1849. p. 40. Alpent.äler, Gebirgswälder, Ufer d. Flüsse u., stchw. im Geb., Schlesien, Maffelwig bei Breslau u. Marchwig bei Ohlau; Destr. Böhmen, Tyrol, Krain; Schweiz; Piemont auf d. M. Genis. 3—4. $\frac{1}{2}$

11. *S. purpurea* L. K. syn. *S. monandra* Hoffm. Var. α . *S. purpurea* Smith, Sturm. — β . *S. Lambertiana* Smith. — γ . *S. Helix* L. Smith. — δ . *androgyna*: *S. mirabilis* Host. — ϵ . *sericea*: *S. monandra-sericea* Sering. Var. von *S. purpurea* sind noch *S. mutabilis*, *S. oppositifolia* et *S. carniolica* Host. Fl. austr. Rasse Wiesen, Triften, Gebüfche, Ufer d. Flüffe, Bäche, dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 3—4. $\frac{1}{2}$

12. *S. rubra* Hudson. K. syn. *S. fissa* Ehrh. *S. membranacea* Thuill. *S. virescens* Vill. delph. *S. concolor* Host. Austr. *S. purpurea-viminalis* Wimmer. Var. β . *sericea*: *S. elaeagnifolia* Tausch. — γ . *S. Forbyana* Smith. Guimp. — δ . *S. sciaphylla* Tausch. Feuchte u. nasse Orte, Wiesen, Triften, Gebüfche, Flußufer u., dch. d. Geb., Rheing.

von Basel dch. Elfaß, Baden im Breisgau, Hessen, Pfalz bis Mainz, Coblenz, Köln, Düsseldorf zc., am Rhe-, Glan- u. Moselufer, Westphalen zc., sandige Orte am Seestrande in Preußen bei Memel u. Kreuzburg, Schlessien nach Destr. Böhmen, Ungarn, Lombardien; Var. β . in Böhmen bei Prag. 3—4. \ddagger

5) *Viminalis*, Korbweiden. K. syn.

13. *S. mollissima* Ehrh. Willd. K. syn. *S. pubera* Koch. ap. Boeningh. Fl. monast. *S. triandra-viminalis* Wimmer. Flußufer, feuchte, schattige Orte, Wälder, Gebüsch im nördl. Geb., stchw. am Niederrheine, dch. Westphalen an d. Weser, Hamburg bis Pommern, Preußen, Schlessien, Böhmen, Ungarn. 4. \ddagger

14. *S. viminalis* L. K. syn. Flußufer, feuchte Wälder, Gebüsch, im g. Geb. 3—4. \ddagger

15. *S. dasyclades* Wimmer. Flora 1849. p. 35. Flußufer sehr selten, in Schlessien bei Troppau u. Scheitnick bei Breslau. 4. \ddagger

16. *S. stipularis* Smith. Koch comment. K. syn. *S. longifolia* Host. Austr. *S. viminalis-caprea* Wimmer. Feuchte Gebüsch, Flußufer, Hannover auf d. Insel Rorderney, Schlessien um Breslau u. Neisse; Unterösterreich. 3—4. \ddagger

17. *S. Smithiana* Koch. Willd. K. syn. *S. mollissima* Smith, Koch. *S. lanceolata* Fries nov. *S. aurita-viminalis* Wimmer. Ufer u. feuchte Gebüsch, stchw. dch. d. Geb., Schwaben, Franken, Thüringen, Jena, Rheing., am Neckar oberhalb Heidelberg, um die Großenwoog bei Darmstadt, im Rhe- u. Glanthal, Flora v. Trier, Hessen bei Cassel, dann bei Hamburg, Bremen, Schlessien, Salzburg. 3—4. \ddagger

18. *S. acuminata* Smith K. syn. Meyer. *S. appendiculata* Villars. teste Wimmer. *S. dasyclados-caprea* Wimmer. V. β . *virescens* Meyer. Ufer, Wälder, feuchte Gebüsch, stchw. im Geb., Rheing., Heidelberg zw. Feimen u. Rohrbach, Mannheim, Speier, Mainz, Kaiserslautern nach Kusel u. Moorlautern, am Glanfluß, Luxemburg, Hessen bei Cassel, dch. Westphalen nach Hannover, Lausitz, Preußen

bei Königsberg, Schlesien, Böhmen, Mähren, Oest. Tyrol, Krain, Galizien. 4. ‡

6) Capreae, Saßweiden. K. syn.

19. *S. Seringeana* Gaud. helv. K. syn. *S. lanceolata*, *S. Kanderiana* et *S. holosericea* Sering. *S. longifolia* Schleich. *S. intermedia* Host. *S. incana-caprea* Wimmer. Thäler d. Boralpen, an Bächen, stellw. Schweiz bei Rheinfelden im Cant. Argau u., Tyrol, Kärnthen u. Krain, 4. ‡

20. *S. salviaefolia* Koch nicht Link. K. syn. *S. patula* Sering. *S. oleifolia* Sering. *S. Flüggiana* Willd. *S. aurita-incana* et *S. incana-aurita* Wimmer. Sumpfige, moorige Orte, stellw. im Geb., Schlesien bei Ustron, Schweiz bei Bern in d. Egmatte, Südtirol. 4—5. ‡

21. *S. incana* Schrank. K. syn. *S. riparia* Willd. *S. lavandulaefolia* Lapeyr. Sering. *S. angustifolia* Poir. *S. rosmarinifolia* Gouan. *S. Elaeagnos* Scopol. An Alpenbächen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Salzburg nach Oest. bis ins südl. Geb. mit d. Bächen u. Flüssen in d. Niederungen, Rheing., Bodensee bei Bregenz, Oberbadon bei Müllheim, Kehl, Pforzheim, Darland, Kniezingen, bei Karlsruhe, Flora v. Trier einzeln an d. Sauer bei d. Weilerbach, Schlesien, dann an d. Donau u. Weichsel, an d. Delfe u. Mora bei Troppau u. 4—5. ‡

22. *S. holosericea* Willd. K. syn. *S. velutina* Schrader. Rasse Wiesen, Ufer, stellw. mehr im nördl. Geb., Berlin bei Treptow, Hannover, Göttingen an d. Rasenmühle, Hessen bei Cassel u. in Krain. 4. ‡

23. *S. cinerea* L. Wahlenb. Smith. K. syn. *S. acuminata* Hoffm. *S. polymorpha* Host. *S. Hoffmanniana* Bl. et Fgh. Var. β . *S. aquatica* Smith. *S. polymorpha* Pollini veron. — γ . *Timmii* Schkr. Feuchte, schattige Orte, Wälder, Gebüsche, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., fast dch. d. Rheinflähe im Neckar-, Main-, Rahr-, Saar- u. Moselthale u. 3—4. ‡

24. *S. nigricans* Fries. K. syn. *S. phylicifolia* Koch.

Wahlenb., Wulfen. *S. stylaris* Sering. *S. hastata* Hoppe. *S. Amaniana* Willd. *S. Andersoniana* Smith. *S. ovata*, *S. menthaefolia*, *S. rivularis*, *S. prunifolia*, *S. parietariaefolia* et *S. aurita* Host. Var. β . *eriocarpa*: *S. nigricans* Wahlenb. *S. rupestris*, *S. hirta*, *S. Forsteriana* et *S. cotinifolia* Smith. *S. Halleri* Sering. — γ . *concolor*: *S. nigricans* γ . *punctata* Hartm. Sumpfige Wiesen, feuchte Gebüſche in d. Thälern d. Boralpen u. von da hinab in d. Niederungen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, mit dem Rheine bis Raftatt u. Mannheim, Baiern, auf d. Pegles bei Erlangen, bei Hamburg, in Ostpreußen bei Königsberg, Tilsit, mit d. Flüssen an d. Donau in Schwaben, Destr. Böhmen, Galizien, in d. Lombardei. 4—5. ‡

25. *S. silesiaca* Willd. K. syn. *S. sphacelata* Smith. *S. Ludowigii* Schrk. *S. livida-cinerascens* Wahlenb. Var. β . *eriocarpa*: *S. sagifolia* Willd. *S. silesiaca* β . *dasycarpa* Tausch. — γ . *angustifolia*: *S. rubens* Presl. Fl. Cech. — δ . *tomentosa*: *S. tomentosa* Tausch. *S. nepitifolia* Presl. Var. find noch ferner von *S. silesiaca*: *S. rhiphaea*, *S. sphenogyna*, *S. multiglandulosa*, *S. albiphylla*. *S. pulverulenta* et *S. cistifolia* Tausch. pl. select. Gebirgswälder u. Boralpen, besonders an Bach- u. Flußufern, stchw. im Geb., Schlesien im Riesengebirge von d. untern Thälern bis zu 4000 Fuß hinauf, unter d. Felsen d. Ultvaters im Gefenke d. Bavia Gora; Destr. Böhmen, Mährische Carpathen, Galizien, Steyermark, Ungarn. 5—6. ‡

26. *S. grandifolia* Sering. K. syn. Wälder d. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Kärnthen, Rheing. bei Basel, Oberbaden im Breisg. auf dem Feldberg, Schwarzwald; dann in Destr. Böhmen im Littoral u. in d. Lombardei. 3—4. ‡

27. *S. caprea* L. K. syn. *S. tomentosa* Sering. *S. ulmifolia* Thuill. *S. aurigerana* Lapeyr. Var. β . *S. lanata* Villars. — γ . *S. sphacelata* Willd. Feuchte, schattige Orte, an Flüssen, Bächen, Teichen, in Wäldern, Gebüſchen, Hecken, im g. Geb. 3—4. ‡

28. *S. aurita* L. K. syn. *S. rugosa* Sering. Salic. helv. *S. heterophylla* Host. Var. β . *S. uliginosa* Willd. — γ . *S. cladostemma* Hayne dendr. Feuchte u. nasse Wiesen, Triften, Wälder, Gebüſche, im g. Geb. 4—5. §

29. *S. depressa* L. K. syn. *S. livida* β . Wahlenb. lapp. Koch. com. *S. arbuscula* γ . Lin. *S. Starkeana* Willd. Rehb. exc. Var. β . *livida*: *S. livida* α . Wahlenb. *S. foliosa* Afzel. — γ . *bicolor*. *S. bicolor* Fries. Sumpfiger Torfboden, ſelten im Geb., Oſtpreußen bei Kapſeim, Tilsit, Rönigsberg u., Schleſien bei Tſchirnau, Galizien. 4. §

30. *S. phylicifolia* L. K. syn. Smith, Fries. *S. bicolor* Ehr. K. syn. edit. I. Meyer chlor. hann. *S. Weigeliana* Willd. Rehb. exc. *S. arbuscula* Wahlenb. Koch. Salic. europ. Rehb. exc. *S. radicans* Smith. *S. Diksonia* Smith. *S. tetrapta* Welker. Var. β . *majalis*: *S. majalis* Wahlenb. lapp. Rehb. exc. *S. tenuifolia* Smith. — δ . *hirsuta*: *S. Schraderiana* Willd. An quellenreichen Orten d. Hochgebirge u. Voralpen, ſtellw. im Geb., Hamburg bei Trittau, Harz auf d. Brocken, in den Sudeten im Rieſengrund; Böhmen, Tyrol, Ungarn, Galizien. 5—6. §

31. *S. laurina* Smith. Willd. Rehb. icon. *S. phylicifolia* β . *laurina* Koch syn. *S. caprea-phylicifolia* Wimm. Feuchte Orte in Sachſen zw. Schönfeld u. Abtaundorf bei Leipzig häufig. 5—6. §

32. *S. glabra* Scopol. K. syn. *S. corruscans* et *S. Wulfeniana* Willd. Rehb. exc. *S. Wulfeniana* Host, Sturm. *S. phylicaeifolia* Wulf. in Jacq. Quellen, Wäſchen d. Voralpen, Baieriſche Alpen, Salzburg, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Deſtr. Vittoral, Lombardei, Venedig. 6—7. §

33. *S. Hegetschweileri* Heer. K. syn. Alpenthäler in d. Schweiz, am Ufer d. Reuß im Uſerenthal gegen Andermatt u. im Engadin bei Samaden u. Revers. 6—7. §

34. *S. hastata* L. K. syn. Koch com. Willd. *S. serratulata* Willd. *S. elegans* Host. *S. malifolia* Smith, Besser. *S. cerasifolia* Balbis. Feuchte u. nasse Triften d. Alpen, Schweiz u. öſt. d. g. Alpenkette nach Tyrol u., im

Harz am alten Stollberg, Schlessien im Gesenke d. Sudeten, Böhmen, Mähren, Ungarn, Galizien. 6. ‡

35. *S. myrtilloides* L. K. syn. *S. elegans* Besser. Var. β . *S. daphneola* Tausch. Moorige, sumpfige Triften, Heiden in d. Boralpen, stellw. Baiern, im Deininger Moos bei München, Schlessien um Königshuld bei Oppeln, auf d. Sudeten bei d. Heuscheuer u. beim Tierskamm; Böhmen, Mähren, Ungarn. 5—6. ‡

36. *S. ambigua* Ehrh. K. syn. *S. plicata* Fries. *S. versifolia* Sering. non Wahlenb. *S. aurita-repens* Wimmer. Var. α . *S. ambigua* Willd. — β . *S. spathulata* Willd. — γ . *S. prostrata* Smith. — δ . *S. cinerea-repens* Wimmer. Moormiesen, torfhaltige, sandige Triften, in lichten Nadelholzwäldern unter *S. aurita* u. *S. repens* stellw. bch. d. Geb., Rheing., Baden bei Graben, Waghäusel, Pfalz bei Maxdorf, Ellerstadt, Kaiserslautern u. Bitsch, Hamburg, Schlessien, Oestr. Tyrol, Lombardien u. 4—5. ‡

37. *S. repens* L. K. syn. Willd. *S. fusca* Willd. *S. polymorpha* Ehrh. *S. depressa* Hoffm. non Lin. Var. α . *vulgaris*: *S. repens* Smith. Rehb. exc. — β . *fusca*: *S. fusca* Smith non Lin. — γ . *argentea* Smith. Rehb. exc. *S. arenaria* Lin. *S. lanata* Thuill. — δ . *leiocarpa*: *S. fusca* α . *leiocarpa* Meyer Chlor. hann. Schlechte, moosige Wiesen, Triften, Heiden, lichte Nadelholzwälder auf torfhaltigem, unfruchtbarem Sandboden, stellw. bch. d. g. Geb., Rheing., v. Bregenz bis Straßburg, Hagenau, Baden bis Karlsruhe, Waghäusel, Pfalz bei Speier u. Mainz, Nassau, Kaiserslautern, Boppard, Coblenz bei Laach, Düsseldorf, Kreuznach, Saarbrücken, Luxemburg, Eifel, Akenau, Grefeld, Westphalen, Hamburg u. 4. ‡

38. *S. finmarchica* Willd. Fries. Rehb. exc. *S. onusta* Besser volh. *S. repens* ϵ . *finmarchica* K. syn. *S. aurita-myrtilloides* Wimmer. Moormiesen in Oberschlessien um Königshuld u. Trenschein bei Oppeln u. bei d. Heuscheuer in d. Sudeten. 5—6. ‡

39. *S. angustifolia* Wulfen. K. syn. Fries nov.

S. incubacea Willd. et herb. Lin. *S. pratensis* Host. & *rosmarinifolia* β . *incubacea* Koch. com. *Salic. europ.* *S. fusca* β . *longifolia* Meyer. Chlor. hann. *S. lactea* Schultz starg. *S. viminalis-repens* Wimmer. Sumpfige Moorniesen, stellw. dch. d. Geb., Westphalen, Hamburg in d. Beseu-
horst, um Bremen, Mecklenburg, Schlesien; Destr. Kärnthen, Krain, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 5. ‡

40. *S. rosmarinifolia* L. K. syn. Koch com. *Salic. europ. excl. var.* β . et γ . *S. tenuis*, *S. parviflora* et *S. littoralis* Host. austr. Torfwie-
en, stellw. im Geb. mehr im nördl. u. südl. Westphalen bei Münster, Hamburg, Preu-
ßen bis Memel, Königsberg, Schlesien; Böhmen, Destr. bei Wien, Tyrol, Galizien, Lombardei, Venedig. 5. ‡

41. *S. Doniana* Smith. K. syn. *S. purpurea-repens* Wimmer. Feuchte Gebüsch an Wiesenrändern, stellw. im
Geb.; Westphalen bei Steinfurt, am Unterharze, Schleswig, Königsberg, Schlesien um Rosenthal, Carlowitz, Lilienthal,
Hennigsdorf, Kobernwitz bei Breslau. 5. ‡

7) Frigidae, Alpenweiden. K. syn.

42. *S. arbuscula* L. K. syn. Var. α . *Waldstei-*
niana: *S. Waldsteiniana* Willd. Rehb. exc. *S. corruscans*
Sturm. *S. ovata* Sering. *S. arbuscula* Jacq. *S. alpestris*
Host. austr. — β . *foetida*: *S. foetida* Schleich. *S. pruni-*
folia β . Koch. com. *S. alpina* Suter helv. *S. prunifolia*
Sering. *S. vacciniifolia* Smith. *S. formosa* Willd. herb.
— γ . *prunifolia*: *S. prunifolia* Smith. Rehb. exc. *S. ni-*
gricans var. δ . Wimmer, *S. venulosa* et *S. carinata*
Smith. Bewachsene Orte d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g.
Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Destr. Steyermark, Galizien,
Ungarn, Lombardei. 6—7. ‡

43. *S. Lappinum* L. K. syn. *S. limosa* Wahlenb.
Rehb. exc. *S. helvetica* Villars. *S. nivea* Sering. *S. lactea*
Bray, *S. arenaria* Willd. Smith. *S. glaucophylla* Willd.
S. Stuartiana Smith. Var. β . *dentata* Tausch. *S. glauca*

Smith. — *γ. latifolia* Tausch. — *δ. marubiiifolia* Tausch. — *ε. angustifolia* Tausch. — *ζ. acuminata* Tausch. Rasse, sumpfige Orte d. Alpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Destr.; Schlesien in d. Sudeten, Riesengebirge um d. Teichen, im Elbgrunde, am Altvater; Karpathen in Mähren, Böhmen, Siebenbürgen, Lombard. 5—6. ‡

44. *S. glauca* L. K. syn. *S. sericea* Villars. Var. *β. angustifolia*: *S. glauca γ. Lapponum* Wahlenb. *S. albida* et *S. elaeagnoides* Schleicher. cat. — *γ. subovata*: *S. glauca α. appendiculata* Wahlenb. lappon. *S. appendiculata* Vahl. Alpen in d. südl. Kette; Schweiz vom Gotthard bis z. St. Bernhard nach Piemont, Savoyen u. Lombard. 6—7. ‡

45. *S. caesia* Villars. K. syn. *S. prostrata* Ehrh. *S. myrtilloides* Willd. nec. Lin. et Smith. Moorboden, an Bächen d. Hochalpen, Schweiz im Cant. Waadt auf d. Enzeindaz, M. Genis, Tyrol auf d. Boralpe della Costa in Levinolongo. 6—7. ‡

46. *S. myrsinites* L. Willd. K. syn. *S. arbutifolia* Willd. *S. dubia* Suter helv. *S. Jacquiniiana* Sturm. Var. *β. S. Jacquiniiana* Willd. *S. Jacquinii* Host. Rehb. exc. *S. fusca* Jacq. *S. alpina* Scopol. Feuchte, bewachsene Orte d. höchsten Alpen von d. Schweiz bis Tyrol, Destr. Steyermark, Kärnthen, Krain, Littoral, Lombard, Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen. 6—7. ‡

8) Glaciales, Gletscherweiden, K. syn.

47. *S. reticulata* L. K. syn. Rasse, bewachsene Orte d. Hochalpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. bis ins südlichste Geb., Lombard u. Venedig. 7—8. ‡

48. *S. retusa* L. K. syn. Var. *β. major*: *S. Kitaibeliana* Willd. — *γ. minor*: *S. serpyllifolia* Scopol. Willd. — *δ. reticulato-retusa* Rehb. icon. *S. Thomasiana* Rehb. Steinige, grasige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Steyermark

Destr. bis ins südlichste Geb. Var. γ . auf Hochalpen u. Var. δ . im Valle Bagnes im Cant. Wallis. 7—8. ‡

49. *S. herbacea* L. K. syn. Alpen an d. Schneegrenze, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette u. in d. Sudeten, nach Baiern, Salzburg, Destr. Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. Lombardien. 7—8. ‡

710. *Populus* L. (XXII. 7.) Pappel. 'K. syn. 759. Rechb. exc. p. 173. Comp. II. p. 735.

1. *P. alba* L. K. syn. *P. nivea* Willd. *P. major* Miller. Etwas feuchte Waldstellen, Gebüsche, stchw. dch. d. Geb. bis in d. Lombardien; Rheing., Pfalz in d. Rheinwaldungen u. am Rheinufer in Menge; auch mit d. Folgenden häufig im Geb. angepflanzt. 3—4. ‡

2. *P. canescens* Smith. K. syn. *P. alba* Willd. Miller. *P. alba* α . *canescens* Aiton. Etwas feuchte Wälder, Gebüsche, besonders in Gebirgen, stchw. dch. d. Geb., Rheing., mit voriger Art bei Karlsruhe, Knielingen, Eggenstein, Frankenthal, Worms, Mainz, Trier, Coblenz, Eöln u. Destr. Böhmen, Tyrol, Ungarn u. angepflanzt. 3—4. ‡

3. *P. tremula* L. K. syn. Var. β . *P. villosa* Lang. In Wäldern, Gebüschen, dch. d. g. Geb.; Var. β . in d. Rheing.; Baden im Breisg., bei Karlsruhe, Waghäusel, Heidelberg, Pfalz bei Wardorf, Bitsch u. in Ungarn u. 3—4. ‡

4. *P. pyramidalis* Rozier. K. syn. *P. dilatata* Aiton. Rechb. exc. *P. fastigiata* Poir. *P. nigra italica* Du Roi. *P. italica* Mch. Aus d. Orient, im g. Geb. an Wegen u. angepflanzt. 3—4. ‡

5. *P. repanda* Baumgarten. Transyl. I. p. 348. Maly enum. pl. austr. p. 85. An d. Ufern d. Muta in Siebenbürgen. 3—4. ‡

6. *P. nigra* L. K. syn. Feuchte Orte, Ufer, Gebüsche, dch. d. g. Geb. u. angepflanzt. 4. ‡

7. *P. pannonica* W. et Kit. Zawadzki enum. Fl. Galiz. Maly enum. pl. austr. p. 85. In Galizien. 4. ‡

8. *P. monilifera* Aiton. Kew. K. syn. *P. carolinensis* Mneh. Aus Amerika, stchw. an Wegen, Straßen u. in Anlagen angepflanzt. 4. ‡

Hundertundzwölfte Ordnung.

Betulineen.

Richard. K. syn. 760. K. Taschb. 471. Amentaceae prs. Rchb. exc. p. 174. et icon. T. 621—631.

711. *Betula* L. (XXI. 5.) Birke. K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 680.

1. *B. alba* L. K. syn. Var. β . *B. pendula* Roth. Schkr. Rchb. icon. — γ . *B. verrucosa* Ehrh. — δ . *B. laciniata* Wahlenb. Rchb. icon. Wälder, Gebüsche, besonders auf sandigem Boden dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 4—5. ‡

2. *B. pubescens* Ehrh. K. syn. *B. tomentosa* Reitt. *B. odorata* Bechstein. Rchb. icon. *B. davurica* Pall. *B. torfacea* Schleicher. Var. β . *glabrata*: *B. carpatica* Willd. Rchb. exc. *B. glutinosa* Wallr. Sumpfige Torfmoore, auf Heiden, in Wäldern u. Gebüschen dch. d. g. Geb. bis in d. Vor-alpen, nördl. nach Hannover, Preußen bis Königsberg. 4—5. ‡

3. *B. intermedia* Thomas. K. syn. Torfmoore d. Schweiz im Jura, M. Chafferal, Chaur d'Abel, Val de Chaur. 5—6. ‡

4. *B. humilis* Schrank. K. syn. *B. fruticosa* Willd. K. syn. edit I. Rchb. exc. non Pallas. Torfmoore, mehr auf d. nördl. Seite d. Alpen u. auf sumpfigen Torfboden im nördl. Geb., Rheing., Oberbaden im Torfried bei Wilingen, Trauchgau bei Hohenschangau; Baiern Kreis Schwaben bei Memmingen u. Kloster-Roth; Preußen bei Königsberg, Thorn, Brandenburg bei Grünberg u. Orienburg, Pommern, Mecklenburg; Salzburg u. Reichenhall, Tyrol, Galizien. 4. ‡

5. *B. oycoviensis* Busser. Galiz. Rchb. exc. in add. p. 846. R. Saccolovii Jacq. fil. Moorboden in Galizien im Thale Dykow u. bei Gebutow. 5. 3

6. *B. nana* L. K. syn. Torfmoore d. Alpen u. Boralpen u. in d. Niederungen stellw. bis in d. nördl. Geb., Oberschwaben im Reichenhölzrieder-Moos, Oberbaiern bei Schongau, Erzgebirge, Harz auf dem Brocken, Osterode bei Königsberg, Thorn, in Preußen, auf d. Sudeten, Böhmerwald bei Ruckwarda, Destr. Salzburg u. Reichenhall, Tyrol, Krain, Lombardien, Schweiz Cant. Waadt, besonders im Jura Chaux d'Abel, Brevine u. bei Einsiedel. 5. 3

712. *Alnus Tournef* (XXI. 5.) Erse. K. syn. 762. Rchb. exc. p. 174. Comp. II. 683.

1. *A. viridis* DC. K. syn. *Betula ovata* Schrank., Host. *B. Alnobetula* Ehrh. *B. viridis* Chaix. *B. alpina* Borkhaus. Alpen u. Boralpen, besonders in d. g. Urgebirgszüge, wo sie *Pinus Pumilio* ersetzt, bis in d. südlichste Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, Bern auf d. Gurten, Schaffhausen, Rheing. bei Basel, Rheinfelden, Oberbaden am Iwerenbach im Münstertale, in d. Hölle bei Simonswald u. am Schloßberg bei Freiburg; dann in Destr. Böhmen, Mähren, Ungarn zc. 5—6. 3

2. *A. incana* DC. K. syn. Var. β . *pinnatifida* Wahlenb. — γ . *acutiloba* K. syn. Bäche d. Alpenthäler u. Boralpen mit d. Flüssen, an schattigen, feuchten Orten in d. Niederungen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, besonders im g. südl. Geb., Rheing. mit d. Rheine bis Germersheim, Speier, Mannheim, Worms, Coblenz, Bonn bei Beuel, Flora v. Trier an d. Nahe, Saar u. Sauer, bei Kreuznach zc., Schwaben, Baiern, im Harze auf d. Brocken, Thüringen, Ostpreußen bei Tilsit, Memel, Danzig, Schlesiens, v. d. Iller bis zur Donau in Böhmen, Mähren zc. 2—4. 3

3. *A. pubescens* Tausch. K. syn. *A. badensis* Lang. *A. barbata* C. A. Meyer. *A. hybrida* Alex. Braun. Rchb. icon. *A. plicata* Hoffg. Schattige, feuchte Orte an

Flußufern, stello. im Geb., Rheing. Oberbaden immer nur einzeln, Müllheim am Klemmbach, Forchheim, Dachsland u. Rnielingen bei Karlsruhe, Wiesenthal, Nassau bei Hadamar, Bonn u. in Böhmen. 3—4. ‡

4. *A. tirolensis* Sauter. Rchb. icon. t. 630 f. 1293. In Tyrol. ‡

5. *A. glutinosa* Gaertn. K. syn. *Betula Alnus* α. *glutinosa* L. Var. β. *incisa* Willd. K. syn. — γ. *laciniata* Willd. Feuchte u. nasse, besonders moorige Orte in Wäldern, Gebüsche an Flüssen, Bächen, Teichen u. Quellen, dch. d. g. Geb. 2—3. ‡

Hundertunddreizehnte Ordnung.

Myriceen.

Richard. K. syn. 763. K. Taschb. 473. Amentaceae prs. Rchb. exc. p. 175 et icon. t. 620.

713. *Myrica* L. (XXII. 4.) Gagel. K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 728.

1. *M. Gale* L. K. syn. Feuchte Dorfgründe, Moorheiden, besonders dch. d. g. nördl. Geb., Rheing. Siegburg bei Bonn, Mühlheim u. Schleebusch bei Köln, Luxemburg bei Arlon, Düsseldorf u. v. da dch. Westphalen, Hamburg, Hannover, Oldenburg, Holstein, Mecklenburg, Preußen bei Danzig, Pommern u. in Dalmatien bei Trau. 4—5. ‡

Hundertundvierzehnte Ordnung.

Coniferen.

Juss. K. syn. 763. K. Taschb. 473. Taxineae et Strobilaceae Rchb. exc. p. 155 et 158 et Coniferae icon. t. 521—539.

Erste Unterordnung.

Taxineen.

Richard. Rchb. icon. Ephedreen N. v. Esenb. K. syn.

714. *Ephedra* L. (XXII. 11.) Meerträubchen.

K. syn. 764. Rchb. exc. p. 156. et icon. Comp. II. p. 741.

1. *E. distachya* L. K. syn. Rchb. exc. C. A. Meyer monogr. 80. *E. vulgaris* Richard. Var. α . *subtristachya*. — β . *media*: *E. monostachya* M. v. Bieb. — γ . *submonostachya*: *E. monostachya* Lin. *E. distachya* Schkr. *E. minor* Host. Sonnige Felsen im südl. Geb., Südtirol bei Trident, an d. Siegmundskrone bei Bozen, Dalmatien bei Spalato, Kerkra, Ungarn am Adlersberg bei Ofen, Vitoral, Piemont, bei Nizza; Var. γ . in Kärnthen zw. Undine u. Pontebba u. in Ungarn. 4—5. ‡

2. *E. helvetica* C. A. Meyer monogr. 87. *E. distachya* Gaud. helv. Sonnige Felsen in d. Südschweiz Cant. Wallis, Schloß Tourbillon bei Sitten, Foully u. bei Saillon. 4—5. ‡

3. *E. campylopoda* C. A. Meyer monogr. 73. Endl. syn. 259. *E. fragilis* Sieb. Fl. cret. exsicc. Petter. *E. major* Host. Sonnige, sandige Felsen u. Ruinen in Dalmatien, an d. Kastel v. Budua, bei Torrete u. Giralmo. 4—5 ‡

4. *E. fragilis* Desf. Rchb. exc. C. A. Meyer monogr. 69. Endl. syn. In Dalmatien? ‡

715. *Taxus* L. (XXII. 9.) Eibenbaum. K. syn. 764.

Rchb. exc. p. 156. Comp. II. p. 733.

1. *T. baccata* L. K. syn. Gebirgswälder u. Boralpen dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Schweiz u. dch. d. Alpenkette, besonders auf d. Jura nach Baiern, Tyrol, Destr. 2c., Rheing. im Würtemberger u. Badenser Jura, Breisgau im Höllenthal, Moselgebirge bei d. Brodenbach u. auf d. Ehrenburg häufig, Schlesien, Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn 2c., auch nicht selten angepflanzt im mittl. u. nördl. Geb. 3—4. ‡

Zweite Unterordnung.

Cupressineen.

Richar. Conifer. 137. K. syn.

716. *Juniperus* L. (XXI. 5.) Wachholder. K. syn.

764. Rchb. exc. p. 161. Comp. II. p. 731.

1. *J. nana* Willd. K. syn. *J. sibirica* Burgsd. *J. communis* γ . Lin. *J. communis* β . *alpina* Wahlenb. *J. comm.* γ . *alpina* Gaud. helv. *J. comm.* γ . *montana* Aiton. Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette bis in d. Hochgebirge von Schl.-sien, Babia Gora, Altvater, Böhmen, Mähren u. 7—8. \ddagger

2. *J. communis* L. K. syn. Schlechte, magere Bergswälder, Heiden, Triften, dch. d. g. Geb. 4—5. \ddagger

3. *J. macrocarpa* Sibthorp. K. syn. Smith. Rehb. icon. f. 1146. *J. Oxycedrus* α . Visian. Fl. Dalm. Felsen, steinige Orte im südl. Littoral, Istrien zw. Triest u. Duino, bei Rabresina, bei Fiume u. in Dalmatien. 4—5. \ddagger

4. *J. Oxycedrus* L. K. syn. Rehb. exc. et icon. *J. Oxycedrus* β . Visian. Fl. Dalm. Steinige, uncultivirte Orte unter Gesträuchen im südl. Littoral u. auf d. Inseln, Istrien, Dalmatien, Croatien. 5. \ddagger

5. *J. phoenicea* L. K. syn. Var. β . *J. lycia* L. spec. Sonnige, steinige Hügel im südl. Littoral, Istrien Inseln Cherso u. Dsero, Dalmatien bei Spalato, Piemont, Nizza. 5. \ddagger

6. *J. Sabina* L. K. syn. Alpen u. Boralpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis im Nicolaithale, auf d. Foully; Destr. Salzburg, Tyrol im Oetzthal, Matrenerthal, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien u. Venedig. 4—5. \ddagger

717. *Cupressus* L. (XXI. 3.) Cypresse. K. syn.

765. Rehb. exc. p. 161. Comp. II. p. 665.

1. *C. sempervirens* L. K. syn. Miller. *C. fastigiata* DC. *C. pyramidalis* Tragus. Var. β . *horizontalis*: *C. horizontalis* Miller. *C. sempervirens* β . Lin. *C. Tournefortii* Audibert cat. 1834. *C. expansa* et *C. orientalis* Hortul. Im südlichsten Geb., Südtirol, Littoral, Istrien, Südkrain, Dalmatien, Lombardien u. ital. Schweiz, an d. mittelländischen Meeresküste, stellenw. auch cultivirt. 2—3. \ddagger

Dritte Unterordnung.

Abietineen.

Richar. Conifer. 147. K. syn.

718. *Pinus* L. (XXI. 6.) Kiefer. K. syn. 766. Rchb. exc. p. 159. Comp. II. p. 586.

a. *Pinaster* Koch. K. syn. Kiefer.

1. *P. sylvestris* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. f. 1127. *P. Mughus* Jacq. Var. β . *P. rubra* Miller. Rchb. exc. Bildet Wälder, besonders im Sandboden, aus d. Voralpen dch. d. Gebirge bis in d. Niederungen dch. d. g. Geb. 5. ‡

2. *P. obliqua* Sauter. Rchb. exc. et icon. f. 1128. *P. Mughus* α . *uliginosa* K. syn. *P. uliginosa* Neumann. *P. rotundata* Link. Gebirge, Voralpen, im Sächsischen Erzgebirge, Schlesien in d. Sudeten, Tyrol über Innsbruck auf d. Brenner 2c. 6. ‡

3. *P. Mughus* Scopol. K. syn. excl. var. α . Rchb. exc. et icon. f. 1130. *P. Pumilio* Haenke, *Pinaster Pumilio* Clus. Alpen, Voralpen u. Gebirge, besonders auf Kalk u. in Moorgegenden d. niederen Gebirge, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette Erzgebirge, Schlesien in d. Sudeten u. Carpathen, Destr. Böhmen, Mähren bis in d. Lombardei 2c., Rheing. in Oberbaden, Breisg. am Titisee, Rothwasserthal, Bernau im Cumpfe bei Zeltsee, am wilden Hornsee, am kalten Brunnen, Herrenwiese, Hornesgründen 2c. 5. ‡

4. *P. uncinata* Ramond. K. syn. Rchb. exc. et icon. f. 1129. Antoin. conif. *P. Mughus* Poir. In d. südwestl. Schweiz Cant. Wallis. 6—7. ‡

5. *P. Laricio* Poir. K. syn. Rchb. icon. t. 524. f. 1131. *P. Laricio* β . *austriaca* Antoin. conif. *P. austriaca* Tratt. Rchb. exc. Höss. *P. maritima* B. minor Duham. *P. maritima* K. syn. edit. I. *P. nigricans* Link. Host. *P. nigra* Link. *P. Pinaster* Besser, Rochel. ban. Bl. et Fgh. *P. sylvestris* Baumg. Gebirgswälder im südl. Geb., beson-

bers auf Kalk; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Kärnthen, Vittoral, Fiume, Julische Alpen, Dalmatien, Croatien, Ungarn im Banat, Siebenbürgen u. Galizien. 5—6. ‡

6. *P. Pinaster* Soland. in Aiton. h. Kew. Reh. exc. et icon. f. 1132. Antoin. conif. *P. maritima* DC. *P. sylvestris* Mill. dict. *P. syrtica* Thore. Var. β . *escarena* Risso. — γ . *Lemoniana* Benth. — δ . *Pinaster minor* Loisl. — ϵ . *variegata* Hartm. Wälder, Gebüsche, im südlichsten Vittoral, Dalmatien, Lombardei, Venedig; Oberitalien. 5. ‡

7. *P. halepensis* Miller. Reh. exc. et icon. f. 1133. Host. Fl. austr. Antoin. conif. *P. maritima* Lamk.? Am südlichsten Vittoral, am mittelländischen u. adriatischen Meere, Dalmatien u. 5. ‡

8. *P. pinea* L. K. syn. Reh. exc. et icon. f. 1135. Antoin. conif. Wälder im südlichsten Geb., in Dalmatien, auf d. Insel Meleda (Visiani), sonst im Süden angepflanzt, z. B. Südtirol, Krain, Lombardei, Venedig u. 5. ‡

9. *P. Cembra* L. K. syn. Reh. exc. et icon. p. 1136. Hochalpen, besonders auf d. südl. Hochalpenzüge; Baiern; Schweiz Cant. Wallis nach Tyrol, Steyermark, Destr. über d. Enß, Salzburger-Alpen bis z. M. Genis, Kärnthen, Krain, Siebenbürgen, Ungarn, Lombardei, Piemont. 6. ‡

b. *Larix* Tournes. K. syn. Färchen.

10. *P. Larix* L. K. syn. Reh. icon. f. 1137. Antoin. conif. *Larix europaea* DC. Reh. exc. *Abies Larix* Lamk. K. syn. edit. I. Wälder d. Alpen, Boralpen u. Hochgebirge; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. u. bis in d. Lombardei, dann in d. Sudeten u. Carpathen, sonst im Geb. wohl nur angepflanzt. 5. ‡

c. *Abies* Link. K. syn. Tanne.

11. *P. Picea* L. K. syn. *P. abies* Du Roi. Reh. icon. f. 1139. *Abies pectinata* DC. *A. excelsa* Link. *A. vulgaris* Poir. *A. alba* Miller. *A. Picea* Reh. exc. *A. ta-*

xifolia Desfont. Wälder d. Alpen, Boralpen u. Hochgebirge, Schweiz u. dch. d. g. Gebirgskette bis ins südlichste Geb. u. dch. d. g. Geb. in Wäldern angepflanzt. 5. 3

d. *Picea* Link. K. syn. Rothtanne.

12. *P. Abies* L. K. syn. *P. Picea* Du Roi. Rchb. icon. f. 1138. *P. excelsa* Lamk. *Picea excelsa* Link. *Picea vulgaris* Lk. *Abies excelsa* Poir. DC. Rchb. exc. Gebirgswälder, Alpen u. Boralpen bis in d. Niederungen u. Ebenen Wälder bildend. 5. 3

Zweite Classe.

Phanerogamische Endogenen. Monocotyledoneen.

K. syn. 770. K. Taschb. 476

Keim mit einem oder mit wechselständigen Keimblättern

Hundertundfunfzehnte Ordnung. Palmae.

Lin. Rchb. exc. p. 136.

719. *Phoenix* L. (XXII. 6.) Dattelpalme. Rchb.
exc. p. 136.

1. *P. dactylifera* L. Rchb. exc. Aus Asien u.
Afrika; im südlichsten Geb. angepflanzt u. verwildert, Dal-
matien bei Spalato, Piemont zw. Genua u. Nizza bei Bor-
ghera. 2—3. 5

720. *Chamaerops* L. (XXII. 6.) Zwergpalme.
Rchb. exc. p. 136. Comp. II. p. 734.

1. *Ch. humilis* L. Rchb. exc. *Phoenix-Cavan. Cha-
maeriphes major.* Gaertn. Sandige Orte im südlichsten
Ettoral, Piemont bei Nizza. 2—3. 5

Hundertundsechzehnte Ordnung.

Hydrocharideen.

DC. K. syn. 770. K. Taschb. 476. Rchb. exc. excl.
Nymphaeaceae p. 13. et icon. 1. Band.

721. *Vallisneria* L. (XXII. 3.) Vallisnerie.

K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 60. f. 108—110. Comp.
II. p. 723.

1. *V. spiralis* L. K. syn. *V. Micheliana* Spreng.
*V. Jacquini*ana Spr. Stehende Wasser, Seen, Teiche, Was-
sergräben im südl. Geb., Südschweiz Cant. Tessin am Lugan-
er-See in d. Bucht von Capo di Lago u. Agno; Südtirol
im Gardasee; Siebenbürgen, im Banat, Croatien, Lom-
bardei, Venedig bis Padua, bei Treviso zc. 7—8. 4

722. *Stratiotes* L. (XXII. 10.) Wassertscheere.

K. syn. Rchb. exc. et icon t. 61. f. 111. Comp. II.
p. 741.

1. *S. aloides* L. K. syn. Schwimmend in stehen-
dem Wasser, stellw. mehr im nördl. Geb., Rheing., Wür-
temberg bei Althaus, Straßburg, Entensee bei Offenbach
eingebürgert, dann am Niederrheine bei Cleve u. Essen, dch.
Westphalen nach Holstein, Oldenburg, Mecklenburg, Berlin,
Potsdam, Pommern bis Ostpreußen, Lausitz, Sachsen, Thü-
ringen bei Barby; Destr. Mähren, Galizien, Ungarn, Sie-
benbürgen u. Krain. 7—8. 4

723. *Hydrocharis* L. (XXII. 10.) Froschbiß.

K. syn. 771. Rchb. exc. p. 14. et icon. 1. Band. t.
62. f. 112. Comp. II. p. 740.

1. *H. Morsus-ranae* L. K. syn. Stehende Was-
ser, Seen, Teichen, tiefe Gräben, stellw. dch. d. g. Geb.
7—8. 4

724. *Udora* Nutt. (XXII. 3.) Wasserquirl. K. syn. 771. Rchb. exc. p. 14. icon. t. 59. f. 104—106. Comp. II. p. 724.

1. *U. occidentalis* Pursh. K. syn. *U. pomeranica* Rchb. exc. et icon. *U. verticillata* Nutt. Rchb. icon. *U. lithuanica* Besser. Rchb. icon. *Serpicula verticillata* Rostk. et Schm. Stehendes Wasser in Pommern im Dammischen See bei Stettin. 4 .

Hundertundsiebzehnte Ordnung. Alismaceen.

Juss. K. syn. 771. K. Taschb. p. 477. Rchb. exc. p. 12. icon. 1. Band. t. 53—57. f. 94—101.

725. *Alisma* L. (VI. 4.) Froschlöffel. K. syn. Rchb. exc. Comp. I. 1. p. 640.

1. *A. Plantago* L. K. syn. Var. β . *A. lanceolatum* Wither. — γ . *A. graminifolium* Ehrh. Stehende Wasser, Gräben, Teichen, dh. d. g. Geb. 6—8. 4

2. *A. parnassifolium* L. K. syn. *A. dubia* Willd. *A. Damasonium* Willd. Landseen, Sümpfe stchw., aber selten im Geb., Berlin bei Tempelhof, See am Bafedower Theerosen, Frankfurt a. d. Oder, Mecklenburg im Congriker See, Lausitz bei Sonnenwald, Sachsen am Schaafsteiche bei Belzig; Steyermark in d. Pannen bei Sichelendorf, Kärnthen, Krain u. in Dalmatien. 6—8.

3. *A. natans* L. K. syn. *A. natans sparganifolium* Fries. Stehende Wasser, Teiche u. sumpfiger, überschwemmter Boden, stchw. dh. d. Geb., Rheing., Rodder-Maar bei Andernach Flora v. Coblenz, zw. Meerheim u. Mühlheim bei Eöln, Aachen, Cornelimünster, Luxemburg bei Capel u. Bance, nicht bei Trier; Westphalen bei Dülmen, Bentheim zc., nach Hannover, Holstein, Hamburg, Oldenburg, Mecklen-

burg, Berlin u., u. dch. d. nördl. Geb., Sachsen, Lausitz; Oestr. bei Ebersdorf u. in Krain. 6—8. 4

4. *A. ranunculoides* L. K. syn. Var. β . *zosterifolius* Fries. Teiche, Sümpfe, feuchte, überschwemmte Orte, stellw. im Geb., mehr im nördl., Rheing. von Grefeld am Niederrheine dch. Westphalen bei Dülmen im Neusträßer-Bruche, Grefeld, Bentheim, Ochtrup u. nach Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Bremen, Holstein, Hamburg, Preussen, Berlin, Schlesien; Böhmen, Mähren; Schweiz an d. Ahr bei Wangen u. am Neuenburger See; Littoral, Istrien bei Monfalcone, Croatien, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Piemont, Nizza. 6—8. 4

5. *A. Damasonium* L. Bl. Comp. I. 1. p. 642. M. et K. II. p. 632. in nota. *Actinocarpus Damasonium* Smith. An stehendem Wasser, Seen, Ufer, Belgien bei Antwerpen, in Flandern, u. im südl. Geb. in Dalmatien. 4

726. *Sagittaria* L. (XXI. 5.) Pfeilfraut. K. syn. 773. Rchb. exc. et icon. Comp. II. p. 685.

1. *S. sagittifolia* L. K. syn. Var. β . *S. heterophylla* Schw. et Koerte. Stehende u. fließende Wasser, stellw. dch. d. ganze bis ins südlichste Geb., Rheing. nicht selten. 6—7. 4

Hundertundachtzehnte Ordnung.

Butomeen.

Richard. K. syn. 773. K. Taschb. 478. Rchb. exc. *Juncaceae* pars. p. 99.

727. *Butomus* L. (IX. 2.) Wasserviole. K. syn. Rchb. exc. et icon. 1. Baud. t. 58. f. 103. Comp. I. 2. p. 37.

1. *B. umbellatus* L. K. syn. Teiche, Gräben u. langsam fließende Stellen d. Flüsse, Bäche, stellw. dch. d. g. Geb. 6—8. 4

Hundertundneunzehnte Ordnung. Juncagineen.

Richard. K. syn. 773. K. Taschb. 478. Rchb. exc. Juncaceae pars. p. 96.

728. *Scheuchzeria* L. (VI. 3.) Scheuchzerie.

K. syn. Rchb. exc. p. 96. icon. 5. Band. t. 319. Comp. I. 1. p. 639.

1. *S. palustris* L. K. syn. Sumpfiger Moorboden, Torfsümpfe, stellw. dch. d. Geb., mehr im nördl., bis in d. Alpen, Rheing., Schweiz, Oberbaden bei Constanz, Mühlhausen, Schwarzwald a. d. Kniebis, Breisg. auf d. Feldberg, bei Waghäusel, Pfalz bei Kaiserslautern, Zweibrücken, Eitsch, Saarbrücken; Hannover, Mecklenburg, Preußen bei Königsberg u., Berlin, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Krain u. Siebenbürgen. 6. 4

729. *Triglochin* L. (VI. 3.) Dreizack. K. syn.

Rchb. exc. p. 96. icon. 1. Band. t. 51—52. f. 90—93. Comp. I. 1. p. 639.

1. *T. maritimum* L. K. syn. Seeküsten, salzführende Wiesen u. Quellen an d. Küste wie im Binnenlande, v. Norden bis z. südl. Littoral, fehlt in d. Schweiz; Rheing. an d. Salinen in d. Pfalz bei Dürkheim, Maxdorf bis Frankenthal Flora v. Trier, Emmerweiler bei Saarbrücken, Wetterau, an d. Salinen bei Godes, Nauheim u., Destr. Ungarn, Galizien, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig u. 6—7. 4

2. *T. palustre* L. K. syn. Feuchte Wiesen, Tristen auf Lehm u. Kalkboden, besonders an Flußufern, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten. 6—7. 4

3. *T. Barrelieri* Loisl. Rchb. icon. t. 51. b. Im südlichsten Littoral, Dalmatien auf d. Insel Crappano bei Sebenico. 5. 4

Hundertundzwanzigste Ordnung.

Potameen.

Juss. K. syn. 774. K. Taschb. 478. Potamogetoneae
Rchb. exc. p. 6. et icon. 1. Band.

730. *Potamogeton* L. (IV. 3.) Laichkraut. K.
syn. Rchb. exc. p. 7. icon. t. 18—50. Comp. I. 1. p. 263.

1. *P. natans* L. K. syn. Rchb. icon. t. 50. Var. α .
vulgaris M. et K. — β . *prolixus*: *P. serotinus* Schrad.
P. natans-lacustris Fries. Stehende u. stillfließende Wasser,
Teichen, Gräben, Bäche, Flüssen, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *P. oblongus* Vivian. K. syn. Rchb. exc. *P. poly-*
gonifolius Pourr. Rchb. icon. t. 44. *P. natans* γ . *minor*.
M. et K. *P. parnassifolius* Schrad. *P. natans* ϵ . *interme-*
dius M. et K. Sümpfe, Gräben, sumpfige Wiesen, Heiden
in Torfgegenden, stellw. im Geb. Schweiz; Rheing. Pfalz
bei Kaiserslautern, Landstuhl, Bitsch, Stürzelbrunn; Flora v.
Trier Saarbrücken bei Homburg, Limbach; Nassau, Hamburg;
Sachsen an d. Elbe; Dalmatien, Lombardei 12. 7—8. 4

3. *P. fluitans* Roth. K. syn. Rchb. icon. t. 49. *P.*
oblongus Meyer Chlor. han. *P. natans* γ . *angustatus* M.
et K. Var. β . *stagnalis* K. syn. *P. natans* β . *explanatus*
M. et K. *P. sparganifolius* Laestad. — γ . *spatulatus*
Schultz Fl. d. Pfalz. *P. fluitans* β . *Billotii* Schultz. In
Flüssen, Bächen, stellw. dch. d. Geb., mehr im nördl.,
Rheing., auf d. Rheinfläche in Baden Carland bei Karls-
ruhe, Germersheim, Elsaß in Bächen von Lauterburg, Wei-
senburg bis Bitsch häufig, Nassau, Coblenz in d. Lahn,
Aachen, Bäche d. hohen Venn, Luxemburg; Bremen in d.
Trave, bei Idseßloh in d. Wille u. Eiber, Mark Brandens-
burg, Sachsen bei Goltzow; Schweiz, Tyrol, Dalmatien, Sie-
benbürgen, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

4. *P. Kochii* F. W. Schultz. Fl. d. Pfalz. p. 426.
P. spatulatus Schrad. Rchb. exc. et icon. t. 47. In et:

was versumpften Bächen, besonders in Gebirgsgegenden, stellw. im Geb., Rheing., Pfalz im Vogesensandstein bei Kaiserslautern, Zweibrücken, Speier, Limbach bei Saarbrücken Flora v. Trier, Hannover bei Uelzen; Schweiz in Gebirgsümpfen; dann im Lauenburgschen. 7—8. 4

5. *P. rufescens* Schrader. K. syn. Rchb. icon. *P. semipellucidum* K. et Ziz. *P. obscurum* DC. *P. serratum* Roth. *P. fluitans* Smith. Hocker. *P. annulatum* Bellard. *P. alpinum* Balb. *P. purpurascens* Seidel. Presl. *P. nerviger* Wolff, *P. obtusus* Ducros ap. Gaud. helv. Stehende Wasser, Seen, Teiche, Gräben, stillfließende Bäche, besonders in Torfgegenden d. Geb., stellw. dch. d. Geb., Schweiz im Jura; Rheing., Pfalz bei Speier, Mainz, Kaiserslautern, Zweibrücken, Saarbrücken bei Kirfel u. Limbach, Luxemburg an d. Durt, in d. Eifel, Coblenz im Roder-Maar bei Andernach, Niederbiber bei Neuwied, Nassau, Hamburg an d. Bille u. Alster, Preußen bei Königsberg, Elbsitz, Danzig, Schlesien; Destr. Böhmen, Tyrol, Croatien, Venedig. 6—7. 4

6. *P. Hornemanni* Meyer. K. syn. *P. plantagineus* Ducros Rchb. exc. et icon. t. 44. *P. coloratus* Hornem. Stehende u. stillfließende Wasser, Gräben, Bäche, stellw. dch. d. Geb., Rheing. bei Waghäusel, Mainz bei Mombach, Bodenheim, Westphalen, Lauenburg, Ostfriesland; Sachsen bei Dresden; Böhmen; Schweiz bei Bern, Cant. Waadt bei Nyon u. bei Genf. 7—8. 4

7. *P. gramineus* L. Fries. K. syn. *P. heterophyllus* Schreb. Host. M. et K. Var. α . *graminifolius* *P. gramineus* L. Rchb. exc. et icon. t. 41. *P. heterophyllus* γ . *longatus* M. et K. — β . *heterophyllus*: *P. heterophyllus* Koch. Rchb. icon. t. 41. et 42. *P. hybridum* Thuill. *P. angustatum* Balb. *P. distachyum* Bellard. *P. crassipes* Kit. — γ . *paucifolius* M. et K. *P. paucifolius* Opitz. — δ . *Zizii*: *P. Zizii* Koch. Rchb. icon. t. 38 et 39. *P. heterophyllus* δ . *latifolius* M. et K. *P. luteus* β . *minor* Nolte. *P. luteus* β . *heterophyllus* Fries. Stehende u. stillfließende Wasser, stellw. dch. d. g. Geb.,

Rheing., Baden von Constanz nach Basel, Rastatt, Knielingen, Mannheim, Pfalz bei Frankenthal, Worms, Oppenheim, Mainz, Bingen, Nassau bis z. Niederrheine, Luxemburg, Westphalen, Hamburg, Hannover, stellw. nach Preußen bei Elbgen, Schlesien; Destr. Böhmen, Tyrol bis in d. Lombardei; Schweiz zc. 7—8. 4

8. *P. nitens* Weber K. syn. *P. gramineus* Wahlenb. *P. nitens* α . *salicifolius* Fries. Var. β . *heterophyllus* Fries. *P. curvifolius* Hartm. *P. heterophyllus lacustris* Chamisso. In Teichen u. in Bächen im nördl. Deutschland, z. B. bei Hamburg, Sachsen bei Pirna, Wittenberg, Berlin, Preußen im Mauersee bei Elbgen zc. 7—8. 4

9. *P. lucens* L. K. syn. Rchb. icon. t. 36. *P. serratum* Weber. Var. α . *ovalifolius* M. et K. — β . *lanceifolius* M. et K. — γ . *coriaceus* Nolte. Rchb. icon. t. 37. — δ . *acuminatus*: *P. acuminatus* Schum. Rchb. *P. cornutus* Presl. *P. caudatus* Seidel. *P. lucens* α . *corniculatus* Meyer. Chlor. hannov. Stehende u. langsamfließende Wasser, stellw. dch. d. g. Geb. 6—8. 4

10. *P. decipiens* Nolte. K. syn. In Flüssen im nördl. Deutschland, Hamburg in d. Bille u. Elbe, Hannover bei Verden, in Lauenburg u. Holstein. 7—8. 4

11. *P. praelongus* Wulfen. K. syn. Rchb. icon. t. 33. *P. lucens* Weber. *P. flexuosum* Schleich. Wredow. *P. flexicaulis* Dethard. *P. acuminatum* Wahlenb. *P. serratum* Scopol. Stehende u. fließende Wasser, stellw. dch. d. Geb., besonders im nördl. Rheing., Luxemburg bei Grandvoir; Hamburg bei Wandsbeck, Holstein nach Lüneburg, dch. d. g. nördl. Deutschland nach Hannover, Pommern, Preußen bei Königsberg, an d. Meisse, Spree u. Havel, Berlin im Tegelersee, Schlesien; Sachsen bei Schönsfeld; Böhmen, Destr. bei Wien, Krain am Laibachflusse, in d. Alpenseen d. Schweiz u. in Holland bei Utrecht. 7—8. 4

12. *P. longifolius* Gay. Rchb. icon. t. 40. f. 70. *P. macrophyllus* Wolfg. Wilna in d. Wilia u. Wiha. 7. 4

13. *P. perfoliatus* L. K. syn. Rchb. icon. *P. Loe-*

selii R. et Schl. Var. β . ovatus — γ . ovato-lanceolatus Rchb. icon. t. 29. Stehende u. fließende Wasser dch. d. g. Geb. 7—8. 4

14. *P. crispus* L. K. syn. Rchb. icon. Var. β . gum-mifer Rchb. icon. t. 30. — γ . serrulatus Rchb. icon. t. 30. *P. serrulatus* Schrader. Stehende u. fließende Wasser dch. d. g. Geb. 7—8. 4.

15. *P. zosteraefolius* Schum. Rchb. icon. t. 27. *P. compressus* At. et K. syn. *P. complanatum* Willd. *P. laticaulis* Wahlenb. Stehende u. stillfließende Wasser, Landseen, Teichen, Gräben, Bäche, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Basel, Würtemberg bei Tuttlingen, Baden, Elsaß bei Straßburg bis Mainz, Nassau, Kreuznach, Trier, Eifel, Luxemburg, Aachen, Bonn, Neuß u., Baiern, Sachsen, Schlesien; Destr. Böhmen, Steyermark, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

16. *P. compressus* L. Rchb. icon. t. 24. f. 42. *P. mucronatus* et *P. cuspidatus* Schrader. In Landseen in Holstein; Schweiz im Züricher-See; in Teichen, Wassergräben, Bächen, in Böhmen bei Lissa u. Riemes; weitere Standorte dürften, nach Reichenbach, noch zweifelhaft sein. 7—8. 4

17. *P. rutilus* Wolfgang. Rchb. icon. t. 23. f. 40 et 41. *P. caespitosus* Nolte. Landseen in Mecklenburg, bei Hamburg u. in Holstein, Berlin. 7—8. 4

18. *P. acutifolius* L. K. syn. Rchb. icon t. 23. *P. compressus* DC. Stehende u. stillfließende Wasser, stellw. dch. d. g. Geb., besonders im nördl., Rheing. auf d. Rhein-fläche bei Mannheim, besonders im Ultrheine, bei Straßburg, Speier, Oppenheim; Nassau im Braunfeller Weiher, Trier bei Probdorf, Luxemburg bei Vance, Aachen, Grefeld, Hamburg in d. Bille u. Alster, Holstein, Mecklenburg, Preußen, Königsberg, Tilsit, Danzig, Berlin, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren, Ungarn u. 6—8. 4

19. *P. obtusifolius* M. et K. K. syn. Rchb. icon. t. 25. *P. compressum* Willd. Roth. *P. gramineum* Smith. Gaud. Host. Var. α . angustifolius. — γ . latifolius. In Flüssen, Bächen, Teichen, Gräben, stellw. dch. d. g. Geb.,

Rheing., mit voriger bei Straßburg, Speier, Oggersheim, Friesenheim, Frankfurt a. M., Grefeld, Aachen, Luxemburg, Westphalen, Bentheim, Epe etc., Schwaben, Baiern, Thüringen, Sachsen, Hannover, Berlin, Preußen bei Tilsit; Destr. Mähren. 6—8. 4

20. *P. Reichenbachii* * *P. pusillus* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 22. f. 38. *P. pusillus* b. vulgaris Fries. Stehende u. langsam fließende Wasser stellw. dch. d. g. Geb. gemein. 7—8. 4

21. *P. tenuissimus* Rchb. icon. t. 22. f. 39. *P. gracilis* Fries. *P. pusillus* β . *tenuissimus* M. et K. et K. syn. *P. pusillus* Thuill. Mit der Vorigen nur etwas fetter. 7—8. 4

22. *P. Berchtoldi* Fieber. Rchb. icon. t. 22. f. 37. *P. pusillus* Fl. Dan. *P. pusillus* α . major K. syn. Fries. *P. pusillus* B. Chamisso. Stehende u. stillfließende Wasser, stellw. im Geb., Rheing., Godesberg bei Bonn, Sachsen bei Leipzig, Dresden, Preußen, Berlin; Destr. Böhmen, Krain. 7—8. 4

23. *P. condylocarpus* Tausch. bot. Zeit. Fieber. Rchb. icon. t. 22. f. 36. Bäche u. Wassergräben in Böhmen bei Königsall. 7. 4

24. *P. trichoides* Chamisso et Schlecht. K. syn. Fieber. Rchb. icon. t. 21. f. 34. Var. β . *tuberculosis*: *P. trichoides* β . *tuberculosis* Rchb. icon. In Fischteichen, Bächen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Oberbaden v. Bregenz bis Constanz, Belgien, Baiern Nürnberg; Hamburg bei Trittau, Brandenburg, Wittenberg, Berlin, Bremen, Schlesien, Frankfurt a. d. Oder; Böhmen, Ungarn, Lombardien; Var. β . in Böhmen bei Prag. 7—8. 4

25. *P. pectinatus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 19. Var. α . *scoparius* Wallr. — β . *protensus* Wallr. — γ . *dichotomus* Wallr. *P. Vaillantii* R. et Sch. Stehende u. fließende Wasser, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

26. *P. marinus* Allion. Fries K. syn. Rchb. icon. t. 18. *P. setaceum* Schumacher. *P. filiformis* Pers. *P.*

fasciculatus Wolsf. An d. südl. u. nördl. Seestrande u. in Landseen in Holstein, Schleswig, Preußen in d. Ostsee bei Danzig, Südtirol in einem Alpenteiche zw. Badia u. Gardona, Galizien, Siebenbürgen, Lombardei u. Venedig. 7—8. 4

27. *P. densus* L. K. syn. Rchb. icon. Var. β . *lanceifolius* K. syn. *P. densus* α . *rigidus* Fieber. *P. oppositifolius* DC. *P. serratum* L. — γ . *angustifolius* K. syn. *P. oppositifolius* β . *lanceifolius* M. et K. *P. setaceum* L. *P. pauciflorus* Lamk. Stehende u. fließende Wasser, stchw. dch. d. Geb., Rheing. dch. d. g. Rheinthal von Basel dch. Baden, Elsaß bis Frankfurt u. Mainz, Nassau, Coblenz nach d. Niederrheine u. Westphalen, Hannover, Oldenburg, Holstein, Bremen, Thüringen, Schwaben, Mosel bei Trarbach, Luxemburg u.; Oestr. Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen u. Lombardei. 6—7. 4

731. *Ruppia* L. (IV. 4.) Ruppie. K. syn. 781.

Rchb. exc. p. 6. Comp. I. 1. p. 270.

1. *R. maritima* L. K. syn. Rchb. icon. t. 17. In d. Ost- u. Nordsee u. im Adriatischen Meere, in d. Denkhäuser Sumpfe bei Göttingen, an d. Salinen in Hannover u. in d. Lombardei bei Venedig. 8. 4

2. *R. rostellata* Koch. K. syn. Rchb. icon. t. 17. *R. maritima* β . M. et K. *R. obliqua* Meyer Mspt. In Gräben an d. Ostsee u. an d. Salinen bei Artern. 8—10. 4

732. *Zannichellia* L. (XXI. 1.) Zannichellie.

K. syn. 782. Rchb. exc. p. 6. Comp. II. p. 583.

1. *Z. palustris* L. K. syn. Rchb. icon. t. 16. f. 20 — 24. *Z. major* et *Z. repens* Boenningh. Rchb. exc. et icon. Stehende u. stillfließende Wasser, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. häufig. 7—9. 4

2. *Z. pedicellata* Wahlenb. Fries. K. syn. *Z. pedunculata* Rchb. exc. et icon. *Z. gibberosa* Rchb. exc. et icon. In süßem u. salzigem Wasser, in d. Ost- u. Nordsee u. im südl. Littoral, an Salinen u. in Wassergräben, stchw. im Geb., Rheing. Flora v. Trier, Roßbrück bei Saarbrücken

in d. Gifel im Pulvermaar, Hamburg an d. Elbe bei Blankenese; Destr. Ungarn, Croatien. 7—9. 4.

3. *Z. polycarpa* Nolte. K. syn. An d. Nord- u. Ostsee in offener See, an d. Küste v. Holstein u. Schleswig bei Heiligenhafen. 7—9. 4

Hunderteinundzwanzigste Ordnung. Najadeen.

Link. K. syn. 782. K. Taschb. 484. Rchb. exc. p. 6 et p. 150.

733. *Najas* L. (XXI. 1.) Najade. K. syn. Rchb. exc. p. 150. Comp. II. p. 584.

1. *N. major* Roth. K. syn. *N. marina* α. L. Rchb. exc. *N. fluvialis* Lamk. *N. monospermum* et *N. tetraspermum* Willd. *N. muricata* Thuill. Ittnera *Najas* Gmel. Stehende Wasser u. stillfließende, feichte Stellen d. Flüsse, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Baden bei Knielingen, Mannheim, Pfalz Griesenheim, Frankenthal, Worms, dann häufig in d. Mosel oberhalb Trier, bei Berncastel u. bei Trarbach, stellw. bis Coblenz, Baiern, Degen Dorf bei Erlangen, Hamburg, Berlin; Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Venedig. 7—9. 4!

2. *N. minor* Allion. Schkr. K. syn. Rchb. exc. *N. fragilis* Rostk. et Schm. *Caulinia* — Willd. Ittnera *minor* Gmel. Stehende Wasser, in Gräben, Teichen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. in Baden, Neckarauer Wald bei Mannheim, Elsaß, Pfalz bei Frankenthal, Griesheim, Worms, Rorheim, Berlin; Destr. Steyermark, Tyrol, Kärnthén, Croatien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 8—9. ☉

3. *N. microphylla* Balb. et Nocca. Rchb. exc. in add. p. 843. In Gräben d. Reissfelder in d. Lombardei bei Pavia. 7—8. ☉

4. *N. alaguensis* Pollini Rchb. exc. *Caulinia* inter-

media Balb. et Nocca. In Gräben d. Reissfelder im südlichsten Geb., Lombardei bei Mailand u. Pavia. 6.—7. ☉

5. *N. flexilis* Rostk. et Schm. *Caulinia* — Willd. Stehende Wasser in Pommern bei Stettin im Sande d. Binowachen-Sees häufig, bei Danzig. 8—9. 4

734. *Zostera* L. (I. 1.) Wasserriemen. K. syn. 783.

Rchb. exc. p. 6. Comp. I. 1. p. 2.

1. *Z. marina* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 4. f. 4. Im Sande auf d. Meeresgrunde u. in Gräben an d. Seeküste, d. Nord- u. Ostsee, in Preußen von Danzig bis Memel u. im Adriatischen Meere. 8. 4

2. *Z. angustifolia* Rchb. icon. t. 3. f. 3. *Z. marina* β. *angustifolia* Fl. Dan. In d. Nord- u. Ostsee u. im südl. Littoral; sie bildet, nach Reichenbach, förmliche Wiesen auf d. Grunde des Meeres, wird trocken zum Polstern gebraucht u. ist wohl am weitesten verbreitet. 8. 4

3. *Z. nana* Roth. K. syn. *Z. minor* Nolte Rchb. exc. et icon. t. 2. f. 2. *Z. Noltei* Hornem. *Z. uninervis* Rchb. non Wahlenb. In d. Ost- u. Nordsee den Inseln um Norberney, Röm, Amron, Göhr u. im südl. Littoral in Dalmatien u. um Venedig. 7—8. 4

735. *Posidonia* Koenig. (I. 1.) Posidonie. Rchb.

exc. in add. p. 137. Comp. I. 1. p. 2.

1. *P. Caulini* Koenig. Rchb. exc. et icon. t. 5. f. 5. *Zostera oceanica* L. *Caulinia* — DC. In d. Tiefe d. Adriatischen Meeres in Dalmatien, in d. Nordsee am Zuidersee u. Wieringen in Holland. 3. 4

Hundertzweiundzwanzigste Ordnung. Lemnaceen.

Link. K. syn. 783. K. Taschb. 484. Rchb. exc. Aroideae pars p. 10.

736. *Lemma* L. (II. 1.) Wasserlinse. K. syn. Rchb. exc. et icon. Comp. I. 1. p. 10.

1. *L. trisulca* L. K. syn. Rch. icon. t. 19. f. 19. In stehendem Wasser untergetaucht, dch. d. g. Geb. 4—5. ☉

2. *L. orbicularis* Kit. Rchb. exc. in add. p. 138 et icon. t. 15. f. 18. Stehende Wasser in Ungarn im Borser Comit. ☉

3. *L. polyrrhiza* L. K. syn. Rchb. icon. t. 15. *Spirodela* — Schleid. Stehende Wasser, schwimmend, dch. d. g. Geb. 5. ☉

4. *L. minor* L. K. syn. Rchb. icon. t. 14. Stehende Wasser, schwimmend, dch. d. g. Geb. 4—6. ☉

5. *L. gibba* L. K. syn. Rchb. icon. t. 14. *Telmatophace gibba* Schleiden in d. *Linnaea*. Stehende Wasser, schwimmend, dch. d. g. Geb. 4—6. 4

6. *L. arrhiza* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 14. Stehende Wasser, Breslau, in d. Schweiz im Ragensee, Belgien in d. Flora v. Spa u. in Südholland bei Gonda. 5—9. ☉

Hundertdreiundzwanzigste Ordnung. Typhaceen.

Juss. K. syn. 785. K. Taschb. 484. Rchb. exc. p. 11.

737. *Typha* L. (XXI. 2.) Rohrkolbe. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 319—323. f. 742—749. Comp. II. p. 594.

1. *T. angustifolia* L. K. syn. *T. elatior* Boenningh. Rchb. exc. et icon. *T. gracilis* Schkr. Rchb. icon. *T. media* DC. Teiche, Gräben, Flüsse, Bäche, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. d. Schweiz dch. Baden, Elsaß, Mannheim, Straßburg, Frankenthal, Nassau stchw. bis nach d. Niederrheine, auch in d. Mosel, Saar u., nördl. bis Preußen u. südl. bis Destr. u. in d. Lombard. 7—8. 4

2. *T. latifolia* L. K. syn. Rchb. icon. *T. major* Curt. In stehendem u. fließendem Wasser, Teichen, Gräben, Flüssen, stchw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

3. *T. Schuttleworthii* Koch et Sond. K. syn. Rchb. icon. Schweiz am Ufer d. Aar bei Aarau u. b. Belp im Cant. Bern. 7—8. 4

4. *T. minima* Hoppe, Funk. K. syn. Rchb. icon. *T. elliptica* Gmel. *T. minor* Smith. *T. angustifolia* β . L. *T. nana* Ave Lall. ap. Rchb. icon. Nasse, steinige Orte an Bergströmen d. Alpen u. Boralpen, stchw. im Geb., Rheing., Oberbaden vom Bodensee den Rhein hinab bis Fort-Louis im Elsaß, Schweiz bei Bern, Genf; Destr. Salzburg, Tyrol, Croatien, Ungarn, Lombardie, Venedig.

738. *Sparganium* L. (XXI. 2.) Igelfnöspe K. syn. 786. Rchb. exc. p. 12. icon. t. 324—326. f. 749—751.

1. *S. ramosum* Huds. K. syn. Rchb. icon. *S. erectum* α . Lin. An Landseen, Teichen, Ufern, in Gräben, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *S. simplex* Hudson. K. syn. Rchb. icon. *S. erectum* β . L. *S. natans* Pollich. In stehendem Wasser, in Gräben, Bächen, Sümpfen, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. nicht selten. 7—8. 4

3. *S. affine* Schnitzlein bot. Zeit. 1845. p. 670. *S. simplex* var. *natans* auct. rhean. *S. natans* α . Lin.? Stehende Wasser, in Teichen, Seen, Gräben, besonders in Moorboden, stchw. im Geb., Rheing., in d. höheren Seen d. Bogen, Oberbaden im Feldsee, Darensee am Königsstuhl; Pfalz bei Kaiserslautern, Zweibrücken; Flora v. Trier bei Saarbrücken, Luxemburg, Köln bei Schlebusch u., Sachsen im Mansfeldschen. 7—9. 4

4. *S. natans* L. K. syn. Rchb. icon. *S. minimum* Fries. Sumpfige, nasse Stellen, Seen, Teichen, Gräben, besonders in Torfmooren, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., von Schaffhausen bis Basel nach Baden im Breisg. auf d. rauhen Alp u. auf d. faulen Waag, Mannheim bei Sanddorf, Darmstadt, Elsaß bei Straßburg, Pfalz bei Mardorf, Mainz, Kaiserslautern, Homburg, Neuhäusel bei Saarbrücken, Flora v. Trier, Eifel im Pulvermaar u., Luxemburg, Rheinbreit-

bach, Bonn, Remagen, Köln, Grefeld nach Westphalen, Hamburg, Hannover, Holstein, Oldenburg, Berlin nach Preußen bei Königsberg, Elbing u., Sachsen, Franken, Schwaben, Baiern; Destr. in allen Provinzen bis in d. Lombardei. 7—8. 4

Hundertvierundzwanzigste Ordnung. Aroideen.

Juss. K. syn. 786. K. Taschb. 785. Rchb. exc. p. 10.

739. *Arum* L. (XXI. 1.) Aron. K. syn. Rchb. exc. Comp. II. p. 581.

1. *A. Dracunculus* L. Rchb. exc. *Dracunculus polyphyllus* C. Bauhin. Rchb. icon. t. 12. Schattige, cultivirte Orte, in Weingärten, im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien bei Ragusa, Croatien, Piemont u. 6—7. 4

2. *A. maculatum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 8. *A. vulgare* Lamk. Etwas feuchte Laubwälder d. Ebenen u. Gebirge dch. d. g. Geb. 5. 4

3. *A. italicum* Miller. K. syn. Rchb. icon. t. 11. In Hainen, Laubwäldern, Weingärten, im südl. Littoral, Krain, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 4—5. 4

4. *A. longispathum* Rchb. icon. p. 5. t. 10. *A. pictum* L. fil. *A. corsicum* Loisl. Gebüsch in Dalmatien bei Ragusa. 5—6. 4

5. *A. orientale* M. v. Bieb. Visian. Fl. Dalmat. Rchb. icon. t. 9. *A. pictum* Petter. Waldgebüsch, im südl. Geb., Dalmatien bei Cattaro, Bergato bei Ragusa u. 5. 4

6. *A. Arisarum* L. K. syn. *Arisarum vulgare* Tragus Rchb. exc. et icon. t. 7. Gebüsch, Wein- u. Oliven-gärten, am südl. Littoral u. auf d. Inseln, Istrien, Dalmatien, Croatien, Piemont, Ligurien, Genua, Nizza. 3. 4

7. *A. alpinum* Schott et Kotschy. Bot. Zeit. 1851. p. 285. Auf d. südl. Alpen v. Siebenbürgen mit *Pinus Panilio*. 4—5. 4

740. Biarum Schott. (XXI. 1.) Burmaron. Rehb. icon. Spitzkeimer I. B. p. 6. t. 6.

1. *B. tenuifolium* Rehb. icon. Arum — L. Rehb. exc. Steinige, waldige Hügel im südl. Geb., Dalmatien bei Sebenico u. a. d. Insel Curzola. 4. 4

741. Calla L. (XXI. 1.) Drachenwurz. K. syn. 787. Rehb. exc. p. 10. Comp. II. p. 582.

1. *C. palustris* L. K. syn. Rehb. icon. In Sümpfen, besonders auf Moorboden, stellw. dch. d. Geb., aber nicht in d. Schweiz; Baiern, Schwaben, Sachsen, Thüringen, Rheing., Rheinpfalz bei Kaiserslautern, Zweibrücken Bitsch, Nassau, Neuwied, Siegburg bei Bonn, Mühlheim bei Geln, Düsseldorf, Grefeld, Flora v. Trier, bei Randerath, Saarbrücken, Saarlouis; bei Hanau, Westphalen, Hamburg, Hannover, Oldenburg, Bremen, Holstein nach Preußen bei Königsberg 2c.; Oestr. bis in d. Lombardei. 6—7. 4

742. Acorus L. (VI. 1.) Kalmus. K. syn. 787. Rehb. exc. p. 11. Comp. I. 1. p. 623.

1. *A. Calamus* L. K. syn. Rehb. exc. Stehende u. stillfließende Wasser, in Teichen, Seen, Flußrändern 2c., stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

Hundertfünfundzwanzigste Ordnung. Orchideen.

Juss. K. syn. 788. K. Taschb. 486. Rehb. exc. p. 118. Gynandria — Monandria Class. XXI. Ord. 1. Lin.

I. Gruppe. Ophrydineen Koch. K. Taschb.

743. Orchis L. Knabenkraut. K. syn. Rehb. exc. Comp. II. p. 516.

1. *O. fusca* Jacq. K. syn. Rehb. exc. *O. militaris*

β. L. *O. militaris* Scopol. *O. purpurea* Huds. *O. hybrida* Boeningh. Var. β. *O. moravica* Jacq. Rchb. exc. Richte Gebirgswälder, bewachsene Bergheiden, besonders auf Kalkboden, stellw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., Rheing., nicht selten am g. Rheine, am Neckar, Main, Nahe, Mosel, Saar u., besonders häufig bei Trier, Baiern, Schwaben, Thüringen, Sachsen bei Dresden, bis z. Harze u. 4—5. 4

2. *O. longibracteata* Bivona Rchb. exc. *O. Robertiana* Loisl. *O. fragrans* Tenor. Bewalbete Hügel im südlichsten Eittoral, Dalmatien, Piemont um Nizza. 4. 4

3. *O. militaris* L. K. syn. Rchb. exc. *O. cinerea* Sutter. *O. Rivini* Gouan. Var. β. *O. galeata* Lamk. Rchb. exc. *O. mimusops* Thuill. *O. simia* b. Loisl. *O. signifera* Vest. Waldwiesen, Gebüsche, mit kurzem Gesträuche bewachsene Heiden, besonders auf Kalk- u. Mergelboden, stellw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., Rheing., mit voriger auch bei Trier u. Luxemburg u. 5—6. 4

4. *O. spuria* A. Rchb. Bot. Zeit. 1849 p. 891. Hügel, Schweiz bei Ber, Lausanne, Oberbaden b. Müllheim. 4—5. 4

5. *O. simia* Lamk. K. syn. *O. tephrosanthos* Vill. delph. Rchb. exc. *O. militaris* s. Lin. *O. Zoophora* Thuill. *O. italica* Poir. Sonnige, waldbige Kalkhügel, stellw. im Geb., besonders im g. südl., Rheing., im Elsaß bei Dorlishheim, Siegolshheim, Jägersheim; Baden im Breisg. auf d. Kaiserstuhl; Schweiz bei Basel, Schaffhausen, Bern, Nyon, Genf an d. Salève; Tyrol, Eittoral, Istrien bei Veruba, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Piemont u. Oberitalien. 5. 4

6. *O. variegata* Allion. pedm. K. syn. Rchb. exc. *O. simia* Vill. delph. *O. tridentata* Scopol. Gebirgswiesen, Triften, stellw. dch. d. Geb., Rheing. v. Basel nach Oberbaden, Luxemburg bei Höhlenfels, Schwaben, Franken, Thüringen, Jena, Halle, Hannover, Pommern bei Stettin, Schlesien bei Ustron; Schweiz bei Schaffhausen u. Genf; Destr. in allen Provinzen, Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Eittoral, Ungarn u. 5. 4

7. *O. ustulata* L. K. syn. Rchb. exc. *O. Colum-*

nae Schm. Trockene Wiesen, Triften, besonders auf Lehm u. Kalk, stellw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., Rheing. zerstr. v. Basel dch. Baden bis Mannheim, Nassau, Pfalz v. Dürkheim bis Zweibrücken, Saarbrücken, Trier, Luxemburg; Frankfurt, Nahe bei Kreuznach bis Meisenheim, Coblenz im Lahnthale, Einz am Rheine, Thüringen nördl. bis Pommern, Harz, Sachsen 2c.; Schweiz; Destr. bis in d. südl. Littoral. 5. 4

8. *O. coriophora* L. K. syn. Rechb. exc. Etwas feuchte Wiesen, Triften, besonders in Gebirgen auf Kalk- u. Lehmboden, auch auf Sand, im g. südl. u. dch. d. mittlere Geb., Rheing., v. Basel dch. Baden, Breisgau, Pforzheim, Rastatt, Karlsruhe bis Heidelberg, Frankfurt a. M., Nassau, Elsaß, Pfalz, Dürkheim, Worms, Kreuznach bis Oberstein, Saarbrücken, Coblenz im Lahnthale zw. Ems u. Lahnstein, Trier, Aachen, Sachsen, Thüringen, Jena 2c., nördl. nach Preußen bei Thorn; Destr. in allen Provinzen. 5. 4

9. *O. fragrans* Pollin. Rechb. exc. *O. Polliniana* Spreng. *O. cariophora* β . Visiani Fl. Dalm. Sonnige Gebirgstriften, Wiesen im südl. Littoral, Südtirol, Istrien, Dalmatien, Piemont, Nizza 2c. 5. 4

10. *O. globosa* L. K. syn. *Nigritella globosa* Rechb. exc. p. 121. *O. Halleri* Crntz. Triften d. Alpen u. Vor-alpen, u. hohe Gebirgswiesen; Rheing., Oberbaden, Schwarzwald, Vogesen, Breisg. a. d. Kaiserstuhl; Schweiz u. dch. d. Alpenkette, besonders im g. Jura, nach Baiern, Sachsen, Erzgebirge im Delsengrunde 2c., Schlesien, Frankfurt a. d. Oder, Riesengebirge; Böhmen, Mähren, Tyrol, Salzburg, Destr. bis in d. südl. Littoral u. in Piemont. 5—6. 4

11. *O. Morio* L. K. syn. Rechb. exc. Richte Wald-wiesen, Wiesen, Triften, Haiden 2c., dch. d. g. Geb. 3—6. 4

12. *O. Spitzelii* Sauter. K. syn. Alpentriften, Wiesen in Tyrol, Weissbachalpe bei Saalfelden, Südtirol, in d. Voralpen, Val di Ledro. 6. 4

13. *O. pallens* L. K. syn. Rechb. exc. Waldige Gebirgsstellen, buschige Hügel, besonders auf Kalk, nur dch. d.

südl. u. mittlere Geb., Rheing., Schaffhausen, Rheineck, im schwäbischen Jura, Baden zw. Maischdorf u. Heidelberg, Luxemburg bei Fischbach; Thüringen bei Jena, Halle, Sachsen bei Dresden, Lausitz, Schlesien bei Ustron; Destr. Steyermark, Kärnthen, Tyrol, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig. 5—6. 4

14. *O. provincialis* Balb. Rchb. exc. *O. Morio* β. Visian. Sonnige Hügel im südl. Littoral, Istrien Beglia, um Pola, Dalmatien bei Zara, Clissa; Lombardien, Piemont, Ligurien. 4. 4

15. *O. mascula* L. K. syn. Rchb. exc. Var. β. *O. speciosa* Host. austr. — γ. *O. brevicornu* Viviani Fl. ital. Rchb. exc. Lichte Berge u. Waldwiesen, Triften dch. d. g. Geb. Var. γ. Piemont um Genua. 4—6. 4

16. *O. Hostii* Trattinik. Rchb. exc. *O. Brancifortii* Bivona Rchb. exc. *O. quadridentata* Tenore. Gebirgsstellen im südl. Littoral, Istrien auf Lesina u. Beglia, Croatien, Dalmatien bei Stretto u. Sutorna. 4—5. 4

17. *O. saccata* Tenore. Rchb. exc. *O. sparsiflora* v. Sprunner. Im südl. Littoral, Istrien bei Triest. 5. 4

18. *O. patens* Desfont. Fl. Atl. Visiani Fl. Dalmat. Maly enum. pl austr. p. 64. Schattige Orte im südl. Littoral, Dalmatien um Lesina. 5. 4

19. *O. laxiflora* Lamk. K. syn. Rchb. exc. Var. α. *O. Tabernamontani* Gmel. — β. *O. palustris* Jacq. *O. ensifolia* Vill. Sumpfige Moorniesen, stellw. im g. südl. u. mittleren Geb. bis in d. Gebirge, seltener im nördl.; Rheing., Schwaben, Bodensee, Schaffhausen, Basel nach Elsaß, Colmar, Straßburg, Baden bei Waghäusel, Pfalz bei Speier, Dürkheim bis Mainz, Bingen, Luxemburg Flora v. Trier, Franken, Jena, Halle, Sachsen bei Leipzig, Schlesien; Destr. in allen Provinzen. 5—6. 4

20. *O. elegans* Heuffel. Fl. 1835. Comp. II. p. 525. Sumpfige, schlammige Gebirgswiesen im Banat. 5—6. 4

21. *O. sambucina* L. K. syn. Rchb. exc. *O. latifolia* Scopol. Var. β. *O. incarnata* Willd. Gebirgswiesen,

Borallen im g. südl. u. im mittl. Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, Baiern, Schwaben, Sachsen, Lausitz bis zum Harze; Rheing., Elsaß bei Burweiler, Pfalz, Neustadt an d. Hardt, Donnersberg, Bitsch, an d. Nahe bei Kreuznach auf d. Rothfels, Rheingrafenstein, d. Gans, bei Oberhausen, Sobernheim, am Lemberg; Nassau, Luxemburg bei Diekirch; Westphalen bei Lengerich u. Hülshof, Halle an d. Saale, Jena, Queblinburg im Steinholze, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol zc. 5—6. 4

22. *O. romana* Seb. et Maur. Rchb. exc. *O. bracteata* et *O. pseudo-sambucina* Tenore. Im südl. Geb., Piemont, Genua. 5. 4

23. *O. papilionacea* L. K. syn. Rchb. exc. *O. rubra* Jacq. Rchb. exc. *O. expansa* Tenore. Gebirgswiesen im südl. Geb., Ungarn, Krain, Eittoral, Istrien bei Pola, Dalmatien bei Zara; Lombardien, Venedig. 3. 4

24. *O. saccifera* Brogn. Visian. Fl. Dalm. I. p. 172. Maly enum. pl. austr. p. 64. Felsige, steinige Orte in Dalmatien um Cattaro. 5. 4

25. *O. maculata* L. K. syn. Rchb. exc. Waldbiesen, Feuchte, schattige Triften, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

26. *O. latifolia* L. K. syn. *O. majalis* Rchb. exc. Var. β . *latifolia* Sturm. Fries. *O. comosa* Scopoli. — γ . *O. longibracteata* Schm. Feuchte Wiesen, Triften, in Wäldern, stellw. dch. d. g. Geb. 5—6. 4

27. *O. incarnata* L. K. syn. *O. angustifolia* Wimm. et Grabowsk. *O. latifolia* Rchb. exc. *O. haematodes* Rchb. exc. Sumpfige Moorbiesen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. bei Basel, Baden bei Waghäusel, am Main u. Neckar, Pfalz v. Kaiserslautern bis Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Aachen, Coblenz, oberhalb Horchheim im Lahnthale, Bonn nach Westphalen, dch. d. nördl. Deutschland nach Preußen bis Königsberg, Memel; Destr. Tyrol, Eittoral, Dalmatien, Venedig, Galizien zc. 6. 4

28. *O. tetragona* Heuffel. Flora 1833. p. 363. Gebirgswälder, Ungarn im Banat bei d. Percules-Wäldern 7—8. 4

29. *O. Traunsteineri* Sauter. K. syn. *O. angustifolia* Rehb. Fries. Rehb. pl. crit. t. 9. f. 1140. Sumpfige Moorrwiesen, stellw. im Geb., Rheing. in d. Rheinpfalz bei Maxdorf, Eppstein, Lambsheim, Thüringen Jena im Schillerthale bei Großlobigau; Schweiz am Bodensee bei Bregenz, Tyrol, Salzburg. 5—6. 4

30. *O. cruenta* Retz. Rehb. exc. Ungarn auf d. M. Sarco am Wasserfall d. Sebes im Banat selten. 7—8. 4

744. *Anacamptis* Richard. *Anacamptis*. K. syn. 793. Rehb. exc. p. 122. Comp. II. p. 529.

1. *A. pyramidalis* Rich. K. syn. Rehb. exc. Orchis — L. *O. condensata* Desf. Sonnige Waldwiesen, bewachsene, grasige Hügel in d. Gebirgen bis in d. Boralpen, besonders auf Kalk- u. Mergelboden, stellw. dch. d. Geb., Schweiz dch. d. g. Boralpenkette, besonders im g. Jura, Rheing. auf d. Kalkhügeln im Elsaß bei Ingersheim, Dorlisheim an d. Gansau bei Straßburg u. bei Niederbrunn, Oberbaden im Breisg. auf d. Kaiserstuhl, bei Durlach, Wiesloch, Heidelberg, bei Mosbach u. einzeln an d. Bergstraße bis Hemsbach, Pfalz bei Speier, Zweibrücken, Bitsch, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Nassau, Linz an d. R., Siebengebirge u. Roisdorf bei Bonn, Westphalen bei Nienberge zw. Leden u. Lengerich, Medebach u., Hannover, Preußen, Schwaben, Thüringen Jena, Baiern; Destr. Tyrol, Salzburg u. 5—7. 4

745. *Gymnadenia* Richard. R. Brow. Nachdrüse. K. syn. 794. Rehb. exc. p. 120. Comp. II. p. 529.

1. *G. conopsea* R. Br. K. syn. Rehb. exc. Orchis — L. Var. β . Fl. alb.: *G. ornithis* Spr. Rehb. exc. — γ . *G. cymigera* Rehb. exc. Bergwiesen, Triften, Waldwiesen u. Waldränder, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

2. *G. odoratissima* Rich. K. syn. Rehb. exc. Orchis — L. Var. β . *G. suaveolens* Rehb. exc. Orchis *erubescens* Zuccarini, Jacq. Rehb. exc. Alpen, Boralpen u. grasige Orte d. Gebirge, stellw. im Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. u., Rheing. auf d. Jura

bei Basel, in Württemberg u. Baden bei Willingen, Donau-
eschingen, Breisg. auf d. Kaiserstuhl, bei Pforzheim über
Nöttingen bis zu d. Kalkhügeln bei Berghausen, Bogesen,
Kalkhügel im Elsaß bei Muzig, Ingersheim, Bensfeld, Pfalz
bei Zweibrücken gegen Bitsch u. Pirmasenz, an d. Kirchbacher
u. Walbacher Höfen, bei Neuhornbach, Stammbach u. Del-
feld, in Westphalen bei Lengerich am Galgenberge, Thürin-
gen, Jena bei Schöngleina, Halle, Eisenach, Sachsen bei
Leipzig, Preußen, Mähren bis zum südl. Littoral, Istrien,
Lombardien, Venedig. 6—7. 4

3. *G. albida* Richard. K. syn. *Habenaria* — R. Brow.
Rechb. exc. *Peristylus albidus* Lindl. Koch Taschb. *Saty-
rium albidum* L. *Orchis* — a Scopol. *Leucorchis* — E.
Meyer. Gräßige Orte, Triften d. Alpen, Boralpen u. stellw.
dch. d. Gebirge d. g. Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette
nach Baiern; Destr. bis in d. südl. Littoral; Rheing. Boge-
sen, Schwaben, Oberbaden, Rheingebirge, Nassau bis Co-
blenz, Bonn, Hochwald, Eifel, Trier, Luxemburg 2c., West-
phalen, Hannover, Thüringen, Jena, Erzgebirge, Harz,
Schlesien 2c. u. in g. Destr. 6—8. 4

4. *G. cucullata* Richard. Rechb. pl. crit. *Himanto-
glossum* — tum Rechb. exc. *Orchis* — ta L. Waldige Hügel
in Galizien. 7. 4

746. *Himantoglossum* Spreng. Riemenzunge.

K. syn. 794. Rechb. exc. p. 120. Comp. II. p. 532.

1. *H. hircinum* Spr. K. syn. Rechb. exc. *Loroglos-
sum* — Richard. *Satyrion* — L. *Orchis hircina* Swartz.
Orchis caprina M. v. Bieb. *Aceras* — Lindl. Orch. Bor-
alpen, waldige Gebirgswiesen, Triften d. Kalkformation,
stellw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., nördl. bis Thüringen,
Schweiz besonders im Jura u. dch. d. g. Alpenkette nach
Schwaben, Baiern, Tyrol, Rheing., Oberbaden v. Constanz
bis Basel, Elsaß, im Breisg. auf d. Kaiserstuhl, Pfalz im
Hardtgebirge, bei Zweibrücken, Nahe- u. Glangebirge, Rochus-
Capelle bei Bingen, Meisenheim, Obernheim, Stromberg auf

d. Hochwalde, um Trier u. an d. Sauer, Luxemburg, Einz an d. R., Siebengebirge bei Bonn zc., Thüringen bei Halle, Jena, Ebersleben, Schwarzburg; Destr. Mähren, Tyrol, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 5—6. 4

747. Coeloglossum Hartmann. K. syn. 795.

Habenaria Rob. Br. Comp. II. p. 534.

1. *C. viride* Hartm. K. syn. *Satyrium* — L. *Himantoglossum* — Rchb. exc. *Gymnadenia viridis* Richard. *Habenaria* — R. Br. *Perystilus* — Lindl. K. *Taschb. Orch.* — Swartz. Etwas feuchte Waldwiesen, Triften, auf d. Gebirgen, stchw. bis in d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, besonders im g. Thura, Rheing. dch. d. Rheinthalgebirge u. in allen Nebenthälern, v. Basel dch. Elsaß, Baden, Breisg., Mannheim, Pfalz Harbdtgebirge, bei Speier, Dürkheim, Frankenthal, Nassau, Coblenz, im Lahnthale bei Ems, Altenahr, Bonn, Nahe u. Glanthal, Kreuznach bis Meisenheim, Eufel, Saarbrücken, Hochwald, Trier, Luxemburg, Westphalen bei Ulbe, Beckum zc., Thüringen, Jena, Sachsen, Hannover, nach d. nördl. Geb bis Preußen bei Königsberg, Schlesien; Destr. in allen Provinzen bis in d. Lombardei. 6—8. 4

748. Platanthera Richard. Platanthere. K. syn.

795. Rchb. exc. p. 120. Comp. II. p. 534.

1. *P. bifolia* Richard. K. syn. Rchb. exc. *Orchis* — L. *Habenaria* — R. Br. *Gymnadenia* — F. W. Meyer. Var. *β. brachyglossa* Wallr. *Pl. brachyglossa* Rchb. Waldwiesen, Wälder, Gebüsche, Hecken, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

2. *P. chlorantha* Custor. K. syn. Rchb. exc. *Orch. bifolia α. macroglossa* Wallr. *O. bifolia β. elatior* Gaud. helv. *O. virens* Zollik. Var. *β. P. Wankelii* Rchb. fil. Fl. Saxon.? Gräßige Orte in Gebirgswäldern, Waldtriften, Waldränder, stchw. mit *P. bifolia* dch. d. Geb., Rheing., Elsaß, Baden im Breisg., bei Durlach, Wiesloch, Bergstraße, Weinheim, Pfalz Niederalben u. Grimbach im Steinalbthale, Mainz, Kreuznach, Trier, Coblenz auf d. Höhen d. rechten

Rheinufers, Linz, Siebengebirge bei Bonn, Aachen 2c., nördl. bis Preußen bei Danzig, Schweiz bei Bregenz am Bodensee, Bülach, Basel, Neuschâtel, Baiern, Sachsen, Thüringen 2c.; Destr. Tyrol, Steyermark, Dalmatien. 6. 4

749. Nigritella Richard. Nigritelle. K. syn. 796.

Rehb. exc. p. 121. Comp. II. p. 536.

1. *N. angustifolia* Rich. K. syn. Rehb. exc. *Satyrion nigrum* Lin. Orchis — a Scopol. Graßige Orte, Wiesen, Triften d. Alpen u. Voralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Krain, Steyermark, Destr. in d. südl. Vittoral, Dalmatien, Lombardien, Venedig. 4—8. 4

2. *N. suaveolens* Koch. K. syn. *N. fragrans* Sauter. Rehb. exc. Orchis suaveolens Vill. delph. Triften d. Hochalpen, Schweiz selten, im Jura auf d. Dola; Destr. Steyermark, Gollstein bei Zierl in Tyrol, Kärnthen u. Krain. 7—8. 4

750. Ophrys L. Ragwurz. K. syn. 796. Rehb. exc. p. 126. Comp. II. p. 538.

1. *O. muscifera* Huds. K. syn. *O. myodes* Jacq. Rehb. exc. *O. insectifera* α. *myodes* L. Orch. muscaria Scopol. Gebirgswälder, Gebüsche, Triften, besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., im nördl. selten bis Mecklenburg, Rheing. v. Basel dch. Elsaß, Baden, Breisg. bis Mainz, Kreuznach, Zweibrücken, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Coblenz, Bonn, Westphalen 2c. 6. 4

2. *O. Arachnites* Reichard. K. syn. *O. oestrisera* et *O. fuciflora* Rehb. exc. *O. Arachnites* Schleich. et Thom. *O. crabronifera* Seb. Maur. *O. fuciflora* Hall. fil. *O. exaltata* Tenore. *O. cornuta* Steven. *O. apiculata* Richard. *O. apiifera* Tratt. Fl. austr. Mit kurzem Gesträuche bewachsene Kalkhügel u. Gebirge, stellw. dch. d. südl. u. mittl. Geb., Schweiz, Rheing., Basel nach Elsaß, Baden im Breisg., bei Durlach, Heidelberg bis Frankfurt a. M., Pfalz bei Mardorf, Zweibrücken, Birkenfeld, Trier u. Luxemburg nicht selten, Coblenz bei Ems, oberhalb Linz am Rheine, Schwar-

ben, Baiern, Thüringen, Halle, Rauenburg; Destr. Tyrol, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Ungarn. 6. 2

3. *O. atrata* Lindl. Visian. Fl. Dalm. Rechb. exc. Steinige Orte im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig. 4. 2

4. *O. Pseudo-speculum* DC. Comp. II. p. 541. Rechb. pl. crit. f. 1152. *O. araneola* Rechb. exc. in addent. Grasse Gebirgsstellen im südlichsten Geb., Dalmatien. 5. 2

5. *O. aranifera* Huds. K. syn. Rechb. exc. *O. fuciflora* Curt. Mit niederem Gesträuche bewachsene Kalkhügel u. Gebirge, dch. d. südl. u. stellw. dch. d. mittl. Geb., nördl. bis Thüringen, Jena, Schwaben, Baiern, Franken, Rheing. von Basel nach Elsaß, Neuhof bei Straßburg, Baden im Breisg. am Kaiserstuhl, bei Durlach, Maisbach, Ruppertsberg, Hasloch, Wertheim, Pfalz bei Mardorf, Leistadt bei Dürkheim, Hausbach, Bergstraße am Melibocus, zw. Mardorf u. Frankenthal, Landau zw. Arzheim u. Albesheim, Schloßberg bei Oppenheim, Mainz zw. Oberingelheim u. Algesheim, Trier, Luxemburg u., Schweiz bei Zürich, Solothurn, Bern, Nyon u.; Destr. Tyrol, Steyermark, Krain bis Venedig. 6—7. 2

6. *O. apiifera* Hudson. K. syn. Rechb. exc. *O. aquisgranensis* Fl. v. Aachen. Orchis. *fuciflora* Hall. helv. Var. β . *lutea* Löhr Fl. v. Trier. Mit niederem Gesträuche bewachsene Kalkhügel u. Mergelboden, stellw. im südl. u. mittl. Geb., Baiern, Mainthal bei Würzburg, Franken, Thüringen, Jena, Rheing., Oberbaden von Konstanz am Bodensee bei Kastel u. Staad, bei Rheineck, Basel, Elsaß Ruggisberg bei Muzig, Langweiler, Breisg. auf d. Schönberg, Kaiserstuhl, bei Durlach, Wiesloch, Pfalz bei Zweibrücken im Walde Wolfsacht am Kirchbacher u. Wollbacher Hof, Wiesen d. Rheinfläche bei Mardorf, Frankenthal, Eppstein, Lamsheim, Unzenheim, Landau, Forst, Wachenheim, Mainz, Saarbrücken, Trier bei d. Sivenischen Höfen, Luxemburg nach Verviers, Westphalen u., Halle. Bremen, Hannover, Schweiz bei Aarau, Solothurn, Bern bei

Schinzach, Neuveville, Nyon, Genf u.; Destr. Tyrol, Krain, Dalmatien, Lombardien; Var. β . bei Trier. 6—7. 4

7. *O. brachyotus* Rehb. exc. *O. hiulea* Seb. et Maur. Hügel im südlichsten Geb. bei Genua. 5. 4

8. *O. cornuta* Steven. Rehb. exc. in add. p. 140. Visian. Fl. Dalm. *O. Scolopax* Host. austr. nec. Visian. non Cavan. Triften im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien. 5 4

9. *O. bombylifera* Link. Visian Fl. Dalm. Rehb. pl. crit. IX. f. 1160. Sonnige, grasige Orte in Dalmatien. 4

10. *O. tabanifera* Willd. Visian. Fl. Dalm. Rehb. pl. crit IX. f. 1169 et 1170. In Weingärten d. südl. Eittorals, Dalmatien bei Zara. 5. 4

11. *O. Bertolonii* Moretti. K. syn. Rehb. exc. *O. speculum Bertol.* Grasige Hügel am südl. Eittoral, Istrien bei Fiume, auf d. Insel Veglia, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Piemont, Genua. 4—5. 4

12. *O. flavicans* Visian. Fl. Dalmat. p. 178. Maly enum. pl. austr. p. 67. Steinige, grasige Gebirgsstellen in Dalmatien bei Trau auf d. Monte Bernistroviza. 4

13. *O. tricolor* Desf. Atl. Visian. Fl. Dalmat. Rehb. pl. crit. IX. f. 1148. Unterm Gesträuche, in Gebüsch, Dalmatien auf d. Insel Cefina. 5. 4

14. *O. lutea* Link. Cavan. Rehb. exc. *O. insectifera* E. Lin. Schattige Wiesen, Triften im südl. Eittoral, Dalmatien bei Zara u. um Nizza. 4—5. 4

15. *O. fusca* Link. Handb. *O. Myodes* Lap. *O. lutea* Bivon. Kalkhügel am südl. Eittoral, Genua, Nizza. 4—5. 4

751. *Chamaeorchis* Richard. Zwergfnabenfraut. K. syn. 798. Rehb. exc. p. 127. Comp. II. p. 542.

1. *Ch. alpina* Rich. K. syn. *Chamaerepes* — Spr. syst. Rehb. exc. *Ophrys* — Lin. Wiesen, Triften d. Hochalpen im Urgebirge, Schweiz u. d. d. g. Granitkette nach Baiern, Tyrol, Salzburg, Destr. Kärnten, Krain, Eittoral, Ungarn, Piemont. 7—8. 4

752. *Aceras* R. Brow. Spornlose. K. syn. 798.

Rehb. exc. p. 127. Comp. II. p. 533.

1. *A. anthropophora* R. Br. K. syn. Rehb. exc. Ophrys — *L. Loroglossum* — Rich. Gräßige, etwas feuchte Kalkhügel unter niederem Gesträuche, Gebirgswiesen, stellenw. im südl. u. im mittl. Geb., Rheing. Rheinfeld, Basel nach Oberelsaß, Oberbaden bei Müllheim u. Mauchen. Preussg. bei Freiburg im Ehrenstetter Eichenwalde, Württemberg, Trier an mehreren Stellen, besonders in d. Wäldern am Ufer d. Sauer, Luxemburg bei Diekirch u. Grevenmacher, Einz am Rheine, Thüringen bei Halle, Jena bei Berka, Schweiz bei Schaffhausen, Aarau, Solothurn, Creux du Van im Jura, Biel &c., Dalmatien, Lombardien. 5—6. 4

2. *A. secundiflora* Nees v. E. Comp. II. p. 533. *Himantoglossum* — *florum* Rehb. exc. Ophrys *densiflora* Desf. *Orchis secundiflora* Bertol. *Or. parviflora* Willd. Gräßige Hügel im südl. Eittoral, Dalmatien auf d. Insel Vésina, Piemont, Nizza, Ligurien. 4—5. 4

753. *Herminium* R. Brow. Herminie. K. syn.

798. Rehb. exc. p. 119. Comp. II. p. 536.

1. *H. Monorchis* R. Br. K. syn. Rehb. exc. Ophrys — *L. Wiesen, Triften, besonders Waldwiesen, Waldränder, auf Kalk- u. Lehmboden dch. d. Alpen, Boralpen u. Gebirgen, stellenw. dch. d. Geb., Schwaben, Baiern, Franken, Thüringen, Rheing., an vielen Orten zerstr. v. d. Schweiz dch. Baden, Elsaß, Pfalz im Harbtgebirge, Dürkheim bis Bingen, v. d. Rochus-Capelle d. Hörschens bei Ockenheim bis Nieder- ingelheim, Bergstraße bei Weinheim, Nassau, Zweibrücken, an d. Nahe u. Glan u. auf d. Hochwalde bis Trier, Eifel, Luxemburg, Coblenz, Bonn nach Westphalen bei Stromberg u. Neuenberg &c., Hannover u. dch. d. nördl. Geb. nach Preussen bei Tilsit, Königsberg. 5—6. 4*

754. *Serapias* L. Stendelwurz. K. syn. 798. Rehb.

exc. p. 129. Comp. II. p. 542.

1. *S. cordigera* L. K. syn. Uncultivirte Hügel im südl. Eittoral, Istrien auf d. Insel Livella-Grande bei Promontore, Dalmatien bei Zara, Lombardei, Genua. 5. 4

2. *S. pseudo-cordigera* Morican. K. syn. *S. longipetala* Pollini. Rchb. exc. *S. Lingua* Bertol. Gaud. *S. cordigera* Hegtsch. et. Heer. K. syn. edit. I. *Orchis Lingua* Scopol. *Helleborine longipetala* Seb. Maur. Tenore. *Serapias hirsuta* Lap. Uncultivirte, grasige Hügel, Gebirgs- wiesen im südl. Geb., Schweiz Locarno im Cant. Tessin; Südtirol, Roveredo, Borgo, Krain, Eittoral, Lombardei, Venedig u. im g. Oberitalien. 4—5. 4

3. *S. Lingua* DC. K. syn. Rchb. exc. *S. oxyglottis* Bertol. *Helleborine Lingua* Pers. Grasige Hügel im südl. Eittoral, Istrien Fiume bei Pola, auf d. Insel Dsero, auf dem Promontore, Cossino, Dalmatien; Piemont, Nizza, Ligurien. 4—5. 4

4. *S. triloba* Vivian. Fl. ital. Sonnige Hügelwiesen im südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Piemont, Genua u. in Ligurien. 5. 4

II. Gruppe. *Limodoreen* Koch. K. syn. K. Taschb.

755. *Epipogium* Richard. Oberfinn, Aufbart.

K. syn. 799. Rchb. exc. p. 135 Comp. II. p. 545.

1. *E. Gmelini* Rich. K. syn. *E. aphyllum* Gmel. Rchb. exc. *Limodorum Epipogium* Swartz, *Satyrium* — L. Auf faulem Holze in schattigen Wäldern, am Fuße d. Alpen u. höheren Gebirge, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Oberbaden im Scheuerbusch bei Salem, im Zimmerholzer Gemeindewald bei Engen, Basel oberhalb Ramstein, Vogesen am Rothensbach, im Münsterthale in d. Schlucht gegen Lundeühl, Schwarzwalb, Baden beim Steinbacher Bad, Schweiz im Jura, Coblenz im Obermendiger Forst, Westphalen bei Uehrendorf, Bielefeld selten, Thüringen Jena, Harz Rennchenberg, Brocken, Hannover bei Deißer u. Göttingen, Mecklenburg, Preußen, Lausitz, Schlesien in d. Sudeten, Böhmen, Mähren, Oestr. Ungarn u. Siebenbürgen. 7—8. 4

756. *Limodorum* Tournef. Dingel. K. syn. 800.

Rchb. exc. p. 131. Comp. II. p. 545.

1. *L. abortivum* Swartz K. syn. Rchb. exc. Orchis — *L. Serapias* — Scopol. Sonnige, bewaldete u. buschige Hügel, besonders im Kalkgebirge, im südl. u. stellw. im mittl. Geb., Rheing., Rheinfeld bei Delsberg, Basel, Oberbaden, Breisg. auf d. Kaiserstuhl zw. d. Eichelspiße d. neun Linden u. Bogtsburg, auf d. Schneckenberg bei Achtkarren u., Trier, Sauerthal in d. Gegend v. Kalingen, Luxemburg bei Rosport, Machtum, Schweiz Neuchâtel, Bern, Nyon, Genf, Südtirol, Destr. Ungarn, Steyermark, Krain, Littoral, Dalmatien, Lombardei u. 5—6. 4

757. *Cephalanthera* Richard. Kopfbeutel. K.

syn. 800. Rchb. exc. p. 132. Comp. II. p. 546.

1. *C. pallens* Rich. K. syn. Rchb. exc. *Serapias grandiflora* Scopol. *S. longifolia* Huds. *S. lancifolia* Roth. *Epipactis grandiflora* Smith. *E. pallens* Sw. Wälder, buschige Orte, d. Kalkgebirge, Hügel, stellw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Rheing. an vielen Stellen, vom Bodensee nach Basel, Elsaß, Baden, Breisg., Bergstraße am Melibocus, Kreuznach, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Coblenz u., Baiern, Schwaben, Franken, Thüringen nach Sachsen, Schlesien; Destr. bis in d. Lombardei. 4—5. 4

2. *C. ochroleuca* Rchb. exc. in add. Nro. 884. b. *Epipactis* — Baumg. Transylv. III. p. 154. Schattige Bergwälder in Siebenbürgen bei Segeşvar im Reifelt. 5. 4

3. *C. ensifolia* Rich. K. syn. Rchb. exc. *Serapias* — Smith. *S. grandiflora* Fl. Dan. *S. Xiphophylla* L. Sonnige Kalkgebirge unter Gebüsch mit *C. pallens*, stellw. dch. d. Geb., nördl. nach Preußen bei Danzig. 4—5. 4

4. *C. rubra* Rich. K. syn. Rchb. exc. *Serapias* — *L. Epipactis* — Allion. Wälder, schattige Hügel, besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Rheing., vom Bodensee nach Basel, Elsaß, Baden im Breisg., Rastatt,

Mannheim, Pfalz Zweibrücken, Bitsch, Lauterecken, Mainz, Nassau, Kreuznach, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Coblenz u., nördl. nach Preußen bei Thorn. 6—7. 4

758 *Epipactis* Richard. *Cumpfwurz*. K. syn.

800. *Rchb. exc.* p. 123. *Comp. II.* p. 548.

1. *E. latifolia* Allion. K. syn. *Rchb. exc.* *Serapias* — L. Var. β . *E. viridiflora* *Rchb. exc.* *Serapias* — Hoffm. Wälder, Gebüsche, Hecken, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *E. rubiginosa* Gaud. helv. K. syn. *E. latifolia* β . *rubiginosa* K. syn. edit. I. *E. atrorubens* *Rchb. exc.* *Serapias* — Hoffm. Uncultivirte, schattige Gebirgsstellen, Wälder, stellw. dch. d. Geb. bis in d. Alpen. 7—8. 4

3. *E. microphylla* Ehrh. W. et Kit. K. syn. Gebirgswälder, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Aachen im Krapler-Wäldchen bei Eupen, Westphalen bei Bielefeld auf d. Altenberg, Tecklenburg, Hannover, Braunschweig, Lüneburg, Harz, Thüringen bei Ebersdorf, Jena; Destr. Mähren, Steyermark, Krain, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombardien u. 6—7. 4

4. *E. palustris* Crantz. K. syn. *Rchb. exc.* *Serapias* — Scopol. *S. longifolia* L. Sumpfige Wiesen, nasse Waldstellen, besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. Geb.; Rheing. nicht selten u. 6—7. 4

759. *Listera* R. Brow. *Listere*. K. syn. 801.

Rchb. exc. p. 133. *Comp. II.* p. 549.

1. *L. ovata* R. Br. K. syn. *Rchb. exc.* *Ophrys* — L. *Epipactis* — Allion. ped. *Neottia latifolia* Richard. *Distomaca ovata* Spenn. Gebirgs- u. Waldwiesen, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

2. *L. cordata* R. Br. K. syn. *Ophrys* — L. *Epipactis* — Allion. ped. *Neottia* — *Rchb. exc.* *Distomaea* — Spenner. Schattige Waldstellen, meistens im Torfmoose, an etwas sumpfigen Orten d. Boralpen u. höheren Gebirge im südl. u. mittleren Geb., Schweiz u. längs d. g. Alpen-

kette nach Baiern, Tyrol, Destr. Krain; Rheing., Oberbaden, Vogesen, Württemberg, Fichtelgebirge, Harz, Thüringen, Hamburg, Holstein, Schlesien in d. Sudeten, im Norden unter Moos in Nadelholzwäldern. Preußen bei Königsberg; Böhmen, Mähren, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen. 5—7. 4

760. *Neottia* L. Nestnest. K. syn. 802. Rchb. exc. p. 132. Comp. II. p. 551.

1. *N. Nidus-avis* Rich. K. syn. Rchb. exc. *Ophrys* — *L. Neottidium* — v. Schlechtent. Auf Baumwurzeln, in schattigen Laubwäldern schmarotzend, zerstr. dch. d. g. Geb. 5—6. 4

761. *Goodyera* R. Brow. Goodiere. K. syn. 802. Rchb. exc. p. 131. Comp. II. p. 551.

1. *G. repens* R. Br. K. syn. Rchb. exc. *Satyrium* — *L. Neottia* — Swartz. In Nadelholzwäldern, auf dünnen Triften, in Gebirgswäldern bis in d. Boralpen, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Bodensee, Basel nach Elsaß bei Weissenburg, Baden im Breisg. zw. Karlsruhe u. Waghäusel, Darmstadt, Frankfurt, Hanau, Kaiserslautern u. Hohenessen; Westphalen im Teutoburger Walde bei Bielefeld, Warendorf, Thüringen, besonders im nördl. Geb., in Preußen, Königsberg, Danzig, Schlesien; Böhmen, Mähren; Schweiz bei Schaffhausen, Rheinfeld auf d. Oberrhein, Solothurn bis Genf dch. d. Alpenkette nach Baiern, Destr. Tyrol, Krain, Ungarn u. 7—8. 4

762. *Spiranthes* Richard. Blüthenschraube. K. syn. 802. Rchb. exc. p. 127. Comp. II. p. 552.

1. *S. aestivalis* Rich. K. syn. Rchb. exc. *Neottia* — DC. *Ophrys* — Lamk. *O. aestiva* Balb. Feuchte, schwammige Wiesen, Triften, stchw. dch. d. südl. u. mittlere Geb., Rheing., Basel, auf d. Jura, Elsaß bei Mundelsheim, Dorlishheim, Wolzheim, Württemberg, Baden bis Heidelberg,

Bessunger = Wald bei Darmstadt, Pfalz zw. Dürkheim u. Rastatt, im Hahnhof, Lüttich; Schweiz am Bodensee bei Bregenz, Genf, Neuchâtel u. besonders im Jura; Destr. Böhmen, Tyrol, Krain, Croatien, Lombardien u. Venedig; Piemont u. 7. 4

2. *S. autumnalis* Rich. K. syn. *Rchb. exc. Neottia* — Pers. *Ophrys spiralis* L. *Neottia* — Swartz. Feuchte Gebirgstriften, Waldwiesen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., stellw. v. Basel dch. Elsaß, Baden im Breisg., bei Rastatt, Karlsruhe, Heidelberg, Hanau, Nassau, Pfalz bei Zweibrücken, Saarbrücken, Coblenz, Westphalen u. 8—10. 4

III. Gruppe. Malaxidineen Koch. K. syn. K. Taschb.

763. *Corallorrhiza* Haller. Korallenwurz. K. syn. 803. *Rchb. exc. p. 131. Comp. II. p. 554.*

1. *C. innata* R. Brow. K. syn. *Rchb. exc. C. Halleri* Richard, *Ophrys Corallorrhiza* L. *Cymbidium* — Sw. Schattige Wälder d. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, besonders im Jura, nach Baiern, Schwaben, Thüringen; Destr. Tyrol, Krain, Steyermark u. sehr zerstr. in Gebirgswäldern d. Geb., Rheing., Württemberg bei Tuttlingen, Baden bei Engen, Elsaß, Preuß. Rheinprovinz bei Schleiden in d. Schneeeifel zw. Trier u. Aachen, Thüringen bei Jena, Erzgebirge, Lausitz, Preußen; Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. Dalmatien. 6—8. 4

764. *Sturmia* *Rchb. Sturmie.* K. syn. 803. *Rchb. exc. p. 135. Liparis* Richard. *Comp. II. p. 554.*

1. *S. Loeselii* *Rchb. K. syn. Rchb. exc. Liparis* — Rich. *Ophrys* — L. *Malaxis* — Sw. *Ophrys liliifolia* Lamk. *O. paludosa* Fl. Dan. Sumpfige Torfwiesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Bodensee bei Rheineck, Basel, nach Elsaß bei Straßburg, Hagenau, Württemberg, Baden bei Waghäusel, Trier bei Konz, Düsseldorf, Grefeld, Westphalen, Sep-

pentader Tenne, Hamburg, Wetterau, Thüringen, Harz, Preußen bei Tilsit, Königsberg, Schlesien; Schweiz, Winterthur, Hallwylsee, Rastensee, Solothurn, Cant. Wallis bei Sitten; Destr. Böhmen, Tyrol, Krain, Ungarn u. Siebenbürgen. 6—8. 4

765. *Malaxis* Swartz. Weichfraut. K. syn. 804.

Rchb. exc. p. 134. Comp. II. p. 555.

1. *M. paludosa* Sw. K. syn. Rchb. exc. Ophrys — Lin. Sumpfige Moorwiesen zw. Sumpfmooß, stellw. mehr im nördl. u. westl. Geb., Rheing., Baden, am Bodensee bei Eris Kirch, im Murgthale bei Reichenbach, Nassau, Elsaß bei Niederbrunn, Bitsch, Pfalz, Kaiserslautern, Flora v. Trier bei Saarbrücken, Malmédy, Aachen, Siegburg bei Bonn u. v. Niederrheine nach Westphalen, Hannover, bei Hamburg, Holstein, in Mecklenburg, Berlin nach Preußen, Königsberg, Danzig u., Thüringen bei Jena; Böhmen, Destr. Tyrol, Krain, Ungarn. 7—8. 4

2. *M. monophyllos* Swartz. K. syn. Rchb. exc. Ophrys — L. *Microstylis* — Lindl. K. Taschb. 196. Moorige, nasse Grasstellen d. Voralpen, zerstr. bch. d. Alpenkette, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyermark, Ungarn u. in d. Gesenke d. Sudeten in Schlesien, Mähren, wie in den kalten Moorbrüchen von Preußen, Ellerbruch bei Kapheim, Insel Rügen. 7. 4

IV. Gruppe. Cyripedineen Koch. K. syn. K. Taschb.

766. *Cypripedium* L. Frauenschuh. K. syn. 804. Rchb. exc. p. 134. Comp. II. p. 556.

1. *C. Calceolus* L. K. syn. Rchb. exc. Schattige Waldstellen, stellw. bch. d. südl. u. mittleren Geb. bis in d. Voralpen, nördl. bis zum Harze, aber auch noch in Pommern bei Stettin, in Preußen bei Memel, Lyck u. Elbing; Rheing., Oberbaden v. Constanz am Bodensee nach Eglisau, Basel, im Würtemberger u. Badener Jura, Breisg.

auf d. Kaiserstuhl, Nassau bei Taub u. Ems, Coblenz, Linz, Remagen, Siebengebirge, Mayensfeld, Eifel, Trier u. Luxemburg, Thüringen bei Jena u.; Schweiz, besonders auf d. Jura bei Neuchâtel, M. Chasseral, Creux du Vant, Nyon, Salève bei Genf, Schaffhausen, Rheinfeld; Destr. in allen Provinzen bis in d. südlichste Littoral, fehlt in Sachsen. 5—6. 4

Hundertsechszwanzigste Ordnung. Irideen.

Juss. K. syn. 804. K. Taschb. 496. Rchb. exc. p. 80. et icon. 4. Band.

767. *Crocus* L. (III. 1.) Safran. K. syn. Rchb. exc. p. 84. et icon. t. 355—361. Comp. I. 1. p. 64.

1. *C. vernus* Allion. pedm. K. syn. Rchb. icca. *C. sativus* β . *vernus* L. *C. sativus* Scopol. *C. vernus* α . *grandiflorus* Gay. Var. β . *C. vernus parviflorus* Gay. — γ . *C. albiflorus* W. et Kit. Rchb. exc. et icon. Grasige Orte d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Schwaben, Tyrol, Destr. bis in d. südl. Littoral; Rheing. auf d. Jura bei Basel u. auf d. Zavelstein in Württemberg u., Schlesien. 3—4. 4

2. *C. biflorus* Mill. K. syn. Rchb. icon. *C. lineatus* Jan, *C. pusillus* Tenore. *C. versicolor* Gawl. Rchb. exc. Sonnige, waldbige Gebirgstriften im südl. Littoral, Istrien, Triest bei d. Dörfe Comen, Dalmatien auf d. M. Marian bei Spalato, bei Ragusa u., Lombard bei Verona, Venedig, Piemont, Nizza. 1—3. 4

3. *C. variegatus* Hoppe et Hornsch. *C. reticulatus* Steven. Rchb. exc. et icon. *C. reticulatus* β . M. v. Bieb. Steinige, grasige Hügel, Gebirge im südl. Littoral, Istrien bei Triest im Walde v. Lippiza, bei Monfalcone, Insel Veglia, Dalmatien, Ungarn bei Pesth. 2—3. 4

4. *C. veluchensis* Herbert Bot. Reg. 1847. *C. ni-*

valis Coll. v. Sprunner. Fluren d. Alpen in Siebenbürgen bei Kronstadt häufig. 2—3. 4

5. *C. aureus* Sibth. Rchb. icon. *C. lagenaeiflorus* γ. Salisb. Ungarn M. Strass bei Mehadia. 3—4. 4

6. *C. luteus* Lamk. Rchb. exc. et icon. *C. Moesianus* Gawl. *C. vernus* β. Hoppe. Ungarn im Banat u. häufig in Gärten angepflanzt. 3—4. 4

7. *C. Pallasii* M. v. Bieb. Visian. Fl. Dalm. Rchb. icon. *C. odoratus* Visian. stirp. *C. Thomasii* Tenore. *C. longiflorus* Rchb. nec. Rassin. Sonnige Hügel, unter Zäunen, in Dalmatien. 8—9. 4

8. *C. sativus* L. K. syn. Rchb. icon. *C. autumnalis* Smith. Hügel im südlichsten Littoral, Dalmatien um Salona, Spalato, Oberitalien bei Ascoli; dann im südl. Geb. cultivirt; Destr. Südtirol, Schweiz im Cant. Valais um Sitten. 9—10. 4

9. *C. banaticus* Heuffel. Fl. 1835. Comp. II. in add. p. 746. Rchb. icon. t. 360. Etwas feuchte Laubwälder, besonders Buchenwälder in Ungarn, am Salomon-Berge im Banat. 2—3. 4

10. *C. iridiflorus* Heuffel. Rchb. icon. *C. speciosus* Rchb. pl. crit. Hügelwälder in Ungarn im Comitatus Krassó, Banat u. Siebenbürgen. 9—10. 4

11. *C. bizantinus* Ker. *C. longiflorus* Rassin. Comp. I. 1. p. 67. *C. banaticus* Gay. In Dalmatien. 11—12. 4

12. *C. dalmaticus* Visian. Fl. Dalm. I. p. 119. Maly enum. pl. austr. p. 61. Sonnige Gebirgshelden auf dem Baffanka in Dalmatien. 4

768. *Trichonema* Ker. (III. 3.) Triole. K. syn.

805. Rchb. exc. p. 83. icon. t. 364. f. 782—785. Comp. I. 1. p. 64.

1. *T. Bulbocodium* Ker. K. syn. Rchb. icon. *Ixia* — *L. Romulea* — Seb. et Maur. Gräßige Orte am südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Croatien; Oberitalien. 2—3. 4

2. *T. Columnae* Seb. et Maur. Fl. rom. Rchb. exc. et icon. *Ixia minima* Tenore. Sonnige Hügel im südlichsten Geb., Dalmatien; Oberitalien. 3—4. 4

769. *Gladiolus* L. (III. 1.) Siegwurz. K. syn. 805. Rchb. exc. p. 83. et icon. t. 349 — 353. f. 777 — 781.

1. *G. triphyllus* Sibth. Bertoloni. Fl. ital. Maly enum. pl. austr. p. 60 et 373. *G. communis* Rchb. pl. crit. VI. f. 817. Gebirgstriften im südl. Geb., Dalmatien. 5—6. 4

2. *G. palustris* Gaud. K. syn. Rchb. icon. *G. Boucheanus* v. Schlechten. *G. communis* Wim. et Grab. *G. pratensis* Dietr. *G. tenuis* M. v. Bieb. Rasse, sumpfige, mit Schilf u. Riedgras bewachsene Wiesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Oberbaden am Bodensee bei Constanx, zw. Billingen u. Münsterweiler, bei Trochelsingen, an d. rauhen Alp, zw. Kehl, Goldschiefer u. Hochdorf; Elsaß bei Herbstheim u. Rosfeld häufig; Pfalz bei Dannstadt, Wachenheim, Forst häufig, Marxborf bis gegen Eppstein; Baiern, Thüringen bei Halle, Sachsen Leipzig, Dresden, Preußen bei Gerbauenen, Berlin, Schlesien, Frankfurt a. d. Oder; Oestr. Böhmen, Tyrol, Krain, Dalmatien, Ungarn u. 5—6. 4

3. *G. communis* L. K. syn. Rchb. icon. Nees v. E. Sturm III. 56 et 83. Var. β . *G. italicus* Miller. *G. dalmaticus* Tausch. Rchb. exc. non Steudel. Wiesen u. Weingärten mehr im südl. Geb., nördl. in Pommern bei Stettin, Schlesien bei Rosnig, Frankfurt an d. Oder; Böhmen, Mähren, Galizien, Steyermark, Tyrol, Krain, Littoral, Istrien, Siebenbürgen, Ungarn, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Schweiz am Genfer-See bei Nyon. 5—6. 4

4. *G. illyricus* Koch. K. syn. Rchb. icon. Etwas feuchte Wiesen u. auf Saatäckern im südl. Littoral, Krain an d. Sau, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. 5—6. 4

5. *G. imbricatus* L. K. syn. Rchb. icon. *G. rosicus* Pers. *G. neglectus* Schult. *G. galiciensis* Besser.

Feuchte Moormiesen, grasige Waldstellen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Duisburg bei Düsseldorf, Thüringer-Wald im Steiger, Sachsen, Ostpreußen, Königsberg, Thorn, Tilsit, Schlesien, Frankfurt an d. Oder, Glas, Reihwiesen in d. Schlesischen u. Mährischen Gebirgen; Destr. Böhmen bei Wodna, Tyrol, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Lombardei. 6. 4

6. *G. segetum* Gawler. K. syn. Rchb. icon. *G. communis* Sibth. Bertolon. *G. Ludowicae* Jan. *G. italicus* Gaud. Unter d. Saat im südl. Eittoral, Istrien, Stramare zw. Saule u. Muchia bei Triest, bei Fiume, Insel Veglia, Dalmatien, Croatien, Lombardei bei Verona. 4—5. 4

770. *Iris* L. (III. 1.) Schwertlilie. K. syn. 807. Rchb. exc. p. 80. et icon. t. 337 — 348. f. 752 — 776. Comp. I. 1. p. 70.

Erste Rotte. Gebärtete. K. Taschb. p. 498.

1. *I. pallida* Lamk. K. syn. Rchb. icon. *I. odoratissima* Jacq. *I. florentina* M. et K. Steinige Gebirgstellen im südl. Geb., Südtirol, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei. 6. 4

2. *I. florentina* L. Rchb. exc. et icon. Auf Mauern, in Oberitalien, bei Florenz selten. 5. 4

3. *I. germanica* L. K. syn. Rchb. icon. Steinige Orte d. Gebirge, Abhänge, Felsen dch. d. g. südl. Geb., im mittleren wohl nur verwilbert; Schweiz besonders im Jura; Rheing. auf d. Würtemberger Jura, Elsaß, dann auf d. steilsten u. höchsten Mandelsteintrappgebirgen, an d. Nahe bei Bingen, Kreuznach bis Oberstein, Abhänge d. Burg Hammerstein bei Linz an d. R., hohe Felsen an d. Mosel bei Gondorf, Luxemburg, Baiern, Thüringen, Sachsen; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Kärnthen, Krain, Eittoral bis Venedig, Ungarn u. Galizien u. 4—5. 4

4. *I. lurida* Soland. Rchb. exc. et icon. Bewachsene Sandhügel, Ungarn im Banat selten. 5—6. 4

5. *I. sambucina* L. K. syn. Rchb. icon. Sonnige, steinige Orte d. Gebirge, Felsen, Abhänge, stellw. im Geb., Rheing., Württemberg, Baiern, Baden, bei Mannheim, an d. Donau, Nahegebirge bei Kreuznach, Braubach, Coblenz an Felsen d. Ehrenbreitenstein; Raumburg, dann in Böhmen, Tyrol, Siebenbürgen, Croatien u. Lombardei. 6. 4

6. *I. squalens* L. K. syn. Rchb. icon. *I. sambucina* Berg. Steinige, bewachsene Gebirgsstellen, stellw. im Geb., Rheing., Schloßberg bei Heidelberg, Felsen bei Duppelheim; dann in Siebenb., Vittoral, Istrien, Lombard. 6. 4

7. *I. bohémica* F. W. Schmidt. K. syn. *I. nudicaulis* Schauer Rchb. exc. et icon. *I. extrafoliacea* Mik. Steinige, sonnige Orte, lichte Stellen in Gebüsch, stellw. im Geb., an d. Gebirgen d. Moldau, in Böhmen bei Prag, Halle im Mittel- u. Lindenhölze, Queblinburg, Schlesien auf d. Georgenberg bei Strigau; Mähren. 5. 4

8. *I. Fieberi* Seidl. K. syn. Rchb. icon. *I. biflora* Schauer. Waldwiesen, an Felsen, Schlesien bei Breslau, Kellwitz, Böhmen auf Gelltschberg im Leitmeritzer Kreis u. in Ungarn. 5. 4

9. *I. hungarica* W. et Kit. K. syn. *I. biflora* Rchb. exc. et icon. *I. bisflorens* Host. Grasige Gebirgsstellen in Böhmen am Millerschau; Ungarn um Pesth; Siebenbürgen. 5. 4

10. *I. variegata* L. K. syn. Rchb. icon. Grasige Hügel in Destr. Mähren, Ungarn, Siebenbürgen. 5—6. 4

11. *I. pumila* L. K. syn. *I. lutescens* Red. Sonnige, mit Gebüsch bewachsene Hügel, stellw. mehr im südl. Geb., im mittleren u. nördl. wohl nur verwildert; Destr. Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Tyrol, Croatien, Dalmatien 2c. 4—5. 4

12. *I. tristis* Rchb. icon. t. 338. Kalkhügel, Felsen im südl. Geb., Südtirol bei Roveredo, M. Goag; Ungarn um Ofen, im Banat, Dalmatien bei Zara. 4—5. 4

13. *I. Clusiana* Tausch. Rchb. exc. et icon. *I. pumila* Curtis. In Dalmatien. 4—5. 4

14. *I. lutescens* Lamk. K. syn. Rchb. icon. *I. virescens* Red. Kalkgebirge, Felsen, stellw. im südl. Geb., Schweiz Cant. Wallis bei Sitten am Schloß Tourbillon; Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn. 5. 4

15. *I. arenaria* W. et Kit. Rchb. icon. Sandige Wiesen in Ungarn um Pesth u. Ofen, Siebenbürgen. 4—5. 4

Zweite Rotte. Bartlose. K. Taschb. p. 500.

16. *I. Pseudacorus* L. K. syn. Rchb. icon. Stehende Wasser, Sumpfwiesen im g. Geb. 5—6. 4

17. *I. sibirica* L. K. syn. Rchb. icon. *I. pratensis* Lamk. *I. stricta* Moench. Feuchte, schattige Wiesen, in Waldgegenden, stellw. dch. d. g. bis in d. nördl. Geb. Schweiz; Rheing. an vielen Orten v. Basel nach Elsaß, Baden im Breisg., bei Mannheim, Pfalz bei Speier, Forst, Maxdorf, Worms, Oppenheim, Mainz, Rempten u. Gaulsheim oberhalb Bingen, Coblenz, Kaiserslautern, Kreuznach, Hamburg, Thüringen 2c.; Destr. in allen Provinzen. 4—6. 4

18. *I. spuria* L. K. syn. Rchb. icon. Nasse u. trockene grasige Orte, Wiesen, stellw. im Geb., Rheing., Dämme, Hügelabhänge d. Baierschen Pfalz bei Nierstein, Laubenheim, Bodenheim, zw. Bauschheim u. Altheim bei Mainz, bei Rempten u. Gaulsheim oberhalb Bingen; Destr. zw. Laxenburg, Münchendorf u. Guntramsdorf, bei Oberwaltersdorf u. Margarethen am Moos, Ungarn, Siebenbürgen u. Venedig. 5. 4

19. *I. graminea* L. K. syn. Rchb. icon. Grasige Gebirgsstellen, Hügel, Waldwiesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Württemberg am Pfaffberge bei Wangen, Elsaß auf d. Sulzer-Ballon am See; Oberschwaben, Baiern, Schlesien am Zul bei Brenna; Destr. bei Wien, Mauerbach, Mähren, Galizien, Ungarn, Steyermark, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig. 5—6. 4

20. *I. foetidissima* L. Rchb. exc. et icon. Laubwälder, an d. Küste d. Nordsee u. im südl. Littoral, Süd-

tyrol, Ungarn, Lombardei, Venedig; Belgien u. Holland.
6—7. 24

21. *I. tuberosa* L. Rchb. exc. et icon. Grasige
Orte, in Gebüsch, Sainen, im südl. Eittoral, Dalmatien,
Lombardei, Venedig. 3—4. 24

Hundertsiebenundzwanzigste Ordnung. Amaryllideen.

R. Brow. K. syn. 810. K. Taschb. 501. Narcissae et
Bromeliaceae Rchb. exc. p. 86—90.

771. *Sternbergia* W. et Kit. (VI. 1.) Stern-
bergie. K. syn. Rchb. exc. p. 87. et icon. t. 372.
Comp. I. 1. p. 576.

1. *S. colchiciflora* W. et Kit. Rchb. exc. et icon.
Amaryllis — Ker. Var. β . *S. dalmatica* Rchb. Grasige
Orte in Ungarn, auf d. Adlersberg u. im südl. Eittoral,
Dalmatien, Croatien. 9—10. 24

2. *S. lutea* Ker. K. syn. Rchb. icon. Amaryllis —
L. Auf Feldern u. an Mauern im südl. Eittoral, Istrien
u. Inseln, bei Rovigno, Dalmatien bei Ragusa u. Insel Pe-
sina, Venedig. 9—10. 24

772. *Agave* L. (VI. 1.) Agave. K. syn. 811. Rchb.
exc. p. 90. Comp. I. 1. p. 581.

1. *A. americana* L. K. syn. Rchb. icon. t. 374.
Gebirgsabhänge, Felsen im südl. Geb., Südtirol bei Bogen,
Eittoral, Istrien bei Rovigno, Insel Cherso, Dalmatien u.
auf d. Inseln, Piemont, Nizza u. in Oberitalien bei St.
Vigilio. 6—7. 24

773. *Pancratium* L. (VI. 1.) Gilgen. Rchb. exc.
p. 89. et icon. t. 371. Comp. I. 1. p. 580.

1. *P. maritimum* L. Rchb. exc. et icon. Sandige
Küste am, südl. Eittoral u. Inseln des Adriatischen Meeres,

Dalmatien am Strande bei Budna, Piemont, Genua, Ostligurien. 6—8. 4

2. *P. illyricum* L. Rchb. exc. et icon. Küste im südlichsten Littoral am Adriatischen Meere, Dalmatien. 3—4. 4

774. *Narcissus* L. (VI. 1.) Narzisse. K. syn. 811.

Rchb. exc. p. 87. icon. t. 364—370. f. 808—818.

Comp. I. 1. p. 576.

1. *N. poeticus* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. *N. majalis* Curt. Rchb. exc. *N. patellaris* Salisb. Wiesen, Grasstellen dch. d. g. südl. Geb. u. stellw. in Baumgärten d. mittl. Geb., öfters aber wohl nur verwildert; Rheing. bei Basel, Baden bei Mundelfingen, Waghäusel, Elsaß bei Bischofweiler, im Longemerer Moos, Nassau bei Wiesbaden, Luxemburg bei Redange, Westphalen u., Schweiz besonders im Jurazuge, Destr. in allen Provinzen. 4—5. 4

2. *N. radiiflorus* Salisb. K. syn. Rchb. icon. *N. angustifolius* Curt. *N. longipetalus* Schleich. *N. poeticus* Schkr. *N. poeticus* β . *angustifolius* Smith. Wiesen, Tristen d. Gebirge u. Boralpen im südl. Geb., Schweiz bei Chateau d'Or im Cant. Waadt, im südl. Littoral, Istrien bei Triest, M. Spaccato, Ungarn. 4—5. 4

3. *N. biflorus* Curt. K. syn. Rchb. exc. *N. cothurnalis* Salisb. Wiesen im südl. Geb., Schweiz im Cant. Valais bei Sitten, am Genfer-See bei Nyon, Genf, Südtirol, Lombardei u. Venedig. 4—5. 4

4. *N. dubius* Gouan. Rchb. exc. et icon. *N. pallidus* Lamk. *N. compressus* Haw. Sonnige, steinige Orte am südl. Littoral, Piemont, Nizza. 3—4. 4

5. *N. Jonquilla* L. Rchb. exc. Bertol. Grasige Orte im südlichsten Geb., Dalmatien, Venedig. 3—4. 4

6. *N. Tazzeta* L. K. syn. Rchb. icon. Sonnige, steinige Orte am südl. Littoral, Istrien, Insel Dsero, St. Andrea bei Rovigno, Dalmatien bei Propad u. Spalato, Lombardei, Venedig. 3. 4

7. *N. polyanthos* Loisl. Rchb. exc. et icon. *N.*

Tazzeta Allion. pedm. N. orientalis Gawl. Steinige Hügel im südl. Vittoral, Dalmatien, Insel Lesina, Piemont, Nizza. 3—4. 4

8. N. Pseudo-Narcissus L. K. syn. Rchb. icon. Gebirgswiesen im g. südl. u. im mittl. Geb. bis in d. Vor-alpen, im Norden nur verwildert, Rheing. um Basel, nach Elsaß auf d. Ballon, Hoheneck, Nassau, Neuwied, Sieben-gebirge bei Bonn, Nahegegend bei Simmern, Hochwald, Birkenfeld, Trier, Luxemburg häufig in d. Ardennen, Aachen, an d. Mosel bei Berncastel, Winningen, Westphalen, Han-nover, Bremen, Lausitz, Schlesien; Destr. zc. 4—5. 4

9. N. incomparabilis Miller K. syn. in add. p. 1029. Curtis Rchb. exc. et icon. N. Gouani Roth. Wie-sen im südl. Geb., Südtirol bei Bozen, Krain, Lombardei, Venedig, Oberitalien in Olivenwäldern bei Lucca, Bassano zc. 5—6. 4

10. N. odorus L. Rchb. exc. et icon. In Oliven- u. Weingärten im südlichsten Geb., Dalmatien auf d. Insel Lesina, Oberitalien bei Lucca. 3—4. 4

11. N. niveus Loisl. Visian. Fl. Dalmat. N. stellatus Rchb. exc. et icon. Steinige Orte, Hügel im südl. Vittoral, Dalmatien, Piemont, Nizza. 3—4. 4

775. Leucojum L. (VI. 1.) Knotenblume. K. syn. 812. Rchb. exc. p. 87. Comp. I. 1. p. 575.

1. L. vernum L. K. syn. Rchb. icon. t. 362. Etwas feuchte Waldwiesen, Gebüsch, stellw. dch. d. Geb., Rheing. an vielen Orten, v. d. Schweiz nach Elsaß in d. Vogesen, bei Weißenburg, Baden im Breisg., Murgthal, Bergstraße bis Hanau nach Nassau, Pfalz bei Speier, auf einer Rhein-insel bei Worms, Boppard, Neuwied, Kreuznach, Luxemburg, Aachen, Westphalen zc. 3—4. 4

2. L. aestivum L. K. syn. Rchb. icon. Feuchte Wie-sen, besonders im südl. Geb., im mittl. stellw., Westphalen bei Sassenberg, Hamburg, Lübeck, Sachsen b. Baugen, im Erzge-

birge; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Krain, Ungarn, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig u. in Belgien. 4—6. 24

3. *L. autumnale* L. Rchb. exc. et icon. *Galanthus* — is Allion. Hecker im südlichsten Geb., Piemont, Nizza. 9—10. 24

4. *L. trichophyllum* Brot. Rchb. exc. *L. grandiflorum* Red. In Piemont. 3. 24

776. *Galanthus* L. (VI. 1.) Schneeglöckchen.

K. syn. 812. Rchb. exc. p. 87. Comp. I. 1. p. 574.

1. *G. nivalis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 363. f. 807. Feuchte Wiesen, unter Gebüsch, in Hainen, dch. d. g. südl. Geb. u. stchw. dch. d. mittl., im nördl. in Baumgärten wohl nur verwildert; Rheing., Schweiz v. Jura nach Basel, Elsaß bei Mompelgard, Baden am Bodensee bei Constanz, Luxemburg im Walde Catrapperie, Grasgärten bei Trier, Aachen, Münsterfeld, Westphalen bei Darup hinter d. Schulzenhof, Gösfeld etc., bis nach Preußen im Weichselgebiet Thorn, Danzig; in Dalmatien v. December bis Februar. 2—3. 24

Hundertachtundzwanzigste Ordnung.

Asparageen.

Juss. K. syn. 812. K. Taschb. 502. Sarmantaceae et Coronariae pars Rchb. exc. p. 99. et 118. et icon. Smilacae 5. Band.

777. *Asparagus* L. (VI. 1.) Spargel. K. syn. Rchb.

exc. p. 118. et icon t. 518—520. f. 767—772. Comp. I. 1. p. 622.

1. *A. officinalis* L. K. syn. Rchb icon. Wiesen, Tristen, Weingärten, an Zäunen, Waldbrändern, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten, auch allgemein cultivirt. 7. 24

2. *A. scaber* Brignol. K. syn. *A. officinalis* α. Lin. *A. amarus* DC. *A. marinus* Clus. Rchb. exc. et icon.

Grasige Orte im südl. Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Venedig u. Inseln 4—6. 4

3. *A. tenuifolius* Lamk. K. syn. Rechb. icon. *A. officinalis* β . Lin. *A. sylvaticus* W. et Kit. Host. Wal-
dige Gebirgswiesen im südl. Geb., Steyermark bei Gili,
Südtirol, Krain, Galizien, Ungarn, Littoral, Istrien, Dal-
matien, Croatien, Kombarbei, Venedig, Oberitalien. 4—6. 4

4. *A. albus* L. Bertol. Fl. italic. IV. p. 150. Maly
enum. pl. austr. p. 57. et 373. Im südl. Geb., Venedig
in d. Gegend v. Burano. 8. 3

5. *A. acutifolius* L. K. syn. Rechb. icon. *A. Cor-
ruda* Scopoli. Schattige Orte, in Gebüsch, Hecken, am südl.
Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien u. in g.
Oberitalien. 8—9. 3

6. *A. aphyllus* Rechb. exc. Im südl. Littoral, Istrien
am Hafen bei Pola. 8—9. 3

778. *Streptopus* Michaux. (VI. 1.) Knotenfuß.

K. syn. 813. Rechb. exc. p. 100. et icon. t. 431. Comp.
I. 1. p. 622.

1. *S. amplexifolius* DC. K. syn. Rechb. icon. *S. discolor* Michaux. *Uvularia amplexifolia* L. Wälder d.
Alpen, Boralpen u. höheren Gebirgen, Schweiz u. dch. d. g.
Alpenkette nach Baiern; Salzburg, Oestr. außer Dalmatien
in allen Provinzen bis in d. südl. Littoral, Rheing. in d.
Wogesen auf d. Hoheneck, Baden im Breisgau auf d. Feld-
berg, Erzgebirge, Oberlausitz, Schlesien. 7—8. 4

779. *Paris* L. (VIII. 3.) Einbeere. K. syn. 813.

Rechb. exc. p. 99. icon. t. 430. Comp. I. 2. p. 33.

1. *P. quadrifolia* L. K. syn. Rechb. icon. Wälder,
Haine, Gebüsch, im g. Geb. 5. 4

780. *Convallaria* L. (VI. 1.) Maiblume. K. syn.

814. Rechb. exc. p. 99. et icon. t. 432—435. Comp. I.
1. p. 620.

1) *Polygonatum Tournef.* Koch. Taschb. 503.

1. *C. verticillata* L. K. syn. Rchb. icon. Gebirgswälder bis in d. Boralpen, stchw. dch. d. g. Geb., Schwaben, Baiern, Franken, Rheing. v. Jura bei Basel, Elsaß, dch. d. Schwarzwald nach d. Breisg., Nassau, Pfalz auf d. Donnersberg, dch. d. Nahegebirge von Kreuznach bis Oberstein, Idar, Hochwald, Trier, Eifel, Luxemburg, Aachen u. allen Waldgegenden d. Hohen Venn, Moselgebirge v. Berncastel bis Coblenz, Düsseldorf, Westphalen, Thüringen, Hannover, Holstein bis Preußen, Sachsen; Destr. 1c. 5—6. 4

2. *C. Polygonatum* L. K. syn. Rchb. icon. *Polyg. anceps* Moench. *Polyg. vulgare* Red. Steinige Gebirgswälder, in Gebüsch, stchw. dch. d. g. Geb. u. häufiger als *C. verticillata*. 5—6. 4

3. *C. latifolia* Jacq. K. syn. Rchb. icon. *Polygonat.* — Red. Gebirgswälder, stchw. im südl. Geb.; Destr. Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien, Galizien. 5—6. 4

4. *C. multiflora* L. K. syn. Rchb. icon. *Polygonat.* — Moench. Var. β . *C. bracteata* Thom. Gaud. helv. — γ . *C. obtusifolia* Koch. Rchb. icon. Etwas feuchte Waldstellen, Gebüsch, Hecken, Bäume, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

2) *Coelocrinon* K. Taschb. p. 503.

5. *C. majalis* L. K. syn. Rchb. icon. Schattige Wälder, Haine, Gebüsch, im g. Geb. 5—6. 4

781. *Majanthemum Wiggers* (VI. 1.) Schattenblume. K. syn. 814. Rchb. exc. p. 99. et icon. t. 436. Comp. I. 1. p. 619.

1. *M. bifolium* DC. K. syn. Rchb. icon. *M. Convallaria* Wigg. *Convallaria bifolia* L. *Smilacina* — Desf. *Sciaphila convallarioides* Wib. Laubwälder, Haine, Gebüsch um alte Baumstämme, im g. Geb. 5—6. 4

782. *Smilax* L. (XXII. 6.) Stechwinde. K. syn. 815. Rchb. exc. p. 100. et icon. t. 438. Comp. II. p. 734.

1. *S. aspera* L. K. syn. *Rechb. icon.* Unter Gebüſchen im ſüdl. Eittoral, Krain, Iſtrien bei Duino, Fiume, Croatien, Dalmatien, Lombardei. 8—9. ‡

2. *S. nigra* Willd. *Rechb. exc. et icon.* Gebüſche am ſüdl. Eittoral, Iſtrien am M. Maggiore, Dalmatien bei Ragusa. 8—9. 4

783. *Ruscus* L. (XXII. 9.) Mäuſedorn. K. syn.

815. *Rechb. exc. p. 100. et icon. t. 437. Comp. II. p. 742.*

1. *R. aculeatus* L. K. syn. *Rechb. icon.* Wälder, Gebüſche, im ſüdl. Geb., Südschweiz, Tyrol, Krain, Ungarn, Eittoral, Iſtrien, Croatien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 3—4. ‡

2. *R. Hypoglossum* L. K. syn. *Rechb. icon.* Gebirgswälder im ſüdl. Geb., Steyermark im Teufelsgraben, auf d. Wotsberg im Giller Kreis, Tyrol, Krain, Eittoral, Iſtrien, Dalmatien, Croatien, Lombardei u. um Rizza. 3—4. ‡

3. *R. Hypophyllum* L. *Rechb. exc. Host. Fl. austr.* Steinige Waldſtellen, im ſüdl. Eittoral, Krain, Iſtrien bei Fiume, Croatien, Venedig. 5—6. ‡

Hundertneunundzwanzigſte Ordnung. Dioscoreen.

R. Brow. K. syn. 815. K. *Taschb.* 504. *Sarmentaceae* pars *Rechb. exc. p. 101 et icon. 5. Band. t. 439.*

784. *Tamus* L. (XXII. 6.) Schmeerwurz. K. syn.

Rechb. exc. Comp. II. p. 735.

1. *T. communis* L. K. syn. *Rechb. icon. t. 439.* Wälder, Gebüſche, an Zäunen, beſonders im g. ſüdl. Geb. u. ſtellw. im mittleren; Schweiz, Nyon, Schaffhaufen, Baſel, Rheing., Oberbaden, Conſtanz, Müllheim, im Breiſg. auf d. Kaiſerſtuhl, Rheinwaldungen bei Raſtatt in dem groſſen Bruwenb bei Iſſezheim in d. Gagenau; Elſaß bei Mühlhaufen, Straßburg, Flora v. Trier bei Perl an d. Obermo-

sel u. Luxemburg; Steyermark, Südtirol, Ungarn, Krain, Vittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Lombardien 2c. 3—4. 2

2. *T. creticus* L. Spreng. syst. III. p. 905. Maly enum. pl. austr. p. 59. Steinige Orte in Südungarn im Banat. 4. 2

Hundertdreißigste Ordnung.

Liliaceen.

DC. K. syn. 816. K. Taschb. 504. Coronariae Rchb. exc. p. 102 et icon. 5. Band. t. 448—517.

I. Gruppe. Tulipeen K. Taschb.

785. *Tulipa* L. (VI. 1.) Tulpe. K. syn. Rchb. exc. p. 103 et icon. t. 446—450. Comp. I. 1. p. 585.

1. *T. sylvestris* L. K. syn. Rchb. icon. *T. appenninea* Clus. Aecker, Weinberge, Baumgärten, sonnige Waldwiesen, dch. d. g. südl. und im mittleren Geb., seltener im nördl., Rheing., v. Oberbaden stchw. dch. d. Rhein, Main, Nahe u. Moselthale 2c. 5—6. 2

2. *T. Celsiana* DC. Rchb. exc. et icon. *T. Brey-niana* Smith. non Lin. *T. narbonensis* Clus. Wiesen im südlichsten Vittoral des mittelländischen Meeres. 4. 2

3. *T. Clusiana* DC. Rchb. exc. *T. persica* et *T. praecox* Clus. Wiesen in Piemont, Nizza. 3—4. 2

4. *T. Oculus-Solis* St. Amans K. syn. Rchb. icon. *T. acutiflora* Poir. *T. maleolens* Reboul. Rchb. icon. Cultivirte Orte im südl. Geb., Schweiz im Cant. Valais bei Sitten, Piemont, Nizza. 5. 2

5. *T. Gesneriana* L. Rchb. exc. et icon. *T. praecox* Tenore. Rchb. icon. Im südlichsten Geb., Savoyen, Piemont, Nizza, dann an dem Felsen Rasan in Ungarn. 5. 2

786. *Fritillaria* L. (VI. 1.) Schachtblume. K. syn. 816. Rchb. exc. p. 102. icon. t. 442—445. Comp. I. 1. p. 583.

1. *F. montana* Hoppe. K. syn. *F. pyrenaica* M. et K. *F. tenella* Rchb. exc. et icon. Bewachsene Gebirgsstellen im südl. Geb., Istrien bei Triest, N. Spaccato, Dalmatien, Croatien, Ungarn u. Siebenbürgen; Piemont, Nizza u. 5. 24

2. *F. involucrata* Allioni. Comp. I. 1. p. 583. Rchb. icon. Gebirgsstellen, Ungarn im Banat a. d. N. Domuglet; Piemont zw. Tenda u. d. Col di Tenda. 4. 24

3. *F. Meleagris* L. K. syn. Rchb. icon. Var. β . Fl. alba: *F. unicolor* Rchb. Feuchte Wiesen, stellw. im Geb., Rheing., Württemberg, am südl. Abhänge d. Hohenstoffel im Hegau, Pfalz mit d. Var. bei Wachenheim, Baiern bei Ansbach, Westphalen bei Steinfurt u. Sassenberg, Hildesheim, Hamburg, Eppendorfer Moor, Holstein; Böhmen, Steyermark, Krain, Croatien, Galizien, Ungarn u. Siebenbürgen, Piemont; Schweiz, Neuchâtel. 4—5. 24

4. *F. lutea* M. v. Bieb. Rchb. icon. t. 442. f. 975. *F. latifolia* β . *lutea* Curtis, T. *Meleagris* β . Bertolon. Wiesen in Krain bei Laibach. 5. 24

5. *F. pyrenaica* Clus. Host. Rchb. exc. et icon. *F. nervosa* Willd. *F. racemosa* Ker. *F. pyrenaica* α . Gaul. bot. Mag. Bewachsene Berghalten im südl. Eittoral, Dalmatien bei Ragusa, Croatien. 4—5. 24

6. *F. messanensis* Rassin. Rchb. icon. t. 445. f. 981 et 982. Bertolon. Fl. ital. IV. p. 76. Im südl. Eittoral, Istrien. 4. 24

787. *Lilium* L. (VI. 1.) Lilie. K. syn. 816. Rchb. exc. p. 105. icon. t. 451—455. Comp. I. 1. p. 581.

1. *L. bulbiferum* L. K. syn. Rchb. icon. Gebirgswälder, Wiesen, Triften d. Alpen u. Boralpen, stellw. im g. südl. u. im mittleren Geb., Schweiz, besonders im Jura,

Neuchâtel, Sägerberg, Bern u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Schwaben; Rheing., Petershausen bei Constanz, Würtemberg bei Edwinstein, Elsaß bei Rippoldsweiler früher, Frankfurt a. M. an d. Sachsenhäuser Landwehre u. auf d. Lerchenberg, Thüringen, Sachsen im Erzgebirge, Harz; Westr. Böhmen, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Ungarn, Siebenbürgen, Eittoral, Istrien, Lombardien, Venedig. 6—7. 4

2. *L. candidum* L. Rchb. exc. et icon. Aelter am südlichsten Eittoral, Dalmatien, Venedig. 6—7. 4

3. *L. carniolicum* Bernh. K. syn. Rchb. icon. *L. chalcidonium* Jacq. Host. non L. Gebirgswälder u. Vor-alpen im südl. Geb., Steyermark, Krain, Eittoral, Istrien Dalmatien, Croatien. 5—7. 4

4. *L. croceum* Chaix. Rchb. icon. t. 454. Vill. delph. Gebirgsabhänge, Felsen im südlichsten Geb., Piemont, Savoyen, bei Tenda. 6—7. 4

5. *L. Martagon* L. K. syn. Rchb. icon. Var. *β. glabrum* Spreng. Gebirgswälder, stellw. dch. d. g. südl. u. mittlere Geb., nördl. bis Preußen u. südl. bis in d. Eittoral; Rheing., Constanz, Jura bei Basel, Baden im Breisg. auf d. Kaiserstuhl, Elsaß auf d. Vogesen, M. Ballon, Bitsch, Espenbrunn, Pfalz, Donnersberg, Schriesheim, Frankfurt a. M., Nassau bei Dillenburg, Taunusgebirge, Flora v. Coblenz an d. Murburg u. 7—8. 4

6. *L. pyrenaicum* Gouan. Rchb. exc. et icon. *L. luteum* Lamk. Bewachsene, grasige Hügel, Rheing. im Elsaß auf d. Höhen hinter Hohenach; Siebenbürgen bei Werespataf. 6. 4

788. *Lloydia* Salisb. (VI. 1.) Lloydie. K. syn.

818. Rchb. exc. p. 102 et icon t. 440. Comp. I. 1. p. 584.

1. *L. serotina* Salisb. K. syn. Rchb. icon. *Anthericum serotinum* Lin. *Phalangium* — Lamk. *Ornithogalum striatum* M. v. Bieb. Grasige Granitfelsen d. Hoch-

alpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Ungarn, Kombarbei. 7—8. 4

II. Gruppe. Asphodeleen K. Taschb. 505.

789. *Erythronium* L. (VI. 1.) Hundszahn. K. syn. 818. Rchb. exc. p. 102. et icon. t. 441. Comp. I. 1. p. 618.

1. *E. Dens-canis* L. K. syn. Rchb. icon. Var. β . niveum. Gebirgswälder u. Boralpen, stellw. im Geb., besonders im südl., Schweiz im Jura bei la Chaux de Fonds, Bois de Butie, Genfersee; Böhmen an d. Sazawa, Sedčera, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Ungarn, Siebenbürgen, Krain, Littoral, Istrien, Dalmatien, Croatien, Kombarbei u. in g. Oberitalien. 4—5. 4

790. *Asphodelus* L. (VI. 1.) Affodill. K. syn. 818. Rchb. exc. p. 117. Comp. I. 1. p. 615.

1. *A. albus* Miller. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 515. Schattige Gebirgsstellen in d. Region d. Buče u. Pechtanne, im südl. Geb., Südtirol bei Roveredo, M. Genoso, Krain, Littoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Kombarbei bei Verona, Piemont; Schweiz Cant. Valais bei Niederborn, am Aletschgletscher u. auf d. Alpen über Lens, Cant. Tessin. 5—6. 4

2. *A. neglectus* Schultes. Rchb. exc. K. syn. edit. I. Visian. Fl. Dalm. Sonnige Felsen im südl. Littoral, Dalmatien auf d. Insel Lesina. 4—5. 4

3. *A. ramosus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 514. *A. microcarpus* Visian. Rchb. exc. et icon. Steinige Hügel im südl. Geb., Südtirol, Ungarn, Littoral, Istrien, Fiume, Dalmatien bei Spalato, Piemont. 3—4. 4

4. *A. fistulosus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 513. *A. ramosus* Sturm. In Oliven- u. Weingärten, Wegen am südl. Littoral, Istrien auf Scoglio grande im Hafen v.

Polá, Dalmatien bei Zara, Ragusa, Sebenico, Spalato, Insel Lesina, Lombardien, Venedig. 4. ☉

791. *Asphodeline* Rchb. exc. p. 116. et icon. *Asphodelus* K. syn. 819.

1. *A. lutea* Rchb. exc. et icon. t. 517. *Asphodelus luteus* L. K. syn. Steinige Hügel, Felsen, im südl. Geb., Südschweiz, M. Gräla im Veltlin; Südtirol M. Balbo, Eittoral, Istrien u. Inseln Beglia, Baccari, bei Fiume, Dalmatien bei Ragusa, Sebenico u., Lombardien. 4—5. 4

2. *A. liburnica* Rchb. exc. et icon. t. 516. *Asphodelus liburnicus* Scopol. K. syn. *A. creticus* Lamk. Schattige Wiesen im südl. Eittoral, Istrien bei Fiume u. Bološca, Insel Beglia, Dalmatien, Insel Pagota, bei Zara, Croatien. 6—7. 4

792. *Anthericum* L. (VI. 1.) Zaunblume. K. syn. 819. Rchb. exc. p. 117. et icon. t. 511 — 512. Comp. I. 1. p. 614.

1. *A. Liliago* L. K. syn. Rchb. icon. *Phalangium* — Lamk. Sonnige, mit Gesträuchen bewachsene Hügel, Felsen, steinige Waldstellen. stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten. Fehlt in Schlesien u. d. Lausitz. 5—6. 4

2. *A. ramosum* L. K. syn. Rchb. icon. *Phalangium* — Lamk. Schattige Hügel, Felsen, Abhänge, stellw. dch. d. g. Geb. 6—7. 4

793. *Paradisica* Mazzucati (VI. 1.) K. syn. 820. *Czackia* Rchb. exc. p. 116. et icon. t. 509. Comp. I. 1. p. 617.

1. *P. Liliastrum* Bertoloni K. syn. *P. hemeroantherioides* Mazzuc. *Czackia Liliastrum* Andr. Nees. Rchb. exc. et icon. K. syn. edit. I. *Anthericum* — L. *Hemeroallis* — L. *Phalangium* — Tratt. Wiesen, Triften d. Alpen u. Gebirge, in d. südl. Kette; Schweiz bei d. Grimsel an d. Maierwand nach d. Rhonegletscher, Cant. Wallis, Sura

auf d. Dole; Südtirol bis z. Orteles, Baldo u.; Kärnthen, Alpe Plecken im Gailthale, Krain, Kombardei, Venedig, Piemont, Oberitalien. 7—8. 4

794. *Ornithogalum* L. (VI. 1.) Vogelftern.

K. syn. 820. Rchb. exc. p. 118. icon. t. 467—473. f. 1019—1032. Comp. I. 1. p. 598.

Erste Rotte. *Ornithogalum* L.

1. *O. sulphureum* R. et Schult. K. syn. Rchb. icon. Bertol. *O. pyrenaicum* Gouan. Bertol. *O. stachyoides* Host. *Anthericum sulphureum* W. et Kit. Bewachsene Gebirge, Hügel, auf Wiesen, stchw. mehr im südl. Geb., besonders auf Kalk; Rheing., Basel, Elßaß bei Pulverheim, Mömpelgard, an d. Saar in d. Flora v. Trier, Bitscher-Rohrbach, bei Sebingen, Wisingen, Aachen, Saargemünd, Schweiz im Jura bei Genf, Cant. Wallis, Tyrol, Ungarn, Vittoral, Croatien, Venedig. 5—6. 4

2. *O. pyrenaicum* L. K. syn. Rchb. icon. Hügel, Weinberge, Wiesen, mit Voriger stchw. mehr im südl. Geb., Rheing., Basel an d. Birs bis Dornbach, Schweiz bei Arau, Orbe, Genf Wallis; Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol, Ungarn, Krain, Vittoral, Kombardei. 6—7. 4

3. *O. stachyoides* Schultes Aiton. K. syn. Rchb. icon. *O. pyrenaicum* β . *stachyoides* DC. Aecker im südl. Geb., Südtirol, Ungarn, Siebenbürgen, Vittoral, Istrien bei Triest, Croatien. 5—6. 4

4. *O. narbonense* L. Rchb. exc. et icon. Visian. Fl. Dalmat. *O. pyrenaicum* Eng. bot. Aecker, grasige Hügel im südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien, Kombardei bei Verona, Venedig u. 5—6. 4

5. *O. arcuatum* Steven. K. syn. Rchb. icon. Destr. in Grasgärten bei Steyer. 6. 4

6. *O. collinum* Gusson. K. syn. Rchb. icon. Bertol. Fl. italic. *O. saxatile* Visian. *O. garganicum* Tenore. Gebirgswiesen, Felsen, stchw. besonders im südl. Geb., Ger-

leben bei Magdeburg; Destr. bei Wien, Krain im Karstgebirge, Vittoral, Istrien, bei Fiume, Duino, Dalmatien. 5—6. 4

7. *O. comosum* L. K. syn. Rchb. icon. *O. pannonicum* Clus. Graßige Sand- u. Kalkfelsen im südl. Geb.; Destr. bei Wien auf d. Heide d. Laaerberges u., Baden auf d. Calvariberg, Mödling auf d. Lichtenstein u. Calenderberg, Vittoral, Istrien, Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien. 5—6. 4

8. *O. umbellatum* L. K. syn. Rchb. icon. Hecker, Wiesen, Triften, stellw. dch. d. g. Geb. 4—5. 4

9. *O. exscapum* Tenore. Visian. Fl. Dalm. Rchb. exc. et icon. Waldhügel in Dalmatien am Ežerna. 5. 4

10. *O. refractum* W. et Kit. K. syn. Rchb. icon. Hecker, Zäune, Weingärten im südl. Geb., Vittoral, Istrien, Venedig, Ungarn bei Pesth. 4—5. 4

11. *O. arabicum* L. Rchb. exc. et icon. Visian. Fl. Dalm. Steinige Orte am südl. Vittoral, Istrien, Dalmatien bei Ragusa, Piemont, Nizza. 4. 4

Zweite Rotte. *Albucea* Reichb.

12. *O. nutans* L. K. syn. *Albucea* — Rchb. exc. et icon. *Myogalum* — Link. Hecker, Wiesen, Weinberge, Zäune, stellw. dch. d. Geb. 4—5. 4

13. *O. chloranthum* Sauter. K. syn. *Albucea chlorantha* Rchb. icon. t. 473. *O. nutans* β . *umbrosum* Britt. Graßgärten in Destr. bei Steyer. 4—5. 4

795. *Gagea* Salisbury. (VI. 1.) Gelbster. K. syn. 823. Rchb. exc. p. 107. et icon. 474—481. Comp. I. 1. p. 592.

1. *G. stenopetala* Rchb. exc. et icon. K. syn. *G. pratensis* R. et Schlt. *Ornithogalum stenopetalum* Fries. Or. *luteum* Hoffm. Or. *pratense* Wahlenb. et R. et Schlt. Var. β . *grandiflora*: *G. Schreberi* Rchb. — γ . *G. pratensis* Koch. *G. pratensis* γ . R. et Schlt. syst. Or. *stenope-*

talum γ . M. et K. Or. pratense Person. *Necker*, *stellw.* dch. d. g. Geb. 4—5. 4

2. *G. arvensis* Schult. *Rchb.* K. syn. *Rchb. icon.* *Ornithogalum arvense* Person. Or. villosum M. v. Bieb. Or. minimum Roth. *Necker*, *angeb.* Orte, dch. d. g. Geb. 3—4. 4

3. *G. bohémica* Schult. K. syn. *Rchb. icon.* Or. bohemicum Zauschner. Or. Zauschner. Pohl. Bemooste Felsen u. Triften d. Gebirge, *stellw.* im Geb., Sachsen, Schlesien bei Troppau, Böhmen an Felsen d. Podbaba bei Prag; Destr. bei Wien am Eaaerberg gegen Simmering. 3—4. 4

4. *G. saxatilis* Koch. K. syn. *Rchb. icon.* Schult. *Ornith. bohemicum* β . saxatile M. et K. Or. bohemicum Gaud. helv. Or. fistulosum Wallr. *G. arvensis* subuniflora *Rchb. exc.* Gebirgsabhänge, Felsen, Hügel, Triften, Heiden, besonders in d. Porphyr-, Mandelstein-, Trapp-, Grauwacke-, Schiefer- u. Kalkformation, *stellw.* im Geb., Rheing., Pfalz bei Dürkheim, Kallstadt, auf d. Donnersberg bei Kirchheimboland, Winnweiler, an d. Nahe bei Kreuznach auf d. Rothenfels, Bingen, Kirn u., Thüringen bei Eisenach an d. Wartburg, bei Aschersleben, Halle, Gotha, Harz, Bernburg; Schweiz Cant. Wallis, bei Branson. 3. 4

5. *G. pygmaea* R. et Schult. *Rchb. icon.* in adnot. Kunth. enum. IV. p. 240. Maly enum. pl. austr. p. 50. *O. pygmaeum* Alschinger. *Gagea gracilis* Welw. *Rchb. icon.* Sonnige Hügel im südl. Littoral, Dalmatien bei Zara. 4

6. *G. Liottardi* Schult. syst. K. syn. *Rchb. icon.* Or. — Sternb. Or. fistulosum Ram. M. et K. Var. β . *G. intermedia* Schleich. *Rchb. icon.* Triften d. Kalkalpen, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Lombardien, Piemont, 5—6. 4

7. *G. spathacea* Schult. syst. K. syn. *Rchb. icon.* Or. — ceum Hayne. Or. Haynii Roth. Or. minimum β . Wahlenb. Haine, Gebüsche, besonders im nördl. Geb., seltener im südl. u. mittl. Geb., Westphalen im Teutoburger Walde, Hannover, Oldenburg, Holstein, Mecklenburg bis Pommern, Sachsen bei Dresden, Dippelsdorf, im Ronne-

wiſer Holze bei Leipzig, Lauſitz, Sondersleben, Belzig, auf d. Brandheide; Deſtr. bei Wien u. in Siebenbürgen. 4—5. 4

8. *G. minima* Schult. syst. K. syn. Rchb. icon. Or. — um L. Or. *Sternbergii* Hoppe. Or. *gracile* Hagen. Haine, Gebüſche, Waldwiefen, ſtellw. dch. d. Geb. bis in d. Alpen, Baiern, Franken, Sachſen, Holſtein, Preußen Königsberg, Memel, Tilsit zc., Schleſien; Deſtr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Galizien, Ungarn u. Lombardei. 4. 4

9. *G. lutea* Schult. syst. K. syn. Rchb. icon. Or. *luteum* β . L. Or. *luteum* β . *sylvaticum* Willd. Or. *sylvaticum* Pers. Or. *Personii* Hoppe, Sturm. Waldwiefen, Gebüſche, ſtellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen, Rheing. Baſel, Elſaß, Vogesen, Baden im Breiſg., bei Raſtatt zc., Naſſau Kreuznach, Saarbrücken, Luxemburg, Aachen, Coblenz nach Weſtphalen bei Dülmen, Darup am Sudfelde zc. bis Preußen, Königsberg, Memel; Deſtr. Böhmen, Mähren, Ungarn, Tyrol u. Lombardei. 4. 4

10. *G. pusilla* Schult. K. syn. Rchb. icon. Or. — um Schmidt. Or. *Clusianum* Tausch. Or. *pannonicum* Clus. Steinige Aecker, Triſten, Waldſtellen, ſtellw. im Geb.; Deſtr. bei Wien auf d. Türkenſchanze, Laaerberg am Rande d. Remiſe, Hügel um Weinhaus, Gatterhölzchen, Böhmen, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen u. Dalmatien. 3—4. 4

796. *Scilla* L. (VI. 1.) Meerzwiebel. K. syn. 825.

Rchb. exc. p. 106. icon. t. 463—466. Comp. I. 1. p. 590.

1. *S. amoena* L. K. syn. Rchb. icon. Schattige Gebirgswiefen im ſüdl. Geb. u. ſtellw. im mittl. Naſſau bei Dieß, Harz bei Wolbeck, Schleſien; Böhmen, Steyermark, Croatien, Ungarn, Lombardei, Oberitalien; auch hin u. wieder in Graſsgärten verwildert. 4—5. 4

2. *S. bifolia* L. K. syn. Rchb. icon. Steinige, graſige Orte in Wälder u. Gebüſchen, an Fellen, ſtellw. dch. d. g. ſüdl. u. mittl. Geb., Rheing. an vielen Orten im Rhein-, Neckar-, Main-, Moſel- u. Saarthale zc. 3—4. 4

3. *S. pratensis* W. et Kit. Rchb. exc. et icon. S.

amethystina Visian. Fl. Dalmat. Wiesen, Tristen im südl. Littoral, Dalmatien bei Zara, Dernis, Ragusa u., Croatien bei Korenicza. 5. 24

4. *S. italica* L. K. syn. Rchb. icon. *S. verna* K. syn. edit. I. *S. Bertoloni* Duby. *S. bifolia* Fl. Dan. *S. umbellata* Red. Cultivirte u. uncultivirte Orte, stchw. im Geb., Rheing., Oberbaden bei Kleinlausenburg, Schweiz bei Bern, Cant. Wallis, Piemont bei Nizza, Ligurien. 3—4. 24

5. *S. autumnalis* L. K. syn. Rchb. icon. *Anthericum autumnale* Scop. Kalkhügel, Weinberge, stchw. besonders im südl. Geb., Rheing., Elsaß bei Orschwyhr, im Kastelwalde bei Colmar; im südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Piemont, Ligurien. 7—8. 24

6. *S. hyacinthoides* L. Rchb. exc. et icon. Gebüsche in Dalmatien bei Sebenico, Ragusa. 3—4. 24

7. *S. comata* Hoffm. Rchb. icon. Bertol. Fl. ital. IV. p. 108. *S. peruviana* L. Hügel im südlichsten Geb., Piemont, Genua außerhalb d. Hafens Degli Angeli. 4—5. 24

8. *S. verna* Hudson. Rchb. exc. et icon. Aecker u. Brachäcker außerhalb d. westl. Grenze an d. Obermosel bei Bruyères, Departement d. Vogesen; F. W. Schulz Cent. 3—4. 24

9. *S. maritima* L. Rchb. exc. et icon. Sonnige, steinige Orte im südlichsten Littoral, Dalmatien, Casteli Andreis bei Sebenico, Toreto bei Spalato, Ragusa, Budua, Cattaro; Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza. 8—10. 24

797. *Allium* L. (VI. 1.) Gauch. K. syn. 826. Rchb. exc. p. 110. et icon. t. 482—508. Comp. I. 1. p. 600.

Erste Rotte. *Allium* Reichb.

1. *A. Victorialis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 508. *A. plantagineum* Lamk. Steinige, grasige Orte d. Alpen, Voralpen u. Hochgebirge, Schweiz, besonders im Jura u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Schwaben, Salzburg u., Jura Creux du Vent, Dole, Chasseral, Cant. Bern u., Rheing.

auf d. Vogesen, Sulzer Ballon, Kastelberg, Baden im Breisgau, Schlesien in d. Sudeten Altvater, Babia Gora, Böhmen, Mähren nach Destr. Tyrol bis in d. südl. Eittoral. 7—8. 4

2. *A. ursinum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 507. *Ophioscorodon* — Wallr. Feuchte Wälder, Gebüsche, an Gebirgsbächen, besonders auf Kalk, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., von d. Schweiz nach Baden, Elsaß, Nassau, Pfalz im Rheing., Saar- u. Moselthale, Kreuznach, Trier, Aachen u. nach Westphalen, Hamburg, Hannover, Holstein nach Preußen bei Königsberg u. 4—5. 4

3. *A. Moly* L. Rchb. exc. et icon. t. 501. *A. aureum* Lamk. Boralpen in Siebenbürgen. 6—7. 4

4. *A. Chamaemoly* L. K. syn. Rchb. icon. t. 501. Sandige Orte im südl. Eittoral, Istrien bei Baruda, Insel Dsero, Fossino; Dalmatien bei Zara, Sebenico, Insel Cefina. 3—5. 4

5. *A. subhirsutum* L. K. syn. Rchb. icon t. 502. *A. ciliatum* Cyrill. Rchb. exc. *A. Clusianum* Retz. *A. subhirsutum* β . Treviran. *A. trifoliatum* Cyrill. Gräßige Hügel im südl. Eittoral, Istrien a. d. Inseln Dsero u. Fossino. Dalmatien bei Spalato, Ragusa, Zara. Trau u. 4—5. 4

6. *A. pendulinum* Tenore. Rchb. exc. et icon. t. 503. Auf d. südlichsten Grenze d. Geb., Piemont, Genua bei Barzana. 4. 4

7. *A. triquetrum* L. Rchb. exc. et icon. t. 503. Im südlichsten Geb., Lombardien bei Verona, Piemont, Ligurien. 3—4. 4

8. *A. neapolitanum* Cyrill. Rchb. exc. et icon. t. 507. *A. album* St. Viagg. *A. laetum* Fl. graec. Steinige Orte, an Mauern, in Olivengärten, am südl. Eittoral, Dalmatien um Trau, Spalato, Lombardien bei Verona; Genua bei De Regri. 3—4. 4

9. *A. atropurpureum* W. et Kit. Rchb. exc. et icon. t. 505. Acker, unter d. Getreide im südl. Geb., Südungarn, Siebenbürgen, Dalmatien bei Spalato, Trau. 7. 4

10. *A. multibulbosum* Jacq. Fl. austr. K. syn.

Rchb. icon. t. 506. *A. nigrum* Red. Lin. K. syn. edit. I. Rchb. exc. et icon. *A. magicum* Curtis. *A. monspessulanum* Gouan. Aecker u. Saatsfelder, stellw. mehr im südl. Geb., Rheing., Bonn zw. Beuel u. Rheindorf; Destr. bei Wien, Tyrol, Dalmatien, Lombardien, Venedig zc. 5. 4

11. *A. roseum* L. K. syn. Rchb. icon. p. 504. *A. illyricum* Jacq. Var. β . *bulbiferum*: *A. roseum* β . DC. Fl. fr. *A. carneum* Bertolon. *A. ambiguum* Sibth. et Smith. *A. Tenorii* Spreng. Gräßige Hügel, Wein- u. Olivengärten, Aecker am südl. Littoral u. Inseln, Istrien, Friaul bei Pirano, Fiume, Insel St. Andrea, Dalmatien bei Zara, Ragusa, Sebenico, Piemont, Genua, Nizza zc. 4—5. 4

12. *A. pedemontanum* Willd. Rchb. exc. et icon. t. 504. *A. grandiflorum* Rchb. exc. *A. nigrum* Allion. pedm. Alpen u. Voralpen im südlichsten Geb., Lombardien am Comer-See, auf d. Corni di Conzo zc., Piemont, Oberitalien. 7—8. 4

13. *A. fallax* Don. Monogr. K. syn. *A. angulosum* Jacq. Rchb. exc. *A. angulosum* α . minus Treviran. *A. acutangulum* β . *montanum* et γ . *calcareum* M. et K. *A. senescens* Wim. et Grab. *A. montanum* Schmidt. böhm. Rchb. icon. t. 500. *A. angulosum* β . *petraeum* DC. Gaud. helv. *A. serotinum* Schleich. Felsen d. Kalkgebirge u. Voralpen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Schaffhausen, Basel, am Main im Föhrenwalde bei Offenbach unweit Frankfurt, Nassau, Hessen, Thüringen, Baiern bei Baireuth, Berlin, Preußen im Weichselgebiete bei Thorn, Marienburg zc., Schlesien; Böhmen, Mähren nach Destr., Ungarn; Schweiz u. längs der Alpenkette nach Tyrol zc. 7—8. 4

14. *A. acutangulum* Schrad. Willd. K. syn. Rchb. icon. t. 500. *A. angulosum* Pollich. *A. angulosum* β . *majus* Trevir. Feuchte Wiesen, Triften, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Schaffhausen, Baden bei Constanz am Bodensee zc., Elsaß nach Landau, Speier, Dürkheim, Maxdorf, Frankenthal, Worms, Mainz bei d. Hartmühle, Laubenheim, Mombach, Bingen, Nassau bei Destrach zc., Neckarau, Darmstadt, Baiern, Schwaben,

Thüringen, Harz, Sachsen, Hannover 2c.; Schweiz bei Genf, Nyon; Destr. Mähren, Tyrol, Ungarn, Lombardei. 7—8. 4

15. *A. flavescens* Besser. Rchb. exc. et icon. t. 499. *A. ammopilum* Heuff. Flora. Grasige Sandhügel, Ungarn im Banat bei Grebenacz in Cuschera. 6. 4

16. *A. Kermesinum* Rchb. Fl. germ. exsicc. Nr. 2141. et icon. t. 498. Alpen in Krain, Alpe Rosick bei Grebui-Berch u. Alpe Mokrizza-Storischeh. 7. 4

17. *A. moschatum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 498. *A. setaceum* W. et Kit. Trockene Hügel, Kalkfelsen im südl. Vittoral, Istrien bei Fiume, Dignano, Dalmatien bei Zara, Ragusa, Cattaro, Croatien, Ungarn. 7—8. 4

18. *A. saxatile* M. v. Bieb. K. syn. Rchb. Fl. germ. exsicc. et icon. t. 497. Kalkfelsen d. Gebirge, im südl. Geb., Krain, am südl. Abhange d. Karstes, M. Spaccato; Vittoral, Istrien, Dalmatien auf d. M. Svilaja gegen Dernis, M. Biocovo u. d. Gebirgen um Narenta. 9. 4

19. *A. ochroleucum* W. et Kit. K. syn. Rchb. icon. t. 498. *A. ambiguum* DC. *A. ericetorum* Thore. *A. appendiculatum* Ramond. Steinige Orte d. Kalkgebirge im südl. Geb., Steyermark im Giller-Kreis an d. Save, Krain, Idria, Laibach auf d. Karst, Südtirol am Gardasee, Vittoral, Istrien, Croatien, Siebenbürgen u. Venedig. 7—8. 4

20. *A. suaveolens* Jacq. icon. K. syn. Rchb. icon. t. 499. Moorige, sumpfige Wiesen d. Gebirge, stellw. im Geb., Rheing., Oberbaden bei Constanz, Schwaben, Baiern im Erdinger Moos bei Freissing, Dachau im Memminger Ried; Südschweiz Cant. Wallis bei Zermatten; Destr. zw. Moosbrunn u. Himberg bei Wien, Südtirol Valle di Vestino, Krain, Vittoral, Istrien bei Monfalcone, Ungarn, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

21. *A. strictum* Schrader. K. syn. Rchb. icon. *A. reticulatum* Presl. *A. volhynicum* Besser. *A. suaveolens* Gaud. helv. *A. microcephalum* Tausch. Felsen d. Kalkgebirge, stellw. im Geb., Hessen auf d. Bielsteine zw. Alungen

u. d. Meißner; Kyffhäuser; Böhmen am Kugelbad bei Prag, Tyrol, Krain. 7. 4

Zweite Rotte. *Porrum* Reichb.

22. *A. sativum* L. K. syn. *Rchb. icon. t. 488. Porrum* — *Rchb. exc. »Knoblauch«, allgemein cultivirt. 7—8. 4*

23. *A. Ophioscordon* Link. Don. Monogr. K. syn. *Porrum* — *Rchb. exc. All. controversum* Schrader. *Rchb. icon. t. 488. Cultivirt als Rosambolle, u. stellw. im Geb. verwildert. 7—8. 4*

24. *A. Porrum* L. K. syn. *Rchb. icon. t. 489. Porrum communis* Bauh. *Rchb. exc. Allgemein cultivirt u. im südl. Geb. stellw. verwildert. 6—7. 4*

25. *A. Ampeloprasum* L. K. syn. *Rchb. icon. t. 489. Acker, Weinberge, Wege, stellw. mehr im südl. Geb., Rheing., Basel bei Wiesa, Grenzach u. Neudorf; im südl. Littoral, Dalmatien, Croatien, Ungarn, Lombard. 6—7. 4*

26. *A. amethystinum* Tausch. Comp. I. 1. p. 611. *Porrum* — *Rchb. exc. Am südl. Littoral, Dalmatien bei Ragusa, Zara, Sebenico, Croatien. 6—7. 4*

27. *A. rotundum* L. K. syn. *Rchb. icon. t. 492. A. Ampeloprasum* β . Trevir. *A. Ampeloprasum* W. et Kit. *A. Waldsteinianum* Don. *Porrum* — *Rchb. exc. Steinige Acker, Weinberge, sonnige Raine, Dämme, stellw. im südl. u. im mittleren Geb., Rheing., Basel bei Wyl u. Grenzach, Baden bei Stühlingen, Breisg., Schwefingen beim Relaishaus, Mannheim, Pfalz, Landau, Speier, Dürkheim, Westhofen, v. Bingen Nassau bis Bonn, Einz. u. Uhrgebirgen; an d. Nahe bei Laubenheim, Kreuznach bis Oberstein, Kirn, Oberwesel, Baiern, Schwaben, am Main bis Würzburg, Frankfurt, Wertheim, Thüringen, Jena; Elsaß auf d. Isteiner Klotz; Schweiz bei Genf; Brandenburg, Schlesien, Frankfurt a. d. D.; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Ungarn, Siebenbürgen u. Dalmatien. 7—8. 4*

28. *A. sphaerocephalum* L. K. syn. *Rchb. icon.*

t. 492. *A. veronense* Pollini. Sonnige Hügel, bewachsene Felsen, Weinberge, Acker, Felder, Ufer, stellw. dh. d. g. Geb. mit *A. rotundum*, Rheing., stellw. häufig v. Basel bis Godesberg bei Bonn u.; Baiern, Schwaben, Schlesien; Destr. u. 6—7. 4

29. *A. crinitum* Tausch. Comp. I. 1. p. 614. Porrum — Rchb. exc. in add. Nr. 750 b. In Destr. 4

30. *A. margaritaceum* Sibth. Visian. Fl. Dalm. Rchb. icon. t. 491. Bertoloni Fl. italic. *A. guttatum* Steven. Schult. 53. Am südl. Eittoral, Dalmatien bei Nagusa-vecchia. 7. 4

31. *A. acutiflorum* Loisl. Schult. Rchb. icon. t. 491. Bertol. Fl. ital. Am südlichsten Eittoral, Lombard bei auf d. Gebirgen am Comersee; Piemont am Montalban bei Nizza. 6. 4

32. *A. vineale* L. K. syn. Rchb. icon. t. 490. *A. arenarium* Fries. Lin. Porrum — Rchb. exc. Var. β . *cap-suliferum*: *A. descendens* K. syn. edit. I. non Lin. — γ . *A. compactum* Thuill. Sandige Hügel, Weinberge, Acker, Brachfelder, dh. d. g. Geb. 6—7. 4

33. *A. descendens* L. Rchb icon. t. 493. *A. sphaerocephalum* β . Treviran. Porrum descendens Rchb. exc. Gebirgswiesen am südl. Eittoral, Istrien am Karst bei Triest, Oberitalien. 6—7. 4

34. *A. Scorodoprasum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 490. *A. arenarium* Wallr. Smith. etc. Porrum Scorodoprasum Rchb. exc. Wiesen, Waldbirsten, Gebüsch, stellw. dh. d. Geb., Rheing., Basel, Baden bei Stühlingen, Neckarauer Wald, Rohrbach bei Handschuhsheim, Mannheim, Heidelberg, Darmstadt, Nassau, Elsaß, Frankenthal, Alzei, Bingen, Kreuznach, Bonn u., Baiern, Thüringen, Sachsen, Hamburg, Hannover, Mecklenburg, Preußen, Wittenberg, Schlesien; Schweiz Cant. Zürich bei Bülach, Egglisau u.; Destr. Böhmen, Mähren, bis in d. Lombard. 6—7. 4

Dritte Rotte. *Codonoprasum* Reichb.

35. *A. oleraceum* L. K. syn. *Rehb. icon. t. 487.*
Codonoprasum — *Rehb. exc. Var. β. A. carinatum* Pollich.
A. oleraceum β. campanulatum Fries. Gelber, Ketter,
 Brachen, Raine, an Zäunen, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

36. *A. carinatum* L. K. syn. *Rehb. icon. t. 482.*
A. violaceum Willd. *Rehb. exc. et icon. t. 482.* *A. mon-*
tanum β. Visian. A. flexum W. et Kit. *Rehb. exc. A.*
flexuosum Host. *Var. β. capsuliferum: A. montanum*
Smith, Sibth. A. montanum α. Visian. Fl. Dalm. A. pul-
chella Don. *Rehb. icon. t. 483. A. paniculatum* *Rehb.*
Red. Host. Bewachsene Hügel, Gebüsche, Triften, stellenw. dch.
d. südl. u. mittl. Geb., Basel nach Elsaß bei Straßburg,
Pfalz, Speier auf d. hohen Rheindamm bei Altlussheim,
Belgien, Hamburg an d. Elbe, Schlesien, Schwei; besonders
Var. β. bei Neuchatel, Neuville, Cant. Wallis; Destr. Wien
bei Weiblingbach, Ralksburg, bei Himberg auf Moormiesen,
Moosbrunn, Littoral, Dalmatien, Croatien, Lombardei. 6—7 4

37. *A. asperum* Don. *Rehb. icon. t. 483. A. cari-*
natum *Rehb. pl. crit. Fl. germ. exsicc. 559. Im südl.*
Throl bei Roveredo in Fassa u. Triemme. 7. 4

38. *A. flavum* L. K. syn. *Rehb. icon t. 485. Var. β.*
flavo-roseum: A. nebrodense Gusson. Buschige Felsen,
 Weinberge, mehr im südl. Geb.; Destr. Mähren, Südtirol,
 Dalmatien, Croatien; *Var. β. in Dalmatien. 7—8. 4*

39. *A. pallens* L. K. syn. *Rehb. icon. t. 484. Co-*
donoprasum — *Rehb. A. paniculatum* K. syn. edit. I.
 Sonnige, sterile Hügel am südl. Littoral, Istrien bei Triest
 im Thale Rozzol, Insel Iossina, um Dolina, Dalmatien bei
 Ragusa, Sebenico, Cattaro, Ungarn, Siebenbürgen, Venedig,
 Piemont, Nizza. 7—8. 4.

40. *A. fuscum* W. et Kit. *Rehb. exc. et icon. t. 485.*
 Ralkfelsen am südl. Littoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei,
 Ungarn im Banat. 7. 4

41. *A. cornutum* Clementi iter. Dalm. Visian. Fl.

Dalm. I. p. 139. Maly enum. pl. austr. p. 56. Trockene Abhänge im südl. Littoral, Dalmatien bei Budua. 4.

42. *A. intermedium* DC. Rchb. icon. t. 486. Visian. Fl. Dalm. Codonoprasum — Rchb. exc. p. 114. *A. incarnatum* Hornem. Steinige Orte, unter Gebüsch, an Zäunen am südl. Littoral, Dalmatien um Zara, Dernis, Sebenico, Promina u. Salona. 7—8. 4

43. *A. tenuiflorum* Tenore. Visian. Fl. Dalm. I. p. 138. Maly enum. pl. austr. p. 56. Sonnige Orte im südl. Geb., Dalmatien. 4

44. *A. longispathum* Red. Rchb. icon. t. 487. Codonoprasum — Rchb. exc. *A. pallens* bot. Mag. Ungarn im Banat. 7. 4

45. *A. paniculatum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 484. Sonnige Hügel im südl. Littoral, Istrien auf d. Insel Brioni, Dalmatien bei Zara, Salona, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

Vierte Rotte. *Schoenoprasum* Koch. syn.

46. *A. Schoenoprasum* L. K. syn. Rchb. icon. Var. β . *alpinum* Gaud. helv. *A. roseum* Kroker. *A. foliosum* Clarion. *A. sibiricum* Willd. Rchb. exc. et icon. Feuchte, steinige Orte, Ufer, Gebirgswiesen bis in d. Alpen, stellw. im g. südl. u. mittl. Geb., Rheing., von d. Schweiz Bodensee bis Coblenz, Linz, Beuel, Bonn, Mosel aufwärts, stellw. häufig bis Trier, Luxemburg, Hamburg, Schwaben, Baiern, Franken, Hessen, Thüringen, Harz, Schlesien, Sachsen an d. Elbe; Var. β . Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Oestr. Tyrol, Kärnthen, Krain zc. bis Ungarn u. in d. Lombardei; auch allgemein als Schnittlauch cultivirt. 6—7. 4

47. *A. globosum* M. v. Bieb. Rchb. exc. in add. et icon. t. 497. Ungarn bei Pesth. 6. 4

48. *A. fistulosum* L. K. syn. Rchb. icon. *A. altaicum* Pall. Culturpflanze »Winterzwiebel«. 6—7. 4

49. *A. Ascalonicum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 491. Culturpflanze »Schalotte«, Weinberge im südl. Littoral, Istrien bei Fiume zc. verwilbert. 7—8. 4

50. *A. Cepa* L. K. syn. Rchb. icon. Culturpflanze
»Sommerzwiebel-Bolle«. 7—8. 2

III. **Gruppe.** Hemerocallideen R. Brow. K. syn.
K. Taschb. 516.

798. *Hemerocallis* L. (VI. 1.) Tagblume. K.
syn. 833. Rchb. exc. p. 115. et icon. t. 510. Comp. I.
1. p. 618.

1. *H. flava* L. K. syn. Schattige, sumpfige Orte,
Ufer, Gräben, stellenw. im südl. Geb., Baiern bei München
in d. Nähe d. Hirschau, Schweiz Cant. Wallis, Steyermark,
Tyrol, Kärnthen, Krain bei Laibach, Ungarn, Vittoral, Istrien,
Siebenbürgen u. Venedig. 6. 2

2. *H. fulva* L. K. syn. Steinige Gebirgswiesen, stellenw.
mehr im südl. Geb., Schweiz Solothurn bei Buchwil, Win-
terthur, Cant. Zürich, Canton Wallis bei Aulen; Tyrol,
Salzburg, Kärnthen, Krain, Siebenbürgen, Lombardien, Ve-
nedig. 7—8. 2

799. *Endymion* Dumort. (VI. 1.) Endymie. K.
syn. 834. *Agraphis* Link. Rchb. exc. p. 105. et icon.
Comp. I. 1. p. 589.

1. *E. nutans* Dum. K. syn. *Hyacinthus non scriptus*
L. *Scilla nutans* Smith. *Agraphis nutans* Lk. Rchb. exc.
et icon. t. 461. Schattige Laine, Gebüsche, stellenw. doch sel-
ten im Geb., Rheing. im Walde bei Rödrenzig unweit Jülich
Flora v. Aachen; Belgien, Westphalen bei Eßfeld, Schweiz
bei Winterthur, im südl. Vittoral u. in d. Lombardien bei
Mailand. 5. 2

2. *E. patulus* * *Agraphis* — la Desf. Rchb. exc. et
icon. t. 462. *Hyacinthus spicatus* Moench. Schweiz in d.
Gegend v. Chamouny u. in Belgien. 3—4. 2

800. *Uropetalum* Ker. (VI. 1.) Spigghyacinthe.
Rchb. exc. p. 105. Comp. I. 1. p. 588.

1. *U. serotinum* Ker. Rchb. icon. t. 459. *Hyacinthus* — *us* L. *Lachenalia* — a Willd. Hügel am südlichsten Littoral, in Ligurien. 6. 2

801. *Bellevalia* Lapeyr. (VI. 1.) *Bellevalie*.

Rchb. exc. p. 105. Comp. I. 1. p. 588.

1. *B. romana* Rchb. exc. et icon. t. 458. *B. operculata* et *B. appendiculata* Lapeyr. *Hyacinthus romanus* L. Host. *Scilla romana* bot. Mag. Grasige, mit Gesträuche bewachsene Orte im südlichsten Littoral u. auf d. Inseln, Dalmatien, Küsterränder am Diklo bei Zara, Lombardien, Venedig. 4—5. 2

2. *B. dubia* Rchb. exc. et icon. t. 458. *Hyacinthus* — Gusson. Bewachsene Orte im südl. Littoral, Dalmatien auf d. Insel Vegina, Ligurien. 4. 2

802. *Hyacinthus* L. (VI. 1.) *Hyacinthe*. Rchb.

exc. p. 105. Comp. I. 1. p. 587.

1. *H. amethystinus* L. Rchb. exc. et icon. t. 460. In Croatien auf d. Berge Capela u. Pleschiviza. 3—4. 2

2. *H. orientalis* L. Rchb. exc. et icon. t. 460. Felsen am südl. Littoral, Dalmatien bei St. Girolamo, M. Marian über Spalato, Piemont, Nizza. 4—5. 2

3. *H. pallens* M. v. Bieb. Rchb. pl. crit. et icon. *Hyacinthus* — Visian. Fl. Dalm. *Muscari* — Fisch. Felsenspalten in Dalmatien über Breno bei Ragusa u. in Galizien. 5—6. 2

803. *Muscari* Tournef. (VI. 1.) *Bisamhyacinthe*.

K. syn. 834. Rchb. exc. p. 104. Comp. I. 1. p. 586.

1. *M. comosum* Miller. K. syn. Rchb. icon. t. 457. *Hyacinthus* — *us* L. Necker, Brachfelber, Weinberge, stellw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., nördlich bis Quedlinburg, Rheing. an vielen Orten, v. Basel nach Elsaß, Baden, im Breisg. bei Freiburg, Rastatt, Karlsruhe, Schwegingen, Pfalz bei Landau, Mainz, Bingen, Nassau bei Wiesbaden, Winkel, Kreuznach, Oberwesel,

Boppart, Coblenz, Obermosel, Trier, Luxemburg u., Schwaben, Baiern, Thüringen, Sachsen, Schlesien n. Destr. u. 5—6. 4

2. *M. racemosum* Mill. K. syn. Rchb. icon. t. 456.

Hyacinthus — us L. Aecker, Weinberge, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., von Basel nach Baden, im Breisg., bei Durlach, Bruchsal, Mannheim, Elsaß bis Marxdorf, Bingen, Nassau bei Hochheim, Bieberich, Kreuznach, Boppart, Coblenz, Andernach, Neuwied u., Schwaben, Baiern, Franken, Sachsen, Westphalen, Hannover bei Göttingen, Schwarzburg bei Frankenhäusen, Oberlausig, Schlesien u. in g. Destr. bis in d. südl. Littoral. 4—5. 4

3. *M. botryoides* Mill. K. syn. Rchb. icon. t. 456.

Hyacinthus — L. Aecker, Brachfelder, Weinberge, stchw. dch. d. g. Geb. bis in d. südl. Littoral, Rheing., Elsaß, Württemberg, Baden bei Schwetzingen, Mannheim, am Main von Frankfurt bis Würzburg, Pfalz bis Mainz, Bingen, Nassau, Boppart Coblenz, Andernach, Königswinter, Nahegegend von Kreuznach bis Oberstein, Westphalen, Franken, Thüringen, Arnstadt, Halle, Baiern bei München, Schweiz bei Schaffhausen, Solothurn, Basel; Destr. 4—5. 4

IV. Gruppe. Abameen Koch. K. Taschb. 517.

804. *Narthecium* Moehring. (VI. 1.) Beinfeil.

K. syn. 834. Rchb. exc. p. 116. Comp. I. 1. p. 573.

1. *N. ossifragum* Hudson. K. syn. Rchb. icon.

t. 421. *N. anthericoides* Hoppe. *Anthericum ossifr.* Lin.

Abama — DC. Moorwiesen, sumpfige Torfgründe, stchw. besonders im nördl. Geb., Rheing., Malmehy Flora v. Trier, Luxemburg, Aachen in allen Torfsümpfen d. Hohen Wonn, Schneefel, Niederrhein bei Goch, dch. Westphalen nach Hamburg, Hannover, Oldenburg, Lüneburg bis Holstein, Schleswig, Bremen, Schlesien; Böhmen, Galizien, Ungarn. 7—8. 4

Hunderteinunddreißigste Ordnung. Colchicaceen.

DC. K. syn. 835. T. Taschb. 517. Juncaceae pars Rehb. exc. p. 97. et icon. 5. Bd. t. 420—428.

805. *Bulbocodium* L. (VI. 1.) Lichtblume. K. syn. Rehb. exc. et icon. t. 428. Comp. I. 1. p. 619.

1. *B. vernum* L. K. syn. Wiesen u. grasige Nadelholzwälder, Südschweiz Cant. Wallis bei Branson, la Barme u. Montorge, Ungarn bei Debreczin. 3—4. 4

806. *Colchicum* L. (VI. 3.) Zeitlose. K. syn. 835. Rehb. exc. p. 97. Comp. I. 1. p. 634.

1. *C. autumnale* L. K. syn. Rehb. icon. t. 426. Var. β . *vernum*: *C. vernum* Schrank. *C. vernale* Hoffm. *C. praecox* Spenn. *C. patens* Schultz. Etwas feuchte Wiesen im g. südl. u. mittleren Geb. 8—10. 4

2. *C. alpinum* DC. K. syn. Rehb. icon. t. 425. *C. montanum* Allion. *C. autumnale* γ . Bertol. Wiesen, Triften in d. Alpenthälern d. südl. Kette; Schweiz Cant. Wallis, Nicolaithal über Zermatten u. am Matterhorn, St. Bernhard nach Piemont, Lombardei u. Savoyen. 7—8. 4

3. *C. arenarium* W. et Kit. K. syn. Rehb. icon. t. 425. Sandige, mit Gras bewachsene Hügel im südl. Geb.; Istrien um Fasanna, Ungarn im Pesther-Comitat. 9—10. 4

4. *C. montanum* L. Bertol. Rehb. exc. et icon. t. 424. *C. Bertolonii* Steven. Var. β . *C. Cupani* Gusson. Hügel in Dalmatien bei Ragusa, Zara, Sebenico u. Spalato. 9—10. 4

5. *C. Bivonae* Gussoni. Visian. Fl. Dalm. Bertol. Fl. ital. Rehb. icon. t. 427. *C. variegatum* Bivon. *C. autumnale* Visian. strip. Dalm. *C. latifolium* Sibth. Ger. Rehb. exc. in add. *C. speciosum* Steven. Gebirgswiesen im südl. Geb., Dalmatien auf d. Bellebith u. auf d. Biofovo, um Ragusa, Salona, Darnis. 9—10. 4

807. *Veratrum* L. (VI. 3.) Germer. K. syn. 836.

Rechb. exc. 97. Comp. I. 1. p. 636.

1. *V. nigrum* L. K. syn. Rechb. icon. t. 423. Gebirgswälder, besonders auf Kalk, stellw. im südl. Geb., Destr. bei Wien auf d. Geisberg, d. Anninger, bis in d. Thal bei Brühl, Baden, Steyermark, Kärnthen, Krain bei Görz, Südtirol, M. Generoso; Schweiz Cant. Tessin; Ungarn, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

2. *V. album* L. K. syn. Rechb. icon. t. 422. Var. β . *V. Lobelianum* Bernh. *V. album* β . *viridiflorum* M. et K. Wiesen, Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. Tyrol u. in d. Gebirgen d. Vogesen im Elsaß, M. Ballon, d. Jura in Württemberg, Oberbaden, in d. Sudeten in Schlesien, Böhmen, Karpathen in Mähren u. 7—8. 4

808. *Tofieldia* Huds. (VI. 3.) Tofieldie. K. syn.

836. Rechb. exc. p. 98. Comp. I. 1. p. 637.

1. *T. calyculata* Wahlenb. K. syn. Rechb. icon. t. 420. *T. palustris* Hoppe et Sternb. *T. alpina* Smith. Host. *Anthericum calyculatum* α . Lin. An. *Pseudo-Asphodelus* Jacq. *Narthecium iridiflorum* Vill. *Heiteria anthericoides* Schrank. *Helonias borealis* Willd. *Hebelia allemanica* et *collina* Gmel. bad. Sumpfige u. feuchte Moorswiesen d. Alpen, Boralpen, Gebirge bis in d. Niederungen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., v. Basel dch. Elsaß, Baden im Breisg., Kaiserstuhl, Pforzheim, Durlach, Oberweier, Wiesloch, Hasloch, Igelheim, Schriesheim, Weinheim an d. Bergstraße bis Frankfurt a. M., Thüringen bei Halle, Sachsen bei Leipzig; Holstein, Preußen um Thorn, Berlin, Schlesien bei Frankfurt a. d. O.; Württemberg, Baiern an d. Donau bis Destr. Mähren, Böhmen; Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol u. 7—8. 4

2. *T. glacialis* Gaud. helv. Rechb. icon. t. 420. *T. palustris* β . *capitata* Hoppe. Moorswiesen d. Hochalpen,

Schweiz auf d. St. Gotthard; Salzburg unter d. Kammerhorn, Kärnthen. 7—8. 4

3. *T. borealis* Wahlenb. K. syn. Rchb. icon. t. 420. *T. alpina* Hoppe et Sternb. *T. palustris* Hudson. Smith. *Anthericum calyculatum* β . Lin. Sumpfige Orte d. Alpen an d. Grenze d. immerwährenden Schnees, Gletscherränder; Schweiz im Cant. Wallis auf d. Simplon u. im Nicolaithale über Zermatten; Destr. Steyermark, Kärnthen, Tyrol u. Salzburg. 8. 4

Hundertzweiunddreißigste Ordnung. Juncaceen.

Bartl. K. syn. 837. K. Taschb. 518. Rchb. exc. p. 90 et icon. 4. Bd. t. 385—418.

809. *Aphyllanthes* L. (VI. 1.) Jominelle.

Rchb. exc. in add. 140. ¹¹. Comp. I. 1. p. 573.

1. *A. monspeliensis* L. Rchb. exc. et icon. t. 418. f. 926. Steinige, sonnige Orte im südlichsten Geb., Piemont, Savoyen bei Chambery. 4—5. 4

810. *Juncus* L. (VI. 1.) Binse. K. syn. 837. Rchb. exc. p. 90 et icon. Comp. I. 1. p. 553.

1. *J. maritimus* Lamk. K. syn. Rchb. icon. t. 402. *J. acutus anglicus* Moris. Seeküsten d. Nordsee u. im südl. Littoral; Ostfriesland u. Inseln, Mecklenburg, Holstein u.; Istrien, Dalmatien, Croatien, Venedig u. 7—8. 4

2. *J. acutus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 401. *J. pungens* Moris. *J. subulatus* Forsk. Schlammige, feuchte Orte am südl. Littoral, Istrien, Ungarn, Dalmatien, Kombarbei u. Venedig. 5—6. 4

3. *J. Jacquini* L. K. syn. Rchb. icon. t. 392. *J. biglumis* Jacq. *J. atratus* Lamk. Feuchte, grasige Orte d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Destr. bis in d. Kombarbei. 6—7. 4

4. *J. conglomeratus* L. K. syn. Rehb. icon. t. 409. *J. communis* α. Meyer. Var. β. *effusus* Hoppe. *J. effusus* M. et K. Nasse u. sumpfige Orte in Gräben, an Teichen, feuchten, sandigen Tristen u., dch. d. g. Geb. 5—6. 24

5. *J. fistulosus* Gusson. Fl. Sicu. Bertol. Fl. ital. Rehb. icon. t. 409. Feuchte Orte, Schwarzburg-Rudolstadt um Rönitz, Sachsen um Rößterwitz bei Dresden. 6—7. 24

6. *J. effusus* L. K. syn. Rehb. icon. t. 413. *J. communis* β. Meyer. Var. β. *J. effusus* β. *compacta* Hoppe. Feuchte, nasse u. sumpfige Orte dch. d. g. Geb. 6—7. 24

7. *J. diffusus* Hoppe. K. syn. Rehb. icon. t. 414. *J. conglomeratus glaucus* Lasch. Wassergräben, stellw. im Geb., Thüringen, Hamburg, im Steinbecker Moor nach Holstein bei Kiel, Mark Brandenburg bei Driesen, einzeln bis Ostpreußen unter d. Eltern, Baiern, Donaufauf bei Regensburg; Tyrol, Schweiz bei Appenzell. 6—7. 24

8. *J. glaucus* Ehrh. K. syn. Rehb. icon. t. 415. *J. effusus* Pollich. *J. inflexis* Leers. *J. tenax*. Poir. Nasse, sandige Orte, Sümpfe, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. 24

9. *J. paniculatus* Hoppe. K. syn. Rehb. icon. t. 412. *J. Angelisii* Tenore. Im südl. Littoral am Adriatischen Meere. 7—8. 24

10. *J. balticus* Willd. K. syn. Rehb. icon. t. 411. *J. helodes* Link. *J. glaucus* β. *littoralis* Wahlenb. An d. sandigen Küste d. Nord- u. Ostsee, Preußen bis Memel, Danzig. 7—8. 24

11. *J. inundatus* Dreier in Kroyers Annal. Rehb. icon. t. 410. f. 916. Im Flugsande auf d. Dünen v. Jütland bei Rorß. 24

12. *J. arcticus* Willd. K. syn. Rehb. icon. t. 410. *J. acuminatus* Balb. *J. effusus* β. Lin. *J. pauciflorus* Schleich. Urgebirgsfelsen d. Hochalpen auf Glimmerschiefer d. südl. Kette; Südschweiz auf d. Breuil am südl. Abhange d. Matterhorns, am Mat-Mat-See, Monte Moro oberhalb Saas im Cant. Wallis; Südtirol auf d. Schleehorn, auf

b. Hochebene d. Schlern, nördl. von d. Capelle im Daronthale im Fassa. 6—7. 4

13. *J. filiformis* L. K. syn. *Rehb. icon. t. 412.* Var. *β. foliosus.* Sumpfige u. nasse Moorniesen, besonders in Gebirgsgegenden bis in d. Alpen u. nördl. in d. Niederungen nach Preußen, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Oberbaden im Breisg. auf d. Feldberg, Schwarzwald, Herrnwiese, auf d. Kniebis, Hengster bei Heusenstamm; Hessen bei Darmstadt, Nassau, Westerwald bei Dierdorf, Laacher-See bei Coblenz, Eurenburg, Eupen bei Aachen u. 6—7. 4

14. *J. stygius* L. K. syn. *Rehb. icon. t. 392.* Sumpfige Orte d. Alpen, stchw. Baiern auf d. Alpe Seck bei Güssen im Algau in d. Niederungen bei Boebing u. Rothembuch in Oberbaiern, Schweiz bei Einsiedel. 7—8. 4

15. *J. castaneus* Smith. K. syn. *Rehb. icon. t. 393.* *J. triceps* Rostk. Feuchte Moorniesen d. Hochalpen; Schweiz Cant. Graubünden bei Brin; Destr. Tyrol in d. Reichenau, Salzburg, Rastatter-Tauern, Steyermark, Kärnten, Krain. 7—8. 4

16. *J. triglumis* L. K. syn. *Rehb. icon. t. 392.* Sumpfige, nasse Moorniesen d. Urgebirgsalpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Tyrol, Destr. Steyermark, Kärnten, Krain, Lombard. 7—8. 4

17. *J. trifidus* L. K. syn. *Rehb. icon. t. 394.* Etwas feuchte Orte d. Urgebirgsalpen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Destr. u., dann auf d. Sudeten in Schlesien, Böhmen nach Mähren u. 7—8. 4

18. *J. Hostii* Tausch. K. syn. *J. monanthos* Jacq. *Rehb. exc. et icon. t. 394.* Etwas feuchte Felsen d. Kalkalpen; Baiern, Destr. Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnten, Siebenbürgen u. Vittoral. 7—8. 4

19. *J. triandrus* Gouan. K. syn. *Rehb. icon. t. 391.* Vorgebirge im südl. Vittoral, Istrien auf d. Insel Rossino. 4—5. 4

20. *J. pygmaeus* Thuill. *Rehb. exc. et icon. t. 391.*

Küste d. Nordsee auf d. Dünen bei Gylt, auf d. Insel Gylt um Gyltstätt in Holstein. 6—7. ☉

21. *J. capitatus* Weigel. K. syn. Rchb. icon. t. 391. *J. ericetorum* Pollich. *J. gracilis* Roth. Sandige, feuchte Orte, Triften, Wiesen, Felder, stchw. dch. d. mittl. u. nördl. Geb., seltner im südl., Rheing., von Basel auf d. g. Rheinfläche, Baden, Elsaß bei Colmar, Niederbrunn, Hagenau, Hasloch, Speier, Dürkheim, Worms, Zweibrücken, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Aachen nach Belgien dch. Westphalen nach d. nördl. Deutschland, nach Preußen, Königsberg, Memel, Tilsit, Schlesien, Böhmen, Tyrol u. Lombardien, aber nicht in Oberbayern u. Oestr., Südschweiz selten. 6—8. ☉

22. *J. obtusiflorus* Ehrh. K. syn. Rchb. icon. t. 404. *J. bifolius* Hoppe. *J. retroflexus* Rafn. *J. divergens* K. et Ziz. *J. Neesii* Heller. Sumpfige Wiesen, an Teichen, Gräben, Pfützen, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. fast allenthalben u. in allen Nebenthälern. 7—8. 4

23. *J. sylvaticus* Reichard. K. syn. *J. acutiflorus* Ehrh. Rchb. exc. et icon. t. 406. *J. articulatus* γ . Lin. *J. subnodulosus* Schrank. Var. β . *J. brevirostris* Nees v. E. *J. acutiflorus* β . multiflorus Weihe. — γ . *pallens* Meyer. — δ . *macrocephalus*. Feuchte, sumpfige Wiesen, Gräben, Teichen, Wälder, Gebüsche, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

24. *J. lamprocarpus* Ehrh. K. syn. Rchb. icon. t. 405. *J. aquaticus* Roth. *J. ascendens* Host. *J. foliosus* Hoppe. *J. articulatus* α . et β . Lin. Var. β . *fluitans*: *J. lamprocarpos* γ . et ϵ . Meyer. Feuchte u. sumpfige Orte, an Gräben, Teichen, Ufern, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

25. *J. atratus* Kroker. K. syn. Rchb. icon. t. 407. *J. melananthos* Rchb. exc. Sumpfige Wiesen, stchw. im Geb., Rheing. bei Speier, Sachsen bei Leipzig, Magdeburg, Scheiting bei Breslau Schlesien; Böhmen, Oestr., Galizien. 7—8. 4

26. *J. nigricans* Dreier. Rchb. icon. t. 407. f. 911. *J. atricapillus* Dreier. *J. heptangulus* Petermann. Gräben in Sachsen bei Leutsch u. Gandersdorf. 8. 4

27. *J. alpinus* Vill. K. syn. Rchb. icon. t. 403. *J.*

fusco-ater Schreb. *J. ustulatus* Hoppe. *J. nodulosus* Wahlenb. *J. geniculatus* Schrank. *J. alpestris* Hartm. Feuchte Orte d. Alpen, dch. d. g. Alpenkette nach d. Gebirgen in d. Niederungen d. mittl. u. nördl. Geb., stellw. auf nassem, überschwemmt gewesenem Sande, an Ufern so am Rheine, an d. Nahe, Mosel, Uhr u. in d. Eifel zc. 7—8. 4

28. *J. supinus* Moench. K. syn. Rchb. icon. t. 397. *J. bulbosus* L. spec. edit. I. *J. uliginosus* α. Meyer. *J. setifolius* Ehrh. *J. subverticillatus* Wulf. *J. fasciculatus* Schrank. *J. verticillatus* Pers. *J. capitatus* Schkr. Var. β. *J. uliginosus* Roth. — δ. *J. nigritellus* K. syn. edit. I. Feuchte, sumpfige u. überschwemmt gewesene Orte, an Gräben, Teichen, besonders auf sandigem Torfboden, stellw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

29. *J. squarrosus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 400. *J. Sprengelii* Willd. Etwas sandige Torfheiden, Triften, Wiesen, besonders dch. d. nördl. u. mittl. Geb., seltener im südl.; Schweiz nur auf d. Gotthard, sonst nicht in d. Alpenkette, im Süden in d. Lombardei u. Venedig; Rheing. häufig auf d. Vogesen, d. Schwarzwalde, d. Westerwalde, Hochwald, Eifel, Trier, Aachen bis zum Niederrheine, dch. d. g. nördl. Deutschland nach Preußen Königsberg, Memel, Thorn, Schlesien; Böhmen, Mähren, Ungarn nach Croatien. 7—8. 4

30. *J. compressus* Jacq. K. syn. Rchb. icon. t. 399. *J. bulbosus* L. spec. edit. II. Pollich. Feuchte Wiesen, Triften, an Gräben, Ufern, Teichen, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

31. *J. Gerardi* Loisl. Fl. gall. K. syn. Rchb. icon. t. 398. *J. bottnicus* Wahlenb. *J. consanguineus* K. et Ziz. *J. coenosus* Rchb. *J. bulbosus* β. Wahlenb. Seestrand im Norden u. Süden, Salinen u. auf salzhaltigem, sumpfigem Boden, stellw. dch. d. Geb., Rheing. bei Mannheim, Pfalz an d. Salinen bei Dürkheim, von da nach Erpolsheim, Maxdorf, Eppstein, Oppau, Friesenheim, Saline bei Kreuznach zc., Westphalen, Hamburg, Hannover, Holstein bis Preußen bei Memel; Destr. Böhmen, Tyrol, Littoral, Dalmatien. 7—8. 4

32. *J. tenuis* Willd. K. syn. Rchb. icon. t. 398. Feuchte Waldstellen an Wegen, stellw. im Geb., Rheing., Pfalz bei Annweiler zw. St. Johann u. Gleisweiler, Baiern, Oberschwaben bei Memmingen, Hessenkassel, Kloster Roth in d. Illergegend, Lausitz bei Herrnhuth, Hamburg, Holstein bei Oldešloe u. in d. Campine in Belgien. 6—7. 4

33. *J. insulanus* Vivian. Rchb. icon. t. 396. *J. fasciculatus* Bertolon. Fl. ital. *J. bufonius* β . *fasciculatus* K. syn. *J. bufonius* Seb. et Mauric. *J. mutabilis* β . Savi. *J. hybridus* Brot. Auf feuchtem, überschwemmt gewesenem Sandboden, stellw. im Geb., Rheing. Pfalz, Rahweiler bei Kaiserlautern, zw. Worms u. Mainz; Mähren, Dalmatien bei Sebenico, Piemont, Nizza. 7—8. ☉

34. *J. bufonius* L. K. syn. Rchb. icon. t. 395. Feuchte, sandige Orte, Ufer, Wiesen u. im g. Geb. 6—8. ☉

35. *J. Tenageia* Ehrh. K. syn. Rchb. icon. t. 396. *J. Vaillantii* Thuill. *J. gracilis* Lejeun. Feuchter Sandboden, Ufer, Moorniesen, stellw. dch. d. Geb., Rheing. auf Wiesen, lichte Waldstellen, v. Basel dch. Baden, Breisg. bei Freiburg, Mannheim, Vogesen dch. Elsaß, Speier, Friesenheim, Haßloch, Mardorf, Birkenfeld, Luxemburg, Aachen u. v. Bonn nach d. Niederrheine, dch. Westphalen nach Hannover, Hamburg, Mecklenburg, Berlin, Schlesien bei Kosel, Sachsen u.; Destr. Böhmen, Siebenbürgen u. Lombardei. 6—7. ☉

36. *J. sphaerocarpos* Nees. Fl. 1818. K. syn. Rchb. icon. t. 396. Feuchte Orte, stellw. im Geb., Franken auf d. Röhn; Destr. bei Wiener-Neustadt. 6—7. ☉

811. *Luzula* DC. (VI. 1.) Hainsimse. K. syn. 845. Rchb. exc. p. 91. et icon. Comp. I. 1. p. 568.

1. *L. flavescens* Gaud. K. syn. Rchb. icon. t. 383. *L. Hostii* Desv. *J. flavescens* Host. Wälder, Gebüsche d. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Destr. Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain u. Lombardei. 6—7. 4

2. *L. Forsteri* DC. K. syn. Rchb. icon. t. 382.

Juncus — Smith. Gebirgswälder, stellw. im Geb. bis in d. Boralpen, Rheing., v. Basel dch. Oberbadern im Breisgau, Elßaß in d. Vogesen, am Rheine hinab bei Coblenz bei Wallendar, Roisdorf bei Bonn, an d. Nahe bei Oberstein, Idar, Söbernheim, am Lemberg, Mosel bei Winnigen, Oldenburg im Seeberger Holz, Baiertische Alpen, Schweiz besonders auf d. Jura Creur du Vant, Lausanne, Nyon, Genf u., Tyrol bei Bozen, Lombardei. 6—7. 4

3. *L. pilosa* Willd. K. syn. Rchb. icon. t. 381. *L. vernalis* DC. *Junc.* — Ehrh. *J. luzulinus* Vill. *J. Luzula* Krok. *J. pilosus* α. Lin. Laubwälder, Gebüsch, im g. Geb. 4—5. 4

4. *L. pediformis* DC. Desv. Rchb. exc. et icon. t. 380. *Juncus* — Vill. delph. Gebirge im südlichsten Geb., Lombardei u. auf d. Mont Genis in Piemont. 6—7. 4

5. *L. maxima* DC. K. syn. *L. sylvatica* Gaud. helv. Richeno Rchb. exc. et icon. t. 390. *J. maximus* Ehrh. *J. latifolius* Wulf. *J. sylvaticus* Smith. *J. nemorosus* β. Pollich. *J. pilosus* δ. Lin. *J. montanus* Lamk. Laubwälder, Gebüsch, dch. d. g. südl. u. mittl. Geb. bis in d. Boralpen, Schlesien, Thüringen, Erzgebirge u. Harz, Rheing. häufig. 5—6. 4

6. *L. Sieberi* Tausch. herb. Fl. Bohem. Rchb. icon. t. 389. f. 860. *J. maximus* β. *angustifolius* Sieber. Gebirgslaubwälder; Destr. u. Böhmen. 6—7. 4

7. *L. glabrata* Hoppe. K. syn. Rchb. icon. t. 388. *L. spadicea* γ. M. et K. *Junc. glabratus* Sturm. *J. intermedius* Host. Wiesen, Triften d. Kalkalpen, Destr. Steyermark, Tyrol, Salzburg, Krain, Ungarn u. Siebenbürgen. 6—7. 4

8. *L. spadicea* DC. K. syn. Rchb. icon. t. 387. *Junc. spadiceus* Allion. pedm. Triften d. Alpen u. Boralpen, besonders im Urgebirge, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei u. Venedig; Rheing. auf d. Schwarzwald u. d. Vogesen u., Schlesien in d. Sudeten u. 6—7. 4

9. *L. parviflora* Desv. Rchb. icon. t. 388. K. syn.

846. in adnot. *L. glabrata* β . Rchb. exc. *Junc. parviflorus* Ehrh. Reitr. Kalkalpen in Salzburg u. Tyrol. 6—7. 4

10. *L. lactea* Link. Kunth. enum. Rchb. icon. t. 386. *L. nemorosa*. E. Meyer. Fl. germ. exsicc. 2315. Im südlichsten Geb., Piemont, Nizza. 7. 4

11. *L. albida* DC. Desv. K. syn. Rchb. icon. t. 385. *Junc. albidus* Hoffm. *J. angustifolius* Wulf. *J. luzuloides* Lamk. *J. pilosus* ϵ . Lin. *J. nemorosus* α . Pollich. Var. β . *L. rubella* Hoppe. Laubwälder, Gebüſche, dch. d. Gebirge bis in d. Alpen, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

12. *L. nivea* DC. K. syn. Rchb. icon. t. 384. *Junc. niveus* L. Alpen u. Boralpen, besonders auf Kalk, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Salzburg. Tyrol, Krain auf d. Matajur in Görz, Croatien, Lombardien. 6—8. 4

13. *L. lutea* DC. Desv. K. syn. Rchb. icon. t. 385. *Juncus luteus* Allion. *J. campestris* ϵ . Lin. Triften der Alpen, besonders auf Urgebirge, stchw. Schweiz auf d. Grimsel, Gotthard, Cant. Wallis u., Südtirol, Lombardien. 7—8. 4

14. *L. campestris* DC. K. syn. Rchb. icon. t. 375. *J. campestris* L. *J. nemorosus* Host. Gebüſche, grasige Raine, Triften, Wiesen, im g. Geb. 3—5. 4

15. *L. multiflora* Lejeune. K. syn. Rchb. icon. t. 377. *L. erecta* Desv. *L. campestris* β . M. et K. *L. intermedia* Spenn. *Juncus multiflorus* Ehrh. *J. erectus* Pers. *J. intermedius* Thuill. Var. β . *congesta*: *L. congesta* Lej. *Junc. — tus* Thuill. — γ . *L. nigricans* DC. *J. nigricans* Willd. — δ . *nivea* Wahlenb. *L. alpina* Hoppe. — ϵ . *L. pallens* Hoppe. Besser. Schlechte Wiesen, Triften, lichte Waldstellen, Heiden, dch. d. g. Geb.; Var. γ . et δ . in Gebirgen u. auf d. Alpen. 5—6. 4

16. *L. spicata* DC. K. syn. Rchb. icon. t. 379. *Juncus spicatus* L. *J. sudeticus* Krok. Var. β . *L. conglomerata* Mielichhofer. Triften u. Felsen d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. südl. Alpenkette u. auf d. Schneeberg in d. Sudeten. 6—8. 4

Hundertdreiunddreißigste Ordnung. Cyperaceen.

Juss. K. syn. 848. K. Taschb. 525. Rchb. exc. p. 55. et icon. 3. Bd. t. 193—318.

I. Gruppe. Cyperen Koch. K. Taschb. 525.

812. *Cyperus* L. (III. 1.) Cypergras. K. syn.
Cyperus et *Picreus* Rchb. exc. p. 72. Comp. I. 1. p. 75.

1. *C. pannonicus* Jacq. Austr. Rchb. exc. et icon. t. 278. Sümpfe, besonders auf salzhaltigem Boden, in Ungarn bei Uba, Rakos, Neusiedlersee u. in Siebenbürgen. 8—9. ☉

2. *C. mucronatus* Rottb. Bertol. Fl. ital. Rchb. icon. t. 278. *C. distachyos* Willd. *C. junciformis* Cavanil. Straßengräben im südlichsten Geb., Piemont zw. Nizza u. d. Varflusse. 8. 4

3. *C. flavescens* L. K. syn. Rchb. icon. t. 278. *Picreus* — P. Beauv. Uberschwemmte, besonders sandige Orte, nasse torfige Triften, an Fluß- u. Bachufern, stellw. dch. d. Geb. 7—9. ☉

4. *C. globosus* Allion. pedm. Rchb. exc. in add. et icon. t. 279. *C. fascicularis* DC. Im Schlamme d. Varflusses bei Nizza, in Piemont. 6—7. 4

5. *C. Monti* L. K. syn. Rchb. icon. t. 279. *C. serotinus* Vahl. Rottb. *C. glaber* Turi. In Gräben u. Sümpfen im südl. Geb., Südschweiz, Südtirol, Krain, Littoral, Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig. 7—8. 4

6. *C. fuscus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 280. Var. β . *C. virescens* Hoffm. *C. viridis* Krok. *C. glaber* Hoppe ap. Sturm. Sumpfige u. überschwemmt gewesene, grassige Orte, Ufer, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten, z. B. Coblenz, Trier, Köln u. 6—9. ☉

7. *C. glaber* L. Rchb. exc. et icon. t. 280. *C. pictus* Tenore. *C. brachystachys*. Presl. *C. erubescens* Link.

C. erythracus Schrad. Kunth. Rasse u. feuchte Orte am südl. Vittoral, Dalmatien, Lombardei, Verona bei Ronca, Venedig zc. 9—10. ☉

8. *C. Tenorei* Presl. Rchb. icon. t. 281. *C. esculentus* L. K. syn. Sturm. *C. aureus* Tenore. *C. Tenorianus* R. et Sch. Cultivirt im südlichsten Geb., Lombardei zc. 7—9. 4

9. *C. olivaris* Trag. Tozz. Rchb. exc. et icon. t. 281. *C. radiosus* Sibth. *C. esculentus* Savi. *C. rotundus* DC. Tenore, Gusson. *C. longus* Turi. *C. tetrastachys* Presl. Gräben, Aecker, Gärten, im südl. Vittoral, Dalmatien bei Ragusa, Budua, Oberitalien. 7—8. 4

10. *C. thermalis* Du Mort. *C. badius* Desf. K. syn. Rchb. icon. t. 283. *C. longus* et *C. elongatus* Lej. *C. tenuiflorus* Presl. Sumpfige Orte, an Quellen, stellenw. im Geb., Rheing., an d. warmen Quellen um Birtscheid bei Aachen, im Schleibener Thale, Belgien in Flandern, südlich im Vittoral, Dalmatien Insel Pesina, Curzola u. an d. Narenta. 7—8. 4

11. *C. longus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 282. *C. myriostachys* Tenore. *C. intermedius* Gussoni. Rasse Wiesen an Gräben, Flußufern, stellenw. dch. d. g. südl. Geb., Baiern, Lindau am Bodensee, Schweiz bei Lausanne; Destr. Baden bei Wien, Tyrol, Ungarn, Vittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

12. *C. patulus* Host. Rchb. exc. Host. Fl. austr. Feuchte, sandige Wiesen auf d. Donauinseln in Ungarn u. im Banat. 6—8. 4

13. *C. difformis* L. Rchb. exc. et icon. t. 284. *C. prostratus* Sieb. *C. viridis* Willd. Gräben d. Reisfelder im südlichsten Geb., Dalmatien an d. Narona, Lombardei bei Pavia, Venedig, Oberitalien. 7—9. 4

14. *C. glomeratus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 284. *C. australis* Schrader. Cultivirt Orte im südl. Geb., Steyermark bei Gräß, Südtyrol, Vittoral, Istrien, Monfalcone, Ungarn, Croatien, Reisfelder in d. Lombardei bei Verona Venedig. 7—8. 4

813. *Schoenus* L. (III. 1.) Knopfriet. K. syn.

850. Rehb. exc. p. 74. et icon. Comp. I. 1. p. 94.

1. *Sch. mucronatus* L. K. syn. Rehb. icon. t. 286. *Sch. capitatus* Vand. *Mariscus mucronatus* Presl. *Cyperus aegyptiacus* Gloxin. *Cyp. macrorrhizus* Richard. *Scirpus Kali* Forsk. Im südl. Littoral, Istrien bei Aquileja, Dalmatien, Piemont, Venedig. 6—7. 4

2. *Sch. coarctatus* R. et Sch. Roth. enum. Comp. I. 1. p. 94. Sumpfige Orte im südl. Littoral, Istrien auf d. Inseln Dsero u. Cherso. 8. 4

3. *Sch. nigricans* L. K. syn. Rehb. icon. t. 286. *Chaetospora* — Kunth. Etwas feuchte Moorbiesen, Torfheiden, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Baden im Breisg., bei Baghäusel, Elß, Pfalz bei Oggersheim, Dürkheim, Maxdorf, Frankenthal, Worms, Mainz, dann Rhein abwärts, Düsseldorf bei Hilden bis in d. Niederlanden, Württemberg, Baiern, Thüringen bei Jena, Berlin, Pommern, Holstein; dch. d. Schweiz nach Destr. Tyrol, Krain u. im g. südl. Littoral bis in d. Lombardei nach Venedig. 5—6. 4

4. *Sch. ferrugineus* L. K. syn. *Chaetospora* — ea R. Brow. Rehb. exc. et icon. t. 285. *Strebliidia* — Link. Sumpfige Torfwiesen, stchw. im Geb., Württemberg, Oberschwaben, Oberbaiern, Sachsen, Thüringen, Pommern, Mecklenburg; Schweiz bei Bern, Detsberger Thal im Jura u., Destr. Kärnthen, Südtirol, Siebenbürgen, Lombardei. 5—6. 4

II. Gruppe. *Scirpeen* Koch. K. Taschb. 526.814. *Cladium* P. Brow. (III. 1.) Nußrieth. K. syn 851. Rehb. exc. 75. Comp. I. 1. 95.

1. *C. Mariscus* R. Br. K. syn. Rehb. icon. t. 287. *Schoenus* — L. *Clad. germanicum* Schrader. *C. occidentale* R. et Schult. *Schoenus Cladium* Sw. *Sch. effusus* Sw. *Sch. palustris* Poir. *Sch. leptostachyus* Nees v. E. Sumpfige Orte a. Torfboden, an Teichen, Seen, im g. südl. u. im mittl. Geb., seltner im nördl., Rheing., vom Bodensee nach Ba-

den bei Waghäusel, Elsaß bei Weissenburg, Straßburg, Coblenz am Raachersee, bei Spa, bei Grefeld, Oberbaiern, Oberschwaben bei Memmingen, Sachsen, Lausitz, Erfurt, Berlin, Mecklenburg, Holstein, Preußen, Hannover bei Göttingen, Schweiz besonders auf d. Jura; Destr. u. im g. südl. Eittoral bis in d. Lombardei, Venedig. 7—8. 4

815. *Rhynchospora* Vahl. (III. 1.) Schnabelriet. K. syn. 851. Rchb. exc. p. 74. Comp. I. 1. p. 93.

1. *R. alba* Vahl. K. syn. Rchb. icon. t. 285. *Schoenus albus* L. Sümpfe, stumpfige Wiesen auf Torfboden, stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Gebirge, Schweiz, Baiern, Schwaben, Rheing. dch. Baden, Breisg., Elsaß bei Hagenau, Pfalz Zweibrücken, Kaiserslautern, Saarbrücken, Saarlouis, Luxemburg, Aachen, Siegburg bei Bonn, Mühlheim bei Cöln, Grefeld nach Westphalen, Hannover bis Holstein, Mecklenburg bis Preußen; Destr. bis in d. südlichste Eittoral, nach d. Lombardei u. Venedig. 7—8. 4

2. *R. fusca* R. et Sch. K. syn. Rchb. icon. t. 285. *Schoenus fuscus* L. *R. alba* β . *fusca* Vahl. *Schoenus setaceus* Thuill. Sumpfige, nasse Torfwiesen, schlammige, sandige Orte d. Torfmoore, stellw. aber etwas seltner, mit *R. alba* dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten mit Voriger, z. B. Mühlheim bei Cöln in großer Menge, Westphalen zc.; Destr. Böhmen, Kärnthén, Tyrol, Lombardei bis Venedig. 6—7. 4

816. *Heleocharis* R. Brow. (III. 1.) Teichbinse.

K. syn. 852. Rchb. exc. p. 77. Comp. I. 1. p. 90.

1. *H. palustris* R. Br. K. syn. Rchb. exc. *Scirpus* — L. Rchb. icon. t. 297. *Sc. repens* Thuill. *Sc. acicularis* Fl. Dan. *Sc. varius* Schreb. *Fimbristylis melanostachys* Brongn. Nasse Wiesen, Sümpfe an Gräben, Teichen, Ufern, dch. d. g. Geb. gemein. 6—8. 4

2. *H. uniglumis* Link. K. syn. Rchb. exc. *Scirpus* — M. et K. Link. Rchb. icon. t. 296. *Sc. tenuis* Schreb. *Sc. intermedius* Thuill. Feuchte, sumpfige u. moorige Wie-

sen, besonders auf Lehm- u. Kalkboden, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten, von Basel dch. Baden, Breisg., bei Rastatt, Mannheim, Speier, Worms, Mainz, Nassau am Seeburgerweiher, Coblenz, Eöln bis in d. Niederlanden, Saarbrücken, Trier, Luxemburg zc. 6—8. 4

3. *H. multicaulis* Smith. K. syn. *Limnochloa* — Rchb. exc. *Scirpus* — Du Mort. Smith. Rchb. icon. t. 295. Sumpfige Moorniesen, stellw. im Geb., Rheing., Eöln bei Schleebusch u. Schildchen unweit Mühlheim, Westphalen bei Bentheim, Gronau, Dinslaken, Burgsteinfurt, Hamburg, Ostfriesland bei Jever, Holstein, Schleswig u. auf d. Dorfmooren in Belgien u. Holland. 6—8. 4

4. *H. ovata* R. Brow. K. syn. Rchb. exc. *Scirpus ovatus* Roth. Rchb. icon. t. 295. *Sc. capitatus* Schreb. *Sc. compressus* Moench. *Sc. multicaulis* Gmel. *Sc. annuus* Thuill. *Sc. turgidus* Pers. *Sc. soloniensis* Dubois, *Eleogenus ovatus* Nees v. E. Schlammiger Sandboden an Teichrändern u. überschwemmten Orten u. auf Moorniesen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. von Basel nach Baden, im Breisg., Freiburg, Rchl, Rastatt zc., Nassau bei Weilburg, Elsaß bei Niederbrunn, Bitsch, Pfalz bei Zweibrücken, Saarbrücken, Trier bei Grach an d. Mosel, Coblenz am Laachersee, Eöln bei Passrath, Schleebusch unweit Mühlheim, Rees, Emmerich nach Westphalen, Thüringen, Hamburg, Hannover bis Holstein, Schlesien nach Destr. zc. 6—8. ☉

5. *H. atropurpurea* Koch K. syn. *H. Lereschii* Rchb. exc. *Scirpus atropurpureus* Retz Rchb. icon. t. 295. *Scirpus Lereschii* Thom. Nasse, sandige Orte am Genfersee, aux Piarettes zw. Lausanne u. Morges. 7—8. ☉

6. *H. carniolica* Koch. K. syn. *Scirpus gracilis* Salzmann. Rchb. icon. t. 294. Nasse Wiesen in Krain auf d. Adlersberg u. in Siebenbürgen. 7—8. ☉

7. *H. acicularis* R. Brow. K. syn. *Scirpus* — Lin. Rchb. icon. t. 294. *Limnochloa* — Rchb. exc. *Isolepis* — v. Schlechtend. *Scirpidium aciculare* Nees v. E. Var. β . *Scirpus comosus* Du Mortier. — γ . *natans*. *Sc. pauci-*

florus Du Mort. — *δ. filiformis* Sauter. Schlammiger, sumpfiger Sandboden, um stehende Wasser, ausgetrocknete Teiche, Gräben, an sumpfigen Orten u., im g. Geb. 6—8. ☉

817. *Scirpus* L. (III. 1.) Binse. K. syn. 853.

Rchb. exc. p. 77. et icon. Comp. I. 1. p. 92.

1. *S. caespitosus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 300. *Limnochloa caespitosa* Rchb. exc. *Heleocharis* — Link. *S. Baeothryon*. Timm. Torfgründe d. Alpen, Boralpen u. Gebirge bis in d. Niederungen, Rheing. auf allen Moorgründen, vom Bodensee nach d. Schwarzwalde, Obenwald, Bogesen, Nassau, Siegburg bei Bonn, Eln um d. Orte Paffrath, Schleebusch bei Mühlheim, Trier in d. Eifel und Schneeeifel bei Malmedy, Aachen auf d. hohen Vennen, Grefeld bis in d. Niederlanden u. dch. Westphalen, Hamburg, Holstein, nach Preußen; Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, besonders im Jura, von da nach Baiern, Thüringen, in d. Sudeten, Böhmerwald, Böhmen nach Destr. u. in d. Lombardi. 5—6. 4

2. *S. alpinus* Schleicher K. syn. Rchb. icon. t. 300. *Limnochloa alpina* Rchb. exc. Alpenmoore in d. südl. Schweiz im Cant. Wallis über Zermatten. 7—8. 4

3. *S. pauciflorus* Lightfoot. K. syn. Rchb. icon. t. 299. *Heleocharis pauciflora* Link. *S. Baeothryon* Ehrh. *Limnochloa* — Rchb. exc. *S. caespitosus* Pollich. *S. campestris* Roth. *S. Halleri* Vill. *Baeothryon* — Nees v. E. Feuchte Triften, Moormiesen, stellw. dch. d. g. Geb., Schweiz besonders im Jura, Rheing. an vielen Orten, von Basel nach Baden bei Baghäusel, Elsaß bei Straßburg, Pfalz bei Speier, Dürkheim, Maxdorf, Oppenheim, Nassau bei Eoden u., Coblenz am Eaaersee, Neuwied, Siegburg, Bonn, Eln, Mühlheim bis Uerdingen, Trier bei Saarbrücken, Luxemburg, Hannover nach Holstein, Preußen Königsberg, Memel, Tilsit, Schlesien; Destr. Böhmen, Ungarn, Tyrol, Kärnthen u. 6—7. 4

4. *S. parvulus* R. et Sch. K. syn. Rchb. icon. t. 299. *S. nanus* Spreng. *S. humilis* Wallr. *Limnochloa parvula* Rchb. exc. *Heleogiton parvulum* Link. Landseen u. an d.

Seefüfte, stellw. im Geb., Mansfeld bei Rolsdorf, Erdeborn, Rölme, Lauenburg, Elbinsel bei Biege, Schleswig, Holstein; am südl. Vittoral bei Monfalcone, Dalmatien. 7—8. 4

5. *S. fluitans* L. K. syn. Rchb. icon. t. 298. *Dichostylis* — P. Beauv. Rchb. exc. *Heleogiton* — Link. *Isolepis* — R. Brow. S. stolonifer Rchb. Roth. Sümpfe u. stehende Wasser, besonders auf Moorboden, stellw. dch. d. Geb., mehr im nördl.; Rheing., Köln bei Meerheim, Paffrath unweit Mülheim häufig, Düsseldorf, Neuß nach d. Niederlanden, Grefeld, nach Westphalen bei Dülmen, Gösfeld, Hamburg nach Hannover, Oldenburg, Holstein, Schleswig, Mecklenburg, Thüringen bei Jena; Destr. Krain, Siebenbürgen u. Lombard. 7—9. 4

6. *S. setaceus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 301. *Isolepis* — R. Brow. Rchb. exc. Var. β . *S. clathratus* Rchb. icon. Rasse, sandige Wiesen, Triften, Heiden, im g. Geb. 7—8. ☉ u. 4

7. *S. Savii* Seb. et Maur. Rchb. icon. t. 301. *S. setaceus* Bivona. *S. filiformis* Savi. *S. leptaleus* Koch sylog. *S. numidianus* Vahl. *Isolepis Saviana* R. et Sch. *Isol. sicula* Presl. *Isol. tenuis* Visiani Fl. Dalm. *Isol. pygmaea* Kunth enum. Feuchte, grasige Orte im südlichsten Geb., Rheing. auf einer Wiese bei Cleve im Regierungsbezirk Düsseldorf; Dalmatien bei Ragusa, Cattaro. 5—9. ☉ oder 4?

8. *S. supinus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 302. *S. lateralis* Retz. *S. erectus* Poir. *Isolepis supina* R. Brow. Rchb. exc. *Schoenus junceus* Willd. Sumpfige, überschwemmte Orte, Uferkies, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Elsaß bei Colmar, Straßburg, Philippsburg, Baden bei Rehl, Darland, Mannheim u. Ludwigshafen, Coblenz, Baiern bei Regensburg, Magdeburg, Aschersleben, Brandenburg bei Prenzlau, Berlin, Thorn; Schweiz am Genfersee bei Nyon; Destr. Krain, Ungarn, Vittoral, Lombard. 7—8. ☉

9. *S. mucronatus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 303, *S. glomeratus* Scopoli. Stehende Wasser, Sümpfe, stellw. mehr im südl. Geb., Rheing. im Bodenseeried bei Rheineck.

Württemberg bei Oberkirch in d. Ganstatter Heide, Thüringen, im Gossbacher Weiher, Baiern bei Erlangen; Schweiz Cant. Tessin, Marais de Roche, Lago Locarno u. Lago Lugano; Destr. Tyrol, Kärnthen, Krain, Ungarn, Littoral, Lombardei, Venedig, Reisfelder in Piemont, Oberitalien zc. 7—8. 4

10. *S. lacustris* L. K. syn. Rchb. icon. t. 306. Stehende u. stillfließende Wasser im g. Geb. 5—6. 4

11. *S. Tabernamontani* Gmel. K. syn. Rchb. icon. t. 307. *S. glaucus* Smith. *Heleogiton glaucum* Rchb. exc. *S. lacustris* β . Pollich. γ . Schrader. Stellw. mit *S. lacustris* $\delta\delta$. d. Geb., Rheing. nicht selten, Pfalz an d. Salinen bei Dürkheim u. d. benachbarten Rheinsümpfen bei Worms zc., im Nahethal bei Bingen, Kreuznach, im Lahnthale zw. Lahnsstein u. Nievorn, Köln, im Saarthale bei Saarbrücken, Westphalen bei Dissen, Salzkotten, Gösfeld, Hamburg, Hannover, nach Preußen bei Königsberg, Thorn zc.; Destr. Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen, Steyermark, Tyrol, Dalmatien u. Venedig. 6—7. 4

12. *S. Duvalii* Hoppe M. et K. K. syn. Rchb. icon. t. 308. *S. trigonus* Nolte K. syn. edit. I. *Heleogiton trigonum* Rchb. exc. *S. carinatus* Smith. *S. macrophyllus* Wolfgang. *S. lacustris* c. *trigonus* Döll. Fl. rh. Landseen u. Flußufer, stellw. $\delta\delta$. d. Geb., Rheing., vom Bodensee nach Baden, bei Mannheim, Pfalz bei Dürkheim, Flora v. Trier Emmerweiler bei Saarbrücken, Luxemburg, Sachsen bei Artern, Hamburg, Holstein an d. Elbe u. Eider; Schweiz am Zürichsee, Destr. Böhmen, Ungarn, Tyrol. 7—8. 4

13. *S. littoralis* Schrader K. syn. Rchb. icon. t. 309. *Heleogiton littorale* Rchb. exc. *S. mucronatus* Scopol. *S. balearicus* Willd. *S. fimbrisetus* Delile. *Fimbristylis mucronata* Vahl. *Malacochaete littoralis* Nees v. E. Sumpfige Orte im südl. Littoral, Istrien auf d. Insel Beglia, Montefalcone, Duino, Venedig auf d. Inseln. 7—8. 4

14. *S. triqueter* L. K. syn. Rchb. icon. t. 305. *Heleogiton* — Rchb. exc. *S. trigonus* Roth. *S. mucronatus* Pollich. Host. Var. β . *S. Hoppii* Weihe Rchb. icon. — γ .

S. Lejeunii Weihe Rchb. icon. — *δ. conglomeratus* Rchb. *S. triqueter* β. Gaud. helv. Schlammiger Boden an Teichen, Gräben, Flußufern, stellw. dch. d. Geb., Rheing., vom Bodensee nach Baden bei Rehl, Elsaß bei Straßburg, Pfalz bei Speier, Worms, Oppenheim bis Mainz, Obermosel im Luxemburgischen, in d. Flora von Spa, dann wieder am Niederrheine zw. Düsseldorf u. Hamm, bei Rees u. Emmerich nach Westphalen, Hannover, Hamburg, an d. Elbe u. Eider in Holstein, Sachsen bei Leipzig, Unterbaiern mit d. Donau nach Destr. Tyrol, Ungarn, Krain u. Lombardien; Schweiz Cant. Bern an d. Aar, Aarau, Cant. Wallis Marais de Rocher, M. Fouty, Genfersee, Lausanne. 7—8. 4

15. *S. Rothii* Hoppe K. syn. Rchb. icon. t. 304. *S. pungens* Vahl. Heleogiton — Rchb. exc. *S. triqueter* et *S. mucronatus* Roth. *S. triqueter* β. Smith, Schrader. *S. tenuifolius* DC. *S. americanus* Pers. Schwammiger, sumpfiger Boden in Gräben, Sümpfen, Teichen, an Ufern, stellw. dch. d. Geb., mehr im nördl., Rheing., Baden im Breisgau auf d. Rheininseln, Hamburg am Elbteiche, Elbmündung, in Lauenburg, an d. Leesum beim Ausfluß d. Weser bei Vegesack; Schleswig an d. Ems; Schweiz an d. Sihl bei St. Quentin; Ungarn, Tyrol u. Venedig. 7—9. 4

16. *S. Holoschoenus* L. K. syn. *S. Holoschoenus α. vulgaris* Koch. *Holosch. vulgaris* Link. *Holosch. Linnaei* et *H. australis* Rchb. exc. et icon. t. 318. f. 739—741. Var. β. *romanus* K. syn. *S. romanus* L. Feuchte Ufer, überschwemmt gewesene, sumpfige Orte im g. südl. Geb.; Destr. Südtirol, bei Bogen, Vittoral, Istrien bei Triest u. Dalmatien, Croatien, Lombardien, Venedig; Schweiz am Genfersee bei Aubonn, Lausanne, Piemont, Nizza, Savoyen u. Oberitalien. 6—8. 4.

17. *S. australis* L. *S. Holosch. β. australis* K. syn. *Holosch. filiformis* et *H. exserens* Rchb. exc. et icon. t. 316—317. f. 736—738. *Isolepis filiformis* Comp. Fl. germ. Sandige feuchte Wiesen, Ufer, stellw. im Geb.; an d. Elbe bei Barby, Zerbst, Potsdam, bei Werder u. Anhalt,

Schlesien an d. Oder bei Frankfurt; Destr. Steyermark bei Grätz, Böhmen an d. Elbe, Südtirol, Krain, Vittoral, Istrien bei Fiume, Südschweiz. 6—8. 4

18. *S. maritimus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 310. *S. corymbosus* Forsk. *S. robustus* Pursh. *S. decumanus* Willd. *S. tridentatus* Roxb. *S. lucidus* Lessing. Var. β . *compactus* Krock. Rchb. icon. t. 311. *S. tuberosus* Desf. *S. maritimus* b. *congestus* Döll. Fl. rh. — γ . *macrostachys* K. syn. non Willd. Seefüfte, Landseen, Teiche, Gräben, Flußufer im g. Geb. 7—8. 4

19. *S. macrostachys* Willd. enum. Rchb. icon. t. 311. Ufer im südl. Vittoral, Istrien bei Fiume, Insel Beglia, Croatien. 7—4. 4

20. *S. sylvaticus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 313. *S. gramineus* Neck. Rasse, sumpfige Waldwiesen, Gräben, Teiche, Ufer, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

21. *S. radicans* Schkr. K. syn. Rchb. icon. t. 314. Sumpfige Moorbiesen, an Landseen, Teichen, Gräben, Flußufern, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Pfalz bei Eppenbrunn, Zweibrücken, Neuhausler Weiher, Homburg, Saarbrücken, Moselufer bei Trier, Berncastel, Westphalen, Hamburg nach Holstein, Pommern, Preußen bei Königsberg, Schlesien, Sachsen nach Destr. Steyermark bis in d. südl. Vittoral. 6—8. 4

22. *S. Michelianus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 312. *Fimbristylis Micheliana* Rchb. exc. *Isolepis* — R. et Sch. *Dichostylis* — Nees v. E. Ueberschwemmte, sandige, feuchte Orte, an Flußufern, stchw. im Geb.; an d. Elbe bei Wittenberg, Anhalt bei Gribo, Schlesien an d. Lohe u. Oder bei Mariculin, Ohlau, Cosel; Destr. Mähren, Steyermark, Ungarn, Croatien, Dalmatien u. Lombardien. 7—8. ☉

23. *S. compressus* Pers. K. syn. *S. caricinus* Schrader. *S. Caricis* Retz. *Blyssmus compressus* Panzer. Rchb. exc. et icon. t. 293. *Carex uliginosa* L. Etwas feuchte, sandige Wiesen, Tristen, an Gräben, Bach- u. Flußufern, Quellen, stchw. dch. d. g. Geb. 7—8. 4

24. *S. rufus* Schrader K. syn. *Blyssmus* — Link.

Rchb. exc. et icon. t. 293. Schoenus — Huds. S. bifolius Wallr. S. Wallrothii bot. Zeit. Küste d. Nord- u. Ostsee u. salzhaltige Wiesen, stellw. im Geb., Thüringen, am Rölmersee, bei Gisleben, Staßfurt, Berlin, Pommern, Mecklenburg, Hannover u. Holstein. 6—8. 4

818. *Fimbristylis* Vahl. (III. 1.) Faserriet. K. syn. 859. Rchb. exc. p. 75. Comp. I. 1. p. 80.

1. *F. dichotoma* Vahl K. syn. Rchb. icon. t. 315. *Scirpus dichotomus* L. Rottb. S. bisumbellatus Forsk. S. annuus Host. S. pallescens Roxb. *Isolepis* — Dietr. Sumpfige Orte im südl. Geb., Südschweiz Cant. Tessin, Stadtgraben bei Treviso im südl. Tyrol, Littoral, Lombardei u. Venedig. 6—8. ☉

2. *F. annua* R. et Schult. K. syn. Rchb. icon. t. 315. S. annuus Allion. pedm. Feuchte Orte im südl. Geb., Südtirol zw. Bozen u. Meran, Lombardei, Venedig, Schweiz Cant. Tessin, Piemont, Nizza. 7—8. ☉

819. *Eriophorum* L. (III. 1.) Wollgras. K. syn. 859. Rchb. exc. p. 79. Comp. I. 1. p. 84.

Erste Rotte. *Trichophorum* Pers. K. Taschb. p. 532.

1. *E. alpinum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 288. *Trichophorum* — Pers. Torfgründe d. Alpen, Boralpen bis in d. Niederungen längst d. Alpenkette nach Oberschwaben, Oberbaiern, auf d. Brocken, Schneekopfe, im Thüringerwald, Hamburg im Eppendorfer Moor, zw. Hannover u. Pommern, Schlesien in d. Sudeten, Böhmerwald, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. Mähren, Tyrol, Steyermark, Krain, Lombardei. 4—5. 4

Zweite Rotte. *Eriophorum* Pers. K. Taschb. p. 532.

2. *E. vaginatum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 289. *E. caespitosum* Host. Torfgründe der Ebenen u. Gebirge bis in d. Boralpen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., v. Ba-

fel dch. Baden, Schwarzwald, Elsaß, Hagenau bis Kaiserslautern, Zweibrücken, Saarbrücken, Hochwald, Eifel bis Aachen, Köln, dch. Westphalen, Hannover nach Preußen u.; Destr. bis in d. Lombardei. 4—5. 4

3. *E. Scheuchzeri* Hoppe K. syn. Rchb. icon. t. 289. Torfgründe d. Hochalpen, Schweiz Grimsel, Gotthard, Gemmi u. dch. d. g. Alpenkette nach Destr. Tyrol, Steyermark, Eittoral bis in d. Lombardei, Venedig. 6—7. 4

4. *E. angustifolium* Roth. K. syn. Rchb. exc. *E. polystachyum* α. L. Rchb. icon. t. 291. Var. α. *vulgare* K. syn. *E. angustifolium* α. *congestum*. D. Fl. *E. angustifolium* β. *laxum* M. et K. *E. Vaillantii* Poir. et Turp. K. Taschb. — γ. *elatus* K. syn. *E. angustifolium* β. *longifolium* Hoppe. *E. polystachyum* Smith. — δ. *alpinum* Gaud. helv. *E. gracile* Smith. Sümpfe in Torfmooren, sumpfige Wiesen, Triften, stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen. 4—5. 4

5. *E. latifolium* Hoppe. K. syn. Rchb. icon. t. 292. *E. polystachyum* β. L. *E. pubescens* Smith. Feuchte, sumpfige Wiesen, Triften, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

6. *E. gracile* Koch. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 290. *E. triquetrum* Hoppe. *E. polystachyum* γ. Lin. Schwammige, sumpfige Torfgründe, Moorsümpfe u. Gräben, stellw. dch. d. Geb., Rheing., vom Bodensee nach Basel, Elsaß in d. Vogesen bis Straßburg, Baden bei Rastatt, Waghäusel, Sandbors, Mannheim, Pfalz bei Murbors, Kaiserslautern bis Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Köln nach Westphalen bei Dorsten, Hannover u. stellw. dch. d. nördl. Geb. bis Preußen bei Königsberg u.; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Tyrol u. Krain. 5—6. 4

III. Gruppe. Cariceen K. Taschb. 532.

820. *Elyna* Schrad. (III. 1.) *Elyne*. K. syn. 861. Rchb. exc. p. 55. Comp. I. 1. p. 95.

1. *E. spicata* Schrad. K. syn. Rchb. icon. t. 193.

Carex myosuroides Vill. *C. Bellardi* Allion. *C. hermaphrodita* Gmel. *C. Dufourii* Lapeyr. *Kobresia scirpina* Willd. Triften d. Hochalpen, Schweiz auf d. Grimsel, Gemmi, Gotthard u., dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Salzburg, Kärnten, Steyermark, Krain, Görz, Vitoral. 7—8. 4

821. *Kobresia* Willd. (III. 1.) Kobresie. K. syn. 861. Rchb. exc. p. 55. Comp. I. 1. p. 96.

1. *K. caricina* Willd. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 193. *Elyna caricina* M. et K. *Schoenus monoicus* Engl. bot. *Carex bipartitus* Allion. *C. mirabilis* Host. *C. hybrida* Schkr. Hochalpen, Schweiz an d. Gletscher d. Ar, am Rhonegletscher auf d. Gemmi u. Furka, Cant. Graubündten Sils u. Bevers, M. Genis, Südtirol, Destr. Steyermark, Kärnten auf d. Salmshöhe. 8. 4

822. *Carex* L. (XXI. 3.) Segge. K. syn. 862. Rchb. exc. p. 55. et icon. Comp. II. p. 597.

a. *Psyllophorae* Lois. K. Taschb. 533.

1. *C. dioica* L. K. syn. Rchb. icon. t. 194. *C. Linnaeana* Host. *C. laevis* Hoppe. Var. β . *androgyna*: *C. Metteniana* Lehm. *C. parallela* Laestad. Sumpfige, schwammige Moorniesen, Triften, stchw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, Rheing. Baden, Breisgau, Elsaß, Nahethal bei Bochenau, Trier, Luxemburg, Eöln nach Westphalen u. dch. d. nördl. Geb. nach Preußen um Königsberg u.; Destr. bis in d. Lombardei. 4—5. 4

2. *C. Davalliana* Smith. K. syn. Rchb. icon. t. 194. *C. dioica* Host. *C. scabra* Hoppe. *C. spicata* Spreng. Var. β . *monoica*: *C. Sieberiana* Opitz. Torfige, bemooste Wiesen, Triften bis in d. Boralpen, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing. im Elsaß, Baden, Breisgau, Rastatt bis Mannheim, Pfalz Speier, Kaiserslautern, Trier, Hochwald, Eifel, stchw. nach d. Niederrhein u. Westphalen u. 4—5. 4

3. *C. pulicaris* L. K. syn. Rchb. icon. t. 195. *C.*

psyllophora L. Sumpfiger Moorboden, Wiesen, Tristen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., vom Bodensee nach Basel, Baden, Breisgau, Elsaß, Pfalz vom Donnersberg bis Kaiserslautern, Homburg, Saarbrücken, Hochwald, Trier, Eifel, Nassau, Bonn, Köln nach Westphalen u. dch. d. nördl. Geb. nach Preußen u.; Destr. Ungarn, Galizien u. Siebenbürgen. 5—6 4

4. *C. capitata* L. K. syn. Rchb. icon. t. 195. Moorige, bemooste Wiesen, stellw. im Geb. bis in d. Boralpen, Schwaben bei Nesselwang u. Gronebach, Baiern am Wurmssee, Rothenbusch u. im Deininger Moos bei München, Tyrol bei Füssen, Eiser-Alp. 5. 4

5. *C. obtusata* Liljeb. K. syn. Rchb. icon. t. 195. *C. spicata* Schkr. Rchb. exc. *C. mycrocephala* Meyer. *C. leucoglochin* Wohlleben. Sandige, schattige Hügel, Tristen, stellw. im Geb., Thüringen bei Halle, Sachsen im Bienitz zwei Stunden v. Leipzig, Bärwald im Erzgebirge, sumpfige Wiesen im Banat u. Siebenbürgen. 4—5. 4

6. *C. rupestris* Allion. K. syn. Rchb. icon. t. 198. *C. petraea* Schkr. Graßige Felsen d. Hochalpen, Schweiz dch. d. Alpenkette, E Bern bei Bürgeln, Cant. Wallis am Schwarzensee, M. Räfel, Bernhardin, Thal Onni u. Abula in Graubünden, Schlesien auf d. rothen Berge im Gesenke auf d. Brünnelheide nach Mähren, Destr. Kärnthen, Tyrol M. Schlehren, Großglockner, Steyermark M. Mannhard, in Görz. 7—9. 4

7. *C. pyrenaica* Wahlenb. Degl. Rchb. exc. in add. et icon. t. 198. *C. Ramondiana* DC. *C. acutissima* Degl. *C. Marchandiana* Lapeyr. *C. Grosseckii* Heuffel. Felsen d. Alpen, Alpe Szerko im Banat u. häufig um d. oberen See To-Blatoi unter d. Alpe Retyr in Siebenbürgen. 7—8. 4

8. *C. pauciflora* Lightfoot. K. syn. Rchb. icon. t. 196. *C. patula* Huds. *C. leucoglochin* Lin. Ehrh. Rchb. exc. Schwammige Torfwiesen u. Tristen d. Ebenen, Gebirge bis in d. Alpen, stellw. dch. d. g. Geb., Schweiz nicht selten, besonders im Jura; Rheing. Baden, Breisgau auf d. Feldberg, Vogesen, im Murgthale, bei Waghäusel, Pfalz auf d.

Sandstuhler Torfgründen bei Spesbach, Eifel, bei Malmédy, auf d. hohen Venn bei Aachen häufig u. in Torfmooren bei Schleebusch unweit Eöln, Brocken, Erzgebirge, Schlesien u.; Destr. Böhmen u. 6—7. 4

b. *Orthocerates* Koch. K. Taschb. 534.

9. *C. microglochin* Wahlenb. K. syn. Rchb. icon. t. 196. *Uncinia* — Spreng. Comp. II. p. 596. Schwammige Moormiesen, stellw. im Geb. bis in d. Alpen, Schweiz Cant. Wallis, Alpen d. Einsiedthales, Oberengadin, M. Genis, Südtirol auf d. Geiseralp, im Duronthale, Oberbaiern am Staarenberger See, im Deiningen Moos, bei Rothenbusch u. an d. Ammer. 7—8. 4

c. *Cyeroideae* Koch. K. Taschb. 534.

10. *C. Cyperoides* L. K. syn. Rchb. icon. t. 224. *C. bohémica* Schreb. *Schelhammeria Cyperoides* Rchb. exc. Schelh. *capitata* Moench. Ueberschwemmt gewesene Orte, Seeufer, an sandigen, schlammigen Seichrändern, stellw. im Geb., Rheing., Baden am Kniebis bei Oppau, Flora v. Trier Bombogen bei Wittlich, Naunheim; Baiern, Erlangen, Oberschwaben. Basel, Franken, Schlesien bei Breslau, Sachsen u.; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien u. 8—9. 4

11. *C. baldensis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 224. Alpen u. Boralpen in d. Buchenregion, stellw. mehr im südl. Geb., Oberbaiern am linken Ufer d. Loisach, an d. Raibach, bei Partenkirchen; Südtirol bis zum M. Baldo, Schweiz Cant. Wallis im zehnten Gombé, in d. Egina; Olivenwälder in d. Lombardei um Como, Venedig. 5—6.

d. *Vignea* Koch. K. Taschb. 534.

12. *C. illegitima* Cesati in Friedrichthal's Reisen in Griechenland p. 271. Maly enum. pl. austr. p. 31 et 371. Im südl. Littoral, Dalmatien auf d. Insel Vefina. 4

13. *C. gynomane* Bertoloni K. syn. Rchb. icon.

t. 258. *C. Linkii* Schkr. Rchb. exc. *C. tuberosa* Degler. *C. Mülleri* Steudel. *C. distachya* Desf. Grasige Hügel am südl. Eittoral, Istrien auf den Inseln Pola, Beruda, Dalmatien bei Ragusa auf d. Biofovo. 4—5. 4

14. *C. curvula* Allion. K. syn. Rchb. icon. t. 201. Grasige Orte d. Hochalpen in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Wallis M. Gemmi, Saßthal am M. Moro; Destr. Steyermark, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Ungarn, Lombardien, M. Genis, Piemont u. Savoyen. 7—8. 4

15. *C. incurva* Lightf. K. syn. Rchb. icon. t. 199. *C. juncifolia* Allion. Urgebirgsfließ d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis, Saßthal, Ravyl, Graubünden, Südtirol auf d. Schlehren, Piemont M. Genis. 7—8. 4

16. *C. chordorrhiza* Ehrh. K. syn. Rchb. icon. t. 200. *C. junciformis* Clairv. Schwammige, tiefe Torfsümpfe, stellw. im Geb., Rheing. bei Kaiserlautern, Oberschwaben, Oberbaiern bei München, im nördl. Deutschland Hamburg, von Ostfriesland nach Holstein, Lüneburg, Hochmoor bei Aurich rechts vom Canal, bis Ostpreußen, Königsberg, Tilsit, Danzig, Berlin, Mecklenburg, Schlesien im großen See, Torfmoor am Fuße d. Heuscheuer; Destr. Ungarn. 5—6. 4

17. *C. stenophylla* Wahlenb. K. syn. Rchb. icon. t. 200. *C. juncifolia* Host. Schkr. *C. glomerata* Host. gram. Grasige, sandige Hügel, Wiesen, stellw. im Geb., Holstein; Destr. bei Wien, Böhmen bei Prag, Mähren, Steyermark bei Gills u. auf d. Schweinstratte bei Görz, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen, Tyrol, Eittoral, Istrien bei Trieste. 4—5. 4

18. *C. divisa* Hudson. K. syn. Rchb. icon. t. 205. *C. schoenoides* Host. K. syn. edit. I. *C. austriaca* Schkr. *C. divisa* Host. Feuchte, sandige Wiesen im südl. Geb., Destr. Steyermark, Ungarn, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig. 5—6. 4

19. *C. rivularis* Schkr. Kunth. enum. II. p. 373. *C. divisa* β . Rchb. exc. in add. Nro. 398. An Bächen, Tei-

den, Seen in Ungarn am See Fertoe, am Bache Rafos u. in Siebenbürgen. 5—6. 4

20. *C. Bertolonii* Schkr. Rchb. in Moesler p. 1678. non Wahlenb. *C. cuspidata* Bert. Im südlichsten Geb., Piemont um Genua. 4. 4

21. *C. disticha* Hudson. K. syn. *C. intermedia* Goodenow. Rchb. exc. et icon. t. 210. *C. arenaria* Leers. *C. spicata* Pollich. Var. β . *C. repens* Bellard. Vignea — Rchb. exc. Feuchte Wiesen an Teich- u. Flußrändern, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

22. *C. pseudo-arenaria* Rchb. exc. et icon. t. 208. Sandstellen, stellw. im nördl. Geb., Sachsen bei Dresden, Berlin u. Hamburg auf d. Elbinseln. 6. 4

23. *C. arenaria* L. K. syn. Rchb. icon t. 209. Sandboden, im Fluglande d. Seefüste, besonders im g. nördl. Geb., Nord- u. Ostsee, von Ostfriesland bis nach Preußen häufig, bei Berlin, landwärts bis Magdeburg, Dresden, Schlesien u. stellw. dch. Westphalen bis Düsseldorf am Rheine; in Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. im südl. Vittoral. 5—6. 4

24. *C. foetida* Allion. pedm. K. syn. Rchb. icon. t. 199. Etwas feuchte, grasige Orte d. Hochalpen, in d. südl. Kette, Schweiz Cant. Bern, Wallis, Unterwalden, Uri, Graubünden, Südtirol am Salentferner, Piemont M. Genis, Savoyen. 7—8. 4

25. *C. microstyla* Gay. K. syn. Rchb. icon. t. 203. *C. lobata* Schleicher non Allion. Sumpfige Orte d. Hochalpen selten, auf d. Berner, Walliser u. Waadtländer Alpen, Grimsel, Faulhorn, St. Bernhard u., Salzburg, Lombard. 6—8. 4

26. *C. vulpina* L. K. syn. Rchb. icon. t. 217. Var. β . *C. nemorosa* Willd. Rebent. Rchb. icon. t. 216. Feuchte, nasse Orte, Wiesen, Gräben, Ufer, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

27. *C. muricata* L. K. syn. Rchb. icon. t. 215. *C. canescens* Leers, Pollich. *C. spicata* Huds. *C. contigua* Hoppe. Var. β . *virens*: *C. virens* DC. et Lamk. *C. nemorosa* Lumitzer. *C. muricata* β . *loliacea* Weihe. *C. loliacea*

Schreb. *C. divulsa* Gaud. helv. Trockene Wiesen, Tristen, Heiden, Raine, lichte Waldstellen, dch. d. g. Geb. Var. β . stellw. 5—6. 4

28. *C. divulsa* Gooden. K. syn. Rchb. icon. t. 220. Wälder, Gebüsche, stellw. dch. d. Geb., besonders im westl. u. südwestl.; Rheing. an vielen Orten, Baden im Murgthale b. Karlsruhe, Graben, Heidelberg, Nassau, Elsaß b. Weisenburg, Hagenau, Pfalz Donnersberg. Zweibrücken, Kusel, Saarbrücken, Trier, Köln, Westphalen u.; Destr. Mähren, Tyrol, Ungarn, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombard. 5—6. 4

29. *C. guestphalica* v. Boeningh. K. syn. Rchb. icon. t. 220. Sumpfige Orte in Westphalen. 5—6. 4

30. *C. teretiuscula* L. K. syn. Rchb. icon. t. 222. *C. diandra* Roth. *C. paniculata* β . Pollich. *C. cylindrica* Hartm. Var. β . major: *C. teretiuscula* α . Hartm. *C. Ehrhartiana* Hoppe. Sumpfige u. nasse Orte, Wiesen, Gräben, stellw. dch. d. g. Geb. 5—6. 4

31. *C. leiorhyncha* C. A. Meyer. Rchb. icon. t. 221. In Dalmatien. 5. 4

32. *C. paniculata* L. K. syn. Rchb. icon. t. 223. Schlammige, sumpfige Wiesen, an Weihern, Torfsümpfe, stellw. dch. d. g. Geb. 5—6. 4

33. *C. paradoxa* Willd. K. syn. Rchb. icon. t. 224. *C. paniculata* Hartm., Wahlenberg. *C. canescens* Host. gram. Sumpfige, moorige Wiesen, Tristen, Gräben u., stellw. dch. d. Geb., Schweiz, Rheing. in d. Torfmooren vom Bodensee nach Basel, Elsaß bei Straßburg, Hagenau, Oberbaden, dann bei Waghäusel im Neckargebiet, Frankfurt a. Main, Pfalz Forst an d. Hardt, Nassau, Coblenz am Laachersee, Köln bei Stommeln, Saarbrücken, Luxemburg in d. Ardennen, Schwaben, Baiern, Preußen bei Königsberg, Tilsit, Hamburg, Thüringen u.; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Ungarn. 5—6. 4

34. *C. Schreberi* Schrank. K. syn. Rchb. icon. t. 207. *C. praecox* Schreber. Trockene, grasige Hügel, Raine, Wege-
ränder, stellw. dch. d. Geb., Rheing. von Basel nach Baden;

Breisgau, Rastatt, Heidelberg, Pfalz am Donnersberg, bei Speier, Dürkheim, Mainz, Kreuznach, Trier, Coblenz, Köln nach Westphalen zc. 5—6. 4

35. *C. curvata* Knaf. Fl. 1847. p. 184. Maly enum. pl. austr. p. 32 et 371. Hügelwälder in schlammigem Boden, besonders unter Eichen in Böhmen bei Komotau. 5—6. 4

36. *C. brizoides* L. K. syn. Rchb. icon. t. 207. Laubwälder, Haine, grasige Waldstellen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. v. Basel nach Baden, Breisgau bei Freiburg, Rastatt, Karlsruhe, Heidelberg bis Frankfurt, Hanau, Nassau, Elsaß bei Hatten, zw. Hagenau u. Lauterburg, Kreuznach, Trier, Luxemburg, Köln, Düsseldorf zc., Westphalen, Hannover nach Ostpreußen, Thüringen, Sachsen zc.; Oestr. in allen Provinzen. 5—6. 4

37. *C. Ohmülleriana* O. F. Lang. K. syn. Rchb. icon. t. 213. Feuchte Wiesen in Oberbaiern bei Rothenbusch. 5—6. 4

38. *C. Boenninghausiana* Weihe. K. syn. Rchb. icon. t. 219. *C. axillaris* Fries. Sumpfige Wiesen, stellw. im Geb., besonders im nördl., Westphalen zw. Halle u. Dieffen, bei Minden, Hannover, Osnabrück, Bingen, Iburg, Lüneburg am Ith bei Wühlenburg, Oberbaiern an d. Ammer bei Rothenbusch. 6—7. 4

39. *C. remota* L. K. syn. Rchb. icon. t. 212. Var. β . *repens* Brittinger Rchb. icon. Etwas feuchte Haine, Waldstellen, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

40. *C. axillaris* Goodenough. K. syn. Rchb. icon. t. 219. Sumpfige Wiesen, stellw. im Geb., Westphalen bei Driburg, Lauenburg bei Müllen, Hannover bei Disfen, Pommern; Schweiz am Bodensee, bei Bregenz u. in Tyrol. 5—6. 4

41. *C. stellulata* Gooden. K. syn. Rchb. icon. t. 214. *C. muricata* Pollich. *C. echinata* Murr. Rasse u. sumpfige Wiesen im g. Geb. 5—6. 4

42. *C. grypus* Schkr. Rchb. exc. et icon. t. 203. *C. stellulata* β . *grypus* K. syn. *C. grypos* Lang. Sumpfige Orte d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis über Zer-

matten, Grimsel an d. Handeck u. Rödtherichboden im Cant. Bern, Destr. Tyrol, Kärnthen. 5—6. 4

43. *C. leporina* L. K. syn. Rchb. icon. t. 211. *C. ovalis* Goodenough. Var. β . *C. argyroglochin* Hornem. Rchb. icon. *C. leporina-pallens* Rchb. *C. tenuis* Sieb. Grasige Hügel, Wiesen, Triften, Wege im g. Geb., Var. β . an mehr schattigen Orten, aber selten; Rheing., in d. Pfalz im Hagenauer-Forst, Donnersberg, Bitsch, Saarbrücken, Trier, Lüneburg, Holstein. 6—7. 4

44. *C. elongata* L. K. syn. Rchb. icon. t. 218. *C. multiculmis* Ehrh. Var. β . *alpestris*: *C. Gebhardii* Willd. Rchb. icon. t. 218. Sumpfige, grasige Orte, Teichränder, in Erlengebüschen, feuchte, schattige Waldstellen, dch. d. g. Geb. Var. β . auf d. Alpen u. Boralpen stellw. 5—6. 4

45. *C. lagopina* Wahlenb. K. syn. Rchb. icon. t. 204. *C. leporina* Gooden. *C. approximata* Hoppe. *C. Lachenalii* Schkr. *C. bipartita* Allion. Feuchte, grasige Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz Cant. Bern, Berner-Oberland, Cant. Wallis, Graubünden; Destr. Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei, Savoyen. 7—8. 4]

46. *C. Heleonastes* Ehrh. K. syn. Rchb. icon. t. 204. Sumpfige Torftriften, stellw. im Geb., Hannover bei Meppen, Oberschwaben, Oberbaiern im Deininger Moos bei München; Schweiz Schwarzenegg bei Bern, La Brevin im Jura; Salzburg bei Ursprung. 6—7. 4]

47. *C. canescens* L. K. syn. Rchb. icon. t. 206. *C. cinerea* Pollich. *C. curta* Good. *C. elongata* Leers. Nassfe Wiesen, an Gräben, auf Moorboden, stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen. 5—6. 4

48. *C. Personii* Sieber. K. syn. Rchb. icon. t. 206. *C. canescens* β . *brunnescens* Koch. *C. Gebhardi* Hoppe. Sturm. Vignea — Rchb. exc. *C. canescens* β . *apicola* Wahlenb. Sumpfige Orte d. Hochalpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Salzburg, Destr. Kärnthen, Krain u.; soll auch in Ostpreußen hinter Brandenburg wachsen. 6—7. 4

49. *C. loliacea* L. K. syn. Rchb. icon. t. 214. Torfmoore, stellw., aber selten im Geb., Westphalen im Burtanger-Moore bei Rhede unter Erlengebüschen, Hannover Kr. Meppen, Pommern, u. bei Greifswalde; im südl. Vitoral, Istrien bei St. Daniele. 5. 4

e. *Carices legitimae* Koch. K. Taschb. 541.

50. *C. mucronata* Allion. pedm. K. syn. Rchb. icon. t. 201. Steinige Triften d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. dch. d. Alpenkette bis z. Monte Generoso; Baierrische Alpen nach Destr. Steyermark, Salzburg, Tyrol, Kärnthen, Krain, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 7—8. 4

51. *C. Gaudiniana* Guttnick. K. syn. Rchb. icon. t. 202. Sumpfige Moorwiesen, stellw. im Geb., Rheing. in Rheinhessen, Hanau, im Hengster bei Seligenstadt; Schweiz Cant. Bern, Amsoldingen bei Thun, Vorarlberg, einem Sumpf in einer Thalvertiefung am Siedensteige bei Brezgenz, Tyrol bei Rißbüchel. 6—7. 4

52. *C. microstachya* Ehrh. K. syn. Rchb. icon. t. 202. Moorgründen, Torfwiesen, stellw. im Geb., mehr im nördl.; Ostfriesland bei Aurich, Holstein bei Schlutup, Hannover, Lüneburg bei Mauster, Pommern bei Stettin, Schlesien bei Wohlau, Tyrol. 6. 4

53. *C. stricta* Gooden. K. syn. Rchb. icon. t. 230. Tiefe Sümpfe, Lachen, Gräben, Teichränder in stehendem Wasser, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Basel nach Baden im Breisgau, Darmstadt, Hanau, Nassau, Elsaß bei Hagenau, Hardtgebirge, Mainz, Kreuznach, Kaiserslautern, Zweibrücken, Saarbrücken, Trier, Coblenz, Bonn, Köln bei Mühlheim, Grefeld, Düsseldorf, dch. Westphalen, nach d. g. nördl. Geb. u. im g. Destr. 4—5. 4

54. *C. Drejeri* O. F. Lang. K. syn. *C. caespitosa* L. Rchb. exc. et icon. t. 229. *C. pacifica* Drejer. Sumpfige Wiesen, stellw. im nördl. Geb., Rheing., Eifel am Moosbrucher Weiher, Hamburg, Hannover bei Gelle u. Osna-brück, Sachsen bei Leipzig, Schlesien am Geiersberg u. 5. 4

55. *C. vulgaris* Fries. K. syn. Rchb. icon. t. 226. *C. acuta* α . *nigra* L. *C. caespitosa* Gooden. et Aut. *C. tricostata* Fr. *C. turfosa* Fr. Sumpfige Wiesen, Triften an Gräben, Teichränder u., dch. d. g. Geb. 4—5. 4

56. *C. acuta* L. K. syn. Rchb. icon. t. 231. *C. friscica* H. Koch. *C. acuta* β . *ruffa* Lin. *C. gracilis* Curtis. Var. β . *C. Moenchiana* Wenderoth. Sumpfige Orte, Teiche, Weiher, Fluß- u. Bachufer, dch. d. g. Geb. 4—5. 4

57. *C. dacica* Heuffel. Flora. 1835. p. 247. Comp. II. p. 621. Sumpfige Orte im Banat auf d. Alpe Szorko u. in Siebenbürgen. 7—8. 4

58. *C. rigida* Gooden. K. syn. Rchb. icon. t. 225. *C. saxatilis* Willd. Steinige, sumpfige Orte d. höheren Gebirge u. Alpen, stellw. im Geb.; auf d. Brocken längst d. Riesenkamme, Schlesien, Grafschaft Glas, Riesengebirge auf d. Schneeberge, Altoater u. im Gesenke; Mähren, Böhmen, Tyrol, Siebenbürgen u. Croatien. 7—8. 4

59. *C. salina* Wahlenb. Comp. II. p. 622. *Vignea* — Rchb. exc. in add. *C. cuspidata* Wahlenb. In Holstein u. Lauenburg. 5—6. 4

60. *C. aquatilis* Wahlenb. Rchb. exc. in add. et icon. t. 234. Sumpfige Orte in d. Niederlanden bei Utrecht. 7—8. 4

61. *C. bicolor* Allion. pedm. K. syn. Rchb. icon. t. 225. *C. androgyna* Balb. *Vignea bicolor* Rchb. exc. Gletscherränder u. feuchte Alpengries-Moore d. höchsten Urgebirgs-Alpen in d. südl. Kette; Schweiz Cant. Wallis, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Piemont Mont Genis, Savoyen. 7—8. 4

62. *C. Buxbaumii* Wahlenb. K. syn. Rchb. icon. t. 235. *C. polygama* Schkr. *C. subulata* Schum. Sumpfige Wiesen, stellw. dch. d. Geb. bis in d. Vorgebirge; Rheing., Baden im Breisgau bei Kirchzarten, Badenweiler, Mannheim, Elsaß bei Benseld, Rosfeld u., Pfalz bei Speier, Forst, Wachenheim, Ellerstadt, Maxdorf, Frankfurt a. M., Eöln, Westphalen, Hamburg, Holstein, Berlin, Halle, Baiern, Lau-

fig., Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Salzburg, Steyermark, Ungarn. 4—5. 4

63. *C. VahlII* Schkr. K. syn. Rechb. icon. t. 235. *C. alpina* Wahlenb. Granitfelsen d. Hochalpen in d. südl. Kette; Schweiz im Cant. Graubünden auf d. Albula u. im Val Bevers, Südtirol im Martelthal gegen Val di sole. 7—8. 4

64. *C. nigra* Allion. pedm. K. syn. Rechb. icon. t. 236. *C. atrata* γ. *nigra* Gaud. helv. *C. parviflora* Host. Gräßige, trockene Orte d. Alpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Destr. Steyermark, Kärnthen bei Heiligenblut auf d. Râsboden, Krain, Lombard. 7—8. 4

65. *C. aterrima* Hoppe. K. syn. Rechb. icon. t. 236. *C. atrata* β. *dubia* Gaud. helv. Gräßige, sumpfige Orte d. Hochalpen, Schweiz dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Destr. Salzburg, Steyermark, Kärnthen bei Heiligenblut gegen d. Schafflerloch, Ungarn. 7—8. 4

66. *C. atrata* L. K. syn. Rechb. icon. t. 237. *C. atrata* α. *varia* Gaud. helv. Steinige, trockene Orte d. Alpen u. Gebirge, Schlesien in d. Sudeten auf d. Schneeberg, Altwater ic., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Destr. ic. 6—8. 4

67. *C. irrigua* Smith. K. syn. Rechb. icon. t. 238. *C. limosa* β. *irrigua* Wahlenb. Torfmoore d. Hochgebirge u. Alpen, stchw. im Geb., Schlesien in d. Sudeten, Böhmen, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain. 7. 4

68. *C. limosa* L. K. syn. Rechb. icon. t. 237. Sumpfige, mit Moos bewachsene Wiesen, Torfmoore, stchw. dch. d. g. Geb., Schwaben, Baiern bei Regensburg, Thüringen, Halle, Sachsen, Berlin, Rheing., vom Bodensee nach Baden, Breisg. b. Freiburg, b. Karlsruhe, Nassau, Elsaß, Vogesen bis Bitsch, Pfalz Kaiserslautern, Zweibrücken, Saarbrücken, Trier in d. Eifel am Moosbrucher Weiher, Eöln um Schlebusch bei Mühlheim, Grefeld, Westphalen bei Dülmen, Hamburg, Hannover, Holstein, Mecklenburg, Preußen ic. 5—6. 4

69. *C. supina* Wahlenb. K. syn. Rechb. icon. t. 259. *C. glomerata* Schkr. non Roth. *C. campestris* Host

Hügel, Felsen, Triften, stellw. dch. d. Geb., Baden bei Mannheim am Relaischaus, Pfalz bei Neustadt, Borchheim, Mainz, Rombach, Heidesheim, Kreuznach, Nassau bei Kostheim, Thüringen Jena, Saalauer, Halle, Magdeburg, Berlin, Stettin, Hannover, Holstein; Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Ungarn, Croatien. 4—5. 4

70. *C. pilulifera* L. K. syn. Rchb. icon. t. 260. *C. filiformis* Pollich. *C. decumbens* Ehrh. *C. thuringiaca* Willd. Sandige Wälder, Heiden, Triften, dch. d. g. Geb. 4—5. 4

71. *C. tomentosa* L. K. syn. Rchb. icon. t. 263. *C. sphaerocarpa* Ehrh. *C. Grassmanniana* Rubenh. Nasse u. trockene Wiesen, Triften, lichte Waldstellen, Gebüsche, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Stellen, v. Schaffhausen besonders im g. Juragebiet nach Basel, Baden im Breisgau, Nassau im Taunus, Elsaß, Pfalz bei Landau, Zweibrücken, Saarbrücken, Trier im Eurerer Walde, Eurenburg, Coblenz, Köln bei Mühlheim u.; Destr. Böhmen, Mähren bis Venedig. 5—6. 4

72. *C. montana* L. K. syn. Rchb. icon. *C. collina* Willd. Var. β . *procerior* Gaud. helv. Wälder, schattige Hügel, Haine, dch. d. g. Geb. 4—5. 4

73. *C. emarginata* Schkr. Comp. II. p. 628. Maly enum. pl. austr. p. 35. *C. caryophyllata* Gmel. Ungarn. 4—5. 4

74. *C. macrolepis* DC Rchb. exc. et icon. t. 246. Oberitalien auf d. Apuanischen Alpen, M. Tambura. 5—6. 4.

75. *C. ericetorum* Pollich. K. syn. Rchb. icon. t. 262. *C. ciliata* Willd. *C. montana* Leers? Sandige, trockene Grasstellen, Triften, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Baden im Breisgau, bei Rastatt, Heidelberg, Darmstadt, Hanau, Pfalz Speier, Hardtgebirge, Kaiserslautern, Homburg bis Bitsch, Mainz, Niederingelheim, Trier, Coblenz u. 4—5. 4

76. *C. membranacea* Hoppe. Sturm. Caric. 22. Rchb. icon. t. 252. *C. ericetorum* β . *membranacea* K. syn.

C. approximata Allion. pedm. *C. ericetorum* Gaud. helv. Granitfelsen d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis, Nicolaital über Zermatten, Tyrol, Salzburg, Kärnthen. 6—8. 4

77. *C. praecox* Jacq. K. syn. Rchb. icon. t. 261.

C. montana Pollich. *C. filiformis* Leers. *C. stolonifera* Ehrh. Var. β . *longifolia*: *C. umbrosa* Host. — γ . *C. reflexa* Hoppe. *C. refracta* Roth. Gräßige Hügel, Raine, Wege, Wiesen, im g. Geb. 3—4. 4

78. *C. polyrrhiza* Wallr. K. syn. *C. longifolia* Host.

C. umbrosa Hoppe. Rchb. ex. et icon. t. 263. Waldbstellen, Haine, dch. d. südl. u. mittl. Geb., Rheing. v. Schaffhausen nach Basel, Winterthur, besonders im g. Jura auf d. Vogesensandstein u. d. Muschelkalke, Elsaß v. Eppenbrunn bis Bitsch, Bergstraße bei Dossenheim, Hanau, Nassau bei Hofheim, Pfalz Zweibrücken, Flora v. Trier bei Saarbrücken, Coblenz, Linz am Schlosse Hammerstein, Aachen, Schwaben, Baiern, Sachsen u., Schlesien; Destr. Böhmen, Steyermark, Tyrol u. 5. 4

79. *C. humilis* Leysser. K. syn. Rchb. icon. t. 239.

C. clandestina Gooden. *C. prostrata* Allion. Gräßige, dürre Hügel, Gebirge u. Abhänge auf Kalk u. Sand, stellw. dch. d. Geb., Schweiz Cant. Bern, Schaffhausen u. besonders im g. Jura, Rheing. Baden, im Breisgau am Kaiserstuhl, Mannheim u. längst d. Bergstraße bis Darmstadt, Nassau, Elsaß, Pfalz bei Dürkheim, Kallstadt, Mainz, Kreuznach, Kirn, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Coblenz bei Winningen, Dhtendung, Andernach, Münster-eifel im Eschweiler Thale, Baiern, Thüringen, Sachsen u.; Destr. u. 3—4. 4

80. *C. gynobasis* Villar. K. syn. Rchb. icon. t. 259.

C. alpestris Allion. Wahlenb. Rchb. exc. *C. diversiflora* Host. Gräßige Hügel in lichten Vornwäldern, an lehmigen Abhängen, mehr im südl. Geb., Rheing. bei Basel, Obermosel außerhalb d. Grenze d. Flora v. Trier bei Nancy, Schweiz im Jura auf d. Creux du Vant, Cant. Wallis, Cant. Waadt u. bei Genf; Destr. Südtirol, Steyermark, Ungarn, Vittoral, Lombardien, Trient, M. Baldo, Piemont u. Oberitalien. 3—4. 4

81. *C. d. gitata* L. K. syn. Rechb. icon. t. 240. Gebirgswälder, Gebüsche u., dch. d. g. Geb. 4—5. 2.

82. *C. ornithopoda* Willd. K. syn. Rechb. icon. t. 240. Sonnige, lichte Waldstellen, Waldränder, sonnige, bewachsene Hügel u. Raine, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Oberbaden bei Willingen, im Breisgau bei Oberkirch, Heidelberg u. längst d. Bergstraße bei Weinheim, Auersbach, Nassau im Taunus, Elsaß, Pfalz an d. Hardt, Oppenheim, Zweibrücken bis Saarbrücken, Schwaben, Baiern, Sachsen, Thüringen bei Jena u., Schweiz bei Bern u. besonders auf d. Jura u.; Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Ungarn u. 5. 2.

83. *C. alba* Scopol. K. syn. Rechb. icon. t. 239. *C. nemorosa* Schrank. Sonnige Gebirgswälder bis in d. Vor-alpen, trockene Wiesen, unter Gebüschen in d. Niederungen, besonders im südl. u. im mittl. Geb., nördl. bis zur Donau, Rheing. Oberbaden, Rheinwald bei Steinmetz, Breisgau am Kaiserstuhl, Elsaß bei Hünningen, Mühlhausen, Württemberg, Oberschwaben, Baiern, Thüringen; Schweiz besonders im Jura u. längs d. g. Alpenkette nach Destr. u. 4—5. 2.

84. *C. nitida* Host. K. syn. Rechb. icon. t. 264. *C. verna* Schkr. Host. Sandige Orte, trockene Hügel im südl. Geb., südl. Gypshügeln d. Harzes, Destr. bei Wien, Südtirol, Ungarn, Kärnthen, Krain, Vitoral, Istrien, bei Monfalcone, Venedig, Südschweiz Cant. Waadt, Nyon, Genf am Salève u. Cant. Wallis. 4—5. 2.

85. *C. globata* Kit. Rechb. exc. et icon. t. 264. Dürre, sandige Orte in Ungarn bei Pesth. 5. 2.

86. *C. pilosa* Scopol. K. syn. Rechb. icon. t. 264. Schattige Wälder, Gebüsche, besonders im südl. u. mittl. Geb., Rheing. Basel, Oberbaden bei Salem im Hardtwalde, Hannover, zw. Förste u. Dorste im Fürstenthum Göttingen, Schlessien bei Troppau, nördl. bis Ostpreußen im Weichselgeb. bei Tilsit, Memel, Oberbaiern; Schweiz an mehreren Orten, bei Bern, Schaffhausen, Glisau u. u. besonders im Jura; Destr. Mähren, Steyermark, Tyrol, Ungarn, Galizien, Kärnthen, Krain, Croatien u. Lombardien. 4—5. 2.

87. *C. panicea* L. K. syn. *Rehb. icon. t. 265. Var. β.*
C. panicea microcarpa Sonder. Nasse u. feuchte Wiesen,
 dch. d. g. Geb. 4—5. 4

88. *C. vaginata* Tausch. K. syn. *Rehb. icon. t. 246.*
C. phaeostachya Smith. *C. subspathacea* Wormsk. *C. sa-*
lina Don. *C. tetanica* *Rehb. exc. non Schkr.* *C. sparsi-*
flora Steudel. Felsige, nasse Orte d. Gebirge u. Boralpen,
 stellw. im Geb., Harz am Brockensee, Schlesien in d. Su-
 deten bei Braunenberg im Rupagrund, Kesselgrube im Ge-
 senke; Böhmen, Mähren, Ungarn im Banat; Schweiz im Ber-
 ner Oberlande am Schwabhorne. 6—7. 4

89. *C. glauca* Scopol. K. syn. *Rehb. icon. t. 269.*
C. recurva Hudson. *C. flacca* Schreb. *C. pendula* Schreb.
Var. β. erecta: C. erythrostachya Hoppe. — *γ. C. acu-*
minata Willd. *Rehb. icon. t. 267. C. cuspidata* Hoppe.
 Trockene u. feuchte Orte, Berglehnen, Abhänge, Wiesen,
 Triften, Waldstellen, bis in d. Alpen, dch. d. g. Geb; *Var.*
β. u. γ. im südl. Eittoral, Istrien u. 5—6. 4

90. *C. Jaegeri* F. W. Schultz. *Fl. d. Pfalz. p. 507.*
 Gebirgswälder in d. Rheinpfalz bei Annweiler. 5. 4

91. *C. claviformis* Hoppe ap. Sturm. K. syn.
Rehb. icon. t. 270. Alpen, Schweiz, Kärnthen, Krain. 8. 4

92. *C. maxima* Scopol. K. syn. *C. pendula* Good.
Rehb. icon. t. 243. C. agastachys Ehrh. Sturm. Wälder
 aus d. Niederungen dch. d. Gebirge bis in d. Boralpen, im g.
 südl. u. im mittl. Geb., nördl. bis Hannover, Erzgebirge,
 Harz; Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Schwaben,
 d. Vogesen, Schwarzwalde, Rheing., Baden bei Ettlingen,
 Geroldsau, Heidelberg, Nassau b. Braunfels, Pfalz Hagenau,
 Dornbach, Saarbrücken, Trier bei Amelbingen, Neuenburg,
 Luxemburg, Aachen, Coblenz b. Winningen, Bonn am Kreuz-
 berg, bei Friesdorf, Dotten Dorf u. bei Brühl, Westphalen,
 Spandau, Sachsen, Franken, Schlesien bei Ustron; Destr.
 Böhmen, Mähren u. 6. 4

93. *C. pallescens* L. K. syn. *Rehb. icon. t. 251.*
Var. β. undulata: C. undulata Kunze. Sumpfige, nasse
 Wiesen, feuchte Waldstellen, Gebüsche, dch. d. g. Geb. 5. 4

94. *C. strigosa* Hudson. K. syn. Rehb. icon. t. 242. *C. leptostachys* Ehrh. Schattige, feuchte Orte, an Bächen, Quellen, Wälder, Gebüsch, stellw. im Geb., Schwaben, Rheing., v. Basel nach d. Elsaß, in Baden bei Durlach, Carlsruhe, Heidelberg, Darmstadt, Nassau bei Kropbach, Bonn bei Poppelsdorf, Steinstraß bei Jülich, Flora v. Trier an d. Obermosel, etwas außerhalb d. Grenze bei Metz, Westphalen, Hamburg, Holstein, Hannover; Schweiz bei Schaffhausen, Rheinfeld, Frauenwald, Sonnenberg u.; Ungarn. 5. 4

95. *C. capillaris* L. K. syn. Rehb. icon. t. 241. Steinige, grasige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. d. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol u. in d. Sudeten im Rübenzählgarten; Destr. bis in d. südl. Eittoral u. 6—7. 4

96. *C. ustulata* Wahlenb. K. syn. Rehb. icon. t. 250. *C. atrofusca* Schkr. Sumpfige Orte d. Hochalpen, Steyermark, Kärnthen auf d. Margaritzen, Krain auf d. Wochener Alpen, Schweiz im Cant. Wallis im Gringer u. Bagnes-Thale. 8. 4

97. *C. fuliginosa* Schkr. K. syn. Rehb. icon. t. 249. *C. frigida* Wahlenb. Host. *C. spadicea* Schkr. Grasige Granitfelsen d. Hochalpen, Destr. Steyermark, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Eittoral, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

98. *C. frigida* Allion. pedm. K. syn. Rehb. icon. t. 250. *C. fuliginosa* Wahlenb. Host. *C. geniculata* Host. Feuchte Triften, Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. d. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Salzburg, Tyrol, Destr. u., Rheing. auf d. Vogesen, Breisg. auf d. Feldberg u. auf d. Sudeten in Böhmen u. 7—8. 4

99. *C. sempervirens* Vill. delph. K. syn. Rehb. icon. t. 247. *C. ferruginea* Schkr. *C. varia* Host. Var. β . *C. erecta* DC. Grasige Orte, Felsen d. Alpen u. Boralpen; Schweiz u. d. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. u., Rheing., Oberbaden bei Dffingen, Basel a. d. Bülchen u. 6—8. 4

100. *C. hispidula* Gaud. helv. K. syn. *C. fimbri-*

cata Schkr. Rchb. exc. et icon. t. 248. Felsen d. Hochalpen, Schweiz Cant. Wallis im Nicolaithal über Zermatten, über d. Bagnesthale am Räfel, auf d. Matterhorn u. in Tyrol. 7—8. 4

101. *C. firma* Host. K. syn. Rchb. icon. t. 247. Feuchte, steinige Stellen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. bch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr. bis ins südl. Geb., dann in d. Carpathen in Mähren, Galizien u. 7—8. 4

102. *C. ferruginea* Scopol. K. syn. Rchb. icon. t. 248. *C. Mielichhoferi* Schkr. *C. Scopol.* Gaud. helv. Var. β . *C. spadicea* DC. — γ . *C. Scopolii*. β . Gaud. *C. Scopoliana* Willd. Host. Feuchte, grasige Orte d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. bch. d. g. Alpenkette nach Bavern, Salzburg, Destr., Tyrol, Dalmatien, Ungarn, Lombardei u. 6—7. 4

103. *C. tenuis* Host. K. syn. Rchb. icon. t. 241. *C. brachystachys* Schkr. Feuchte Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz besonders im Jura auf d. Weissenstein, Hauenstein u. stellw. bch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr., Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Ungarn, Dalmatien, Lombardei u.; Rheing. auf d. Böldchen u. d. Paßwang bei Basel, auf d. Hochgebirgen in Mähren u. Galizien u. 6—7. 4

104. *C. depauperata* Gooden. K. syn. Rchb. icon. t. 256. *C. monilifera* Thuill. *C. ventricosa* Curtis. *C. triflora* Schkr. Waldstellen, Gebüsch, stellw. im Geb., Rheing. im Elsaß in einer Rheinwaldung bei Neu-Breisach, im Kastelwalde; dann wieder im südl. Littoral, Istrien zw. Pola u. Dignano, Ungarn im Banat. 5—6. 4

105. *C. Michelii* Host. K. syn. Rchb. icon. t. 256. Bewaldete Hügel, Gebirge im g. südl. Geb.; Destr. Böhmen bei Bobositz, Mähren, Tyrol, Kärnthen, Krain bis in d. südlichste Littoral. 5. 4

106. *C. brevicollis* DC. Kunth. enum. Rchb. icon. t. 244. *C. rhynchocarpa* Heuffel. Grasige Felsen, Gebirgswiesen auf d. Domuglettberge bei d. Herculesbädern im Banat, Siebenbürgen. 4—5. 4

107. *C. hordeistichos* Vill. delph. K. syn. Rehb. icon. t. 257. *C. secalina* Willd. Wahlenb. Rehb. exc. *C. hordeiformis* Host. Sumpfige, sandige Orte, stchw. dch. d. Geb., Rheing., Bogesen im Elsaß bei Essay, Rheinpfalz bei Alzey u. an d. Obermosel bei Nancy, Thüringen Stotternheim bei Erfurt; Destr. bei Wien, Mautniß bei Brünn in Mähren, Littoral, Istrien, Dalmatien, Ungarn. 4. 24

108. *C. flava* L. K. syn. Rehb. icon. t. 273. *C. patula* Host. Var. β . *polystachya*: *C. foliosa* Gaud. helv. *C. uetliaca* Sut. helv. Feuchte u. sumpfige Wiesen, Tristen, dch. d. g. Geb. 5. 24

109. *C. lepidocarpa* Tausch, Hoppe, Sturm, Rehb. icon. t. 272. Sumpfige Wiesen, stchw. im Geb., Rheing., Coblenz am Raachersee, Thüringen bei Halle, Sachsen bei Leipzig, Baiern bei Regensburg, Böhmen bei Prag. 5—6. 24

110. *C. Oederi* Ehrh. K. syn. Rehb. icon. t. 272. Var. β . *minor*: *C. Lipziensis* Petermann. Sumpfige Wiesen, an Teichrändern, Gräben, dch. d. g. Geb. 6—7. 24

111. *C. fulva* Gooden. K. syn. Rehb. icon. t. 252. *C. biformis* α . *sterilis* F. W. Schultz. *C. distans* β . Cesati. Rasse u. sumpfige Wiesen, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., v. Basel nach Elsaß b. Straßburg, Hagenau, Baden b. Karlsruhe, Waghäusel, Nassau u., Pfalz, Dürkheim, Maxdorf, Kaiserlautern bis Saarbrücken, Kreuznach, Luxemburg, Aachen, Edln bei Mühlheim nach Westphalen, Hannover, im nördl. Geb. nach Preußen bei Königsberg, Memel, Sachsen, Thüringen bei Jena u.; Destr. Böhmen, Mähren bis in d. südl. Littoral. 5—6. 24

112. *C. Hornschuchiana* Hoppe. K. syn. Rehb. exc. et icon. t. 252. *C. fulva* β . *Hoppeana* v. Schlechtenth. *C. biformis* β . *fertilis* F. W. Schultz. *C. speirostachys* Sm. *C. distans* Fl. Dan. *C. binervis* Wahlenb. *C. Hosteana* DC. Rehb. exc. *C. fulva* Host. Rasse Moorwiesen, stchw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen; Rheing. mit *C. fulva* aber häufiger u. 5—6. 24

113. *C. distans* L. K. syn. Rehb. icon t. 253. Var. β .

major: *C. flavescens* Host. — *γ. C. Hampeana* Rehb. icon. t. 254. Feuchte Triften, Moorniesen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., von Basel nach Elsaß u. Baden, Nassau bei Eiden, Pfalz im Harbtgebirge bei Leistadt, Kaiserslautern, Zweibrücken, Saarbrücken, Trier, Luxemburg, Aachen, Coblenz, Bonn bei Kessenich, Westphalen 2c. 5—6. 4

114. *C. binervis* Smith. K. syn. Rehb. icon. t. 255. Heideboden, stellw. im Geb., Rheing., Malmédy zw. Trier u. Aachen, Eupen bei Aachen, Berviers, Hannover zw. Bentheim u. Nordhorn, Mecklenburg, Holstein. 5—6. 4

115. *C. extensa* Gooden. K. syn. Rehb. icon. t. 274. *C. nervosa* Desf. Var. *β. C. Balbisii* Spreng. Rehb. icon. t. 274. Rasse Orte am nördl. u. südl. Seestrande, Hamburg, Ostfriesland, Holstein, Lüneburg, Mecklenburg; Destr. Mähren, Ungarn, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

116. *C. punctata* Gaud. helv. K. syn. Rehb. icon. t. 251. Feuchte, grasige Orte d. südl. Vorgebirge; Rheing., Elsaß in d. Vogesen bei Bruyères; Schweiz Cant. Graubünden, Cant. Tessin, Mont Genis, Piemont im Langothale, Salzburg u. im südl. Eittoral, Istrien, Lombardei. 4—5. 4

117. *C. laevigata* Smith. K. syn. Rehb. icon. t. 254. *C. bilicularis* DC. *C. patula* Schkr. Etwas feuchte, mit Gebüsche bewachsene Wiesen, stellw. im Geb., Rheing., auf d. hohen Benn bei Malmédy zw. Trier u. Aachen, bei Eupen, im Rötgen bei Aachen u. bei Spa, Holstein, Clausendorf bei Kiel; Galizien. 5—6. 4

118. *C. sylvatica* Hudson. K. syn. Rehb. icon. t. 242. *C. Drymeia* Ehrh. *C. vesicaria* *β. Lin. C. patula* Scopol. *C. capillaris* Leers. Var. *β. Tommasinii* Rehb. Schattige Wälder dch. d. g. Geb.; Var. *β.* im südl. Eittoral, Istrien. 4—5. 4

119. *C. Pseudo-Cyperus* L. K. syn. Rehb. icon. t. 275. Waldsümpfe, an Gräben, Teichen, dch. d. g. Geb. 6. 4

120. *C. ampullacea* Gooden. K. syn. Rehb. icon. t. 277. *C. obtusangulum* Ehrh. *C. vesicaria* Hudson. *C.*

vesicaria β . Lin. Moorige, sumpfige Orte, Teichen, Gräben, Ufer, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

121. *C. vesicaria* L. K. syn. Rchb. icon. t. 276. *C. inflata* Huds. Roth. Stehende Wasser, Teiche, Gräben, Ufer, sumpfige Moore, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

122. *C. paludosa* Good. K. syn. Rchb. icon. t. 266. *C. acuta* Curt. *C. acutiformis* Ehrh. Sümpfe, Gräben, Teiche, Fluß: u. Bachufer u., im g. Geb. 5. 4

123. *C. riparia* Curtis. K. syn. Rchb. icon. t. 268. *C. crassa* Ehrh. *C. vesicaria* Leers. Fluß: u. Bachufer, an Teichen, Weihern u., dch. d. g. Geb. 5—6. 4

124. *C. Kochiana* DC. Sturm. Rchb. icon. t. 271. *C. spadicea* Roth. *C. paludosa* β . K. syn. Sumpfige Orte, stehende Wasser, stellw. im Geb., Rheing., Rheinpfalz im Würzbacher Weiher, an feichten Stellen in d. Bliess, bei Speier, auf d. sumpfigen Kalkgebirge im Rödterwalde bei Trier unter *C. glauca*, der *C. nutans* Host. sehr ähnlich, Westphalen, Gölz u. 6. 4

125. *C. nutans* Host. K. syn. Rchb. icon. t. 265. Sumpfige, schattige Orte; Destr. Wien bei Bruck, Kan, Laas u. im Laaser Walde, Gebirgswälder in Steyermark bei Sulzbach, Gili, Tyrol, Ungarn im Banat u. Siebenbürgen. 4—5. 4

126. *C. evoluta* Hartmann. K. syn. Rchb. icon. t. 267. *C. Kochiana* Schübler. Nur am Ufer d. Donau im Steinhäule bei Ulm. 6. 4

127. *C. filiformis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 265. *C. lasiocarpa* Ehrh. *C. splendida* Ehrh. Tiefe Sümpfe, stehende Wasser in Moorgründen, stellw. dch. d. Geb., Rheing., von d. Geerieten d. Schweiz nach Elfaß, Baden bei Mannheim, Nassau bei Herborn, Pfalz Speier bis Kaiserslautern, Saarbrücken, Luxemburg bei Arlon, Coblenz am Saachersee, Bonn bei Dottendorf, Siegburg, Münsterfeld, Gölz bei Schleebusch, Westphalen, dch. d. nördl. Geb. bis nach Preußen, Königsberg, Danzig, Tilsit u. in g. Destr. 5—6. 4

128. *C. hirta* L. K. syn. Rchb. icon. t. 257. Var. β . *glabriuscula*: *C. hirtaeformis* Pers. Sandige, grasige Orte,

Wiesen, Raine, Wegeränder, feuchte Walbwiesen zc., dch. d. g. Geb. 5. 4

Hundertvierunddreißigste Ordnung. Gramineen.

Juss. K. syn. 888. K. Taschb. 555. Rchb. exc. p. 15. et icon. 2. Bd. t. 72—192. Classe Triandria — Digynia Lin.

I. Gruppe. Olyreen Nees v. E. K. Taschb. 555.

823. *Zea* L. (XXI. 3.) *Maiskorn*. K. syn. Rchb. exc. p. 54. Comp. II. p. 659.

1. *Z. Mays* L. K. syn. Rchb. exc. Schkr. t. 283. *Mays Zea* Gaertn. Aus Amerika, stellw. dch. d. Geb. cultivirt. 6—7. ☉

II. Gruppe. *Andropogoneen* Kunth. enum. K. Taschb. 555.

824. *Erianthus* Richard. *Wollzucker*. K. syn. Rchb. exc. p. 35. Comp. I. 1. p. 104.

1. *E. Ravennae* Pal. Beauv. K. syn. *Andropogon* — *L. Saccharum* — Rchb. exc. et icon. t. 173. *Ripidium* — Trin. Feuchte, sandige Orte im südl. Geb, besonders am südl. Littoral, Istrien Insel Cherso u. Sansego, Dalmatien, Ungarn, Lombardei bei Pestrino an d. Etsch, Venedig bei St. Nicolo del Lida, Mantua zc. 7—8. 4

2. *E. strictus* Nees. v. E. Comp. I. 1. p. 105. *Saccharum* — tum Spreng. Rchb. exc. et icon. t. 173. *Andropogon* — Willd. *Ripidium* — Trinius. Steinige, etwas schattige Abhänge, Wiesen, Wein- u. Olivengärten im südl. Geb., Ungarn, Dalmatien bei Zara, Ragusa, Cattaro zc. 7—8. 4

825. *Andropogon* L. Bartgras. K. syn. 889.
Rchb. exc. p. 33. Comp. I. 1. p. 105.

1. *A. Ischaemum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 175.
A. angustifolium Smith. Sonnige Hügel, Abhänge, Raine, Wege, Ufer, besonders auf Kalk, dch. d. g. südliche u. im mittl. Geb., nördl. bis Nuedlinburg im Steinholze; Rheing. aus d. Schweiz nach Elsaß bei Hagenau, Baden im Breisgau, Rastatt, Schwenningen, Mannheim 2c., Pfalz bei Dürkheim bis Worms, Mainz, Bingen an d. Nahe bis Oberstein, Coblenz, Bonn bei Beuel, Godesberg, Bornheim, Eöln, Baiern, Schwaben, Sachsen, Destr. 2c. 7—8. 4

2. *A. hirtus* L. Rchb. exc. et icon. t. 174. Trockene Hügel, Weinberge, Felsen, am Littoral d. Adriat. Meeres, Dalmatien bei Ragusa, Cattaro, Insel Lesina, Piemont, Genua, Nizza. 8—9. 4

3. *A. pubescens* Visian. Fl. Dalm. Rchb. exc. et icon. t. 174. Trockene Hügel, Wiesen, am südl. Littoral, Istrien, Inseln Sanego. u. Rossino, Dalmatien um Spalato, Salona, Insel Curzola bei Ragusa. 8—9. 4

4. *A. distachyus* L. K. syn. Pollinia distachyos Spreng. Rchb. exc. et icon. t. 175. Steinige Hügel, felsige Abhänge am südl. Littoral, Istrien u. auf d. benachbarten Inseln, Dalmatien bei Zara, Piemont, Genua, Nizza. 7—8. 4

5. *A. Gryllus* L. K. syn. Pollinia — Spr. Rchb. exc. et icon. t. 175. Grysopogon — Trin. Grasige Hügel, Wiesen im südl. Geb., Südschweiz Cant. Waadt bei Ber, Cant. Tessin bei Bellinzona im Vivinertal; Destr. Südtirol, Krain, Istrien, Dalmatien, Croatien, Ungarn bei Pesth 2c. 6—7. 4

826. *Heteropogon* Pers. Schopfsgras. K. syn. 890. Rchb. exc. p. 33. Comp. I. 1. p. 104.

1. *H. Allionii* R. et Schl. K. syn. Rchb. icon. t. 174. *H. glaber* Pers. *Andropogon Allionii* DC. *A. contortum* Allion. non Lin. Steinige Hügel, Abhänge im südl. Geb., Tyrol bei Bogen, Schweiz Cant. Tessin bei Gaudia,

Gabra, Bellinzona, Dalmatien bei Macarsca, Lombardei, Venedig, Comersee, Piemont, Savoyen bei Susa, Genua, Nizza u. 7—8. 4

827. *Sorghum* L. Moorhirse. K. syn. 890. Rchb. exc. p. 34. Comp. I. 1. p. 102.

1. *S. halepense* Pers. K. syn. Rchb. icon. t. 175. *Andropogon*—Sibth. *A. avenaceus* Humb. et Kunth. *A. arundinaceus* Scopol. *Holcus avenaceus* Lin. *Trachypogon*—Nees v. E. Trockene Hügel, Weinberge, dch. d. g. südl. Geb., Tyrol, Eittoral, Istrien, Ungarn, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Piemont u. Ligurien u. 6—8. 4

2. *S. vulgare* Pers. K. syn. Rchb. icon. t. 176. *Holcus Sorghum* Lin. Im südl. Geb. angebaut. 6—9. ☉

3. *S. cernuum* Willd. Rchb. exc. et icon. t. 176. Im südlichsten Geb. angebaut, Lombardei bei Verona u. 6—9. ☉

4. *S. saccharatum* Pers. K. syn. Host. gram. *Holcus saccharatus* L. Cultivirt im südl. Geb. 6—8. ☉

III. Gruppe. Paniceen Kunth. K. Taschb. p. 556.

828. *Tragus* Desfont. Klettengras. K. syn 891. Rchb. exc. p. 24. Comp. I. 1. p. 101.

1. *T. racemosus* Desfont. K. syn. *Cenchrus*—L. Lappago—sa Schreb. Rchb. exc. et icon. t. 190. Sand- u. Lehmboden im südl. Geb., Südschweiz Cant. Bern, Cant. Wallis; Belgien bei Gent; Oestr. Bagram bei Wien, Mähren, Südtirol, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Ligurien. 6—8. ☉

829. *Panicum* L. Fennich. K. syn. 891. Rchb. exc. p. 23 et 29. Comp. I. 1. p. 97.

Erste Rotte. *Digitaria* Scopol. K. Taschb.

1. *P. sanguinale* L. K. syn. *Digitaria*—*lis* Scopol. Rchb. exc. et icon. t. 187. *Paspalum sanguinale* Lamk.

Dactylon — Villars. *Syntherisma vulgare* Schrader. Cultivirter u. unangebauter Sandboden im g. Geb. 6—9. ☉

2. *P. ciliare* Retz. K. syn. *Digitaria* — is Scopol. Rchb. exc. et icon. t. 187. *Paspalum* — e DC. *Syntherisma* — Schrad. Sandige Aecker, besonders im g. südl. u. stchw. im mittl., Rheing., v. Basel auf d. Rheinfläche nach Baden im Breisgau, Rastatt, Mannheim, Schwellingen nach Darmstadt, Frankfurt u. Hanau, Elsaß, Hagenau, Speier bis Mainz, Kreuznach u., Baulen, Pommern b. Stettin; Destr. bis in d. südl. Littoral; Schweiz im Cant. Tessin. 7—9. ☉

3. *P. glabrum* Gaud. helv. K. syn. *P. Ischaemum* — Schreb. *P. humifusum* Kunth. *P. lineare* Krok. *Digitaria filiformis* Koel. Rchb. exc. et icon. t. 187. *Paspalum ambiguum* DC. *Syntherisma glabra* Schrader. Sandige Aecker, Brachfelder, Triften u., dch. d. g. Geb. 7—9. ☉

4. *P. aegyptiacum* Retz. Maly enum. pl. austr. p. 27. *Syntherisma* — Schult. Fl. austr. I. p. 169. Trockene Orte in Süd-Pannonien. ☉

Zweite Rotte. *Milium* K. Taschb.

5. *P. miliaceum* L. K. syn. Rchb. exc. *P. milium* Pers. Rchb. icon. t. 192. *P. esculentum* Moench. Cultivirt u. stchw. im Geb. verwildert. 7. ☉

6. *P. capillare* L. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 192. Auf cultivirtem Boden, stchw. im Geb. verwildert; Destr. bei Wien, Belgien bei Brüssel. 7. ☉

Dritte Rotte. *Oplismenus* P. B. K. Taschb.

7. *P. undulatifolium* Arduin. K. syn. *P. Burmanni* M. v. Bieb. *Orthopogon undulatifolius* R. Br. Spreng. syst. Rchb. exc. et icon. t. 189. *Oplismenus* — Kunth. Gebüsche, Olivengärten, Weae. im südl. Geb., Südtirol bei Bozen, im Val Sugano, Littoral, Istrien bei Aquileja, Umbine, Lombardei am Comersee, Mailand, Verona, Venedig, Südschweiz Cant. Tessin bei Luggeris, Codelago, Savoyen, Turin u. 8—9. 24

8. *P. Burmanni* Retz. *P. hirtellum* Burm., Wulfen, Host. *Orthopogon Burmanni* R. Br. Rchb. exc. et icon. t. 189. *Oplismenus* — P. Beauv. Sumpfige Orte am südl. Eittoral, Istrien bei Aquileja. 8—9. 4

830. *Echinochloa* P. Beauv. Stachelgras. K. syn. 892. Rchb. exc. p. 23. Comp. I. 1. p. 99.

1. *E. Crus-Galli* P. Beauv. Rchb. exc. et icon. t. 191. *Panicum Crus-Galli* Lin. K. syn. *Orthopogon* — Sprengel. Var. β . *aristatum*: *Panicum stagninum* Host. Feuchte u. nasse Orte, an Gräben, Teichen, Quellen, Aedern, Wegen, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

2. *E. eruciformis* Rchb. exc. et icon. t. 191. *Panicum* — e Sibth. Smith. Rchb. icon. Sandige Orte im südl. Eittoral, Istrien auf d. Insel Dsero, Dalmatien bei Ragusa u. 6. ☉

831. *Setaria* P. Beauv. Borstengras. K. syn. 893. Rchb. exc. p. 29. Comp. I. 1. p. 98.

1. *S. verticillata* Beauv. R. et Schl. K. syn. Rchb. icon. t. 188. *Panicum* — um L. *Pennisetum* — R. Br. Cultivirte Orte, Weinberge, Aeder, Gärten, Sandstellen u. Flußkies, stchw. dch. d. g. Geb., besonders im südl. u. mittl. Geb., Rheinz., von Basel nach Elsaß, Baden, Breisgau bis Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Nassau, Pfalz bei Speier, Worms, Dürkheim bis Mainz, Bingen, Kreuznach, Kaiserslautern, Trier, Luxemburg, Coblenz, Eöln, Rees, Emmerich, nach Westphalen bei Anholt, nach Hannover, Pommern, Schlesien, Sachsen, Thüringen, Franken, Baiern u. 7—8. ☉

2. *S. viridis* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 188. *Panicum viride* L. P. *bicolor* Moench. P. *Weinmannii* R. et Schl. P. *reclinatum* Villars. P. *viride* β . *majus* Gaud. helv. Sandboden, Felder, Weinberge, Wege, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

3. *S. glauca* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 188.

Panicum glaucum L. *P. flavescens* Moench. Sandboden, Acker, Ufer, Wege, Schutt, dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

4. *S. italica* Beauv. K. syn. *Panicum italicum* L. Var. β . *P. germanicum* Roth. *P. sibiricum* Host. — γ . *P. compactum* Kit. Cultivirt u. stellw. besonders im südl. Geb. verwildert, Rheing. bei Bonn, Edln u., Destr. bei Wien, Schweiz Cant. Tessin. 7—8. ☉

IV. Gruppe. Phalarideen Kunth. K. Taschb. p. 558.

832. *Phalaris* L. Glanzgras. K. syn. 893. Rchb. exc. p. 32. Comp. I. 1. p. 109.

1. *P. canariensis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 181. Angebaut u. im südl. Littoral unter d. Saat u. an Wegen verwildert, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen. 7—8. ☉

2. *P. minor* Retz. K. syn. Rchb. icon. t. 181. *P. aquatica* Aiton. Feuchte, sandige Orte, Saatäcker am südl. Littoral, Istrien zw. Fiume u. Laurana, Dalmatien u. um Nizza. 5—6. ☉

3. *P. aquatica* L. K. syn. Rchb. icon. t. 181. *P. caerulescens* Desf. *P. bulbosa* Presl. *P. variegata* Spreng. Feuchte Orte, in Gräben am südl. Littoral, Istrien, Stramare bei Triest, Dalmatien. 5. 4

4. *P. paradoxa* L. K. syn. Rchb. icon. t. 181. Weinberge, Olivengärten, Acker, Wege, im südl. Littoral u. d. Inseln d. Adriat. Meeres, Istrien bei Triest, Dalmatien, Piemont, Nizza. 5—6. ☉

5. *P. arundinacea* L. K. syn. Baldingera — Rchb. exc. et icon. t. 181. Bald. colorata Fl. Wetterau. Arundo — Aiton. *Digraphis arundinacea* Trinius. Var. β . *P. arundinacea picta* Lin. Stehende Wasser an Teichen, Gräben, ufern, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

833. *Hierochloa* Gmel. Darrgras. K. syn. 894. Rchb. exc. p. 53. Comp. I. 1. p. 111.

1. *H. odorata* Wahlenb. K. syn. *H. borealis* R. et

Schl. Rehb. exc. et icon. t. 183. *Holcus* — Schrader. *Holc. repens* Host. *Holc. odoratus* Schkr. Etwas feuchte, grasige Sandstellen, sumpfige Wiesen, stchw. mehr im nördl. Geb., Dessau, Barby v. Oldenburg dch. d. nördl. Deutschland bis Preußen b. Königsberg, Berlin, Schlesien, Baiern bei München, nach Destr. Böhmen, Mähren u. Siebenbürgen. 5—6. 4

2. *H. australis* R. et Schl. K. syn. Rehb. icon. t. 183. *Holcus* — Schrader. *Holc. odoratus* Host. Schattige Gebüsche, Vorhölder, Waldstellen, stchw. mehr im südl. Geb., Baiern bei Nürnberg, Regensburg, Preußen bei Thorn, Tilsit, Danzig, Schlesien; Destr. bei Wien, Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Ungarn, Siebenbürgen, Eittoral, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Schweiz bei Mühlsäusen K. syn. 3—4. 4

834. *Anthoxanthum* L. Ruchgras. K. syn. 895.

Rehb. exc. p. 53. Comp. I. 1. p. 117.

1. *A. odoratum* L. K. syn. Rehb. icon. t. 182. Var. β . *A. villosum* Loisl. Wiesen, Heiden, Wälder, im g. Geb. 5—6. 4

835. *Imperata* Cyrill. Imperate. K. syn. 895.

Rehb. exc. p. 34. Comp. I. 1. p. 112.

1. *I. cylindrica* Beauv. Host. K. syn. Rehb. icon. t. 173. *I. arundinacea* Cyrill. Link. *Lagurus cylindricus* L. *Saccharum* — cum Lamk. Oliven- u. Weingärten, an Wegen im südl. Eittoral, Istrien u. d. Inseln, Piemont, Nizza am Varflusse. 6—8. 4

V. Gruppe. *Alopecuroideen* Koch. K. Taschb. p. 559.

836. *Alopecurus* L. Fuchsschwanz. K. syn. 896.

Rehb. exc. p. 30. Comp. I. 1. p. 117.

1. *A. pratensis* L. K. syn. Rehb. icon. t. 178. Fruchtbare Wiesen, Grassstellen, dch. d. g. Geb. 5—9. 4

2. *A. nigricans* Hornem. Jacq. K. syn. Rchb. icon. t. 178. *A. repens* M. v. Bieb. *A. ruthenicus* Weinm. *A. arundinaceus* Poir. *A. ventricosus* Pers. Wiesen, selten im Geb., Hamburg nach Holstein; Oestr. bei Steyer u. in Siebenbürgen. 5—6. 4

3. *A. agrestis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 178. Saatäcker, Felder, Weinberge, besonders auf Lehmboden, stellenw. dch. d. Geb., mehr im südl. u. mittl., seltner im nördl. Rheing., gemein auf d. g. Rheinfläche u. 6—7. ☉

4. *A. bulbosus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 178. Sumpfige, salzhaltige Wiesen im südl. Geb., Istrien um Carpano bei Albona, Siebenbürgen, Venedig bei Brondola; Holland bei Amsterdam. 5—6. 4

5. *A. creticus* Trinius. Rchb. exc. et icon. t. 178. Saatäcker u. Weingärten in Dalmatien. 6. ☉

6. *A. fulvus* Smith. K. syn. Rchb. icon. t. 178. *A. paludosus* Beauv. *A. geniculatus* β. Roth. Sumpfige Wiesen, Teichränder, Gräben, dch. d. g. Geb. 5—8. ☉

7. *A. geniculatus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 178. Var. β. *A. bulbosus* Hoffm. Huds. Stehende Wasser, sumpfige Wiesen, an Teichen, Gräben, im g. Geb. gemein. 5—6. 4

8. *A. utriculatus* Pers. K. syn. Rchb. icon. t. 178. *Phalaris* — Host. Fruchtbare, etwas feuchte Wiesen, stellenw. im südl. u. mittl. Geb., Rheing., Elsaß bei Schlettstadt, Pfalz bei Zweibrücken, Trier häufig bei Konz zw. Mosel u. Saar, Saarbücken, Luxemburg; Krain, Littoral, Istrien bei Triest, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Veltlin, Piemont u. 5—6. ☉

837. *Phleum* L. Fieschgras. K. syn. 897. Rchb. exc. p. 31. Comp. I. 1. p. 113.

1. *P. tenue* Schrader. K. syn. Rchb. icon. t. 179. *Achnodon* Bellardi Link. *Achnodonton tenue* et *A. Bellardi* Beauvais. *Phalaris bulbosa* L. *Ph. cylindrica* DC. *Ph. tenuis* Host. *Ph. subulata* Savi. *Ph. sativa* Pers. Gräßige Orte, an Wegen, besonders am südl. Littoral, Krain

auf überschwemmten Stellen neben d. Muhr bei Gräg, Ungarn, Istrien, auf d. Inseln St. Andrea, Beglio, Cherso, Dalmatien. 4—6. 4

2. *P. arenarium* L. K. syn. *Chilochloa* — a Beauv. *Rchb. exc. et icon. t. 180. Phalaris* — Willd. Sandige Orte, besonders an d. Küsten d. Ost- u. Nordsee u. im südl. Littoral, stellw. im Binnenlande; Rheing., Pfalz bei Speier, zw. Mainz u. Bingen, Nassau, Köln, Düsseldorf, Aachen, von Holstein nach Ostfriesland bis Mecklenburg; Böhmen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Littoral, Lombardien, Venedig. 6—7. ☉

3. *P. Michellii* Allion. pedm. K. syn. *Chilochloa* — *Rchb. exc. et icon. t. 180. P. hirsutum* Suter helv. *Phalaris alpina* Haenke. Var. β . *P. trigynum* Schrader. *P. cuspidatum* Willd. *P. Hostii* Host. Fl. austr. *Chilochloa cuspidata* R. et Schl. *Rchb. exc. et icon. t. 180. Phalaris trigyna* Host. Triften d. Alpen, Schweiz im Jura auf d. Chasseral, Chasseron, auf d. Dole u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Oestr., Tyrol u.; Var. β . in Tyrol, Istrien u. Dalmatien. 7—8. 4

4. *P. Boehmeri* Wibel. K. syn. *Chilochloa* — Beauv. *Rchb. exc. et icon. t. 180. P. phalaroides* Koel. *P. glabrum* Bernh. *P. laeve* M. v. Bieb. *Phalaris phleoides* L. Trockene, sandige Hügel, dürre Triften, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. Baden, Mannheim nach Nassau, Elsaß nach d. Pfalz bei Speier, Harbtgebirge bis Dürkheim, Mainz, Bergstraße, Nahegegend, Trier, Luxemburg, Coblenz, Bonn u. 6—7. 4

5. *P. asperum* Villars delph. K. syn. *Chilochloa aspera* Beauv. *Rchb. exc. et icon. t. 180. P. viride* Allion. *P. ventricosum* Moench. *P. paniculatum* Huds. *Phalaris aspera* Retz. obs. *Phal. paniculata* Aiton. Aecker, Weinberge, sandige unangebaute Orte, an Wegen, stellw. im südl. u. mittl. Geb., Rheing., von Schaffhausen nach Basel, Elsaß bei Dürkheim, Burweiler, Baden bei Karlsruhe, Mannheim, Ladenburg, Nassau bei Weilburg, Rheing., Pfalz bei Oppenheim, Nierstein, Mainz bis Bingen, Nahehal bei Monsingen, Sponheim, Trier, Coblenz bei Bassenheim, Baiern bei

Erlangen, Schweinfurt, Hannover bei Göttingen, Meusen, Ellershausen; Destr. Böhmen, Tyrol, Ungarn, Eittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 4—5. ☉

6. *P. pratense* L. K. syn. Rchb. icon. t. 179. Var. β . *P. nodosum* Lin. *P. bulbosum* Host. — γ . *P. Bertolonii* DC. ex Bertol. Fl. italic. Fruchtbare Wiesen dch. d. g. Geb.; Var. β . mehr an trockenen Orten, Rainen, Sandfelder. 6—7. 4

7. *P. alpinum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 179. Var. β . *P. commutatum* Gaud. helv. *P. alpinum* Lap. *P. Bellardi* Schleich. Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. Tyrol bis in d. Lombardei, dann in Schlesien auf d. Sudeten, d. Sonnenkoppe u. im Riesengebirge. 6—8. 4

8. *P. echinatum* Host. K. syn. Rchb. icon. t. 179. *P. felinum* Smith. Gebirgswiesen im südl. Eittoral, Istrien u. d. Inseln, Dalmatien, Lombardei bei Verona. 5. ☉

838. *Colobachne* Pal. de Beauv. Stummelgras. Rchb. exc. p. 31. Comp. I. 1. p. 120.

1. *C. Gerardi* Link. Rchb. exc. et icon. t. 179. *Phleum Gerardi* Jacq. *Phl. capitatum* Scopol. *Alopecurus Gerardi* Vill. Triften, Wiesen d. Hochgebirge im südl. Geb., Eittoral, Istrien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont M. Genis, Seealpen über Vinadio, Savoyen M. Isèran 2c. 7—8. 4

839. *Crypsis* Aiton. Dorngras. K. syn. 897. Rchb. exc. p. 30. Comp. I. 1. p. 116.

1. *C. aculeata* Aiton. K. syn. Rchb. icon. t. 177. *Anthoxanthum aculeatum* Lin. *Schoenus*—*tus* Lin. *Phleum schoenoides* Jacq. *Agrostis aculeata* Scopol. *Heleochoa diandra* Host. Sumpfige Orte im südl. Geb., Destr. Mähren am Mönicher-See, Ungarn, Tyrol, Siebenbürgen, Eittoral, Istrien bei Monfalcone, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 7—8. ☉

2. *C. schoenoides* Lamk. K. syn. Rchb. icon. t. 177. *Spartina phleoides* Roth. *Phleum schoenoides* Lin.

Heleochloa — Host. Rasse, sumpfige Orte im südl. Geb., Krain, Littoral, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardien, Venedig, Piemont, Nizza. 7—8. ☉

3. *C. alopecuroides* Schrader. K. syn. Rehb. icon. t. 177. *Heleochloa* — Host. Sumpfige Orte an Gräben, Teichen, im südl. Geb., Destr. Mähren bei Großenzersdorf, Bisenz, Littoral, Istrien bei Doberdo zw. Duino u. Görz, Croatien, Dalmatien, Ungarn, Lombardien, Piemont. 7—9. ☉

840. *Chamagrostis* Borkhaus. Zwerggras. K. syn. 899. K. Taschb. 561.

1. *Ch. minima* Borkh. K. syn. *Mibora verna* Pal. Beauv. Rehb. exc. et icon. t. 172. *Sturmia minima* Hoppe. Comp. I. 1. p. 120. *Knappia verna* Trin. Kn. *agrostidea* Smith. *Agrostis minima* Lin. Sandboden, Aecker, Brachfelder, stellw. im Geb., Rheing., Elsaß v. Philippsburg bis Mainz, Frankenthal, Bingen, Nassau bei Eltville, Rüdesheim u., Luxemburg, Aachen, Jülich, Belgien, Baden, Schwetzingen, Mannheim bis Darmstadt, Main v. Frankfurt, Hanau nach Baiern bis Würzburg, bei Beireuth, Wertheim, Hamburg, Holstein; Siebenbürgen, Lombardien u. Nizza. 3—4. ☉

VI. Gruppe. Chlorideen Kunth. K. Taschb. p. 561.

841. *Cynodon* Richard. Hundszahngras. K. syn. 899. Rehb. exc. p. 22. Comp. I. 1. p. 153.

1. *C. Dactylon* Rich. K. syn. Rehb. icon. t. 172. *Panicum* — L. *Digitaria stolonifera* Schrad. *Paspalum umbellatum* Lamk. *Dactylon officinale* Villar. delph. Sandboden an Ufern, Wegen, Rainen, Feldern, besonders im g. südl. u. mittl. Geb., Schweiz, Rheing., von Basel, stellw. auf d. g. Rheinfläche bis Westphalen, am Main bis Würzburg, Nahe bei Kreuznach, Saar bei Saarbrücken, Saarlouis, Trier bis Coblenz, Bonn u., Berlin, Potsdam, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren bis in d. südl. Littoral. 7—8. 4

842. *Beckmannia* Host. *Bedfmannie*. Rchb. exc. p. 22. Comp. I. 1. p. 152.

1. *B. erucaeformis* Host. Rchb. exc. et icon. t. 171. *Phalaris* — *L. Cynosurus* — Aiton. *Paspalum cristatum* Moench. *Joachimia phalarioides* Tenore. Sumpfige Wiesen, an Gräben, stellw. im Geb., Schlesien, Breslau bei Polnisch-Neudorf, Ungarn bei Pesth, Dalmatien. 6—7. 4

843. *Spartina* Schreber. *Besengraß*. K. syn. 900. Rchb. exc. p. 22. Comp. I. 1. p. 153.

1. *S. stricta* Roth. K. syn. Rchb. icon. t. 171. *Lemnetis pugnens* Rich. Person. *Dactylis stricta* Aiton. *Paspalum strictum* Brot. *Dactylis cynosuroides* Löffl. *Trachynotia stricta* DC. Sumpfige, sandige Orte, am südl. Eittoral, Istrien, Triest bei Monfalcone, rechtes Ssonzo-Ufer gegen Aquileja u. Garda, Lombardei, Venedig. 8—9. 4

VII. Gruppe. Oryzeen Kunth. K. Taschb. p. 562.

844. *Oryza* L. *Reiß*. Rchb. exc. p. 33. Comp. I. 1. p. 121.

1. *O. sativa* L. Rchb. exc. Angebaut im g. südlichsten Geb., Südungarn, Lombardei bei Verona u. 7—8. ☉

845. *Leersia* Solander. *Seersie*. K. syn. 900. Rchb. exc. p. 33. Comp. I. 1. p. 121.

1. *L. oryzoides* Swartz. K. syn. Rchb. icon. t. 181. *Phalaris* — *L. Homalocenchrus* — Pollich. *Eckharta clandestina* Wiggers. *Asprella oryzoides* Lamk. Ufer an Bächen, Flüssen, Quellen, Teichen, Gräben, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., im Rhein-, Neckar-, Main-, Rahr-, Moseltale u. 8—9. 4

846. *Coleanthus* Seidel. *Scheidenblüthengraß*. K. syn. 900. Rchb. exc. p. 20. Comp. I. 1. p. 150.

1. *C. subtilis* Seidel. K. syn. Rchb. icon. t. 177. *Schmidtia* — Tratt. Schm. utriculosa Sternb. Im Schlamme an Fischteichrändern in Böhmen bei Wossek. 7—9. ☉

VIII. Gruppe. *Agrostideen* Kunth. enum. K. Taschb. p. 562.

847. Polypogon Desfontain. Bürstengraß. K. syn. 901. Rchb. exc. p. 24. Comp. I. 1. p. 129.

1. *P. monspeliensis* Desf. K. syn. Rchb. icon. t. 91. *Alopecurus* — L. *Al. paniceus* Lamk. *Al. aristatus* Huds. *Agrostis panicea* Willd. *Phleum crinitum* Schreb. *Milium paniceum* Host. austr. An Wegen, Ufern, besonders im südl. Littoral, Schweiz bei Freiburg, Istrien, Dalmatien, Lombardien, Venedig 5—6. ☉

2. *P. maritimus* Willd. Rchb. icon. p. 13. et t. 92 et 75. Bertol. Fl. italica. *Alopecurus paniceus* Lin. Am südlichsten Littoral, Dalmatien bei Trau, Marinje bei Sebenico, Piemont, Nizza. 5—6. ☉

3. *P. littoralis* Smith. K. syn. Rchb. icon. t. 91—92. *Agrostis* — Sm. *Ag. lutosa* Poir. An d. Küste d. Nordsee, am Schlickergrund d. Insel Norðerney. 7—8. 4

848. Agrostis L. Straußgras. K. syn. 901. Rchb. exc. p. 25. Comp. I. 1. p. 125.

Erste Rotte. *Agrostis* P. B.

1. *A. stolonifera* Koch. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 75. f. 33. *A. alba* Schrad. *A. capillaris* Pollich. *A. diffusa*, *A. sylvatica* et *A. varia* Host. *A. decumbens* Haller. Gaud. helv. Var. β . *gigantea* Meyer, Roth. *A. gigantea* Gaud. Rchb. icon. t. 75. *A. alba* M. et K. — γ . *pauciflora*: *A. pauciflora* Schrader. *A. patula* Gaud. Rchb. icon. t. 75. — δ . *maritima*: *A. alba* α . *maritima* Meyer. *A. stolonifera* β . Lin. *A. maritima* Lamk. *A. frondosa* Visian. Fl. Dalm. *Vilfa glaucescens* Presl. — ϵ . *vivipara*:

A. sylvatica Rehb. icon. Sandboden, Wiesen, Triften, Wege, Raine, dch d. g. Geb. von d. Seeküste bis in die Boralpen gemein; Var. δ . in Tyrol u. an d. Seeküsten. 6—8. 4

2. *A. pungens* Schreber. Bertol. Fl. ital. Rehb. icon. t. 77. *Podosemum* — Link. *Sporobolus* — R. Br. Villa — Beauvais, Trinius. Im Sande d. südl. Eittoral, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Genua, Ligurien bei Sabona. 7—8. 4

3. *A. verticillata* Vill. delph. Comp. I. 1. p. 126. Rehb. icon. t. 76. *A. stolonifera* L herb. Smith. Sumpfige Wiesen an Wassergräben im südl. Eittoral, Dalmatien bei Sebenico, Cattaro, Spalato, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza. 5—6. 4

4. *A. vulgaris* Withering. K. syn. Rehb. exc. et icon. t. 75. M. et K. Schrader. *A. stolonifera* Pollich. *A. hispida* Willd. *A. rubra* β . Wahlenb. *A. tenella* Hoffm. Var. β . *stolonifera*: *A. stolonifera* α . Lin. — γ . *A. pumila* L. Rehb. icon. — δ . *aristata*: *A. alpina* Besser. Galiz. teste Wahlenb. Wiesen, Triften, Heiden, Sandstellen, Wege, im g. Geb. bis in d. Alpen. 6—8. 4

Zweite Rotte. *Trichodium* Michaux.

5. *A. canina* L. K. syn. Rehb. icon. t. 74. *Trichodium caninum* Schrad. *Agraulis caninus* Beauv. Var. β . *A. hybrida* Gaud. helv. Rehb. icon. Feuchte Wiesen, Seichränder, an Gräben, auf Torfmooren, sumpfigen Waldstellen, dch d. g. Geb. bis in d. Boralpen. 6—8. 4

6. *A. nobilis* De Notaris, Cesati in Saggio etc. Maly enum. pl. austr. p. 22. In d. Lombardei. 6. 4

7. *A. alpina* Scopol. K. syn. Rehb. icon. t. 74. *Trichodium rupestre* Schrader. *Agrostis rupestris* Host. gram. Dub. Var. β . *A. intermedia* Hoppe. *A. filiformis* Villars. *A. flavescens* Host. *Avena aurata* Suter. helv. Triften d. Alpen u. Hochgebirge, Schwarzwald auf d. Belchen, Schlesien in d. Sudeten, Böhmen, Mähren in d. Jano-

wiger Gebirgen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Salzburg, Destr. 2c. 7—8. 4

8. *A. rupestris* Allion. pedm. K. syn. Rchb. icon. t. 74. *A. setacea* Villars. *A. alpina* Host. gram. Dub. Bertol. *Trichodium alpinum* Schrader. Wiesen, Triften d. Alpen u. Hochgebirge, Rheing., Schwarzwald auf d. Belchen, Schlessien im Gesenke Schneekoppe, d. Sudeten, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Destr. 2c. 7—8. 4

9. *A. pusilla* Du Mort. Rchb. exc. in add. 136. b. *Trichodium pusillum* Van Hall. Fl. Belg. *A. canina* d. Lej. et Court. Belg. Sandige Orte in Belgien u. Holland. 6. 4

10. *A. setacea* Curt. Lond. Rchb. exc. in add. 136. b. *Trichodium setaceum* R. et Schult. Trockene Wiesen in d. Niederlanden bei Utrecht. 6—7. 4

849. *Apera* Adanson, Beauvais. Windhalm. K. syn. 904. Rchb. exc. p. 24. Comp. I. 1. p. 128.

1. *Ap. Spica-venti* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 73. *Agrostis* — Lin. *Anemagrostis* — Trinius. Var. β . *purpurea*: *Apera purpurea* Rchb. exc. *Agrostis* — Gaud. helv. Sandige Saatäcker, Felder, im g. Geb.; Var. β . Süd-schweiz, Piemont. 6—7. ☉

2. *Ap. interrupta* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 73. *Agrostis* — L. *Anemagrostis* — Trin. Sandige Acker, stellenw. besonders im südl. Geb., Rheing., Luxemburg bei Kopstal, Sept-Fontaines, Arlon in Belgien, Hannover bei Salzderhelden im Fürstenthum Grubenhagen, Schweiz Cant. Wallis, Genf, Nyon; Destr. bei Wien, Mähren, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Lombardien, Venedig. 6—7. ☉

850. *Lagurus* L. Sammtgras. K. syn. 904. Rchb. exc. p. 24. Comp. I. 1. p. 140.

1. *L. ovatus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 91. Weingärten, Olivengärten, Wege am südl. Littoral, Istrien, Steyer-

mark an d. Abhängen d. Sane bei Gili, Reichenburg u., Dalmatien, Kombarbei, Venedig u. 6—7. ☉

851. *Calamagrostis* Roth. (*Arundo* Lin.) Schilf, Reithgras. K. syn. 905. Rchb. exc. p. 26. Comp. I. 1. p. 131.

1. *C. lanceolata* Roth. K. syn. Rchb. icon. t. 82. *C. ramosa* Host. *Arundo Calamagrostis* Lin. Ar. Schleicheriana Besser. Ar. Leersii Oett. Var. β . *pallida*: *C. Gaudiniana* Rchb. exc. et icon. t. 82. *Arundo canescens* Wiggers. Feuchte Wiesen, Ufer, Wälder, besonders auf Sand- u. Torfboden, stchw. dch. d. g. Geb., Rheing., Schweiz nach Elsaß bei Hagenau mit *C. Gaudiniana*, Baden Heidelberg, Mannheim, Bergstraße bis Frankfurt, Hanau, Pfalz bei Marbors, Oggersheim u., Saarbrücken, Luxemburg, Neuwied, Königswinter bei Bonn, Köln, Jülich u. Eupen bei Aachen, Westphalen bei Bielefeld, Hannover, Holstein nach Ostpreußen, Königsberg, Tilsit, Danzig u., Berlin, Schlesien, Sachsen, Baiern; Destr. Böhmen, Ungarn, Vittoral, Siebenbürgen, Kombarbei, Venedig u. 7—8. 4

2. *C. littorea* DC. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 83. *C. laxa* Host. Rchb. exc. et icon. *Arundo littorea* Schrader. Ar. *Pseudo-phragmites* Haller fil. Ar. *effusa* Gmel. Var. β . *C. glauca* M. v. Bieb. Feuchte Sandstellen, Uferfließ d. Flüsse, stchw. dch. d. Geb., Rheing., von Basel nach Baden, Karlsruhe, Neckartauer Wald, Mannheim, Schweiz mit d. Flüssen d. Alpenkette in d. Niederungen, Rheineck am Bodensee, Baiern an d. Isar bei München, Harz am Bodeufer bei d. Blechhütte, Ostpreußen im Weichselgeb. bei Thorn, Sachsen am Muldeufer; Destr. Steyermark, Tyrol, Ungarn, Vittoral, Istrien, Kombarbei u. 7—8. 4

3. *C. epigejos* Roth. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 84. *Arundo* — L. Ar. *Calamagrostis* M. v. Bieb. Var. β . *colorota*: *Arundo intermedia* Gmel. bad. *C. Hubneriana* Rchb. exc. et icon. t. 84. — γ . *viridis*: *C. glauca* Rchb. exc. et icon. t. 84. non M. v. Bieb. Trockene u. feuchte

Orte in Wäldern, Gebüſche, Ufer d. Flüſſe, Bäche, Triſche, Sandfelder, Hügel zc., dch. d. g. Geb. 7—8. 4

4. *C. Halleriana* DC. K. syn. *C. Pseudo-phragmites* Link. Rchb. exc. et icon. t. 81. *C. varia* Host. *C. Clarionis* Loisl. *C. pulchella* et *C. nutans* Sauter. Rchb. exc. et icon. t. 81. *Arundo Halleriana* Gaud. Ar. *Pseudo-phragmites* Schrad. Ar. *Calamagrostis* Haller. Feuchte Gebüſche, Waldſtellen d. Alpen u. Boralpen, beſonders auf Granit, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette d. Urgebirgs nach Baiern, Tyrol, Kärnthn, Krain u. Ungarn; Holſtein, dch. d. nördl. Geb. nach Pommern, im Harz, Erzgebirge, Schleſien im Gefenke d. Sudeten; Deſtr. Böhmen, Mähren, Siebenbürgen. 7—8. 4

5. *C. tenella* Link. Host. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 78. *Arundo tenella* M. et K. Var. α . *mutica*: Ar. *tenella* Schrad. *C. alpina* Host. *Agrostis pilosa* Schleich. — β . *aristata*: *C. tenella* Host. Ar. *tenella* β . M. et K. Ar. *humilis* R. et Schult. syst. Schattige Triſten d. Alpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette d. Granits nach Tyrol, Salzburg, Krain, Deſtr., Steyermark, Lombardei. 7—8. 4

6. *C. stricta* Sprengel. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 78. *Arundo* — Timm. ap. Sturm. Ar. *neglecta* Ehrh. *Deyeuxia* — Kunth. Feuchte Wiefen, an Gräben im nördl. Geb., Hamburg, Holſtein, Lauenburg, Niederlauſiß, Preußen bei Königsberg, Marienwerber zc., Pommern, Brandenburg, Berlin bis Lüneburg, Mecklenburg, Holſtein, Schleſwig zc. Siebenbürgen. 6—7. 4

7. *C. montana* Host. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 80. *C. varia* Link, Trinius. *Arundo varia* Schrader. Ar. *montana* Gaud. helv. *Deyeuxia varia* Kunth. *C. sylvatica* Host. Gebirgswiefen u. Triſten d. Boralpen, ſtellw. im ſüdl. u. mittl. Geb., Schweiz u. dch. d. Alpenkette, beſonders im Jura. M. Chafferal, Chafferon zc., Rheing., Baſel auf d. Waſſerfall, Flora v. Trier in d. Hocheifel bei Prüm, Luxemburg, nördl. bis in d. Vorharz, Hamburg, Oſtpreußen; Deſtr. bis an d. ſüdl. Eitthal. 7—8. 4

8. *C. acutiflora* DC. Rchb. exc. et icon. t. 80. *C. montana* β . *acutiflora* K. syn. *Arundo acutiflora* Schrad. *Deyeuxia* — Kunth enum. Laubwälder, besonders im südl. Geb., Baiern auf d. Isar-Inseln gegen Harlachin, nördl. bis Ostpreußen bei Tilsit, Salzburg, Krain, Vittoral, Istrien, bei Triest; Schweiz auf d. Gemmi zc. 6—7. 4

9. *C. sylvatica* DC. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 79. *C. arundinacea* Roth. *C. pyramidalis* Host. Rchb. icon. t. 79. *Agrostis arundinacea* L. *Arundo sylvatica* Schrader. *Deyeuxia* — Kunth enum. Gräßige Waldstellen d. Gebirge, gräßige Orte d. Forstholzer, stchw. dch. d. Geb., Rheing., v. Bodensee nach Basel, Baden, im Breisg. auf d. Feldberg, bei d. Wildbad, Ettlingen, Baden-Baden, Durlach, Heidelberg Pfalz Speier bis Kaiserslautern, Kreuznach, Bergstraße nach Nassau, Flora v. Trier in d. Eifel bei Prüm bis Cornelimünster, Aachen bei Eupen, Stollberg, Coblenz, Bonn zw. Sprendorf u. Röttgen, Köln bei Opladen zc., nördl. bis Hamburg, Ostpreußen bei Königsberg u. südl. nach Destr. bis in d. südl. Vittoral. 7—8. 4

852. *Ammophila* Host. Link. Sandrieth. K. Taschb. 565. Rchb. exc. p. 28. Comp. I. 1. p. 135. *Psamma* Beauv. K. syn. 907.

1. *A. arenaria* Link. Rchb. exc. et icon. t. 85. *A. arundinacea* Host. *Psamma arenaria* Beauv. K. syn. *Arundo* — Lin. Schrader. *Calamagrostis* — Roth. Im Fluglande an allen nördl. Seeküsten u. am südl. Vittoral bei Venedig, auf Sandboden im Binnenlande, stchw. im Geb., Darmstadt bei Arheilgen, dch. Westphalen, Hamburg, Holstein nach Hannover bis Berlin, Spandau, Wittenberg bis nach Ostpreußen bei Thorn, Anhalt, Sachsen bei Dresden, Ober- u. Niederlausitz zc. 6—7. 4

2. *A. baltica* Link. Rchb. exc. et icon. t. 85. *Psamma* — R. et Schult. K. syn. *Arundo* — Flügge. Auf d. Dünen d. Nord- u. Ostsee, v. Bremen dch. Holstein, v. Travemünde

bis zum Hafen bei Kiel u. im nördl. Deutschland bis Königsberg in Preußen bei Pillau, Danzig stellw. 7—8. 4

853. *Gastridium* Palisot de Beauv. Nissen-
gras. K. syn. 907. Rchb. exc. p. 24. Comp. I. 1. p. 129.

1. *G. lendigerum* Gaud. helv. K. syn. Rchb. icon. t. 73. *G. australe* Beauv. *Milium lendigerum* Lin. Host. *Agrostis australis* L. *A. ventricosa* Gouan. *A. panicea* Link. *Calamagrostis Schwabii* Sprengel. Var. β . *G. muticum* Spreng. *G. scabrum* Presl. Hügel, Aecker, im südl. Geb., Schweiz bei Genf, im südl. Littoral, Istrien, Dalmatien bei Zara, Cattaro, Piemont Nizza, Genua. 5—8. 4

IX. Gruppe. Stipaceen Kunth enum. K. Taschb. p. 565.

854. *Milium* L. Flattergras. K. syn. 907. Rchb. exc. p. 28. Comp. I. 1. p. 96.

1. *M. effusum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 86. Var. β . *elatus* Gaud. *M. confertum* Mill. Rchb. exc. Laubwälder, Haine, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

2. *M. scabrum* R. et Schult. Rchb. icon. t. 87. *M. confertum* Gusson. Küste d. Nordsee in Belgien u. Holland bei Doversee, Katwijk. 5. ☉

855. *Piptatherum* Beauv. Grannenhirse. K. syn. 908. Rchb. exc. p. 28. Comp. I. 1. p. 123.

1. *P. paradoxum* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 88. *Milium* — Cavanil. Rchb. exc. Urachne — Link. *U. virescens* Trin. Waldwiesen, Gebüsch, im südl. Geb., Tyrol, Krain, Ungarn, Littoral, Istrien bei Pola, Idria, Dalmatien, Croatien, Lombard. 5—6. 4

2. *P. multiflorum* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 87. *Milium* — Cavanil. Rchb. exc. Urachne — Link. *U. parviflora* Trinius. *Agrostis miliacea* L. *Milium frutescens* Sieb. Waldwiesen, Gebüsch, im südl. Geb., Südtirol, Littoral,

Isrien, Insel Vossino, Dalmatien, Ungarn, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

3. *P. caerulescens* Beauv. Kunth enum. I. p. 176. *Milium* — Pers. Bertol. Fl. ital. Maly enum. pl. austr. p. 21. Steinige Gebirgsstellen im Banat auf d. Rakan an d. Donau. 4

856. *Stipa* L. Pfriemengras. K. syn. 908. Rchb. exc. p. 28. Comp. I. 1. p. 122.

1. *St. pennata* L. K. syn. Rchb. icon. t. 89. Steinige Hügel, Felsen, Weinberge, Heiden, Wege, besonders auf Kalk u. Sand, stchw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., selten im nördl., Rheing., v. Basel nach Elßaß bei Westhalten, Baden bei Mannheim, Pfalz bei Dürkheim, Kallstadt, Herrheim, Nierstein, Darmstadt, Mainz, Niederingelheim, Nassau bei Lorch, Hochheim, an d. Nahe v. Kreuznach bis Oberstein, Rorheim, Martinstein, Coblenz b. Boppard, Winningen, Erpeler-See, Hammerstein bei Linz, Schwaben, Baiern, Franken, Thüringen, Sachsen zc., nördl. bis Thorn in Preußen. 5—6 4

2. *St. capillata* L. K. syn. Rchb. icon. t. 89. Hügel, Weinberge, Wege, wie *St. pennata* stchw. dch. d. Geb., Rheing., Baden im Breisg. auf d. Kaiserstuhl, zw. Schwefingen u. Mannheim, Darmstadt b. Bessungen, Pfalz b. Frankenthal, v. Worms bis Alzen, Mainz bis Niederingelheim, bei Rombach, an d. Nahe bei Kreuznach u. bei Kirn, Neuwied auf d. Friedrichstein, Hammerstein bei Linz, Baiern, Flora v. Halle, Thüringen, nördl. nach Pommern u. Preußen bis zur Weichsel; Schweiz im Cant. Wallis; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Tyrol, Lombardei u. Venedig mit Voriger. 7—8. 4

3. *St. Aristella* L. K. syn. Rchb. icon. t. 89. Steinige Orte am südl. Eittoral, Isrien bei Fiume, Dalmatien, Croatien, Ligurien. 7—8. 4

4. *St. tortilis* Desfont. Fl. Atlan. Bertol. Fl. ital. I. p. 688. Maly enum. pl. austr. p. 21. In Dalmatien auf d. Insel Vossina. ☉

857. *Lasiagrostis* Link. *Rauhgras*. K. syn. 909.

Rchb. exc. p. 29. Comp. I. 1. p. 124.

1. *L. Calamagrostis* Link. K. syn. Rchb. icon. t. 89. *Agrostis* — Lin. *Stipa* — Wahlenb. *Arundo speciosa* Schrader. *Calamagrostis* — Host. *Cal. argentea* DC. Felsen der Alpen u. Ufer d. Alpenströme in d. Boralpen, bch. d. g. südl. u. mittl. Alpenkette, Schweiz im Jura auf d. Wasserfall, Vogelberg bei Basel, Weissenstein, Creur du Bant, Cant. Bern, Gotthard an d. Teufelsbrücke, Genf am Salève, Tyrol, Krain, Ungarn, Littoral u. 7—8. 4

X. Gruppe. *Arundinacea* Kunth. enum. K. Taschb. p. 566.858. *Phragmites* Trinius. *Rohrschilf*. K. syn.

909. Rchb. exc. p. 54. Comp. I. 1. p. 136.

1. *Ph. communis* Trin. K. syn. Rchb. icon. t. 185. *Arundo Phragmites* L. Var. β . *flavescens*: Ar. *Phragmites* Custor. Gaud. *Ph. flavescens* Hegetsch. *Ph. Plinii* Meyer et Al. Braun non Turra. Ar. *isiaca* Sieber sec. J. C. Schmidt an Reichenbach? — γ . *subuniflora*. Ar. *Phragmites* β . *subuniflora* DC. Ar. *Pseudo-phragmites* Lej. *Calamagrostis nigricans* Merat. *P. communis* b. *repens* Meyer. Sumpfige Wiesen, Triften, überschwemmte Sandstellen, an Ufern d. Flüsse, Bäche, Seen, Teiche, bch. d. g. Geb.; Var. β . Sachsen bei Leipzig, am Bodensee bei Bregenz, Cant. Wallis bei Turtmann, Tyrol u. bei Triest; γ . auf Sandfeldern d. Rheinfläche u. auf d. Insel Norderney. 8—9. 4

859. *Arundo* L. *Rohr*. K. syn. 909. Rchb. exc. p.

54. Comp. I. 1. p. 136.

1. *A. Donax* L. K. syn. Rchb. icon. t. 186. *Scolochloa* — Gaud. helv. Sc. *arundinacea* M. et K. *Donax arundinacea* Beauv. Sumpfige Orte im südl. Geb., Schweiz

Bal d'Aost, Cant. Tessin, Ungarn, Südtirol, Vitoral, Istrien, Dalmatien, Combarbei, Venedig, Genua. 10. 4

2. *A. Pliniana* Turra. K. syn. *A. Plinii* Witm. Rchb. exc. et icon. t. 186. *A. mauritanica* Desfont. *A. collina* Tenore. *Calamagrostis altissima* Host. Felsige Ufer am südl. Vitoral, Istrien, an d. Nordspitze d. Insel Cherso, Dalmatien, Croatien, Combarbei, Venedig. 8—9. 4

860. *Ampelodesmos* Link. Weinrastrohr. K. syn. 910. Rchb. icon. t. 184. f. 501.

1. *A. tenax* Link. K. syn. Rchb. icon. t. 184. *Arundo* — Vahl. *Ar. mauritanica* Poir. *Ar. festucoides* Desf. *Ar. Ampelodesmos* Cyrill. Sandige Rüste im südl. Vitoral, Istrien im Außen-Hafen bei Pola, in Dalmatien u. Piemont bei Genua. 5—6. 4

XI. Gruppe. Sesleriaceen Koch. K. Taschb. p. 566.

861. *Echinaria* Desfont. Zigelgras. K. syn. 910. Rchb. exc. p. 35. Comp. I. 1. p. 152.

1. *E. capitata* Desfont. K. syn. Rchb. icon. t. 168. *Cenchrus capitatus* L. *Sesleria echinata* Host. Grasige Hügel, Aecker, am südl. Vitoral, Istrien, Dalmatien, Piemont, Nizza, Ligurien. 5—6. ☉

862. *Sesleria* Arduino. Seslerie. K. syn. 910. Rchb. icon. p. 35. Comp. I. 1. p. 155.

1. *S. tenuifolia* Schrad. Host. K. syn. Rchb. icon. t. 169. *S. juncifolia* Suffren. in Host. *S. caerulea* β. Bertol. Fl. ital. *Aira juncifolia* Wulfen. Var. β. *S. juncifolia* Host. Rchb. icon. Dürre, steinige Felsen am südl. Vitoral, Krain, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Ungarn. 5. 4

2. *S. interrupta* Visian. Fl. Dalm. Rchb. icon. t. 169. in add. p. 43. Maly enum. pl. austr. p. 15. *S. tenuifolia* β. Eble Elenchus Fl. Dalm. Felsige Orte im südl. Geb., Ungarn, Dalmatien bei Almissa, Croatien. 5. 4

3. *S. rigida* Heuffel. Fl. 1833. Comp. I. 1. p. 156. Rchb. icon. t. 169. Im Banat auf d. Gipfel d. Domugletberges bei d. Percules-Bädern. 4—5. 4

4. *S. coerulea* Arduin. K. syn. Rchb. icon. t. 168. *Cynosurus — leus* L. Trockene Gebirgsstellen, Felsen, Weinberge, steinige Triften, besonders auf Kalk, im g. südl. u. stellw. im mittl. Geb. bis in d. Alpen, nördl. bis z. Harz nach Ostpreußen bei Danzig, Memel, Rheing., v. Jura d. Donaugegend in Oberbaden, Dessingen bei Willingen, bei Stetten am Kalten Markt, Bingen, Bacharach, Boppard bei Coblenz, Lahnstein, Ems, Altenahr im Ahrthal u. Siebengebirge bei Bonn, an d. Nahe bei Kreuznach, Kirn, Simmern u., Eifel, Mosel v. d. Obermosel im Luxemb. bis Trier u. stellw. bis Coblenz, Schwaben, Baiern, Franken, Westphalen im Teutoburger Walde gegen Tecklenburg, Sachsen, Thüringen; Destr. Böhmen, Mähren u. 3—5. 4

5. *S. elongata* Host. K. syn. Rchb. icon. t. 168. *S. caerulea* J. Bert. Fl. ital. *Phleum autumnale* Scopol. *Aira alba* Wulf. Steinige, dürre, grasige Orte, Wiesen, Felsen, im südl. Geb., Tyrol, Krain, Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Croatien, Ungarn. 8—9. 4

6. *S. cylindrica* DC. Kunth. enum. Maly enum. pl. austr. p. 15. *S. caerulea* γ. Bertol. *S. argentea* Savi. *S. nitida* Tenore. Steinige Orte im südlichsten Geb., Dalmatien, Lombardei. 9. 4

7. *S. microcephala* DC. K. syn. *S. tenella* Host. *Psilathera* — Link. Rchb. exc. et icon. t. 168. *Cynosurus microcephalus* Hoffm. *Cynosurus ovatus* Hoppe. Granitfelsen d. Hochalpen, Baiern, Tyrol auf d. Watzmann, Salzburg, Destr. Steyermark, Kärnthen, Krain, Lombardei. 6—7. 4

8. *S. sphaerocephala* Arduino. K. syn. Rchb. icon. t. 168. *S. leucocephala* DC. *Cynosurus sphaerocephalus* Wulfen. Granitfelsen d. Hochalpen, Südschweiz, Destr. Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Littoral, Lombardei am Comersee. 7—8. 4

9. *S. disticha* Person. K. syn. *Oreochloa*. — Link.

Rchb. exc. et icon. t. 118. Poa — Wulfen. Cynosurus — Hoffm. Poa seslerioides Allion. pedm. Granitfelsen d. Hochalpen in d. südl. Alpenkette, Schweiz Cant. Graubünden, Oestr. Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Galizien, Ungarn, Lombardei. 6—7. 4

XII. Gruppe. Avenaceen Kunth enum. K. Taschb. p. 568.

863. *Koeleria* Person. *Rölerie*. K. syn. 912. Rchb. exc. p. 49. (*Airochloa* Lk.) Comp. I. 1. p. 141 et 172.

1. *K. villosa* Pers. Rchb. icon. t. 93. Am sandigen Meerstrande, Piemont bei Nizza. 3—5. ☉

2. *K. cristata* Pers. K. syn. Rchb. icon. t. 93. Aira — Lin. *Airochloa* — Link. *Dactylis* — M. v. Bieb. *Koeleria avenacea* Tausch. Var. β . *gracilis*. — γ . *major*: *K. pyramidata* Lamk. Sandfelder, Wege, Wiesen, Triften etc., dch. d. g. Geb. 6—7. 4

3. *K. glauca* DC. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 93. Aira — Schrad. Poa — Schkr. *Festuca glaucescens* Roth. Var. β . *K. dactyloides* Rochel. hanat. Rchb. exc. Sandige Orte, im Flugsande, Sandfelder, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Baden bei Rastatt, Schwegingen, Sanddorf, Mannheim, bis Darmstadt, Pfalz Maxdorf, Dürkheim bis Bingen, Kreuznach, Coblenz, Bonn, Trier, Luxemburg etc. 6—7. 4

4. *K. valesiaca* Gaud. helv. K. syn. Rchb. icon. t. 93. Aira — Allion. pedm. Var. β . *setacea*: *K. setacea* DC. *K. setacea et tuberosa* Pers. *Festula splendens* Pourr. *Poa pectinata* Lamk. Dürre, sonnige Hügel, stellw. im südl. Geb., Schweiz im Jura bei Neuenburg, auf d. Creux du Vant, im mittleren Cant. Wallis gemein, Tyrol, Lombardei, Savoyen Mont Genis etc. 4—5. 4

5. *K. grandiflora* R. et Schult. Maly enum. pl. austr. p. 11. Aira — Bertol. Fl. ital. I. p. 436. *K. splendens* Presl. Gebirgstriften in Krain auf d. Schneeberg. 5—6. 4

6. *K. hirsuta* Gaud. helv. *K. syn.* Rchb. icon. t. 93. *Airochloa* — Lk. *Aira* — Schleich. *Festuca* — DC. Granitfelsen u. steinige Triften d. Hochalpen, Schweiz auf d. Furka, am Rhonengletscher, Cant. Wallis Merzenbach im Zehnden Gombès, Cant. Graubünden, Bellin, Tyrol auf d. Schlehern, Saida in Gassa, Zimpeljoch im Oetzthale, Orteles, Lombardei. 7—8. 4

7. *K. phleoides* Pers. *K. syn.* *Lophochloa* — Rchb. exc. et icon. t. 142. *Festuca* — Vill. Host. *Trisetum phleoides* Trinius. *Bromus trivialis* Savi. *Festuca cristata* L. Trockene Orte, Wege, Abhänge im südl. Geb., Tyrol, Krain, Ungarn, Vitoral, Istrien, Fiume, Dalmatien etc. 5—6. ☉

864. *Lamarkia* Moench. *Lamarckie.* *K. syn.* 913. Rchb. exc. p. 36. Comp. I. 1. p. 155.

1. *L. aurea* Moench. *K. syn.* *Chrysurus aureus* Beauvais Rchb. exc. et icon. t. 149. *Chrys. cynosuroides* Pers. *Cynosurus aureus* L. Steinige, grasige Orte am südl. Vitoral, Istrien, Dalmatien, Piemont, Genua, Nizza. 5—6. ☉

865. *Aira* L. *Schmiele.* *K. syn.* 914. Rchb. exc. p. 50. Comp. I. 1. p. 138.

Erste Rotte. *Deschampsia* P. B. *K. Taschenb.* p. 568.

1. *A. caespitosa* L. *K. syn.* Rchb. icon. t. 96. *Deschampsia* — Beauv. Var. β . *montana* Rchb. icon. — γ . *alpina*: *A. alpina* Roth. Rchb. icon. t. 96. — δ . *pallida*: *A. altissima* Lamk. *A. parviflora* Thuill. Rchb. icon. t. 96. — ϵ . *A. caespitosa* β . *setifolia* G. Bischoff. Fruchtbare Wiesen, Waldstellen, Gebüsche, dch. d. g. Geb. bis in d. Vor-alpen; Var. ϵ . bei Heidelberg. 6—7. 4

2. *A. media* Gouan. Visian. Fl. Dalm. Maly enum. pl. austr. p. 19. *A. juncea* Vill. *Deschampsia* — Kunth. Triften in Dalmatien. 4

3. *A. Wibeliana* Sonder. *K. syn.* *A. paludosa* Wibel. Feuchte, schlammige u. sandige Orte, stellw. im nördl.

Geb., Hamburg am Elbufer, Altona auf d. Insel Poggen-
sand in d. Elbe bei Glückstadt. 6—7. 4

Zweite Rotte. *Avenella* K. Taschb. p. 569.

4. *A. flexuosa* L. K. syn. Rchb. icon. t. 95. *Avena* — M. et K. Var. β . *Aira montana* L. suec. Gebirgswälder, Gebüsche, schattige, sandige Heiden, öch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 6—8. 4

5. *A. uliginosa* Weihe. K. syn. Rchb. icon. t. 95. *A. paludosa* Weihe gram. *A. discolor* Thuill. Rchb. icon. *Avena* — Fl. Belg. *A. flexuosa-paludosa* Meyer. Sumpfige Orte in Torfmooren mehr im nördl. Geb., Siegburg b. Bonn, Westphalen Gronau, Bentheim, Rheide, Bochold b. Münster, Hamburg, Hannover bei Hunteburg, Ostfriesland. 8—9. 4

866. *Corynephorus* Beauv. Reulengras. K. syn. 915. Rchb. exc. p. 49. Comp. I. 1. p. 137.

1. *C. canescens* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 94. *Aira* — Lin. Weingaertneria — Bernh. Dürrer Sandboden, Heiden, besonders im g. nördl. u. mittl. Geb., im südl. seltener, Rheing. nicht selten, fehlt in d. Schweiz; wächst wieder in Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Croatien, Kombarbei. 7—8. 4

2. *C. articulatus* P. Beauv. Kunth enum. I. p. 286. Maly enum. pl. austr. p. 19 et 371. *Aira articulata* Desf. Fl. Atl. Bertol. Fl. ital. Im südl. Geb., Südschweiz im Cant. Tessin. 7. ☉

867. *Holcus* L. Honiggras. K. syn. 916. Rchb. exc. p. 32. Comp. I. 1. p. 110.

1. *H. lanatus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 97. *Avena lanata* Koeler Leers. Wiesen, Wälder, im g. Geb. 6—8. 4

2. *H. mollis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 97. *Avena* — Koel. Leers. Waldwiesen, Raine, Wege, im g. Geb. 7—8. 4

868. *Arrhenatherum* Beauv. *Glattthafer*. K. syn. 916. Rchb. exc. p. 53. Comp. I. 1. p. 150.

1. *A. elatius* M. et K. K. syn. *A. avenaceum* Beauv. Rchb. exc. et icon. t. 98. *Avena elatior* L. *Holcus avenaceus* Scopol. Var. β . *bulbosum*: *A. bulbosum* v. Schlechtend. *A. avenaceum* β . *nodosum* Rchb. icon. t. 98. *Avena bulbosa* Willd. *A. praecataria* Thuill. *Holcus bulbosus* Schrad. Wald: u. Wiesenränder, Triften, Wiesen, Felbraine, dch. d. g. Geb. d. Var. stellw. 6—7. 4

869. *Avena* L. *Hafer*. K. syn. 916. Rchb. exc. p. 50. Comp. I. 1. p. 142.

1. *A. brevis* Roth. K. syn. Rchb. icon. t. 106. Unter d. Saat stellw. aber sparsam im Geb., Hamburg bei Wandsebeck, Hannover, Herzogthum Bremen, Verden, Anhalt, Provinz Sachsen; Unteröstr., Ungarn. 6—7. ☉

2. *A. hybrida* Petermann. K. syn. Saatäcker, stellw. im Geb., Thüringen, Sachsen bei Bückmannsdorf u. Dölzig, Schwarzburg-Rudolstadt um Singen, Holstein, Schleswig um Tondern, Preußen bei Danzig; Tyrol. 7—8. ☉

3. *A. sativa* L. K. syn. *A. trisperma* Schübl. Allgemein angebaut. 7—8. ☉

4. *A. orientalis* Schreb. K. syn. Stellw. dch. d. g. Geb. angebaut. 7—8. ☉

5. *A. strigosa* K. syn. Rchb. icon. t. 106. *A. nervosa* Lamk. *Danthonia strigosa* Beauv. Unter d. Saat, besonders Hafer, stellw. dch. d. g. Geb. auch angebaut. 7—8. ☉

6. *A. nuda* L. K. syn. Rchb. icon. t. 106. Stellw. im Geb. angebaut u. hin u. wieder im Geb. besonders im südl. verwildert; Hamburg; Oestr. Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. ☉

7. *A. sterilis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 106. Trockene Abhänge u. Saatäcker am südl. Eittoral, Istrien bei Fiume, Südtirol, Dalmatien, Croatien, Lombardien. 7—8. ☉

8. *A. fatua* L. K. syn. Rchb. icon. t. 106. Unter d. Saat, stchw. dch. d. g. Geb. 7—8. ☉

9. *A. hirsuta* Roth K. syn. *A. barbata* Brot. *A. atherantha* Presl. Saatäcker, Wiesen, an Wegen, am südl. Littoral, Istrien u. auf d. Inseln, Fiume, Osero etc., Dalmatien, Lombardien, Venedig, Oberitalien u. in Belgien. 7—8. ☉

10. *A. planiculmis* Schrad. K. syn. Rchb. icon. t. 104. *A. latifolia* Host. Gebirgswiesen u. Boralpen, stchw. dch. d. Geb., Schlesien an d. Schneeberg in d. Grafschaft Glatz, im Schlesisch-Mährischen Gesenke am Rödpernik, Hochschar, auf d. Brünnelheide d. Altvaters, d. Leiterberg im Kessel; Böhmen, Mähren, Steyermark auf d. Waldwiese am rechten Ufer d. Drau bei Marburg, Kärnten, Krain, Ungarn, Siebenbürgen. 7—8. 4

11. *A. compressa* Heuffel. Flora 1835. p. 247. Rchb. icon. t. 103. Comp. II. in add. p. 747. Sandige Gebirgsstellen unter Weinreben in Ungarn an d. Schlosse Verschetz im Banat. 5—6. 4

12. *A. lucida* Bertol. Fl. ital. Rchb. icon. t. 103. *A. fallax* Pollini non Tenore. An Wegen im südl. Geb., Südtirol im Fassathale, Monte Baldo; Lombardien bei Como. 4—5. 4

13. *A. pubescens* L. K. syn. Rchb. icon. t. 105. Fruchtbare Wiesen, Waldwiesen, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

14. *A. amethystina* Clarion. K. syn. Gebirge in Südtirol, Monte Baldo bei St. Giacomo. 5. 4

15. *A. alpina* Smith. K. syn. Rchb. icon. t. 104. *A. praeusta* Rchb. exc. Alpen in d. südl. Kette, Südtirol Gastei Andraz, Krain in d. Wochein, Monte Nanas, Zhernapferst. 7—8. 4

16. *A. pratensis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 102. Var. β . *maxima*. *A. bromoides* M. et K. Steinige, sandige Hügel, dürre Wiesen, Triften, Waldränder, Krain, stchw. dch. d. g. Geb. bis in d. Alpen, besonders im südl. u. mittl. Geb. 6—7. 4

17. *A. bromoides* L. Rchb. icon. t. 103. Dürre Hügel im südlichsten Geb., Piemont, Genua, Ligurien. 5—6. 4

18. *A. versicolor* Vill. delph. K. syn. *A. Scheuchzeri* Allion. pedm. Rchb. exc. et icon. t. 102. Triften d. Hochalpen, Schweiz u. stellw. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Ungarn, Lombardien u. Venedig. 7—8. 4

19. *A. sempervirens* Vill. K. syn. Rchb. icon. Felsen u. Gerölle d. Hochalpen, Baiern, Destr. Tyrol, Krain, Steyermark, Kärnthen, Lombardien. 7—8. 4

20. *A. striata* Lamk. dict. I. p. 332. K. syn. *A. fallax* Tenore. Felsenspalten am südl. Eittoral, Istrien, Insel Iossino, Dalmatien. 5. 4

21. *A. setacea* Vill. delph. Bertol. Fl. ital. I. p. 707. Maly enum. pl. austr. p. 17. In Siebenbürgen. 4

22. *A. tenuis* Moench. K. syn. Rchb. icon. t. 99. *A. dubia* Leers. *A. triaristata* Villars. *A. striata* Lamk. ill. *A. fertilis* Allion. *Ventenata bromoides et avenacea* Koel. *Bromus triflorus* Pollich. *Holcus triaristatus* Wiggers. *Trisetum tenue* R. et Schult. Dürre, sandige Hügel, Wegetaine, stellw. dch. d. Geb., Rheing., stellw. dch. d. g. Rheintal, Pfalz an d. Nahe bis Sobernheim, Trier, Coblenz, Maifeld, Nassau bis in d. Niederlanden, Baiern am Main b. Würzburg, dch. Hessen nach Sachsen, Thüringen, b. Jena, Zerbst, Hannover, Göttingen; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Eittoral, Lombardien u. 6—7. ☉

23. *A. flavescens* L. K. syn. Rchb. icon. t. 102. *Trisetum* — Beauv. *Tr. pratense* Pers. *Tr. splendens* Presl. Var. β . *major* Schrader. — γ . *variegata* Gaud. helv. Wiesen, Triften, grasige Hügel, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

24. *A. carpatica* Host. Fl. austr. Rchb. exc. *Trisetum carpaticum et Tr. fuscum* R. et Schult. Alpen u. Borralpen d. Karpathen in Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. 4

25. *A. alpestris* Host. gram. K. syn. Rchb. icon. t. 101. *A. sesquiteria* Host. syn. *Trisetum alpestre* Beauv. Triften d. Alpen in d. südl. Kette, Destr. Steyer-

mark, Tyrol, Kärnthen, Krain, Galizien, Ungarn, Venedig.
7—9. 4

26. *A. myriantha* Bertol. Fl. ital. I. p. 722. Rchb. icon. t. 99. Acker in d. Lombardei bei Mailand. ☉

27. *A. distichophylla* Villar. delph. K. syn. Rchb. icon. t. 100. *A. brevifolia* Host. Trisetum distichophyllum Beauv. Felsen u. im Gerölle d. Hochalpen, besonders in d. südl. Kette; Südschweiz Cant. Wallis, Graubünden nach Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Krain, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont. 7—8. 4

28. *A. villosa* Bertol. Rchb. icon. t. 101. Oberitalien in d. Appenninen. 7. 4

29. *A. argentea* Willd. K. syn. Rchb. icon. t. 100. *A. distichophylla* Host. Kalkfelsen u. Gerölle d. Alpen, Schweiz u. d. d. südl. Alpenkette nach Tyrol, M. Generoso, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Destr., Lombardei, Venedig. 7—8. 4

30. *A. neglecta* Savi. Rchb. exc. in add. et icon. t. 99. *A. Loefflingiana* et *A. panicea* Lamk. Trisetum neglectum R. et Schult. Acker, Wege, im südlichsten Geb., Lombardei, Piemont u. 7. ☉

31. *A. subspicata* Clairvill. Gaud. helv. K. syn. Rchb. icon. t. 100. *Aira spicata* et *Aira subspicata* Lin. *Avena airoides* Koel. M. et K. Trisetum — R. et Schult. *Koeleria subspicata* Rchb. exc. Felsen, an Gletscherrändern, d. Hochalpen, Schweiz St. Bernhard, im Bagnes-Thale u. d. d. g. südl. Alpenkette nach Destr. Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Vittoral, Lombardei. 7—8. 4

32. *A. Cavanillesii* Koch. K. syn. *A. pygmaea* Rchb. icon. t. 99. *A. Loefflingiana* L. Cavanill. Rchb. exc. Trisetum hispanicum Person. *Arundo pygmaea* Pollini Fl. veron. Trisetum Cavanillesii R. et Schult. Uncultivirte Orte, an Wegen, im südl. Geb., Südschweiz Cant. Wallis um Montorge u. St. Leonhard bei Sitten, im Aostthale bei Bille Franche u. in d. Lombardei. 4. ☉

33. *A. caryophyllea* Wiggers. K. syn. *Aira* — L.

Rchb. exc. et icon. t. 94. Heiden, Felder, Raine, Wald-
ränder, besonders an trockenen sandigen Orten, dch. d. g.
Geb. 6—7. ☉

34. *A. capillaris* M. et K. K. syn. *Aira* — Host.
Rchb. exc. et icon. t. 94. Sandige, dürre Triften, Abhänge,
Raine, im südl. Geb., Südtirol, Ungarn, Eittoral, Istrien
bei Fiume, Insel Beglia, Dalmatien, Lombardien, Venedig,
Piemont, Genua. 5. ☉

35. *A. praecox* Beauv. K. syn. *Aira* — L. Rchb.
exc. et icon. t. 94. *A. pusilla* Wiggers. *Trisetum praecox*
Du Mort. Sandboden, Hügel, Heiden, Triften, Felder u.,
stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten, häufig bei
Coblenz, Bonn, Köln, Trier u. 4—5. ☉

870. *Danthonia* DC. *Danthonie*. K. syn. 923.
Rchb. exc. p. 52. Comp. I. 1. p. 150.

1. *D. calycina* Rchb. exc. et icon. t. 106. *D. pro-*
vincialis DC. K. syn. *D. alpina* Vent. *Avena calycina*
Vill. *A. striata* Host. *A. spicata* β. Willd. Sonnige Ge-
birgswiesen im südl. Geb., Destr. Südtirol, Krain, Eittoral,
Istrien bei Triest, Ungarn, Siebenbürgen, Piemont. 6. 4

871. *Triodia* R. Brow. *Dreizahn*. K. syn. 923.
Rchb. exc. p. 41. Comp. I. 1. p. 151.

1. *T. decumbens* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 166.
Danthonia — DC. *Festuca* — L. *Poa* — Scopol. *Siegelingia*
— Bernh. *Melica rigida* Wibel. Trockene Gebirgstriften,
Wiesen, Bergwälder, stellw. dch. d. Geb., Rheing. nicht sel-
ten. 6—7. 4

872. *Melica* L. *Perlgras*. K. syn. 923. Rchb. exc.
p. 41. Comp. I. 1. p. 170.

1. *M. ciliata* L. K. syn. Rchb. icon. t. 167. Gräßige
Gebirgsstellen, Felsen, Weinberge, Mauern u., im g. südl.
u. stellw. dch. d. mittl. Geb., nördl. bis Thüringen, Sachsen,
Schlesien, Rheing. v. Basel dch. Baden, im Breisg., Elsaß,

Pfalz, Harbtgebirge bis Zweibrücken, im g. Rhe- u. Moselthale u. d. Rhein bis gegen Bonn hinab zc., Schwaben, Baiern nach Destr. zc. 5—6. 4

2. *M. Bauhini* Allion. K. syn. Rchb. icon. t. 167. *M. pyramidata* Desf. Trockene Hügel, Felsen, am südl. Littoral, Istrien, Piemont, Nizza, Ligurien. 6. 4

3. *M. altissima* L. Rchb. exc. et icon. t. 167. Gebirgswälder, unter Gesträuchen u. Weinreben im südl. Geb., Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

4. *M. nutans* L. K. syn. Rchb. icon. t. 167. *M. montana* Huds. Laubwälder, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

5. *M. uniflora* Retz. K. syn. Rchb. icon. t. 167. *M. Lobelii* Vill. *M. nutans* Pollich. Wälder, Gebüsche, Haine, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

XIII. Gruppe. Festucaceen Kunth. K. Taschb. p. 575.

873. *Briza* L. Zittergras. K. syn. 924. Rchb. exc. p. 48. Comp. I. 1. p. 169.

1. *B. maxima* L. K. syn. Rchb. icon. t. 165. Grasse Orte, Weingärten, Hügel am südl. Littoral, Istrien bei Fiume, Dalmatien, Ungarn, Lombardei. 5—6. ☉

2. *B. virens* L. Rchb. exc. et icon. t. 165. In Dalmatien an d. Rarenta auf Wiesen. 5—6. ☉

3. *B. media* L. K. syn. Rchb. icon. t. 165. Wiesen, Triften, Feldraine zc., im g. Geb. 6—8. 4

4. *B. minor* L. K. syn. Rchb. icon. t. 165. Steinige, grasige Hügel, Feldraine, im südl. Geb., Schweiz Cant. Waadt bei Vevey, Krain, Ungarn, Littoral, Istrien, Lombardei. 5—6. ☉

874. *Eragrostis* Host. Beauv. Liebesgras. K. syn. 924. Rchb. exc. p. 48. Comp. I. 1. p. 164.

1. *E. megastachya* Link. K. syn. Rchb. icon. t. 164. *E. major* Host. *Poa megastachya* Koeler. *Briza Eragrostis* L. Sandige Orte, Felber, Aecker, mehr im südl.

u. mittl. Geb., Rheing., Elsaß bei Colmar, Baden im Breisg. am Kaiserstuhl, bei Karlsruhe, Mannheim, Pfalz Speier, Nassau bei Wiesbaden, Baiern bei Regensburg, Harz, Halberstadt, Westerhausen bei Blankenburg; Schweiz bei Nyon, Genf; Tyrol, Ungarn, Littoral, Istrien, Dalmatien u. Kombarbei. 7—8. ☉

2. *E. poaeformis* Link. Rchb. exc. et icon. t. 164. *E. poaeoides* Beauv. K. syn. *Poa Eragrostis* Lin. Wege, Mauern, Weinberge, dch. d. g. südl. u. stellw. im mittleren Geb., Rheing. Basel, Elsaß bei Bensfeld, Baden bei Schwegingen, Mannheim, u. zerstr. auf d. Rheinfläche nach Westphalen bei Bielefeld, Brackwede; Baiern bei Baireuth, Regensburg, Thüringen, Sena, Arnstadt, Franken, Harz, Westerhausen bei Blankenburg, Sachsen bei Dresden, Schlesien Breslau; Destr. Böhmen, Mähren, Südtirol, Littoral u.; Schweiz bei Genf, Lausanne. 7—8. ☉

3. *E. pilosa* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 164. *Poa* — L. Cultivirte Orte, Sandfelder, an Wegen, stellw. dch. d. g. südl. u. im mittl. Geb., Rheing. Basel, Elsaß bei Colmar, Baden bei Bruchsal, Schwegingen, Halle bei Giebichenstein u. Trotha; Südschweiz am Genfersee bei Roll, Nyon, Genf; Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Ungarn, Littoral, Istrien, Croatien, Kombarbei, Venedig u. 6—9. ☉

4. *E. verticillata* R. et Schult. Rchb. exc. et icon. t. 164. *Poa* — Cavanill. Sandfelder im südl. Geb., Tyrol, Krain, Littoral, Istrien, Fiume, Croatien, Oberitalien. 7—8. ☉

875. *Sclerochloa* Beauv. Hartgras. Rchb. exc. p. 36. Comp. I. 1. p. 168.

1. *S. dura* Beauv. Rchb. exc. et icon. t. 149. *Poa dura* Scopol. K. syn. 925. *Cynosurus durus* Lin. Pollich. Eleusine *dura* Lamk. *Festuca* — Vill. *Sesleria* — Kunth. Lehmboden, auf Tristen, an Wiesenrändern, Wegen, Aekerrändern, besonders im g. südl. Geb. u. stellw. im mittl., Rheing. Elsaß, Baden bei Mannheim, Pfalz bei Oggersheim bis Alzey, Mainz, an d. Nahe von Kreuznach bis Obernheim u. nach

d. Mosel v. Thionville stellw. bis Coblenz, Nassau b. Kropf, Thüringen bei Auleben, Erfurt, Jena, Magdeburg, Quedlinburg im Steinholze, wohl d. nördlichste Fundort; Südschweiz im Cant. Wallis; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Krain, Galizien, Ungarn, Vittoral u. 5—6. ☉

2. *S. procumbens* Beauv. Link. Rchb. exc. et icon. t. 149. *Poa* — Curtis. *Festuca* — Kunth. *Poa rupestris* Wither. An d. Küste d. Nordsee bei Amsterdam, Mecklenburg u. am Adriat. Meere bei Venedig. 8—9. ☉

3. *S. rigida* Link. Rchb. exc. et icon. t. 148. *Festuca rigida* Kunth. K. syn. *Poa rigida* L. *Glyceria* — Smith. *Megastachya* — Beauv. *Triticum rigidum* Wulfen. Gräsige Orte, Hügel, Weinberge, Baumgärten, Wege, stellw. besonders im südl. Geb., Rheing., Eupen u. Cornelimünster bei Aachen, Thüringen bei Jena; Südschweiz Cant. Wallis, Genfersee bei Nyon, Genf, Cant. Tessin; Destr. Vittoral, Fiume, Triest, Krain, Südtirol, Ungarn, Dalmatien, Lombardien. 6—7. ☉

4. *S. dichotoma* Link. Comp. I. 1. p. 169. *S. maritima* Rchb. exc. et icon. t. 149. *Triticum maritimum* L. *Festuca maritima* DC. *Brachypodium* — R. et Schult. Nordseeküste in Belgien. 5—6. ☉

5. *S. divaricata* Beauv. Link. hort. *S. articulata* Link. *Festuca divaricata* Desfont. Atl. K. syn. 936. *Schedonorus divaricatus* R. et Schult. *Sphenopus* — Rchb. exc. et icon. t. 154. *Sph. Gouani* Trinius. *Poa divaricata* Gouan. *Festuca expansa* Kunth. Sonnige, steinige Orte an d. Seeküste, Nordsee in Belgien bei Tournay; im südl. Vittoral, Istrien bei Fiume. 5—6. ☉

876. *Poa* L. Rispengraß. K. syn. 925. Rchb. exc. p. 45. Comp. I. 1. p. 157.

1. *P. loliacea* Hudson. K. syn. *Catapodium loliaceum* Link. Rchb. exc. et icon. t. 125. *Trisetum* — Smith. *Triset. unilaterale* Villars. *Triset. Rottboella* DC. *Brachypodium loliaceum* R. et Schult. *Festuca rottielloides*

Kunth. Gräßige Orte, Wege am südl. Eittoral, Istrien bei Fiume u. an d. Inseln Veglia, Sansego, Brioni, bei Triest, Dalmatien, Lombardei. 5—6. ☉

2. *P. annua* L. K. syn. Rchb. icon. t. 155. Var. β . *varia* Gaud. helv. *P. supina* Schrader. *P. variegata* Haller. Cultivirte u. uncultivirte Orte, dch. d. g. Geb. gemein bis in d. Alpen. 4—11. ☉

3. *P. laxa* Haenke. K. syn. Rchb. icon. t. 157. *P. flexuosa* Smith. *P. elegans* DC. Var. β . *P. flavescens* Thomas. Triften d. Granitalpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Steyermark, Tyrol, Krain, Lombardei; Rheing., auf d. Belgen im Schwarzwalde, Schlesien im Riesengebirge, in d. Sudeten u. Carpathen; Destr. Böhmen, Galizien, Ungarn u. 7—8. 4

4. *P. minor* Gaud. helv. K. syn. Rchb. icon. t. 155. *P. supina* Panzer. Felsen, Abhänge, steinige Triften, Ufer d. Kalkalpen, Schweiz u. dch. d. g. südl. Alpenkette nach Destr., Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Krain, Siebenbürgen, Lombardei. 7—8. 4

5. *P. pumila* Host. K. syn. Rchb. icon. t. 156. Triften d. Destr. Alpen in Krain im Sande d. Germade u. bei Laibach. 5—6. 4

6. *P. concinna* Gaud. helv. K. syn. Rchb. icon. t. 154. Trockene, sandige Orte im südl. Geb., Südschweiz Cant. Wallis, Montorge, Tourbillon bei Sitten, St. Leonhard u., Krain, Eittoral, Istrien bei Perenzo, Triest, Lombardei. 4—5. 4

7. *P. bulbosa* L. K. syn. Rchb. icon. t. 154. Var. β . *P. vivipara* L. Rchb. exc. et icon. t. 154. Wiesen, Triften, sandige Orte, an Wegen, stellw. dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen, Rheing. an vielen Orten, von d. Schweiz nach Baden, Breisgau, Elsaß, Pfalz am Donnersberg, Hardegebirge, Nassau, Nahegegend bis Trier, Coblenz, Eöln, Düsseldorf u. 5—6. 4

8. *P. alpina* L. K. syn. Rchb. icon. t. 156. *P. badensis* Sturm. Var. β . *P. vivipara* L. — γ . *minor*: *P. alpina*

γ. Gaud. helv. — δ. brevifolia Gaud. helv. — ε. badensis: *P. badensis* Haenke. Rchb. icon. *P. brevifolia* DC. syn. Rchb. icon. *P. collina* Host. *P. trivialis* Pollich. *P. Koeleri* DC. *P. brizoides* Wahlenb. *P. thermalis* Pers. syn. *P. Molinerii* Balb. *P. cenisea* Rchb. exc. *P. carniolica* Hladnik. Gebirgstriften, grasige Felsen, Abhänge d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. böh. d. g. Alpenkette, besonders im Fura, nach Baiern, Schwaben, Tyrol, auf d. Schwarzwalde, im Gesenke d. Sudeten in Schlesien, Böhmen u., Rheing., d. Var. ε. von Basel nach Oberbaden, Bergstraße bis Darmstadt, Mainz, Bingen, Ingelheim, an d. Mosel, Thüringen bei Halle; Oest. bei Wien, Mähren, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Lombard. 5—6. 4

9. *P. caesia* Smith. K. syn. Rchb. icon. t. 158. *P. Gaudini* R. et Schult. *P. glauca* Smith. Var. β. *P. aspera* Gaud. helv. Sonnige Felsen d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. böh. d. g. Alpenkette nach Tyrol, Steyermark, Krain u., Schlesien Riesengebirge, im Gesenke d. Sudeten, im Kessel, am Altvater, Rópernick, Peterstein; Böhmen, Mähren, Ungarn, Lombard. 6—7. 4

10. *P. nemoralis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 159. Var. α. vulgaris: *P. nemoralis* β. M. et K. — β. *firmula* Gaud. helv. *P. coarctata* Haller. *P. dubia* et *P. Scheuchzeri* Suter helv. *P. caespitosa* Poir. *P. trivialis* Leers. — γ. *rigidula*: *P. nemoralis* δ. M. et K. *P. pratensis* Leers. herb. *P. palustris* DC. *P. polymorpha* Wibel. *P. serotina* Schreb. — δ. *glauca*. — ε. *montana* Gaud. helv. Trockene Waldstellen, grasige Hügel, Felsen, Mauern, Triften, böh. d. g. Geb. 6—7. 4

11. *P. fertilis* Host. K. syn. *P. palustris* Roth. *P. serotina* Gaud. helv. Ehrh. *P. angustifolia* L. Rchb. exc. et icon. t. 160. Feuchte Wiesen, Triften, an Ufern, Gräben u., böh. d. g. Geb. 7—8. 4

12. *P. sudetica* Haenke. K. syn. Rchb. icon. t. 163. *P. rubens* Moench. *P. quadripetalis* Ehrh. *P. sylvatica* Villars. *P. trinervata* DC. — Var. β. *remota* Fries nov.

P. hybrida Rehb. exc. et icon. Gebirgswälder u. Boralpen, stellw. dch. d. Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Destr., Tyrol u., Rheing. auf d. Vogesen, d. Schwarzwalde, Pfalz, v. Donnersberg nach Bingen, an d. Nahe bis Oberstein n. Trier, Hochwald, Eifel, Luxemburg, Eupen b. Aachen, Nassau, Coblenz, Remagen, Ahrthal, Köln, Westphalen im Teutoburger Walde, Hamburg, Hannover, Hessen, Franken, Thüringen, Jena, Harz, Sachsen, Schlesien bis Pommern u.; d. Var. β . in Wäldern bei Darmstadt, in einem Waldsumpfe bei Erlangen, Schlesien im Gesenke d. Sudeten u. 6—7. 4

13. *P. hybrida* Gaud. helv. K. syn. *Festuca montana* Sternb. et Hoppe. Feuchte Gebüsche d. Alpenthäler u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Baiern, besonders im Jura, Cant. Bern M. Grimsel, Furca, Cant. Waadt M. Dole, Chasseral, Chasseron, Weissenstein u., Salzburg an d. Untersberg, Tyrol bei Risibühl, Steyermark bei Kalbing, Destr. bei Hallstadt, Böhmen, Mähren u. Siebenbürgen. 6—7. 4

14. *P. trivialis* L. K. syn. Rehb. icon. t. 162. *P. scabra* Ehrh. *P. pratensis* Pollich. *P. dubia* Leers. Feuchte Wiesen, Gebüsche, Wege u., dch. d. g. Geb. 6—7. 4

15. *P. pratensis* L. K. syn. Rehb. icon. t. 161. *P. glabra* Ehrh. *P. angustifolia* Pollich. Leers. Var. β . latifolia: *P. subcaerulea* Eng. bot. *P. pratensis* γ . Smith. *P. depressa* Presl. *P. humilis* Ehrh. — γ . angustifolia: *Poa pratensis* β . Smith. *P. angustifolia* Lin. Leers. — δ . *P. pratensis* IV. anceps Gaud. Wiesen, Triften, Brachfelder, Wege, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

16. *P. cenisia* Allion. K. syn. Rehb. icon. t. 157. Bertol. *P. stolonifera* Bellard. *P. distichophylla* Gaud. helv. *P. flexuosa* Wahlenb. Rehb. icon. Var. β . pallescens: *P. Hallerides* R. et Schult. Rehb. *P. pallens* Gaud. Rehb. icon. t. 158. Feuchte Triften d. Alpen, im Gerölle an d. Alpenströmen, Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette nach Baiern, Salzburg, Tyrol, Destr. Kärnthen, Krain, Littoral u. im Harze auf d. Brocken. 7—8. 4

17. *P. compressa* L. K. syn. Rchb. icon. t. 158. Var. β . *P. Langeana* Rchb. exc. in add. et icon. t. 158. *P. compressa* β . *effusa* Tausch. Trockene, sandige Orte, Felsen, Mauern, Ufer, Wege, Triften, dch. d. g. Geb.; Var. β . stellw. 6—7. 4

877. *Glyceria* R. Brow. Süßgras. K. syn. 932. Rchb. exc. p. 45. Comp. I. 1. p. 168.

1. *G. spectabilis* M. et K. K. syn. *G. aquatica* Wahlenb. Rchb. exc. et icon. t. 152. *Poa aquatica* L. *P. altissima* Moench. *Molinia maxima* Hartm. *Hydrochloa* — Hartm. Nasse Orte, in Sümpfen, Gräben, Teichen, Flußufer, stellw. dch. d. Geb. 7—8. 4

2. *G. plicata* Fries. K. syn. Rchb. icon. t. 153. Stehende Wasser, stellw. mit folgender, aber seltener im Geb., Nassau bei Destr. d. Elbe, Holstein bei D. desloe, Thüringen bei Jena am Saalufer. 6—7. 4

3. *G. fluitans* R. Brow. K. syn. Rchb. icon. t. 152. *Festuca* — Lin. *Poa* — Scopol. Koeler. *Hydrochloa* — Hartmann. Stehende Wasser, an Bächen, Teichen, Quellen, nasse Wiesen, im g. Geb. 6—7. 4

4. *G. distans* Wahlenb. K. syn. Rchb. icon. t. 151. *G. intermedia* Klinggr. *Poa* — Lin. *P. salina* Pollich. *P. retroflexa* Curtis. *P. arenaria* α . Trinius. *Festuca distans* Kunth. *Molinia* — Hartm. scand. *Glyceria capillaris* Wahlenb. Hartm. Rchb. icon. t. 151. Feuchte Orte, besonders salzhaltiger Boden, Salinen, Quellen, an Wegen, Düngerhaufen u. an d. Seeküsten zc., stellw. dch. d. g. Geb., Rheing. an vielen Orten, an allen Salinen, Elsaß, Baden bei Bruchsal, Mannheim, Pfalz Speier, Worms, Mainz, Nassau, Kreuznach, Trier, Luxemburg, Schwaben, Baiern, Sachsen, Hannover, Bremen, Pommern, Preußen; Destr. zc. 5—7. 4

5. *G. festucaeformis* Heynhold. K. syn. Rchb. icon. t. 152. *G. capillaris* M. et K. *Poa festucaeformis* Host. *P. arenaria* β . Trin. *Festuca Hostii* Kunth. *F. palustris* Seenus. Nasse, sandige Orte, Sümpfe, im südl. Geb.,

Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen u. Venedig. 6—7. 4

6. *G. maritima* M. et K. K. syn. Rchb. icon. t. 151. Wahlenb. *Poa* — Hudson. *P. arenaria* γ. Trin. *Hydrochloa maritima* Hartm. *Molinia* — Hartm. *Festuca thalassia* Kunth. Sandige Dünen d. Nord- u. Ostsee u. d. Flüsse v. Ostfriesland bis Mecklenburg, Sever, Bremen, Holstein bis Pommern, im südl. Vittoral, Siebenbürgen, Venedig. 6—7. 4

7. *G. aquatica* Presl. K. syn. *G. airoides* Rchb. exc. et icon. t. 150. *Aira aquatica* Lin. *Molinia* — Wibel. *Poa airoides* Koeler. *Hydrochloa* — Hartm. *Catabrosa* — Beauv. *Colpodium aquaticum* Trin. Stehende Wasser, an Bächen, Quellen, Teichen, Gräben u. auf nassen, sandigen Grassstellen, bch. d. g. Geb., Rheing., vom Oberrheine bis Mannheim, Mainz, Kreuznach, Trier, Coblenz, Eöln, Düsseldorf u. 6—7. 4

878. *Molinia* Schrank. Molinie. K. syn. 933.

Rchb. exc. p. 44. Comp. I. 1. p. 171

1. *M. coerulea* Moench. K. syn. Rchb. icon. t. 150. *M. variabilis* Wibel. *Aira coerulea* L. *Melica* — L. mant. *Enodium* — cum Gaud. helv. *Festuca* — DC. *Hydrochloa* — Hartm. Var. γ. major: *M. altissima* Link. *M. littoralis* Host. Rchb. icon. t. 150. *M. arundinacea* Schrank. *Enodium sylvaticum* Link. Sumpfige Wiesen, Triften, nasse Walbwiesen, an Gräben, Teichen, bch. d. g. Geb.; Var. β. im südl. Vittoral. 6—8. 4

2. *M. serotina* M. et K. K. syn. *Diplachne* — Link. Rchb. exc. et icon. t. 166. *Festuca* — Lin. Schrader. Host. *Agrostis* — L. mant. *Melica nodosa* Pill. et Mitterb. *Bromus strictus* Scopol. *Schedonorus* — R. et Schult. Stei- nige Hügel, Abhänge, Wege, im südl. Geb., Südschweiz Cant. Tessin bei Lugano, Cant. Wallis, Waadt; Südtirol, Ungarn, Siebenbürgen, Vittoral, Istrien, Croatien, Dalmatien, Lombardei, Piemont, Ligurien, Genua u. 8—10. 4

879. *Dactylis* L. Rnaußgras. K. syn. 934. Rchb. exc. p. 36. Comp. I. 1. p. 173.

1. *D. glomerata* L. K. syn. Rchb. icon. t. 147. *Festuca* — Allion. *Bromus glomeratus* Scopol. Var. β . *glaucescens*: *D. glaucescens* Willd. *D. altaica* Bess. — γ . *D. abbreviata* Bernh. Rchb. icon. t. 147. — δ . *D. hispanica* Roth. Rchb. exc. et icon. t. 147. *Festuca phalarioides* Lamk. Wiesen, Wege, Raine, Waldränder, Gebüsche, im g. Geb.; Var. γ . u. δ . mehr im südl. Geb., Luxemburg, Littoral, Ungarn u. 6—7. 4

2. *D. littoralis* Willd. K. syn. *D. maritima* Schrad. Suffr. Rchb. exc. et icon. t. 147. *D. distichophylla* Brignoli. *Poa littoralis* Gouan. *P. pungens* M. v. Bieb. *Calotheca littoralis* Spreng. Sandige Orte am südl. Littoral, Istrien, Triest, Fiume, Insel Dsero, Dalmatien, Venedig. 6—8. 4

880. *Cynosurus* L. Rammgras. K. syn. 934. Rchb. exc. p. 17. Comp. I. 1. p. 154.

1. *C. cristatus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 148. *Phleum cristatum* Scopol. Wiesen, Tristen u., im g. Geb. 6—7. 4

2. *C. echinatus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 148. Hecker, Wiesen, Begeränder, Hügel, dch. d. g. südl. Geb., Schweiz im Cant. Valais; Oestr. bei Steyer, Steyermart bei Gili, Südtirol, Krain, Ungarn, Littoral, Istrien, Fiume, Triest, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Genua. 5—6. 4

881. *Festuca* L. Schwingelgras. K. syn. 935. Rchb. exc. p. 37. Comp. I. 1. p. 174.

a. *Nardurus* Bluff. Rchb. icon. gram. p. 27. K. Taschb. p. 581.

1. *F. tenuiflora* Schrad. K. syn. *Nardurus tenellus* Rchb. icon. t. 129. Var. α . *mutica*: *Triticum unilaterale* L. mant. — β . *biuncialis* *Tritic. biunciale* Allioni, Bertol.

— *γ. aristata*: *Brachypodium tenellum* R. et Sch. *Rchb. exc. p. 19.* *Brach. tenuiflorum* R. et Sch. *Triticum Nardus* DC. *Tr. tenellum α.* Lamk. *Sonnige, uncultivirte Orte im südl. Geb., Südschweiz Cant. Wallis am Montorge bei Sitten, Genf; im südl. Littoral, Istrien, Croatien, Lombardei. 6—7. ☉*

2. *F. Lachenalii* Spenner. *Fl. Frib. K. syn. Agropyrum Halleri* *Rchb. exc. p. 20.* *F. Poa* Kunth. *Triticum — DC. Trit. Lachenalii* Gmel. *Trit. tenellum* L. Bertol. *Trit. Halleri Viviani. Brachypodium Poa et Br. Halleri R. et Schult. Rchb. icon. t. 125. Nardurus Halleri* *Rchb. Var. β. ramosa: Trit. Festuca* DC. *Trit. Poa β. Dub. — γ. aristata: F. tenuicula* Kunth. *Trit. — Loisl. Trit. festucoides* Bertol. *Trit. hispanicum Vivian. Sanbige Orte, Wege, Acker, stchw. im Geb., Rheing. in Menge auf Bachfließ, in d. Granit-Vogesen, Basel nach Elsaß bei Colmar, Oberbaden bei Freiburg im Breisg.; Schweiz Val d'Aost, Cant. Tessin bei Locarno u. in d. Lombardei bei Mailand; fehlt im g. nördl. Geb. u. in g. Destr. mit allen Provinzen außer d. Lombardei. 6—7. ☉*

b. *Vulpia* Gmel. *Rchb. exc. et icon. K. Taschb.*

3. *F. Michellii* Kunth. *Vulpia — Rchb. exc. in add. Bromus — Savi. Im südlichsten Littoral u. d. Inseln, Dalmatien Insel Lesina, Lombardei, Venedig auf d. Insel Porbi Lion u. bei Florenz. 3—4. ☉*

4. *F. uniglumis* Soland. *K. syn. Soyer — Willemet. Vulpia — Rchb. exc. et icon. t. 130. V. membranacea* Lk. *Mygalurus uniglumis* Lk. *Stipa membranacea* Lin. *Dürre Orte am südl. Littoral, Istrien, Triest, Fiume, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Nizza, Genua. 5—6. ☉*

5. *F. ligustica* Bertol. *Fl. ital. Vulpia — Lk. Rchb. exc. et icon. t. 130. Bromus — Allioni. Trockene, steinige Hügel am südlichsten Littoral, Piemont, Ligurien, Genua. 4—5. ☉*

6. *F. ciliata* Koch. *K. syn. F. myurus* Lin. *Soyer*

— Willemet. *Vulpia myuros* Rehb. icon. t. 130. *Vulpia ciliata* Lk. *Festuca myurus* β . Seb. et Maur. Uncultivirte, steinige Orte, im südl. Geb., Schweiz bei Genf, Cant. Tessin; Tyrol, Vitorral, Istrien, Fiume, Dalmatien, Lombardien, Venedig, Piemont, Ligurien. 5—6. ☉

7. *F. myuros* Koch. K. syn. *F. Pseudo-myuros*. Soyer — Willemet. *Vulpia myuros* Gmel. *V. Pseudo-myuros* Rehb. exc. et icon. t. 130. *Mygalurus caudatus* Link. Sandboden an Wegen, Rainen, Ufern, auf Aeckern, dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

8. *F. bromoides* L. M. et K. K. syn. *F. sciuroides* Roth. *Vulpia* — Rehb. exc. et icon. t. 130. *V. bromoides* Lk. *Bromus dertonensis* Allion. Bertol. *Br. ambiguus* Cyrill. Uncultivirte, besonders sandige Raine, Ufer, Wege, trockene Triften, stellw. dch. d. g. südl. u. mittl. Geb., Rheing. nicht selten. 5—6. ☉

c. *Festucae genuinae* K. syn. et Taschb.

9. *F. Halleri* Allion. pedm. K. syn. Rehb. icon. t. 131. *F. alpina* Suter helv. Sturm. Hochalpen, Schweiz u. stellw. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Steyermark, Destr., Siebenbürgen, Lombardien. 7—8. 4

10. *F. alpina* Gaud. helv. Rehb. exc. et icon. t. 131. *F. Gaudini* Kunth. *F. ovina* β . *alpina* K. syn. Triften d. Alpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Destr. u. 7—8. 4

11. *F. aurata* Gaud. helv. Rehb. exc. et icon. t. 131. *F. pallida* Gaud. *Schedonorus auratus* R. et Sch. Triften d. Alpen, Südschweiz Cant. Wallis auf dem Gex u. Gailon. 7—8. 4

12. *F. amethystina* Host. Rehb. exc. et icon. t. 131. *F. ovina* η . *amethystina* K. syn. Steinige Hügel im südl. Geb., Destr. bei Wien, Ungarn, Siebenbürgen. 6—7. 4

13. *F. ovina* L. K. syn. Rehb. icon. t. 131. *F. duriuscula* L. Rehb. icon. t. 132. Bertol. Fl. ital. Var. α . vulgaris: *F. ovina* M. et K. *F. tenuifolia* Sibth. Schrad.

F. capillata Lamk. Poa — Merat. *F. setacea* Koeler. — β . *violacea*: *F. violacea* Gaud. M. et K. Rchb. exc. et icon. t. 132. — δ . *valesiaca*: *F. valesiaca* Schleicher. Gaud. helv. Rchb. icon. t. 133. — γ . *duriuscula*: *F. duriuscula* L. spec. Host. *F. ovina* Schrader. *F. curvula* Gaud. *F. hirsuta*, *stricta* et *dura* Host. — ϵ . *glauca*: *F. glauca* Schrader. *F. pallens* Host. Rchb. icon. t. 133. *F. duriuscula* β . *laevigata* Gaud. *F. laevigata* Clairv. Rchb. icon. t. 133. *F. pungens* R. et Schult. — ζ . *pannonica*: *F. pannonica* Host. Rchb. icon. t. 133. — η . *vaginata*: *F. vaginata* Willd. M. et K. ϑ . *F. canescens* Host. Grasige Hügel, Felsen, Raine, Wiesen, Triften, Wege, dch. d. g. Geb. bis in d. Boralpen u. Hochalpen; Var. γ . auf Alpen u. Boralpen, η . in Baiern bei München an d. Isar, ζ . Rheing. bei Aachen, Destr. u. Ungarn, ϑ . auf d. Gebirgen in Krain. 5—6. 4

14. *F. vaginata* W. et Kit. Rchb. exc. et icon. t. 134. *Bromus glaucus* Host. Trockene, grasige Hügel im südl. Geb., Destr. Krain in d. Wochein, Ungarn. 5—6. 4

15. *F. heterophylla* L. Haenke. K. syn. *F. duriuscula* L. syst. nat. Schrader. *F. nemorum* Leyss. Rchb. exc. et icon. t. 137. Wälder d. Gebirge, d. Alpen u. Boralpen, dch. d. Geb., Schweiz besonders im Jura u. dch. d. g. Alpenkette nach Schwaben, Baiern, Salzburg, Tyrol zc., Rheing., von Basel nach Baden im Breisg., Feldberg, Rastatt, Baden-Baden, Heidelberg, Bergstraße bis Frankfurt zc., Elsaß nach Kaiserslautern, Zweibrücken, Nahegebirge, Hochwald bis Trier, Eifel, Luxemburg, Moselgebirge, Coblenz, Köln, Westphalen bei Darup, Havisbeck, Rotteln zc.; Sachsen, Thüringen, Preußen, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren zc. 5—6. 4

16. *F. nigrescens* Lamk. Rchb. exc. et icon. t. 137. *F. heterophylla* β . K. syn. *F. nigricans* Schleicher. Alpen, Boralpen u. Gebirge, stellw. mit *F. heterophylla* dch. d. Geb., Schweiz u. dch. d. g. Alpenkette, besonders im Jura, nach Baiern, Tyrol, Destr., Steyermark, Kärnthen, Krain, Littoral, Ungarn. 5—6. 4

17. *F. rubra* L. K. syn. Rchb. icon. t. 137. Var. β . villosa: *F. dumetorum* L. *F. barbata* Schrank. — γ . arenaria: *F. rubra* γ . lanuginosa K. syn. edit. I. *F. cineraria* DC. *F. arenaria* Osbeck. *F. baltica* Hohmann. *F. dumetorum* Hafn. Trockene Wiesen, Triften, Waldränder, Sandäcker und sandige Brachfelder, dch. d. g. Geb. 5—6. 4

d. *Schedonorus* Koch. K. syn. et Taschb.

18. *F. varia* Haenke. K. syn. Rchb. icon. t. 135. Gaud. *F. acuminata* DC. Gaud. Var. β . flavescens: *F. flavescens* Bellard. Rchb. icon. t. 135. *F. Xanthina* R. et Schult. — γ . crassifolia: *F. Eския* Ramond. Rchb. exc. et icon. t. 136. Steinige Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. dch. d. Alpenkette nach Tyrol, Oestr., Krain bis in d. Seealpen, Schlesien in d. Sudeten, im Teufelsgärtchen u. in d. kleinen Schneegrube, Böhmen, Mähren z.; Var. γ . Schweiz im Val d'Aoste, in Savoyen u. in Krain. 7—8. 4

19. *F. pumila* Villars. K. syn. Rchb. icon. t. 135. *F. varia* Pers. Steinige Triften d. Alpen, Schweiz im Jura auf d. Chasseral, Chasseron, Creux du Vant u. dch. d. g. Alpenkette bis in d. Seealpen. 7—8. 4

20. *F. pilosa* Haller fil. K. syn. *F. rhaetica* Sut. helv. *F. poaeformis* Host. Rchb. exc. et icon. t. 136. *F. violacea* Bellard. Dürre Triften d. Hochalpen u. Gebirge d. südl. Kette, Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Krain, Ungarn, Venedig, Piemont. 7—8. 4

21. *F. laxa* Host. K. syn. Rchb. icon. t. 134. Feuchte, steinige Orte d. südl. Alpenkette von Krain, auf d. M. Roibl. 6—7. 4

22. *F. alpestris* R. et Schult. Rchb. exc. *F. alpina* Host. IV. t. 63. Alpen u. Boralpen in Tyrol u. Krain. 7. 4

23. *F. spectabilis* Jan. K. syn. Rchb. icon. t. 140. *F. spadicea* β . nemorosa Pollin. Fl. veron. Steinige Orte, Kalkfelsen in d. südl. Alpenkette, Tyrol auf d. Seiseralp bis z. Monte Baldo, Krain, Dalmatien, Lombard. 6—8. 4

24. *F. spadicea* L. K. syn. Rchb. icon. t. 138.

Schedonorus spadiceus R. et Schult. *Poa Gerardi* Allion. pedm. *Anthoxanthum paniculatum* L. Triften d. Hochalpen, Südschweiz u. dch. d. südl. Kette nach Tessin; Südtirol, Destr. Kärnten, Krain, Croatien, Siebenbürgen, Lombardei, Savoyen. 7—8. 4

25. *F. ferruginea* Rchb. exc. in add. Kunth. enum. Host. *Schedonorus* — Vest. Auf d. Alpe Rum in Krain. 7—8. 4

26. *F. sylvatica* Vill. delph. K. syn. Rchb. icon. t. 138. Sternb. et Hoppe. *F. calamaria* Smith. Host. *F. latifolia* Host. Rchb. icon. t. 139. *F. decidua* Engl. bot. *Poa trinervata* Schrader. *Poa sylvatica* Pollich. *P. latifolia* Host. *Schedonorus calamarius* R. et Schult. Gebirgswälder, Gebüsche bis in d. Boralpen, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., Basel, Bögessen, Schwarzwald, Baden im Breisg., Murgthal bis Heidelberg u. d. Bergstraße nach Nassau, Elsaß, Pfalz auf d. Donnersberg, Hardt, Kaiserslautern, Kreuznach, Hochwald, Saarbrücken, Trier, Eifel, Luxemburg, Aachen, Coblenz, Eöln, Düsseldorf zc., Schwaben, Baiern, Franken, Thüringen, Hamburg, Hannover bei Göttingen, Holstein, Lausitz, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren zc. 6—7. 4

27. *F. drymeja* M. et K. K. syn. Rchb. icon. t. 139. *F. montana* Rchb. exc. non Sternberg. *F. sylvatica* Host. *F. exaltata* Presl. Feuchte, schattige Gebirgswälder, stellw. im südl. Geb., Destr. um Wien, Böhmen, Mähren, Krain, Ungarn, Siebenbürgen. 6—8. 4

28. *F. Scheuchzeri* Gaud. helv. K. syn. Rchb. icon. t. 138. *F. pulchella* Sehrad. *F. nutans* Host. *Schedonorus nutans* et *Scheuchzeri* R. et Schult. Wiesen, Triften d. Alpen u. Boralpen, Schweiz u. stellw. dch. d. g. Alpenkette nach Salzburg, Tyrol, Steyermark, Destr., Kärnten, Krain, Ungarn. 7—8. 4

29. *F. oryzetorum* Pollini. Rchb. exc. Gräben d. Reisfelder in d. Lombardei bei Verona. 6. 4

30. *F. gigantea* Villars. K. syn. *Bromus* — *teus* L. Schreb. Rchb. exc. et icon. t. 145. Var. β . *F. triflora*

Smith. *Bromus* — us L. spec. Wälder, Gebüſche an Waldbächen, dch. d. g. Geb. 6—8. 4

31. *F. borealis* M. et K. K. syn. *Scolochloa festuacea* Link. Rchb. exc. p. 41 et icon. t. 166. *F. arundinacea* Liljeb. *F. donacina* Wahlb. *Donax borealis* Trin. *D. festuacea* Beauv. *Arundo* — Willd. *Triodia* — Roth. *Glyceria* — Fries nov. Tiefe Gräben u. Seen im nördl. Geb., Havelſee bei Berlin, Treptow an d. Spree, Stettin, Holſtein bei d. Steiſchleuſe im Eidercanal bei Friedrichsort. 6—7. 4

32. *F. arundinacea* Schreb. K. syn. Rchb. icon. t. 141. *F. elatior* Smith, Schrader. *Schedonorus* — R. et Schult. *Bromus* — Sprengel. *Br. arundinaceus* Roth. *Br. littoreus* Retz, Host. *Poa Phoenix* Scopol. Schattige, etwas feuchte, gute Wieſen, an Fluß- u. Bachufern in Gebüſchen, ſtellw. dch. d. g. Geb., Rheing., v. d. Schweiz dch. d. g. Rheinſläche, ſtellw. bis nach Weſtphalen an d. Lippe, bei Dorſten an d. Emſe, Hamburg bis nach Oſtpreußen bei Königsberg u., an d. Main, Nahe u. Mosel u. 7—8. 4

33. *F. elatior* L. K. syn. *F. pratensis* Huds. Rchb. icon. t. 141. *Schedonorus* — R. et Schult. *Bromus elatior* Roth. Koeler. *Br. pratensis* Sprengel. *Poa curvata* Koeler. Wieſen, Triſten, Wegeränder, Raine, dch. d. g. Geb., 6—7. 4

34. *F. decolorans* M. et K. K. syn. edit I. Rchb. icon. t. 136. *Bromus* — Rchb. exc. Schweiz Cant. Bern im Lauterbrunnenthal am Staubbach. 7. 4

35. *F. loliacea* Huds. K. syn. *Lolium festuaceum* Link. Rchb. exc. et icon. t. 112. *F. elongata* Ehrh. *F. adscendens* Retz. *F. Phoenix* Thuill. Fruchtbare Wieſen, Ufer, ſtellw. dch. d. Geb., beſonders im weſtl. u. ſüdl., Rheing., ſtellw. auf d. g. Rheinſläche, Schaffhaufen, Bülach, Rheinſelben, Baſel nach Baden bei Carlsruhe, Einkenheim, Raſſau bei Deſtrich, Pfalz Speyer, Kreuznach, Zweibrücken, Saargemünd, Saarbrücken, Trier, Aachen, Eöln, Dülſſeldorf, Weſtphalen bei Billerbeek, Hamburg, Hannover, ſtellw. bis Preu-

ßen, Zilsit, Königsberg u.; Destr. Böhmen, Tyrol, Dalmatien, Siebenbürgen, Venedig. 5—6. 4

882. *Brachypodium* Beauv. Zwenfe. K. syn. 944.

Rchb. exc. p. 19. Comp. I. p. 192.

1. *B. sylvaticum* R. et Schult. K. syn. *B. gracile* P. Beauv. Rchb. exc. et icon. t. 126. *Festuca sylvatica* Huds. *F. gracilis* Schrader, Moench. *Bromus* — Weigl. *Br. pinnatus* β. Lin. *Br. sylvaticus* Pollich. *Br. dumosus* Villars. *Triticum sylvaticum* Moench. *Tr. teretiflorum* Wibel. Wälder, Gebüſche, dch. d. g. Geb. 7—8. 4

2. *B. pinnatum* R. et Schult. Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 127. *Bromus pinnatus* L. *Festuca* — ta Moench. Schrader. *Triticum pinnatum* Moench. *Tr. bromoides* Wibel. Var. β. *rupestre*: *B. rupestre* R. et Schult. Rchb. icon. t. 126. *Bromus rupestris* Host. *Br. corniculatus* Lamk. *Tr. pinnatum* γ. DC. — γ. *caespitosum*: *B. caespitosum* R. et Schult. Rchb. exc. et icon. t. 127. *Bromus caespitosus* Host. *Triticum gracile* DC. Fl. fr. *Tr. pinnatum* β. DC. Fl. fr. Graſſige Hügel, Abhänge, Wiefen, zw. Hecken, Gebüſchen, dch. d. g. Geb.; Var. β. u. γ. im ſüdl. Geb., Tyrol, Krain u. im ſüdl. Vittoral. 6—7. 4

3. *B. ramosum* R. et Schult. K. syn. Rchb. icon. t. 128. *B. Hostii* Lk Rchb. exc. *B. Plukenetii* Lk. Rchb. icon. t. 128. *Bromus ramosus* L. *Br. Plukenetii* Allion. *Festuca caespitosa* Desf. *Triticum caespitosum* DC. — Var. β. *phoenicoides*: *Triticum phoenicoides* DC. Fl. fr. Dürre, ſteinige Hügel, am ſüdl. Vittoral, Iſtrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig. 6—7. 4

4. *B. distachyon* R. et Schult. K. syn. *Trachynia distachya* Link. Rchb. exc. p. 19. et icon. t. 129. *Bromus distachyus* L. *Festuca diandra* Moench. *F. monostachya* Poir. *F. ciliata* Gouan. *F. distachyos* Koeler. *Triticum ciliatum* DC. Cultivirte Orte, an Wegen, beſonders im ſüdl. Geb., Belgien bei Lüttich, im ſüdl. Vittoral, Iſtrien, Fiume, Trieſt, Ungarn, Dalmatien, Lombardei, Piemont. 5. ☉

883. *Bromus* L. *Trespe*. K. syn. 945. Rchb. exc. p. 42. Comp. I. 1. p. 186.

1. *Br. arduennensis* Kunth. enum. K. syn. *Libertia* — Lejeun. *Calotheca bromoides* Lej. *Michelaria* — Du Mort. *Br. auriculatus* Raspail. *Br. multiflorus* β . *arduennensis* Rchb. exc. et icon. t. 144. f. 351. *Br. polystachys* Desf. Saatäcker in Belgien, bei Aiwaille in d. Ardennen d. Provinz Lüttich. 6—7. ☉

2. *Br. velutinus* Schrader. *Br. multiflorus* Smith. Rchb. exc. et icon. t. 144. *Br. secalinus* β . *velutinus* K. syn. *Br. grossus* α . Gaud. *Br. grossus* DC. *Br. grossus* β . et γ . M. et K. Saatäcker, stellw. dch. d. g. Geb., Rheing., dch. Baden, Elsaß, Pfalz bis Zweibrücken, Bitsch, Kusel, Trier, Aachen, Coblenz, Bonn, Köln, Belgien, Schweiz u. 6—7. ☉

3. *Br. secalinus* L. K. syn. Var. α . *vulgaris*: *Br. secalinus* Schrad. Rchb. exc. et icon. t. 144. *Br. elongatus* Gaud. — β . *grossus*: *Br. secalinus* β . *grossus* DC. — γ . *hordaceus*: *Br. hordaceus* Gmel. non Fries. *Br. badensis* Gmel. Saatäcker, besonders unter d. Wintersaat, dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

4. *Br. commutatus* Schrad. K. syn. Rchb. icon. t. 143. *Br. simplex* Gaud. Aecker, Felder, Wiesen, Wegeränder, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Oberbaden, Kaiserslautern, Mainz, Kreuznach, Boppard bei Coblenz, Bonn, Trier, Prüm in d. Eifel, Aachen, Westphalen bei Herford, Hamburg, Hannover, Göttingen, Hildesheim, Braunschweig, Baiern, Schwaben, Sachsen, Thüringen bei Zerbst, Sondersleben, Magdeburg, Harz u.; Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Ungarn, Lombard. 5—6. ☉

5. *Br. racemosus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 143. *Br. pratensis* Ehrh. *Br. multiflorus* Roth. Wiesen, Triften, Wegeränder, stellw. dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

6. *Br. mollis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 143. *Br. na-*

nus Weigg. Necker, Wegeränder, Wiesen, dch. d. g. Geb. 5—6. ☉

7. *Br. confertus* M. v. Bieb. K. syn. Rchb. icon. t. 143. *Br. intermedius* Gusson. *Br. rectus* et *Br. alopecuroides* Moris. Saatäcker, an Wegen, Schutt, am südl. Littoral, Istrien, Campo marzo bei Triest, bei Pola, Ungarn, Dalmatien, Lombardei. 4—5. ☉ oder ☉

8. *Br. fasciculatus* Presl. Bertol. Fl. ital. I. p. 683. Maly enum. pl. austr. p. 9. Am südl. Littoral, häufig in Istrien, Fasana. 5—6. ☉

9. *Br. divaricatus* Rhode. Rchb. icon. t. 144. f. 352. Var. β . *Br. lanuginosus* Poir. Wegeränder am südlichsten Littoral, Piemont, Nizza um d. Hafen u. bei Villafranca. 6. ☉

10. *Br. brachystachys* Hornung. K. syn. Necker in Thüringen auf d. Gottesacker bei Aschersleben R.-Bezirk Magdeburg. 6. ☉

11. *Br. arvensis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 143. *Br. versicolor* Pollich. *Br. multiflorus* Weigel. Necker, Saatfelder, dch. d. g. Geb. 6—7. ☉

12. *Br. patulus* M. et K. K. syn. Rchb. icon. t. 143. *Br. commutatus* Koch et Ziz. *Br. multiflorus* Host. Var. β *velutinus* K. syn. *Br. patulus* β . M. et K. Saatäcker, Weinberge, stellw. dch. d. südl. u. mittl. Geb., Rheing., auf d. Jura u. Tertiär Kalk, von d. Schweiz nach Württemberg, Baiern, Basel nach Baden, Breisg. am Kaiserstuhl, Durlach, Karlsruhe, Wiesloch, Mannheim nach Darmstadt, Frankfurt, Hanau, Elsaß, Pfalz bei Alzey, Mainz, Nahe- u. Rheinh. häufig, Kreuznach, Grumbach, Meisenheim, Lahntal bei Koblenz, Linz a. d. R., Trier, Luxemburg, Thüringen, Braunschweig u.; Destr. Böhmen, Tyrol, Ungarn, Littoral. 5—6. ☉

13. *Br. squarrosus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 144. Var. β . *villosus*. *Br. squarrosus* β . M. et K. *Br. squarrosus* Host. *Br. villosus* Gmel. *Br. hirsutus* Schrank. — γ . *coloratus*: *Br. coloratus* Baumgarten Trans. Trockene Hügel, Aterrine, Weinberge, stellw. im Geb., besonders im g. südl., Südschweiz, Rheing., Basel bei Grenzach u. Wyl, Oberbaden, Pfalz bei Deidesheim (DdM), Baiern; Destr.

Tyrol, Steyermark, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Lombardei, Piemont &c. 5—6. ☉

14. *Br. asper* L. K. syn. Rchb. icon. t. 145. *Br. ramosus* Murr. *Br. nemoralis* Huds. *Br. nemorosus* Villar. *Br. hirsutus* Curt. *Br. altissimus* Web. *Br. montanus* Pollich. *Br. asper* et *Br. montanus* Gmel. *Festuca aspera* M. et K. Gebirgswälder, Paine, Gebüsch, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

15. *Br. erectus* Huds. K. syn. Rchb. icon. t. 146. *Br. agrestis* Allion. Host. *Br. perennis* Villars. *Br. angustifolius* Schrank. *Br. montanus* Fl. Wett. *Br. arvensis* Pollich. *Br. pseudo-arvensis* Koeler. *Festuca montana* Savi M. et K. — Var. α . *Br. laxis* Horn. Rchb. icon. t. 146. Gräßige Hügel, Wiesen, Triften, Paine, stellenw. dch. d. Geb., besonders im g. südl. u. im mittl. Geb., Rheing., auf d. Tertiärkalk d. Rheinfläche nicht selten, Baden, Nassau, Elsaß, Pfalz, Worms, Mainz, Bingen, Nahe, Kreuznach bis Oberstein &c., Wetterau, Trier, Luxemburg, Coblenz, Bonn, Köln &c., Baiern, Franken, Thüringen. Sava, Halle; Destr. &c. 5—6. 4

16. *Br. inermis* Leysser. Lin. K. syn. *Festuca* — DC. M. et K. Rchb. icon. t. 141. *F. speciosa* Schreb. *F. Leysseri* Moench. *Schedonorus inermis* R. et Schult. Trockene, sandige Wiesen, Uferländer, Paine, an Zäunen, Wegen, dch. d. g. Geb. 6—7. 4

17. *Br. sterilis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 142. Var. β . *australis* Bernh. *Br. longiflorus* Willd. *Br. grandiflorus* Weigel. Uncultivirte Orte, Wege, Paine, Uferländer, im g. Geb. 5—10. ☉

18. *Br. tectorum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 142. Var. β . *murorum* Host. Sandstellen, Wege, Schutt, Mauern u. auf Dächern, im g. Geb. 5—6. ☉

19. *Br. rigidus* Roth. K. syn. Rchb. icon. t. 142. *Br. rubens* Host. *Br. madritensis* Vahl. DC. Dürre Abhänge, Weinberge, an Wegen, im südl. Vittoral, Krain, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Ligurien. 5—7. ☉

20. *Br. diandrus* Curt. lond. Smith. *Br. madriten-*

sis L. Schrad. Host. Rchb. icon. t. 142. Br. gynandrus Roth. Trockene Orte, an Wegen, Abhängen, im südl. Geb., Südtirol, Vittoral, Istrien, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Ligurien u. 5—7. ☉

21. Br. maximus Desfont. Rchb. exc. et icon. t. 142. Dürre Orte am südl. Vittoral, Istrien bei Fiume, Pola, Lombardei bei Mailand, Oberitalien. 4—6. ☉

XIV. Gruppe. Hordeaceen Kunth. enum. K. Taschb. p. 590.

884. *Gaudinia* Beauv. Gaudinie. K. syn. 950. Rchb. exc. p. 19. Comp. I. 1. p. 150.

1. *G. fragilis* Beauv. K. syn. Rchb. icon. t. 90. Avena — Lin. Trockene uncultivirte Orte, Wege, Wiesenränder, stellw. besonders im südl. Geb., Hamburg auf einer Moorniese b. Eppendorf; Mecklenburg; Schweiz Cant. Waadt bei Midde u. Peterlingen, Genf Porte de Cornavin; im südl. Vittoral, Istrien Insel Sansego, Dalmatien. 5—6. 4

885. *Triticum* L. Weizen. K. syn. 950. Rchb. exc. p. 21. Comp. I. 1. p. 201.

1. *T. vulgare* L. K. syn. Var. β . *T. aestivum* L. — γ . *T. hybernum* L. — δ . *T. compactum* Host. Cultivirt. 6—7. ☉ u. ☉

2. *T. turgidum* L. sp. K. syn. *T. compositum* L. syst. Cultivirt. 6—7. ☉ u. ☉

3. *T. durum* Desf. K. syn. *T. hordeiformis* Host. Var. β . *T. villosum* Host. Cultivirt, Schweiz u. mehr im südl. Geb. 6—7. ☉ u. ☉

4. *T. polonicum* L. K. syn. Stellw. im Geb. cultivirt, mehr im südl., z. B. Südschweiz u. 6—7. ☉ u. ☉

5. *T. Spelta* L. K. syn. *T. vulgaris* M. et K. *T. Zea* Host. In Gebirgsgegenden cultivirt, besonders auf Kalk- u. Thonboden. 6—7. ☉

6. *T. dicoccum* Schrank. K. syn. *T. amyleum*

Sering. *T. tricoccum* Schübler. *T. Spelta* Host. gram.
T. atratum Host. Stellw. cultivirt. 6—7. ☉ u. ☉

7. *T. monococcum* L. K. syn. Cultivirt in Gebirgsgegenden. 6—7. ☉ u. ☉

8. *T. villosum* M. v. Bieb. K. syn. Rchb. icon. t. 124. Secalè — Lin. Host. Aeßer unter d. Saat, an Wegen, im südl. Geb., Ungarn, Siebenbürgen, am südl. Eittoral, Istrien, Fiume, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Oberitalien. 5—6. ☉

886. *Agropyrum* Pal. Beauv. Queden. Rchb.
 exc. p. 20. Comp. I. 1. p. 197. *Triticum* L. K. syn. 951.

1. *A. junceum* Beauv. Rchb. exc. et icon. t. 122. Trit. — Lin. K. syn. *T. farctum* Viviani. Sandige Rüste d. Nord- u. Ostsee, Ostpreußen bei Pillau, Danzig; am südl. Eittoral, Krain, Croatien, Venedig, Ungarn. 6—8. 4

2. *A. strictum* Rchb. exc. et icon. t. 123. Tritic. — Dethar. K. syn. *T. acutum* β. *strictum* M. et K. Sandige, im Winter überschwemmt gewesene Orte d. Ostseeküste bei Warnemünde u. am südl. Eittoral bei Venedig. 6—7. 4

3. *A. acutum* R. et Schult. Rchb. exc. et icon. t. 122. Tritic. — DC. K. syn. *T. affine* Dethard. Rchb. icon. t. 121. Lehmgiger, salzhaltiger Boden d. Nordseeküste, Holstein bei Rügelsütte, Darumer See, Insel Borkum, Norderey u. und am südl. Eittoral, Istrien bei Triest, Venedig. 6—7. 4

4. *A. rigidum* R. et Schult. Rchb. exc. et icon. t. 123. Tritic. — Schrader K. syn. *T. elongatum* Host. *T. junceum* β. *giganteum* Roth. Agropyr. *giganteum* R. et Schult. Sumpfige, sandige Orte im südl. Geb., Destr. Böhmen, Mähren, Tyrol, Ungarn, am südl. Eittoral, Istrien u. Venedig. 7—8. 4

5. *A. pungens* R. et Schult. Rchb. exc. et icon. t. 122. Tritic. — Pers. K. syn. Sandige Rüste d. Nordsee in Holstein u. im südl. Eittoral, Croatien, Dalmatien, Venedig. 6—7. 4

6. *A. glaucum* R. et Schult. Rchb. exc. et icon. t. 121. Tritic. — Desf. K. syn. Steinige Orte, sandige Hügel, an Wegen, Ufern, stellenw. bch. d. südl. Geb., Destr. Böhmen, Mähren, Steyermark, Tyrol, Vitoral, Istrien u., Südschweiz. 6—7. 24

7. *A. intermedium* Rchb. icon. t. 123. Tritic. — Host. Fl. austr. T. junceum Host. gram. Steinige, sandige Hügel im südl. Geb., Destr., Ungarn. 6—7. 24

8. *A. littorale* Rchb. icon. t. 121. Tritic. — Host. Am südl. Vitoral, Istrien. 6—8. 24

9. *A. repens* Beauv. Rchb. exc. et icon. t. 120. Tritic. — L. K. syn. Var. β . *glaucum* Trit. firmum Presl. Agrop. — Rchb. icon. t. 119. — γ . *glaucescens*: Trit. repens b. maritimum K. et Ziz. Hecker, Brachfelder, Wege, Säune, Ufer u., im g. Geb. 6—9. 24

10. *A. biflorum* Rchb. exc. et icon. t. 127. Tritic. — Brignol. K. syn. Var. β . Hornemann. K. syn. Trit. violaceum Hornem. Fl. Dan. Auf d. Julischen Alpen in Krain auf d. Matajur. 7—8. 24

11. *A. caninum* R. et Schult. Rchb. exc. et icon. t. 119. Tritic. — Schreber. K. syn. *Elymus caninus* L. Wälder, besonders an Waldbächen, Gebüschen, Hecken, Säunen, bch. d. g. Geb. 6—7. 24

12. *A. imbricatum* * *Triticum imbricatum* M. v. Bieb. M. et K. Agropy. cristatum Beauv. Rchb. exc. et icon. t. 119. Trit. — Lin. Schreb. Trockene, salzhaltige, steinige Orte d. Gebirge im südl. Geb., Destr., Ungarn bei Pesth, Croatien, Siebenbürgen. 6—7. 24

887. *Secale* L. Roggen. K. syn. 954. Rchb. exc. p. 22. Comp. I. 1. p. 204.

1. *S. cereale* L. K. syn. Allgemein cultivirt. 5. 6. ☉ u. ☉

2. *S. fragile* M. v. Bieb. Rchb. exc. et icon. t. 124. *S. sylvestre* Host. *S. campestre* Kitaib. Tritic. — R. et

Schult. Sandige Triften, Anhöhen, Wege, in Ungarn u. Croatien. 6—7. ☉

3. *S. dalmaticum* Visian. Fl. Dalm. I. p. 27. Maly enum. pl. austr. p. 3. In Dalmatien auf d. Velebit u. um Cattaro. 6. 4

888. *Elymus* L. Haargraß. K. syn. 954. Rchb. exc. p. 17. Comp. I. 1. p. 205.

1. *E. geniculatus* Curt. Rchb. exc. in add. p. 206. Seeküste in Belgien u. Holland. 7. 4

2. *E. arenarius* L. K. syn. Rchb. icon. t. 115. Sandige Küsten d. Nord- u. Ostsee, Sandfelder u. im Fluglande, stellw. dch. d. Geb., Rheing., Pfalz bei Homburg, Zweibrücken, Mainz, Hamburg, Berlin, nach Preußen Königsberg, Thorn, Schlesien, Sachsen bei Dresden, Lausitz; Böhmen, Ungarn, Galizien u. im südl. Vittoral. 7—8. 4

3. *E. europaeus* L. K. syn. Rchb. icon. t. 115. *Triticum sylvaticum* Salisb. *Cuviera europaea* Koeler. *Hordeum cylindricum* Murr. *H. sylvaticum* Huds. *H. montanum* Schrank. Grasige Orte d. Gebirgswälder, stellw. dch. d. Geb. bis in d. Boralpen, Rheing., Jura, Schwarzwald, Breisg., auf d. Raubenalp, auf d. Vogelsberg, Bergstraße bis Hanau, Trier, Eifel bei Prüm, Hohe-Acht, Bonn, Baiern, Franken, Hamburg, Hannover, Holstein, Berlin, Pommern, Schlesien; Destr. Böhmen, Mähren, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen, Croatien u. 6—7. 4

4. *E. crinitus* Schreber. K. syn. Rchb. exc. et icon. t. 115. *E. intermedius* M. v. Bieb. *Hordeum crinitum* Desfont. Dürre Sandfelder u. auf Schutt am südl. Vittoral, Istrien, Triest an d. neuen Auffchüttung, Croatien, Ungarn. 5—7. ☉

5. *E. caput Medusae* L. Kunth. enum. I. p. 452. Schreber gram. Maly enum. pl. austr. p. 3. Dürre, sandige Orte in Ungarn. ☉

889. *Hordeum* L. Gerste. K. syn. 954. Rchb. exc. p. 18. Comp. I. 1. p. 206.

1. *H. vulgare* L. K. syn. Cultivirt. 5—6. ☉ u. ☉
2. *H. hexastichon* L. K. syn. Cultivirt. 5. ☉
3. *H. distichum* L. K. syn. Stellw. im Geb. cultivirt. 6—7. ☉

4. *H. zeocriton* L. K. syn. Stellw. im Geb. cultivirt. 6—7. ☉

5. *H. strictum* Desfont. *H. bulbosum* L. Bert. Rchb. exc. et icon. t. 118. *H. nodosum* Savi. Cultivirte u. grasige Orte, besonders am südl. Eittoral; Westphalen bei Oldendorf; Istrien bei Dignano, Dalmatien bei Zara, Ragusa. 5—6. 4

6. *H. murinum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 117. Uncultivirte Orte, Wege, Zäune 2c., im g. Geb. 7—8. ☉

7. *H. pseudo-murinum* Tappeiner. K. syn. An Wegen im südl. Tyrol bei Schlanders u. im Wintschgau. 7. ☉

8. *H. secalinum* Schreber. K. syn. *H. pratense* Huds. Rchb. et icon. t. 117. *H. nodosum* M. v. Bieb. Var. β . *marinum*: *H. marinum* Roth. tent. Wiesen, Wege, sehr zerstr. dch. d. Geb., besonders auf salzhaltigem Boden; Rheing., Basel nach Elsaß bei Bensfeld u. Hüttenheim, Pfalz Speier, Dürkheim, Zweibrücken, Wallmünster, Bitscher Rohrbach, Bliesthal, Saargemünde, Saarbrücken, Saarlouis, Meisenheim, Trier, häufig bei Luxemburg, Nassau bei Cöden, Mainz bei Höchst, Eöln, Westphalen bei Rheine, Münster, Hamburg, Hannover, Sachsen, Thüringen, Baiern 2c.; Schweiz besonders im Jura bei Orbe, Yverdon, Morges, Genf; im südl. Eittoral, Istrien, Dalmatien, Siebenbürgen, Combarbei, Venedig, aber nicht in Destr. 6—7. 4

9. *H. maritimum* Withering. K. syn. Rchb. icon. t. 117. *H. geniculatum* Allion. *H. rigidum* Roth. Triften u. sandige Orte, Uferländer, am Seestrande d. Nordsee u. am südl. Eittoral, Hannover am Ausfluß der Weser, Holstein, Oldenburg bei Zeven, Mariensiel, Schleswig; Destr., Istrien, Dalmatien, Ungarn, Combarbei, Venedig. 5—6. ☉

890. *Lolium* L. *Volchgras*. K. syn. 956. Rchb. exc. p. 16. Comp. I. 1. p. 195.

1. *L. perenne* L. K. syn. Rchb. icon. t. 112. Wege, Wiesen, Triften, dch. d. g. Geb. 6—9. 4

2. *L. italicum* Alex. Braun. K. syn. Rchb. icon. t. 113. *L. Boucheanum* Kunth. *L. multiflorum* Poir. Lamk. DC. *L. perenne* var. *Pollini*. Wiesen, Triften, Grasgärten, Ufer, stchw. dch. d. Geb. besonders im südl. u. westl., Rheing., Basel nach Elßaß bei Hagenau, Niederbrunn, Baden bei Müllheim, Mannheim, Heidelberg, Nassau bei Mittelheim, Saarthal bei Saargemünde, Trier, Luxemburg, Eupen bei Aachen, Hamburg u., Schweiz bei Winterthur, Genf; Destr. Tyrol, Steyermark, Vittoral, Dalmatien, Croatien, Lombardien. 6—9. 4

3. *L. multiflorum* Gaud. helv. K. syn. Rchb. icon. t. 111. Aecker in d. südl. Schweiz bei Genf. 6—7. ☉

4. *L. rigidum* Gaud. helv. K. syn. *L. strictum* Presl. Trockene Wiesen, an Wegen, am südl. Vittoral, Istrien bei Triest, Fiume, Südschweiz Val d'Aoste, Piemont. 6—7. ☉

5. *L. linicola* Sonder. K. syn. *L. arvense* L. Rchb. exc. et icon. t. 110. *L. remotum* Hoffm. Var. β . *complanatum*: *L. complanatum* Schrader. Rchb. exc. et icon. Feinacker, dch. d. g. Geb.; Var. β . stchw., z. B. bei Trier. 6—7. ☉

6. *L. temulentum* L. K. syn. Rchb. icon. t. 111. *Craespalia temulenta* Schrank. Var. β . *speciosum*: *L. speciosum* Steven. *L. speciosum* var. *culm. glabro* K. syn. edit. I. *L. temulentum* β . *arvense* Babingt. *L. arvense* Smith. *L. temulentum* β . *leptochaeton* Alex. Braun. Aecker, unter d. Saat, dch. d. g. Geb.; Var. β . stchw. 6—7. ☉

7. *L. robustum* Rchb. exc. et icon. t. 110. *L. temulentum* γ . *robustum* K. syn. *L. speciosum* var. *scabrum* K. syn. edit. I. Saatacker, mehr im südl. Geb., Rheinpfalz, Südtirol, Vittoral, Istrien, Oberitalien u. 6—7. ☉

8. *L. subulatum* Visian Fl. Dalm. I. p. 90. *Maly enum. pl. austr.* p. 5. Unter d. Saat, am südl. Vittoral, in Dalmatien bei Ragusa u. Bergato. 6. ☉

891. *Aegilops* L. *Waldgras*. K. syn. 957. Rchb. exc. p. 17. Comp. I. 1. p. 106.

1. *A. ovata* L. K. syn. Rchb. icon. t. 114. *A. geniculata* Roth. *Phleum Aegilops* Scopol. Trockene Gebirgsstellen, Abhänge, Weinberge, Wege, Aecker, im südl. Geb., Südtirol, Krain, Littoral, Istrien bei Triest, Fiume, Dalmatien, Lombardei, Venedig, Piemont, Genua u. 5. ☉

2. *A. neglecta* Requien. Bertol. Fl. ital. Maly enum. pl. austr. p. 2. *A. ovata* Pollini. Saatacker in d. Lombardei bei Verona u. Mantua. 5—6. ☉

3. *A. triaristata* Willd. K. syn. Rchb. icon. t. 114. *A. ovata* Roth. Steinige Abhänge, Wege, am südl. Littoral, Istrien, Venedig, Ligurien. 5—6. ☉

4. *A. triuncialis* L. K. syn. Rchb. icon. t. 114. *A. triaristata* Requien. *A. echinata* Presl. *A. elongata* Koeler. Wege, cultivirte Orte, am südl. Littoral, Istrien, Triest, Fiume u. Inseln, Dalmatien, Croatien, Lombardei, Venedig, Ligurien. 5—6. ☉

5. *A. biuncialis* Visian. Fl. Dalm. t. 1. Maly enum. pl. anstr. p. 2. In Dalmatien. 5—6. ☉

6. *A. caudata* L. Rchb. icon. p. 23. *A. cylindrica* Host. Rchb. icon. t. 114. Hügel, Wege, Weinberge, im südl. Geb., Ungarn, Dalmatien, Croatien, Piemont um Aost. 5—6. ☉

892. *Lepturus* Rob. Brow. *Fadenschwanz*. K. syn. 958. Rchb. exc. p. 15. Comp. I. 1. p. 107.

1. *L. incurvatus* Trinius. K. syn. Rchb. icon. t. 108. *Rottboellia incurvata* L. fil. *Aegilops* — Lin. *Ophiurus incurvatus* Beauv. *Agrostis* — ta Scopol. Sandige Orte an d. Küsten d. Nordsee, Seeland u. bei Katwyck in d. Niederlanden, am südl. Littoral, Istrien, Triest u. auf d. Inseln Beglia, Osero, Loffino, Ungarn, Lombardei, Venedig, Piemont, Genua, Nizza. 5—6. ☉

2. *L. filiformis* Trin. K. syn. Rchb. icon. t. 108.

Ophiurus — R. et Schult. *Rottboellia* — Roth. *Rottb. erecta* Savi. *Rottb. incurvata* Nolte. Sandige Küste d. Nord- u. Ostsee, Belgien, Holland; Lübeck bei Travemünde, Oldenburg bei Varel, Holstein, Schleswig Insel Amrum u., am südl. Littoral, Istrien bei Monfalcone, Venedig. 5—6. ☉

3. *L. cylindricus* Trin. K. syn. *Ophiurus subulatus* Link. *Rchb. exc. et icon. t. 109.* *Rottboellia cylindrica* Willd. *Rottb. subulata* Savi. *Monerma* — R. et Schult. Beauv. Sandige Orte, Salinen, am südl. Littoral, Istrien, salzhaltige Wiesen an d. Salzwerken bei Triest, Gause, Dalmatien. 5—6. ☉

4. *L. pannonicus* Kunth enum. *Poliurus* — Trin. *Rchb. exc. et icon. t. 109.* *Rottboellia biflora* Roth. *Rottb. pannonica* Host. Feuchte, salzhaltige Orte im südl. Geb., Ungarn an d. Theiß, Dalmatien an d. Trau. 5—6. ☉

893. *Psilurus* Trinius. Borstenschwanz. K. syn. 959. *Rchb. exc. p. 15.* *Comp. I. 1. p. 107.*

1. *P. nardoides* Trin. K. syn. *Rchb. icon. t. 107.* *Nardus aristata* Lin. *Rottboellia monandra* Cavanil. *Monerma* — Beauv. *Asprella nardiformis* Host. Trockene Hügel, Oliven- u. Weingärten, am südl. Littoral, Istrien, Triest, Fiume, Pola, Veglia, Dalmatien Cattaro, Lombardei, Venedig u. 5—6. ☉

XIV. Gruppe. Nardoideen Koch. K. *Taschb. p. 597.*

894. *Nardus* L. Borstengras. K. syn. 959. *Rchb. exc. p. 54.* *Comp. I. 1. p. 106.*

1. *N. stricta* L. K. syn. *Rchb. icon. t. 170.* Moorboden, besonders sandigen, moorige Triften, bch. d. g. Geb. bis in d. Alpen. 5—6. 4

Z u f ä h e.

Zu den Malvaceen nach Abutilon Dill. einzuschalten :

133 b. *Gossypium* Bauh. (XVI. 6.) Baumwolle.
Rchb. exc. p. 774.

G. herbaceum L. Rchb. exc. et icon. Aus d. Orient,
angebaut in d. Lombardei bei Verona u. 7—8. ☉

Nach den Hypericineen DC. einzuschalten;

Neunzehnte Ordnung b.

Aurantiaceen.

DC. Correa Annal. du Mus. VI. Bartling. Ord. plant.
p. 392. Hesperideae Rchb. exc. p. 840.

136 b. *Citrus* L. (XVIII. 1.) Orangenbaum. Rchb.
exc. p. 841.

1. *C. medica* Risso. Rchb. exc. Aus Asien u. wie
die folgenden Arten im südlichsten Geb. cultivirt, Südtirol,
Littoral, Dalmatien, Lombardei, Piemont u. 5—10. ‡

2. *C. Limetta* Risso. Rchb. exc. ‡

3. *C. Limonium* Risso. Rchb. exc. *C. media* Hayne. ‡

4. *C. vulgaris* Risso. Rchb. exc. Var. *myrrtilifolia*
Bot. Reg. *C. Bigaradia* Duham. *C. sinensis* Pers. ‡

5. *C. aurantium* Risso. Rchb. exc. Südtirol u. ‡

Zu den Solaneen Juss. vor *Hyosciamus* einzuschalten:

566 b. *Ramondia* Richard. (V. 1.) *Ramondie*.

Rchb. exc. p. 388. Comp. I. 1. p. 354.

R. myconi Rchb. exc. *R. pyrenaica* Rich. Comp.
Verbascum Myconi L. Willd. Schattige Orte d. Alpen im
südlichsten Geb., Piemont über Pralles. 6—7. 24

Register der Genera

nach ihren laufenden Zahlen.

Die Ordnungen und übrigen Gattungen sind nach der Seitenzahl bezeichnet.

	Seite		Seite
A.		Actaea L. 19.	
Abama DC. v. Narthecium	690	Adenarium Rafin. v. Hallianthus	114
Abies LK. v. Pinus	622	Adenocarpus DC. v. Cytisus.	
Absinthium Dod. v. Artemisia	332	Adenophora Fischer	496
Abutilon Tournef. 133.		Adenolinum Rehb. v. Linum	129
Acanthaceen		Adenostyles Cassini	371.
Juss. LXXXVIII.	501	Adonis L. 5.	
Acanthus L. 593.		Adoxa L. 349.	
Acarna Willd. 438.		Adyseton Scopol. v. Alysum	63
Acerineen		Aegilops L. 891.	
DC. XX.	138	Aegopodium L. 283.	
Acer L. 137.		Aesculus L. 138.	
Aceras R. Brow. 752.		Aetheorrhiza Cassini v. Crepis	405
Achariterium v. Filago 329		Aethionema R. Brow. 75.	
Achillea L. 409.		Aethusa L. 291.	
Achnodon Link v. Phleum 740		Agathophyton Moq. Tand. v. Blitum	571
Achnodonton Beauv. v. Phleum	740	Agave L. 772.	
Achyranthes Forsk. v. Eurotia	572	Agraphis Link. v. Endymion	688
Achyrophorus Scopol. v. Hypochaeris	396	Agraulos Beauv. v. Agrostis	746
Acinos Moench. v. Calamintha	522	Agrimonia L. 211.	
Aconitum L. 18.		Agropyrum Beauv. 886.	
Acorus L. 742.		Agrostemma L. 105.	

	Seite		Seite
<u>Agrostis</u> L. 848.		<u>Amonia</u> Nestl. v. Are-	
<u>Aira</u> L. 865.		monia	212
<u>Airochloa</u> Link. v. Koe-		<u>Ampelideen</u>	
leria	756	Humb. XXII.	139
<u>Ajuga</u> L. 630.		<u>Ampelodesmos</u> Link. 860.	
<u>Albucea</u> Rchb. v. Orni-		<u>Ampelopsis</u> Mich. 139.	
thogalum.	677	<u>Amygdaleen</u>	
<u>Alcanna</u> Tausch. v. <u>An-</u>		Juss. XXXIV.	197
chusa	463	<u>Amphoricarpos</u> Visian.	
<u>Alchemilla</u> L. 214.		450.	
<u>Aldrovanda</u> Monti 93.		<u>Amygdalus</u> L. 199.	
<u>Alectorolophus</u> Hall v.		<u>Anacamptis</u> Richard. 744.	
<u>Rhinanthus</u>	508	<u>Anacyclus</u> L. 412.	
<u>Alismaceen</u>		<u>Anagallis</u> L. 639.	
Juss. CXVIII.	626	<u>Anagaloides</u> Krock. v.	
<u>Alisma</u> L. 725.		Lindernia	497
<u>Allium</u> L. 797.		<u>Anagyris</u> L. 157.	
<u>Alnus</u> L. 712.		<u>Anarrhinum</u> Desf. 577.	
<u>Alopecurus</u> L. 836.		<u>Anastatica</u> L. v. Eucli-	
<u>Alsineen</u> DC. XIV.	110	dium	77
<u>Alsinanthe</u> Rchb. v. Al-		<u>Anchusa</u> L. 547.	
sine	114	<u>Andrachne</u> L. 689.	
<u>Alsine</u> Wahlenb. 114.		<u>Andromeda</u> L. 502.	
<u>Alsinella</u> Moench. v.		<u>Andropogon</u> L. 825.	
<u>Moenchia</u>	122	<u>Androsace</u> L. 641.	
<u>Althaea</u> L. 129.		<u>Androsaeum</u> Allioni 135.	
<u>Alyssum</u> L. 56.		<u>Andryala</u> L. 487 et v.	
<u>Amaranthaceen</u>		<u>Hieracium</u>	418
Juss. XCVI.	563	<u>Anemagrostis</u> Trinius v.	
<u>Amaranthus</u> L. 657.		<u>Apera</u>	747
<u>Amaryllideen</u>		<u>Anemone</u> L. 4.	
R. Brow. CXXVIII. 664		<u>Anethum</u> L. 317.	
<u>Amaryllis</u> L. v. <u>Stern-</u>		<u>Angelica</u> L. 308.	
<u>bergia</u>	664	<u>Anisum</u> Gaertn. v. Pim-	
<u>Ambrina</u> Spach. v. Che-		pinella	260
<u>nopodium</u>	559	<u>Antennaria</u> Bl. et Fgh.	
<u>Ambrosiaceen</u>		v. <u>Gnaphalium</u>	331
Link. LXV.	421	<u>Anthemis</u> L. 410.	
<u>Ambrosia</u> L. 489.		<u>Anthericum</u> L. 792.	
<u>Ammania</u> L. 236.		<u>Anthoxanthum</u> L. 834.	
<u>Amelauchier</u> Moench. v.		<u>Anthriscus</u> Hoffm. 330.	
<u>Aronia</u>	221	<u>Anthyllis</u> L. 165.	
<u>Ammi</u> L. 282.		<u>Antirrhineen</u>	
<u>Ammophila</u> Lk. Host. 852.		Juss. LXXXIV.	484

Register.		795
	Seite	Seite
Antirrhinum <u>L. 575.</u>		Arnoseris Gaertn. <u>454.</u>
<u>Apargia</u> Willd. v. Leon- todon	<u>388</u>	Aroideen <u>Juss. CXXIV.. . 639</u>
<u>Apera</u> Adans. 849.		Aronia Person. <u>222.</u>
<u>Aphanes</u> <u>L. v. Alche-</u> <u>milla</u>	<u>217</u>	Aronicum Necker. <u>418.</u>
<u>Aphyllanthes</u> <u>L. 809.</u>		Arrhenatherum Beauv. 868.
<u>Apium</u> <u>L. 275.</u>		Artemisia <u>L. 402.</u>
Apocyneen R. Brow. <u>LXXVII. . 446</u>		Arthrocnemum Maq. Tand. v. Salicornia . <u>566</u>
Apocynum <u>L. 524.</u>		Arthrobium DC. <u>185.</u>
Aposeris Necker <u>453.</u>		Arum <u>L. 739.</u>
Aquifoliaceen DC. <u>LXXIII. . . . 442</u>		Arundo <u>L. 859.</u>
Aquilegia <u>L. 16.</u>		Asarum <u>L. 686.</u>
Arabis <u>L. 38.</u>		Asclepiadeen R. Br. <u>LXXVI. . . 445</u>
Araliaceen <u>Juss. LVII. 291</u>		<u>Asclepias</u> <u>L. 523.</u>
Arbutus <u>L. 500.</u>		<u>Asparagineen</u> <u>Juss. CXXVIII. . . 667</u>
Archangelica Hoffm. <u>309.</u>		Asparagus <u>L. 777.</u>
Arctium Willd. v. Lappa <u>371</u>		Asperugo <u>L. 540.</u>
Arctium Lamk <u>435.</u>		Asperula <u>L. 356.</u>
Arctostaphylos Adans <u>501.</u>		Asphodeline Rchb. <u>792.</u>
Arcenthobium M. v. B. v. Viscum	<u>292</u>	Asphodelus <u>L. 790.</u>
Aremonia Necker <u>212.</u>		Asprella Host. v. Psi- lurus <u>790</u>
Arenaria <u>L. 117.</u>		Aster <u>L. 377.</u>
<u>Aretia</u> Willd. Gaud. <u>642.</u>		Asteriscus Tournef. <u>390.</u>
Aretia Lamk. v. Andro- sace	<u>546</u>	Asterocephalus Spr. Rchb. v. Scabiosa <u>312</u>
Aria Host. v. Sorbus.		Asterolinum Lk. v. Ly- simachia <u>545</u>
Arisarum Tournef. v. Arum	<u>639</u>	Astragalus <u>L. 181.</u>
Aristolochia <u>L. 686.</u>		Astrantia <u>L. 272.</u>
<u>Aristolochieen</u> <u>Juss. CV. 587</u>		<u>Astrocarpus</u> Necker. <u>92.</u>
Armeria Willd. <u>652.</u>		<u>Athamanta</u> Koch. <u>298.</u>
Armoracia Fl. Wett. v. Nasturtium.	<u>38</u>	Atractylis Gaertn. v. Kentrophyllum . . . <u>376</u>
Arnica <u>L. 419.</u>		Atragene <u>L. 2.</u>
Arnopogon Willd. v. Urospermum	<u>391</u>	Atriplex <u>L. 672.</u>
		Atropa <u>L. 564.</u>
		Avena <u>L. 869.</u>
		Axyris <u>L. v. Eurotia . 572</u>
		Azalea <u>L. 507.</u>

	Seite	Seite
B.		
Baldringera Fl. Wett.		Bonarota Scopol. v. Pae-
v. Phalaris	738	derota 496
Ballota <u>L. 622.</u>		Bonjeania Rchb. <u>171.</u>
Balsamineen		Bootia Neck. v. Sapo-
<u>A. Richard. XXIV. . 144</u>		naria 101
Balsamita Desf. <u>404.</u>		Borkhausia Host. v. Cre-
Banffya Host. Rchb. v.		pis et Willemetia . 403
<u>Gypsophila 94</u>		Borago <u>L. 546.</u>
Barbarea R. Brow. <u>36.</u>		Boragineen
Barkhausia Moench. v.		Desv. <u>LXXXI. . . 459</u>
Crepis 403		Brachylobus Allion. v.
Bartsia <u>L. 590.</u>		Nasturtium 38
Beckmannia Host. 842.		Brachypodium Beauv. 882.
Bellevalia Lapeyr. <u>801.</u>		Brassica <u>L. 49.</u>
Bellidiastrum Cassini <u>379.</u>		Braya Sternb. et Hoppe
Bellis <u>L. 380.</u>		<u>46.</u>
Berberideen		Briza <u>L. 873.</u>
Vent. II. 30		Bromus <u>L. 883.</u>
Berberis <u>L. 22.</u>		Bruckenthalia Rchb. <u>505.</u>
Beringeria Necker. <u>623.</u>		Bryonia <u>L. 244.</u>
Berinia Brignol. v. Cre-		Buceras Allion. v. Tri-
pis 406		gonella 164
Berteroa DC. v. Far-		Buchingera F. W. Schultz
setia 63		<u>538.</u>
Berula Koch. <u>287.</u>		Buffonia <u>L. 107.</u>
Bessera Schult. v. Pul-		Buglossum Tsch. v. An-
monaria 469		<u>chusa 547</u>
Beta <u>L. 667.</u>		Bulbocodium <u>L. 805.</u>
Betonica <u>L. 619.</u>		Bulliarda DC. <u>258.</u>
Betula <u>L. 711.</u>		Bunias <u>L. 82.</u>
Betulineen		Bunium Koch. <u>285.</u>
Richard. CXII. . . 616		Bupthalmum <u>L. 389.</u>
Biarum Rchb. <u>740.</u>		Bupleurum <u>L. 289.</u>
Biasoletia Koch. <u>333.</u>		Burgsdorffia Moench. v.
Bidens <u>L. 396.</u>		Sideritis 532
Bifora Hoffm. <u>343.</u>		Butomeen
Bignoniaceen		Richard. CXVIII. . 627
R. Br. <u>LXXXV . . 503</u>		Butomus <u>L. 727.</u>
Biscutella <u>L. 71.</u>		Buxus <u>L. 688.</u>
Blitum <u>L. 666.</u>		
Blysmus Panzer v. Scir-		C.
<u>pus 710</u>		
		Cacalia L. v. Adenosty-
		les 315

	Seite		Seite
Cachrys Spr. v. Crith-		Cardaria Desv. v. Le-	
mum	271	pidium	74
Cacteen DC. LIII. .	243	Carduncellus Allion. 443.	
Cactus L. v. Opuntia .	243	Carduus L. 432.	
Caesalpineen		Carex L. 822.	
R. Br. XXXIII. . .	197	Carlina L. 436.	
Cajanus Sturm. v. Cy-		Carpesium L. 398.	
tisus	156	Carpinus L. 707.	
Cakile Tournef. 83.		Carum L. 284.	
Calamagrostis Roth. 851.		Caryolopha DC. v. An-	
Calamintha Moench. 606.		chusa	463
Calendula L. 424.		Caryophyllata Tournef.	
Calla L. 741.		v. Geum.	201
Calepine Desveaux 81.		Cassandra Don. v. An-	
Calianthemum Rchb. v.		dromeda	437
Ranunculus	14	Castanea L. 704.	
Callitriche L. 232.		Catabrosa Beauv. v.	
Callitrichineen		Glyceria	771
Link. XLII.	228	Catananche L. 457.	
Calluna Salisbur. 503.		Catapodium Link. v.	
Calotheca Lejeune Spr.		Poa	766
v. Bromus et Dactylis	780	Caucalis Hoffm. 326.	
Caltha L. 9.		Cathartolinum Rchb. v.	
Calycotome Lk. v. Cy-		Linum	127
tisus	156	Caulinia Willd. v. Najas	635
Calystegia Nees. v. Con-		Celastrineen	
volvulus	457	R. Brow. XXIX. . .	147
Camelina Crantz. 66.		Celsia L. 571.	
Campanula L. 494.		Celtis L. 700.	
Campanulaceen		Cenchrus L. v. Tragus	
Juss. LXVII. . . .	423	et Echinaria . 735—754	
Camphorosma L. 668.		Centaurea L. 447.	
Cannabis L. 696.		Centhranthus DC. 362.	
Capparis L. 87.		Centunculus L. 640.	
Capparideen		Cephalanthera Rich. 757.	
Juss. VII.	80	Cephalaria Schrader 365.	
Capraria L. v. Linder-		Cerastium L. 122.	
nia	497	Cerasus Tournef. v.	
Caprifoliaceen		Prunus	198
Juss. LX.	293	Ceratocephalus Moench. 7.	
Capsella Medicus 74.		Ceratonia L. 197.	
Capsicum L. 563.		Ceratophylleen	
Cardamine L. 39.		Gray. XLIII. . . .	229

	Seite		Seite
Ceratophyllum L. 233.		Chrysocoma L. v. Li-	
Ceratospermum Pers. v.		nosyris	318
Eurotia	572	Chrysosplenium L. 268	
Cercis L. 198.		Chrysurus Beauv. v.	
Cerinthe L. 552.		Lamarkia	757
Cervaria Rivin. v. Peu-		Cicendia Adans. 533.	
cedanum	276	Cicer L. 190.	
Chaerophyllum L. 332.		Cicerbita Wallr. v. Lac-	
Chaetospora R. Br. v.		tuca et Mulgedium .	401
Schoenus	703	Cichorium L. 456.	
Chaiturus Host. 625.		Cicuta L. 274.	
Chamaeledon Lk. v. Azalea	439	Cimicifuga L. 20.	
Chamaelinum Host. v.		Cineraria L. 420.	
Neslia et Nasturtium	38	Circaea L. 228.	
Chamaemelum All. v.		Cirsellium Gaertn. v.	
Anthemis	341	Acarna.	373
Chamaenerion Scopoli		Cirsium Tournef. 426.	
v. Epilobium	224	Cistus L. 88.	
Chamaeorchis Richard.		Cistineen Dunal. VIII.	81
751.		Citrus L. in appendix .	791
Chamaeplium Wallroth		Cladium P. Brow. 814.	
v. Sisymbrium	50	Clematis L. 1.	
Chamaepeuce DC. v.		Clinopodium L. 607.	
Cirsium	359	Clypeola L. 60.	
Chamaerepes Spreng. v.		Cnicus L. 445.	
Chamaeorchis	650	Cnidium Cusson. 296.	
Chamaerops L. 720.		Cochlearia L. 64.	
Chamagrostis Barkh. 840.		Codonoprassum Rchb.	
Cheiranthus L. DC. 34.		v. Allium	686
Chelidonium L. 29.		Coeloglossum Hartmann.	
Chenopodeen		747.	
Vent. XCVIII. . . .	564	Colchicaceen	
Chenopodium L. 665.		DC. CXXXI. . . .	691
Cherleria L. 115.		Colchicum L. 806.	
Chilochloa Beauv. v.		Coleanthus Seidel. 846.	
Phleum	741	Coleostephus Cassini v.	
Chimophila Pursh. v.		Chrysanthemum . . .	346
Pyrola	441	Colobachne Beauv. 838	
Chironia Willd. v. Ery-		Colpodium Trin. v.	
thraea	456	Glyceria	770
Chlora L. 529.		Colutea L. 178.	
Chondrilla L. 475.		Comaropsis DC. v. Wald-	
Chrysanthemum L. 414.		steinia	202

Register.		799
	Seite	Seite
Comarum L. 208.		Crassulaceen
Compositeen		DC. LII. 237
Adans LXIV. . . . 315		Crataegus L. 217.
Condyllocarpus Hoffm.		Crepis L. 485.
v. Tordylium . . . 280		Critamus Besser. v. Fal-
Coniferen		caria 257
Juss. CXIV. . . . 618		Crithmum L. 303.
Conioselinum Fischer. 304		Crocus L. 767.
Conium L. 338.		Crassopetalum Roth. v.
Conringia Andrz. v. Ery-		Gentiana 454
simum et Sisymbrium 50		Croton L. v. Crozophora 598
Convallaria L. 780.		Crozophora Necker 693.
Convolvulaceen		Crucianella L. 357.
Juss. LXXX. . . . 457		Cruciferen Juss. VI. 36
Convolvulus L. 536.		Crupina Pers. 448.
Conyza L. 384 et v.		Crypsis Aiton. 839.
Inula 326		Cucubalus L. 102.
Corallorrhiza Haller. 763.		Cucumis L. 243.
Correopsis L. v. Bidens 328		Cucurbita L. 242.
Coriandrum L. 344.		Cucurbitaceen
Coriaria L. 149.		Juss. XLVIII. . . . 232
Coriariaceen		Cupressus L. 717.
DC. XXVIII. . . . 147		Cupuliferen
Coris L. 650.		Richard. CX. . . . 602
Corispermum L. 662.		Cuscuta L. 537.
Corneen DC. LVIII. . 292		Cuviera Koel. v. Ely-
Cornellia Host. v. Am-		mus 786
mania 230		Cyclamen L. 647.
Cornus L. 346.		Cydonia Tournef. 220.
Coronilla L. 183.		Cymbidium Sw. v. Cor-
Coronopus Moench. v.		rallorrhiza 656
Senebiera 76		Cynanchum R. Br. 521
Corrigiola L. 250.		Cynara L. 428.
Cortusa L. 645.		Cynodon Richard. 841.
Corydalis DC. 31.		Cynoglossum L. 543.
Corylus L. 706.		Cynosurus L. 880.
Corynephorus Beauv. 866.		Cyperaceen
Cotinus Scopoli v. Rhus		Juss. CXXXIII. . . 701
Cotoneaster Medic. 218.		Cyperus L. 812.
Cotula L. 405.		Cypripedium L. 766.
Cotyledon Huds. v. Um-		Cytineen
bilicus 243		A. Brogn. CIV. . . . 587
Crambe L. 85.		Cytinus L. 684.
Crassula L. 260.		Cytisus L. 162.

	Seite		Seite
Czakia Andr. v. Paradisia	675	Dipsacus L. 364	
D.		Distomaea Spenn. v. <u>Listera</u>	654
Dactylis L. 879.		Donax Beauv. v. Festuca et Arundo	778
Dactylon Villars v. Cynodon et Panicum 743, 735		Dondia Spr. v. Hacquetia	253
Danaea Allion. v. Phytospermum	290	Doronicum L. 417	
Danthonia DC. 870.		Dorycnium Tournef. 170	
Daphne L. 678.		Draba L. 63	
Datura L. 568.		Dracocephalum L. 613	
Daucus L. 325.		Drepania Desf. v. Tolpis 387	
Delphinium L. 17.		Drepanophyllum Hoffm. v. Falcaria	257
Dentaria L. 41.		Drosera L. 94.	
Deschampsia Beauv. v. Aira	754	Droseraceen DC. XI.	91
Deyeuxia Kunth. v. Calamagrostis	749	Dryas L. 203.	
Dianthus L. 100.		Drypis L. 106.	
Dibothrospermum Knof. v. Tripleurospermum . 346		E.	
Dichodon Richb. v. Stellaria	120	Ebenaceen Vent. LXXII.	442
Dichostyles Beauv. v. Scirpus	710	Ecballion Richard. 245.	
Dictamnus L. 148.		Echinaria Desfont. 861.	
Digitalis L. 574.		Echinochloa Beauv. 830.	
Digitaria Koel. v. Panicum et Cynodon 735, 743		Echinophora L. 336.	
Dioscoreen R. Br. CXXIX.	670	Echinops L. 425.	
Diospyros L. 512.		Echinopsilon Moquin. Tandon. v. Kochia . 568	
Diotis Desf. v. Otanthus	337	Echinospermum Swartz. 541.	
Diotis Willd. v. Eurotia 572		Echium L. 553.	
Diplachne Lk. v. Molinia	771	Edrajanthus DC. 495.	
Diplopappus Bl. et Fgh. v. Stenactis	321	Ehrharta Wigg. v. Leersia	744
Diploxaxis DC. 53		Elaeagneen R. Brow. CIII.	586
Dipsaceen DC. LXIII.	309	Elaeagnus L. 682.	
		Elatine L. 123.	
		Elatineen Cambess. XV.	126
		Eleocharis R. Brow. v. Scirpus	706

- Eleogenus Nees. v. Scirpus 707
 Eleogiton Lk. v. Scirpus 706
 Elodea Michx. v. Udora 626
 Elodes Spach. v. Hypericum 137
 Elsholzia Willd. 596.
 Elymus L. 888.
 Elyna Schrader 820.
 Empetreen
 Nuttall. CVI. 588
 Empetrum L. 687.
 Endoptera DC. v. Gaytonia 403
 Enodium Lk. Gaud. v. Molinia 771
 Endymion DuMort. 799.
 Ephedra L. 714.
 Ephemerum Rchb. v. Lysimachia 544
 Epilobium L. 225.
 Epimedium L. 23.
 Epipactis Richard. 758.
 Epipogium Gmel. 755.
 Eragrostis Beauv. 874.
 Eranthis Salisb. 11.
 Eremogyne Fenzl. v. Alsine 115
 Erianthus Richard. 824.
 Erica L. 504.
 Ericineen
 Desveaux. LXIX. 435
 Erigeron L. 382.
 Erinus L. 578.
 Eriophorum L. 819.
 Eritrichium Schrad. 558.
 Ernodea Smith. v. Putoria 296
 Erodium L'Herit. 142.
 Erophila DC. v. Draba 68
 Eruca DC. 54.
 Erucago Hornem. v. Bunias 78
 Erucastrum Schimp. et Spen. 50.
 Ervum L. 192.
 Eryngium L. 273.
 Erysimum L. 47.
 Erythraea Richard. 534.
 Erythronium L. 789.
 Esmarchia Rchb. v. Cerastium 124
 Euclidium R. Brow. 77.
 Eupatorium L. 370.
 Euphorbia L. 690.
 Euphorbiaceen
 Juss. CVII. 589
 Euphrasia L. 592.
 Eurotia Adans 670.
 Evax Gaertn. 387.
 Evonymus L. 151.
 Exacum Willd. v. Cicendia 455
 F.
 Facchinia Rchb. 113.
 Fagus L. 703.
 Falcaria Host. 280.
 Farsetia R. Brow. Turra 58.
 Fedia Gaertn. v. Valerianella 307
 Ferula L. 311.
 Ferulago Koch. 310.
 Festuca L. 881.
 Ficaria Dill. v. Ranunculus 16
 Ficus L. 698.
 Filago L. 399.
 Fimbristylis Vahl. 818.
 Foeniculum Hoffm. 292.
 Fosselinum All. v. Cypripella 64
 Fragaria L. 207.
 Frangula Dod. v. Rhamnus 150
 Fraxinus L. 519.
 Freyera Rchb. v. Bissolettia 288

	Seite		Seite
Fritillaria L. 786.		Gorinkia Presl. v. Ery-	
Fumaria L. 32.		simum	55
Fumariaceen		Gossypium L. in addent.	791
DC. V.	34	Gramineen	
		Juss. CXXXIV. . . .	733
G.		Grammarthron. Cass. v.	
Gagea Salisb. 795.		Aronicum	348
Galactites Moench. 430.		Granateen	
Galanthus L. 776.		Don. XXXVIII. . . .	222
Galasia Cassini 470.		Gratiola L. 573.	
Galatella Cass. 378.		Gregoria Duby v. Aretia	548
Galega L. 176.		Grossularieen	
Galeobdolon Huds. 616.		DC. LIV.	224
Galeopsis L. 617.		Gymnadenia R. Brow.	
Galinsoga R. et Pav. 395.		745.	
Galium L. 359.		Gymnocline Cass. v.	
Gastridium Beauv. 853.		Chrysanthemum . . .	345
Gaytonia Cassini 484.		Gypsophila L. 97.	
Gaudinia Beauv. 884.			
Gaya Gaud. 302.		H.	
Genista L. 161.		Habenaria R. Br. v.	
Gentiana L. 532.		Gymnadenia et Coe-	
Gentianeen		loglossum	647
Juss. LXXXVIII . . .	447	Halageton Visian. v.	
Geracium Rchb. v. Hie-		Salsola.	565
racium et Crepis . . .	405	Hacquetia Necker. 271.	
Geraniaceen		Halianthus Fries. 112.	
DC. XXIII.	140	Halimocnemis C. A.	
Geranium L. 141.		Meyer v. Salsola . . .	565
Geropogon L. 466.		Halimus Wallr. 671.	
Geum L. 204.		Halorageen	
Gifola Cass. v. Filago .	329	R. Brow. XL.	227
Gladolus L. 769.		Haplophyllum A. Juss.	
Glaucium Tournef. 28.		v. Ruta.	146
Glaux L. 649.		Hebelia Gmel. v. To-	
Glechoma L. 612.		fieldia	692
Globularia L. 651.		Hedera L. 345.	
Globularieen		Hedypnois Tournef. 459.	
DC. XCIII.	555	Hedysarum L. 188.	
Glyceria R. Brow. 877.		Heleocharis R. Brow.	
Glycirrhiza L. 175.		816.	
Gnaphalium L. 400.		Heleochoa Host. v.	
Goodyera R. Brow. 761.		Crypsis	742

Register.		803
	Seite	Seite
Heleogiton Rchb. v.		Hladnikia Rchb. v. Fal-
Scirpus	707	caria 257
Helianthemum Tournef. 89.		Holcus L. 867.
Helianthus L. 397 .		Holoschoenus Rchb. v.
Helichrysum Gaertn. 401 .		Scirpus. 707
Heliotropium L. 539 .		Holosteum L. 118 .
Helleborine Pers. v. Se-		Homalocenchrus Pollich.
rapias	652	v. Leersia 744
Helleborus L. 12 .		Homogyne Cassini 372 .
Helminthia Juss. 464 .		Honkenya Ehrh. v. Ha-
Helonias Willd. v. To-		lianthus 114
fieldia	692	Hoppea Rchb. v. Ligu-
Helosciadium Koch. 278 .		laria 351
Hemerocallis L. 798 .		Hordeum L. 889.
Hepatica DC. v. Ane-		Horminum L. 609 .
mone	7	Hottonia L. 644 .
Heracleum L. 319 .		Hugueninia Rchb. 45 .
Herbichia Zaw. v. Se-		Humulus L. 697 .
necio	352	Hutchinsia R. Brow. 73 .
Heriteria Schrank. v.		Hyacinthus L. 802 .
Tofieldia	692	Hydrocharideen
Herminium R. Brow. 753		DC. CXVI. 625
Herniaria L. 251 .		Hydrocharis L. 723 .
Hesiodia Moench. v. Si-		Hydrochloa Hartm. v.
deritis	532	Glyceria 770
Hesperis L. 42 .		Hydrocotyle L. 269 .
Heteropogon Pers. 826		Hymenocarpus Savi. v.
Hibiscus L. 132 .		Medicago 160
Hieracium L. 487 .		Hyoscyamus L. 567 .
Hierochloa Gmel. 833.		Hyoseris L. 458 .
Himantoglossum Spreng.		Hypocoum L. 30 .
746.		Hypericineen
Hiorthia Necker. 408 .		DC. XIX. 135
Hippion Schmidt. v.		Hypericum L. 136 .
Gentiana	453	Hypochaeris L. 471 .
Hippocastaneen		Hypopitys v. Monotropa 441
DC. XXI.	139	Hyssopus L. 610 .
Hippocrepis L. 186 .		
Hippophae L. 683 .		
Hippurideen		
Link . XLI	227	
Hippuris L. 231 .		
Hirschfeldia Moench. v.		
Erucastrum	58	

I J

Jasione L. 492 .	
Jasmineen	
R. Brow. LXXV.	445
Jasminum L. 520 .	

Seite	Seite
Laurus L. 679 .	Lineen DC. XVI . . . 127
Lavandula L. 595 .	Linnaea Gronov. 353 .
Lavatera L. 130 .	Linosyris DC. 376 .
Ledum L. 409 .	Linum L. 124 .
Leersia Soland. 845.	Liparis Richard. v. Stur-
Lemna L. 736 .	mia Rchb. 656
Lentibularieen'	Listera R. Brow. 759 .
Richard. XCI. . . . 541	Lithospermum L. 556 .
Leontice L. 24 .	Littorella L. 655 .
Leontodon L. 462 .	Lloydia Salisb. 788 .
Leontopodium Cass. v.	Lobelia L. 491 .
Gnaphalium 330	Lobeliaceen
Leonurus L. 624 .	Juss. LXVI 422
Lepidium L. 72 .	Lobularia Desv. 57 .
Lepigonum Wahlenb.	Loiseleuria Desv. v.
111 .	Azalea 439
Leptocarpacea DC. v.	Lolium L. 890 .
Sisymbrium 51	Lomatogonium Al.Braun.
Leptopyrum Rchb. 14 .	531 .
Lepturus L. 892 .	Lonicera L. 352 .
Leucojum L. 775 .	Loranthaceen
Leuzia DC. 441 .	DC. LIX. 292
Levisticum Koch. 305 .	Loranthus L. 348 .
Libanotis Crantz. 295 .	Loroglossum Richard. v.
Libertia Lejeun. v. Bro-	Aceras et Himantho-
mus 780	glossum 646
Ligularia Cassini. 422 .	Lotus L. 172 .
Ligusticum L. 299 .	Luciola Sm. v. Luzula 698
Ligustrum L. 517 .	Ludwigia Torr. v. Is-
Liliaceen	nardia 226
DC. CXXX. . . . 671	Lunaria L. 59 .
Lilium L. 787 .	Lupinus L. 163 .
Limnanthemum Gmel.	Luzula DC. 811 .
528 .	Lychnis L. 104 .
Limnitis Richard. v.	Lycium L. 559 .
Spartina 744	Lycopsis L. 548 .
Limnochloa Rchb. v.	Lycopus L. 599 .
Scirpus 708	Lycopersicum Tournef.
Limodorum Tournef.	561 .
Richard. 756 .	Lyonia Rchb. v. Andro-
Limosella L. 583 .	meda 486
Linaria Tournef. Desf.	Lysimachia L. 638 .
576 .	Lythraeaceen
Lindernia L. 582 .	Juss. XLIV 229

	Seite		Seite
Lythrum L. 234.		Mibora Beauv. v. Chamagrostis	743
M.		Michelaria DuMort. v. Bromus	780
Majanthemum Wigg. 781.		Micromeria Benth. 605.	
Majorana Moench. v. Origanum	519	Micropsis L. Benth. 386.	
Malabaila Tausch. 340.		Milium L. 854.	
Malachium Fries. 121.		Minuartia Rchb. v. Alsine	117
Malacochaete Nees. v. Scirpus	708	Moehringia L. 116.	
Malaxis Swartz. 765.		Moenchia Ehrh. 120.	
Malcolmia R. Brow. 43		Molinia Schrank. 878.	
Malope L. 126.		Molospermum Koch. 335.	
Malva L. 128.		Molucella L. v. Beringeria	534
Malvaceen		Momordica L. v. Ecballion.	233
R. Brow. XVII.	130	Monerma Beauv. v. Psilurus	790
Mandragora Tournef. 565.		Monesia Salisb. v. Pyrola	441
Margarita Gaud. v. Bellidiastrum	320	Monotropa L. 511.	
Mariscus Presl. v. Schoenus	703	Monotropeen Nutt. LXXI.	441
Marubium L. 621.		Montia L. 248.	
Maruta Cassini v. Anthemis	342	Moricandia DC. 51.	
Matricaria L. 413.		Morus L. 699.	
Matthiola R. Brow. 33.		Mulgedium Cassini 479.	
Mattia Schultes 544.		Muscari Tournef. 803.	
Medicago L. 166.		Myagrum L. 79.	
Medicusia Rchb. v. Picris 391		Mycelis Cassini v. Lactuca	400
Melampyrum L. 587.		Mygalurus Lk. v. Festuca	774
Melanosinapis Schimp. et Spenn. v. Brassica	57	Mylinum Gaud. v. Selinum	272
Melica L. 872.		Myosotis L. 557.	
Melilotus Tournef. 168.		Myosurus L. 6.	
Melissa L. 608.		Myrica L. 713.	
Melittis L. 614.		Myricaria Desv. 239.	
Mentha L. 597.		Myriceen Richard. CXIII.	618
Menyanthes L. 527.		Myriophyllum L. 230.	
Menziesia Smith. 506.		Myrrhis Scopoli 334.	
Mercurialis L. 691.		Myrtaceen Rob. Brow. XLVII.	
Mespilus L. 219.		Myrtus L. 241	232
Meum Tournef. 301.			

N.

Najadeen	
Link, CXXI.	635
Najas L.	733.
Narcissus L.	774.
Nardosmia Cassini	375.
Nardurus Bluff. v. Festuca	773
Nardus L.	894.
Narthecium Moehring.	804.
Nasturtium R. Brow.	35.
Naumburgia Moench. v. Lysimachia	544
Nauplius Cass. v. Asteriscus	324
Nemauchenes Cass.	483.
Neottia L.	760.
Neottidium v. Schlechtend. v. Neottia	655
Nepeta L.	611.
Nerium L.	525.
Neslia Desv.	80.
Neumayera Rchb. v. Alsine	115
Nicotiana L.	568.
Nigella L.	15.
Nigritella Richard.	749.
Noccaea Moench. v. Hutchinsia	75
Nonnea Medic.	549.
Nuphar Smith.	26.
Nymphaea L. Smith.	25.
Nymphaeaceen	
DC. III.	30

O.

Obione Moquin. Tand. v. Halimus	572
Ochrus Moench. v. Lathyrus	192

Ocymum L.	594.
Odontites Haller. Spr. v. Euphrasia	510
Oenanthe L.	290.
Oenothera L.	226.
Oglifa Cassini v. Filago	329
Olea L.	515.
Oleaceen	
Lindl. LXXIV.	443
Oligosporus Cass. v. Artemisia	335
Omalocline Cass. v. Crepis	408
Omalotheca Cass. v. Gnaphalium	330
Omphalodes Tournef.	545.
Onagrarien	
Juss. XXXIX.	223
Onobrychis Tournef.	189
Ononis L.	164.
Onopordon L.	433.
Onosma L.	551.
Ophiurus Beauv. v. Lep-turus	790
Ophrys L.	750.
Oplismenus Kunth. Beauv. v. Panicum	736
Opopanax Koch.	312.
Oporina Less. v. Leontodon	388
Opuntia Tournef.	264.
Orchideen	
Juss. CXXV.	640
Orchis L.	743.
Oreochloa Link. v. Seleria	755
Oreoselinum Tournef. v. Peucedanum	276
Origanum L.	602.
Orlaya Hoffm.	324.
Ormenis Cassini	411.
Ornithogalum L.	794.
Ornithopus L.	184.

- Ornus Dalech. v. Fraxi-
 nus 444
 Orobanche [L. 584.](#)
 Orobancheen
 Juss. [LXXXV.](#) . . . 498
 Orobus [L. 195.](#)
 Ortegia [L. 255.](#)
 Orthopogon R. Br. v.
 Panicum 736
 Orvala L. v. Lamium . 527
 Oryza [L. 844.](#)
 Ostericum Hoffm. 307.
 Ostrya Michel. 708.
 Osyris [L. 681.](#)
 Otanthus Link. 407.
 Oxalideen
 DC. XXV. 144
 Oxalis [L. 144.](#)
 Oxycoccus Tournef. v.
 Vaccinium 435
[Oxyria](#) Hill. 675.
 Oxytropis DC. 180.

 P.
 Pachypleurum Rchb. v.
 Gaya 271
 Paederota [L. 580.](#)
 Paeonia [L. 21.](#)
 Palimbia DC. v. Peuce-
 danum 275
 Paliurus Tournef. 153.
 Pallenis Cassini 391.
 Palmae [L. CXV.](#) . . . 624
 Pancratium [L. 773.](#)
 Panicum [L. 829.](#)
 Papaver [L. 27.](#)
 Papaveraceen
[DC. IV.](#) 31
 Papilionaceen
[Lin. XXXII.](#) 151
 Paradisia [Mazzugati. 793.](#)
 Parietaria [L. 695.](#)
 Paris [L. 779.](#)
 Parnassia [L. 95.](#)
 Paronychia Tournef. 253.
 Paronychieen
 A. St. Hill. [L.](#) . . . 234
 Paspalum DC. v. Pani-
 cum et Cynodon. 735, 743
 Passerina [L. 677.](#)
 Pastinaca [L. 318.](#)
 Pavonia Cavan. 130.
[Pedicularis L. 588.](#)
[Peganum L. 147.](#)
 Peltaria [L. 61.](#)
 Peltidium Zollikh. v.
 Willemetia 396
 Pennisetum R. Br. v.
 Setaria 737
 Peplis [L. 235.](#)
 Periploca [L. 523.](#)
 Periclymenum Mill. v.
[Lonicera](#) 294
 Peristylus Lindl. v. Coe-
 loglossum 647
 Persica Tournef. 200.
 Pervinca Scopol. v.
 Vinca 447
 Petasites Gaertn. 374.
 Petteria Rchb. v. Alsine 115
 Petrocallis R. Br. 62.
 Petroselinum Hoffm. 276.
 Peucedanum [L. 313.](#)
 Phaca [L. 179.](#)
 Phaecasium [Cass. v.](#)
[Crepis](#) 407
 Phagnalon [Cass. 385.](#)
 Phalacrodiscus Lessing.
 v. Chrysanthemum . 344
 Phalangium Lamk. v. An-
 thericum et Lloydia 673, 675
 Phalaris [L. 832.](#)
 Phaseolus [L. 196.](#)
 Phellandrium Tournef.
 v. Oenanthe 264
 Philadelphéen
 Don. XLVI. 232

Register.		809
Seite		Seite
Philadelphus L. 240.	Plumbagineen	
Phillyrea L. 516.	Juss. XCIV.	556
Phleboanthe Tausch. 631.	Plumbago L. 654.	
Phleum L. 837.	Pneumonanthe Schmidt.	
Phlomis L. 626.	v. Gentiana	450
Phoenix L. 719.	Poa L. 876.	
Phoenixopus Cass. v.	Pocockia Trautw. v. Me-	
Lactuca	dicago	160
Pholiurus Trinius v.	Podospermum DC. 469	
Lepturus	Polemoniaceen	
790	Lindl. LXXXIX.	456
Phragmites Trin. 858.	Polemonium L. 535.	
Physalis L. 562.	Pollichia Willd. v. Ga-	
Physocaulus Tausch. 331.	leobdolon	528
Physospermum Gussone	Pollinia Spreng. v. An-	
341.	dropogon	734
Phyteuma L. 493.	Polycarpon L. 254.	
Phytolacca L. 658.	Polycnemum L. 663.	
Phytolacceen	Polygala L. 96.	
R. Brow. XCVII.	Polygaleen	
564	Juss. XII.	92
Picea L. v. Pinus	Polygonatum Desf. v.	
623	Convallaria	669
Picnomon Cass. 427.	Polygoneen	
Picotia R. et Sch. v.	Juss. IC.	575
Omphalodes	Polygonum L. 676.	
462	Polypogon Desf. 847.	
Picridium Desf. 480.	Pomaceen	
Picris L. 463.	Lindl. XXXVII.	219
Pimpinella L. 286.	Populus L. 710.	
Pinardia Cassini 416.	Portulaca L. 247.	
Pinaster Clus. v. Pinus 623	Portulacaceen	
Pinguicula L. 635.	Juss. XLIX.	234
Pinus L. 718.	Posidonia Koenig. 735	
Piptatherum Beauv. 855.	Potameen	
Pistacia L. 155.	Juss. CXX.	629
Pisum L. 193.	Potamogeton L. 730.	
Plantagineen	Potentilla L. 209.	
Juss. XCV.	Prangos Lindley 337.	
558	Poterium L. 216.	
Plantago L. 656.	Prasium L. 629.	
Platanthera Richard. 748.	Prenanthes L. 476.	
Platyspermum Koch. v.	Primula L. 643.	
Orlaya		
283		
Pleurogyne Grieseb. v.		
Lomatogonium		
449		
Pleurospermum Hoffm.		
339.		

	Seite		Seite
Primulaceen		Ramondia Richard. in add.	792
Vent. XCII.	543	Ranunculaceen	
Prismatocarpus Herit.		Juss. I.	1
v. Specularia	434	Ranunculus L. 8.	
Prunella L. 628.		Raphanis Moench. v.	
Prunus L. 201.		Nasturtium	38
Psamma Beauv. v. Amophila	750	Raphanistrum Tournef.	
Psilathera Link. v. Sesleria	755	v. Raphanus	80
Psilurus Trinius 893.		Raphanus L. 86.	
Psoralea L. 174.		Rapistrum Boerh. 84.	
Ptarmica DC. v. Achillea	337	Ranunculus Scopol. v.	
Pterocephalus Vaill. DC. 367.		Phyteuma	292
Pteroneurum DC. 40.		Razoumovskia Hoffm.	
Pteroselinum Rechb. v. Peucedanum	275	v. Viscum	425
Pterotheca Cassini 482.		Reseda L. 91.	
Ptychosotis Koch. 279.		Resedaceen DC. X. 90	
Pulegium Miller 598.		Rhagadiolus Tournef. 455.	
Pulicaria Gaertn. 393.		Rhamneen	
Pulmonaria L. 554.		R. Brow. XXX. . . .	148
Pulsatilla Tournef. v. Anemone.	8	Rhamnus L. 154.	
Punica L. 224.		Rhaponticum Vaill. v.	
Putoria Pers. 354.		Serratula et Centaurea	374, 382
Pycneus Beauv. v. Cyperus	701	Rheum L. v. Oxyria .	579
Pyrethrum Willd. v. Chrysanthemum	344	Rhinanthaceen	
Pyrola L. 510.		DC. LXXXVII. . . .	504
Pyrolaceen		Rhinanthus L. 589.	
Lindl. LXX.	440	Rhizobotrya Tausch. v.	
Pyrus L. 221.		Cochlearia	69
Q.		Rhodiola L. 259.	
Quercus L. 705.		Rhododendron L. 508.	
R.		Rhodothamnus Rechb.	
Radiola Gmel. 125.		v. Rhododendron . .	439
		Rhus L. 156.	
		Rhynchospora Vahl. 815	
		Ribes L. 265.	
		Ricinus L. 693.	
		Ripidium Trin. v. Erianthus	733
		Robinia L. 177.	
		Rochelia Rechb. 542.	
		Rodschiedia Fl. Wett.	
		v. Capsella	75

- Romulea Sebast. v. Tri-
 chonema 659
 Roncela DuMort. Rchb.
 v. Campanula 428
 Roripa Tausch. Rchb.
 v. Nasturtium 38
 Rosa L. 213.
 Rosaceen
Juss. XXXV. 199
 Rosmarinus L. 600.
 Rothia Roth. v. An-
dryala 410
 Rottboellia Willd. v.
 Lepturus 790
 Rubia L. 358.
 Rubus L. 206.
 Rumex L. 674.
 Ruppia L. 731.
 Ruscus L. 783.
 Ruta L. 146.
 Rutaceen
Juss. XXVII. 145

 S.

 Sabulina Rchb. v. Alsine 114
 Saccharum L. v. Erian-
 thus 733
 Sagina L. 108.
 Sagittaria L. 726.
 Salicineen
 Richard. CXI. 605
 Salicornia L. 661.
 Salix L. 709.
 Salsola L. 660.
 Salvia L. 601.
 Salzwedelia Fl. Wett.
 v. Cytisus 156
 Sambucus L. 350.
 Samolus L. 648.
Sanguisorba L. 215.
Sanguisorbeen
 Lindl. XXXVI. . . . 217
 Sanicula L. 270.
 Santalaceen
 R. Brow. CII. . . . 584
 Santolina L. 406.
 Saponaria L. 101.
 Sarcothamnus Wimmer.
 160.
 Satureja L. 604.
 Satyrium L. v. Coelo-
 glossum, Nigritella,
 Herminium et Epipo-
 gium.
 Saussurea DC. 439.
 Saxifraga L. 266.
 Saxifrageen
 Vent. LV. 245
 Scabiosa L. 369.
 Scandix L. 329.
 Schedonorus R. et Schl.
 v. Festuca 778
 Schelhammeria Moench.
 v. Carex 715
 Scheuchzeria L. 728.
 Schmidtia Tratt. v. Co-
 leanthus 745
Schoberia C.A. Meyer 659.
 Schoenus L. 813.
 Schollera Roth. v. Vac-
 cinium 435
 Schultesia Roth. v. Wah-
 lenbergia 434
 Schweycherta Gmel. v.
 Limnanthemum . . . 448
 Sciaphila Wibel v. Ma-
 janthemum 669
 Scilla L. 796.
 Scirpidum Nees. v. Scir-
 pus 705
 Scirpus L. 817.
 Sclerantheen
 Link. LI. 237
 Scleranthus L. 256.
 Sclerochloa Beauv. Link.
 875.

	Seite		Seite
Sclerophyllum Gaud. v.		Sileneen DC. XIII.	94
Crepis	407	Siler Scopoli	321.
Scolochloa Lk. v. Festuca	778	Silybum Gaertn.	429.
Scolymus L.	451.	Sinapis L. Koch.	52.
Scopolina Schult.	566.	Sison L.	281.
Scorpiurus L.	182.	Sisymbrium L.	44.
Scorodonia Moench. v.		Sium L.	288.
Teucrium	539	Smegmatherium Rchb.	
Scorzonera L.	468.	v. Saponaria	101
Scrophularia L.	572.	Smilacina Desf. v. Ma-	
Scutellaria L.	627.	janthemum	669
Secale L.	887.	Smilax L.	722.
Securidaca Tournef. v.		Smyrnium L.	342.
Securigera	154	Solaneen	
Securigera DC.	187.	Juss. LXXXII.	472
Sedum L.	261.	Solanum L.	560.
Selinum L.	306.	Soldanella L.	646.
Sempervivum L.	262.	Solidago L.	383.
Senebiera Pers.	76.	Sommerauera Hoppe v.	
Senecillis Gaertn.	421.	Alsine	114
Senecio L.	423.	Sonchus L.	478.
Senkenbergia Fl. Wett.		Sorbus L.	223.
v. Lepidium	74	Sorghum Pers.	818.
Serapias L.	754.	Soyera Monnier	486.
Seriola L.	473.	Spalanzania Pollini v.	
Serpicula Rostk. Pursh.		Aremonia	212
v. Udora	620	Sparganium L.	738.
Serratula L.	440.	Spartionthus Link. v.	
Sesamum L.	586.	Spartium	151
Seseli L.	294.	Spartina Schreb.	843.
Sesleria L. Arduino	862.	Spartium L.	159.
Setaria Beauv.	831.	Specularia Heister.	497
Sherardia L.	355.	Spergella Rchb.	109.
Sibbaldia L.	210.	Spergula L.	110.
Sicyos L.	246.	Spergularia Pers. v.	
Sida L. v. Abutilon .	134	Lepigonum	113
Sideritis L.	620.	Sphenopus Trin. v. Scle-	
Siebera Hoppe v. Al-		rochloa	766
sine	114	Spinacia L.	669.
Sieglingia Bernh. v.		Spiranthes Richard.	762
Triodia	763	Spirodela v. Schltd. v.	
Sieversia Willd. v. Geum	202	Lemna	637
Silaus Besser.	300.	Sporobolus R. Brow. v.	
Silene L.	103.	Agrostis	746

Squamaria Scopol. v. 503
Lathraea 503
Stachys L. 618.
Staehelina L. 437.
Staphylea L. 150.
Statice L. 653.
Steenhammera Rchb. 555.
Stellaria L. 119.
Stellateen L. LXI. 295
Stellera L. v. Passerina 582
Stenactis Cassini 381.
Sternbergia W. et Kit. 771.
Stipa L. 856.
Stipularia Haw. v. Le-
pigonum 113
Stratiotes L. 722.
Streblidia L. v. Schoe-
nus 703
Streptopus Michx. 778
Sturmia Rchb. 764.
Sturmia Hoppe v. Cha-
magrostis 743
Styrax L. 513.
Suaeda Rchb. v. Kochia
et Schoberia 565, 568
Subularia L. 67.
Succisa M. et K. 368.
Suffrenia Bellar. 237.
Swertia L. 530.
Symphytum L. 550.
Syntherisma Schrad. v.
Panicum 736
Syrenia Andr. 48.
Syringa L. 518.

T

Tamariscineen
Desv. XLV. 231
Tamariscus All. v. Ta-
marix 231

Tamarix L. 238.
Tamus L. 784.
Tanacetum L. 403.
Taraxacum Juss. 474.
Taxus L. 715.
Teesdalia R. Br. 69.
Telekia Baumgarten. 388.
Telephium L. 249.
Telmatophace v. Schltd.
v. Lemna 637
Terebinthaceen
DC. XXXI. 150
Tetragonolobus Scopol.
173.
Teucrium L. 632.
Thalictrum L. 3.
Thapsia L. 223.
Theligonum L. 673.
Thesium L. 680.
Thlapsi L. 68.
Thrinicia Roth. 461.
Thymelaea Scopol. v.
Daphne 582
Thymeleen
Juss. C. 581
Thymus L. 603.
Thysselinum Hoffm. 315.
Tilia L. 134.
Tiliaceen
Juss. XVIII. 135
Tillaea L. 257.
Tithymalus Scopol. v.
Euphorbia 590
Tofieldia Huds. 808.
Tolpis Gaertn. 460.
Tommasinia Bertol. 314.
Tordylium L. 320.
Torilis Adans. Spr. 328.
Tormentilla L. v. Po-
tentilla 209
Tozzia L. 586 b.
Trachynia Lk. v. Bra-
chypodium 779

Tragium Lk. v. Pimpinella	260	Ulmus L. 701.	
Tragopogon L. 467.		Umbelliferen	
Tragus Desf. Haller. 828.		Juss. LVI.	253
Trapa L. 229.		Umbilicus DC. 263.	
Tribulus L. 145.		Uncinia Pers. v. Carex	715
Trichera Schrad. v.		Urachne Trin. v. Piptatherum	751
Knautia	312	Uropetalum Ker. 800.	
Trichodium Schrad. v.		Urospermum Juss. 465.	
Agrostis	746	Urtica L. 694.	
Trichonema Ker. 768.		Urticeen	
Trichophorum Pers. v.		Juss. CVIII.	599
Eriophorum	711	Utricularia L. 636.	
Trientalis L. 637.		Uvularia L. v. Streptopus	668
Trifolium L. 169.			
Triglochin L. 729.		V.	
Trigonella L. 167.			
Trinia Hoffm. 277.		Vaccaria Moench. v. Saponaria	101
Triodia R. Br. 871.		Vaccineen	
Triphane Rchb. v. Alsine	114	DC. LXVIII.	435
Tripleurospermum C.		Vaccinium L. 499.	
H. Schltz. 415.		Vaillantia DC. 360.	
Tripolium Nees. v. Aster	319	Valantia L. v. Galium .	299
Trisetum Pers. v. Avena	761	Valeriana L. 361.	
Triticum L. 885.		Valerianeen	
Trixago Link. 591.		DC. LXII.	305
Trochisanthes Koch. 297.		Valerianella Moench. 363.	
Trollius L. 10.		Valisneria L. 721.	
Tulipa L. 785.		Velezia L. 98.	
Tunica Scopoli 99.		Veratrum L. 807.	
Turgenia Hoffm. 327.		Verbasceen	
Turritis L. 37.		Bartling. LXXXIII. .	476
Tussilago L. 373.		Verbascum L. 570.	
Typha L. 737.		Verbena L. 633.	
Typhaceen		Verbenaceen	
Juss. CXXIII. . . .	637	Juss. XC.	504
Tyrimnus Cass. 431.		Veronica L. 579.	
		Vesicaria Lamk. 55.	
U.		Viburnum L. 351.	
		Vicia L. 191.	
Udora Nuttall. 724.		Vignea Rchb. v. Carex	715
Ulex L. 158.		Vilfa Beauv. v. Agrostis	746

Register.		815
	Seite	Seite
Villarsia Vent. v. Limnanthemum	448	Wiborgia Roth. v. Galinsoga 328
Vinca L. 526.		Wiestia C. H. Schltz. v. Lactuca 399
Viola L. 90.		Willemetia Neck. 472.
Violarieen DC. IX.		Wulfenia Jacq. 581.
Viscago Moench. v. Silene	104	Wylia Hoffm. v. Scandix 285
Viscaria Riv. v. Lychnis	109	
Viscum L. 347.		X.
Vitex L. 634.		Xanthium L. 490.
Vitis L. 140.		Xeranthemum L. 449.
Vogelia Medic. v. Neslia	78	
Voglera Fl. W. v. Genista	153	Z.
Vulpia Lk. v. Festuca	773	Zacyntha Tournef. 481.
		Zahlbrucknera Rchb. 267.
W.		Zannichellia L. 732.
Wahlenbergia Schrad.	498.	Zea L. 823.
Waldschmidia Web. v. Limnanthemum	448	Zizia Roth. v. Petrocallis 65
Waldsteinia Willd. 205.		Ziziphus Tournef. 152.
Wallrothia Spr. v. Bunium	259	Zollikoferia Nees. v. Willemetia 396
Wibelia Röhl. v. Crepis	403	Zostera L. 734.
		Zygophylleen R. Br. XXVI. . . . 145

Nachträge und Verbesserungen.

- Ⓒ. 4, 3. 3 v. o. bei *Clemat. recta*, setze nach Nachen; auch an d. Elbe bis Barby, Schlessien u. nördl. bis Thorn.
- Ⓒ. 4, 3. 9 v. o. *Cl. Flammula*. setze noch zu: Var. ♂. *Cl. decumbens* Noë *Cl. maritima* All. Rehb.
- Ⓒ. 8, nach 3. 10 v. o. einzuschalten:
2. *Anem. angulosa* Lamk. bot. Zeit. 1851. p. 194.
Hepatica angulosa DC. *H. transylvanica*; Verhandlungen d. Naturhistorischen Vereins Siebenbürgens 1850. Nr. 6. Waldstellen in Siebenbürgen bei Kronstadt. 4
- Ⓒ. 25, bei *Delphinium Staphysagria*: I. ☉ st. ☉
- » 30, zw. *Nymph. candida* u. *N. thermalis* schalte ein:
4. *N. semiaperta* Klinggraeff Fl. v. Preussen p. 30.
Preußen im See bei Montken zw. Marienwenwerder u. Stuhm. 6—9. 4
5. *N. neglecta* Hausleutner bot. Zeit. 1850. p. 903.
Seen in Oberschlesien im Plesner Kreis und nach Galizien. 6—8. 4
- » 33, bei *Glaucium luteum* I. ☉ statt ☉
- » 34, bei *Corydalis pumila* Host. noch der Standort Halle an d. Saale häufig.
- » 36, bei *Fumaria micrantha* Lagase noch der Standort Böhmen um Karlsbad.
- » 37, » *Cheiranthus Cheiri* I. 4 statt 3
- » 39, » *Nasturtium palustre* I. ☉ statt 4
- » 40, » *N. pyrenaicum* R. Br. noch d. Standort Wald:

wiesen im Elbthale zw. Alten u. Eberitz, R.-B. Magdeburg.

©. 42, 3. 10 v. o. l. *A. saxatilis* statt *A. saxatilis*.

» 57, bei *Erucastrum obtusangulum* Rehb. noch den Standort Rassel am Druselgraben.

» 60, » *Diplotaxis viminea* DC. d. Standort Raffau am Weilbacher-Brunnen.

» 70, » *Subularia aquatica* L. d. Standort Braunschweig am Drömmlinge.

» 72, » *Iberis intermedia* Guers. gehört noch als Syn. *Ib. boppardensis* Jordan.

» 74, » *Lepidium perfoliatum* L. l. ☉ statt ☉; bei *L. ruderales* l. ☉ statt ☉

» 86, » *Viola collina* Bess. d. Standort Thüringen bei Ronitz, Saalfeld; zu *V. suavis* M. v. B. der Standort Thüringen Kaulsdorf bei Ronitz.

» 122, » *Stellaria uliginosa* Mur. l. ☉ statt 4; zu *St. crassifolia* L. setze noch 4?

» 151, » *Anagyris foetida* L. l. 3 statt 4

» 187, » *Vicia villosa* Roth. l. ☉ statt ☉

» 194, » *Lathyrus tuberosus* l. 4 statt ☉

» 195, vor *Orobanchis* einzuschalten:

25. *Lathyrus pisiformis* L. Garke. Fl. v. Nord- u. Mittel-Deutschl. p. 97. *L. mutabilis* Klinggraeff. Weichselgegend Marienwerder in einer Waldschlucht bei Fiblich. 7. 4

» 206, bei *Potentilla norvegica* L. l. ☉ u. ☉ statt 4

» 218, » *Alchemilla arvensis* Scop. l. ☉ statt 4

» 226, 3. 7 v. o. l. Darlanden statt Dachland.

» 227 » 21 l. *Myriophyllum alterniflorum* DC. statt *alternifolium*.

» 240, bei *Sedum hispanicum* L. l. ☉ statt 4; bei *S. villosum* l. ☉ statt 4

» 249, 3. 29 setze nach Kombarbei 6—7. 4 zu.

» 280, bei *Tordylium apulum* L. l. ☉ statt ☉

» 282, » *Laserpitium prutenicum* L. l. ☉ statt 4.

- 287, bei *Chaerophyllum temulum* L. l. ☉ statt ☉
 » 292, » *Cornus suecica* L. l. 4 statt 3
 » 310, » *Dipsacus pilosus* L. l. ☉ statt ☉
 » 321, » *Bellis annua* L. l. ☉ statt 4
 » 325, » *Pallenis spinosa*, l. ☉ statt 4
 » 327, » *Pulicaria vulgaris*, l. ☉ statt 4
 » 335, » *Artemisia scoparia* L. l. ☉ oder ☉ statt 4
 » 367, » *Galactites tomentosa* l. ☉ statt ☉
 » 376, » *Kentrophyllum lanatum* DC. l. ☉ statt 4
 » 381, » *Centaurea salmantica* L. l. ☉ statt 4
 » 383, nach Cent. *Calcitrapa* L. vor *C. calcitropoides* L.
 einzuschalten:
 51. *C. militensis* L. K. syn. in adnot. p. 475. An
 Rainen, Wegeränder, Rheing., Nassau auf Ewigkleedäcker
 bei Weilmünster, Hessen zw. Schönfeld u. Wäblers-
 hausen bei Kassel. 7—8. 4
 » 384, bei *Xeranthemum cylindraceum* Smith. l. ☉ statt 4
 » 407, » *Crepis pulchra* L. l. ☉ statt 4; bei *Hieracium*
lycopodifolium setze zu 4
 » 428 » *Campanula Erinus* L. l. ☉ statt 4
 » 429, » *Camp. Rapunculus* L. u. *C. patula* L. setze ☉
 statt 4
 » 435, » *Vaccinium uliginosum* L. l. 3 statt 4
 » 438, » *Bruckenthalia spiculifolia*. l. 3 statt 4
 » 460, » *Heliotropium europaeum* L. l. ☉ statt 4
 » 478, » *Verbascum floccosum* Sm. l. ☉ statt ☉
 » 483, » *Scrophularia vernalis* l. ☉ statt ☉
 » 488, » *Lin. Chalepensis* l. ☉ statt 4
 » 497, 3. 8 v. o., l. *Lin. fil.* statt *Host.* u. 3. 10 l. *Host.*
 statt *Lin. fil.*
 » 500, » 15 » » l. *atrorubens* statt *atrorubeus*.
 » 506, » 22 v. o. l. *atrorubens* statt *atrorubeus*.
 » 529, bei *Galeopsis pubescens* l. ☉ statt 4
 » 539, 3. 4 v. o. l. *Laxmanni* statt *Loxmanni*.
 » 557, » 35 l. *rupicola* statt *rupicula*.
 » 580, bei *Polygonum mite* Schr. l. ☉ statt 4

©. 605, 3. 8 v. o. l. 1849 statt 1839.

» 610, » 19, l. nepitifolia statt nepitifolia.

» 630, » 19, l. elongatus statt longatus; 3. 34 l. lucens statt luceus; ebenso 3. 35.

» 636, bei *Najas flexilis* l. ☉ statt 24

» 637, 3. 2 v. o. l. *Lemna* statt *Lemma*.

» 638, bei *Typha minima* Hoppe setze nach *Wenebig* noch zu 4—5. 24

» 695, » *Juncus triandrus* Cuss. l. ☉ statt 24

» 715, » *Carex baldensis* setze 24 zu.

Anmerkung. Am häufigsten vorkommende Abkürzungen sind folgende: *Compendium florum germanicarum* Tom. I. Par. 1 et 2. et Tom. II., steht *Comp. I. 1—2. et II.*; statt *Berg* steht gewöhnlich nur *M.* Die Zeichen der Ausdauer sind: ☉ für einjährige, ☉ für zweijährige und 24 für ausdauernde Pflanzen. ‡ bedeutet Strauch oder Baum.

